


Digitized by the Internet Archive in 2015



Paturgeschichte

in

getreuen Abbildungen

und mit

ausführlicher Beschreibung

berfelben.

Buhle (Chi).

Vöjge I.

Leipzig 1835, bei Eduard Gifenach.


Beit, bei 3m. Bebel.

RB QL Ager 673 p.114 B94

density of density the

All refugite one of the state of

DIE Maturgeschichte ührlicher Beschreibun derselben. Higel. Halberstadt, bei Carl Brüggemann Pesth, bei Otto Wigand.



Alphabetisches Register zur Naturgeschichte ber Bögel.

TO THE STANDARD				Alle Et a strongwist in			To local
26.			Geil	ie. g	Ceite		Ceite.
		Baumhader lang:		Colibri geschilderte	20	1 Elster	186
01.0	Ceil	e. schnablige	19		199	11. 3	187
Unsvogel		4 Baumläufer	19		20	- himmelblaue	187
— schmußiger		4 Barbacou	19			Emeu	280
Albler .	Transfer to		22		200	1	281
— Flußadler — gemeiner	2 2		22		201		348
- große Seeadler	2				201		351
Aldlerhabicht	2		17 16		200		351
- Königsadler	2		20		267		351
- Schreiabler	2		20	The second secon	127		353
Algami	28		20		63	- dinesische	352
Alibatros	33.			Cua	226	2,1119,11111	349
211t	32		200		226	Children	548
Alle, eigentliche	32				220	- AUMINIAN MED	349
- großer	32		r:	mil. 3	288	- Wildeente	352
Allpenschneehuhn	25		197		288	2	167
Ameisenfänger-	79		198		229	- Baum : Eule	39 43
Ameifenfreffer großer	75	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	198		229	- braune	51
— gezäumter	79				229	- gemeine	42
Ummer	151					- große Ohreule	44
— Buschammer	151		163		en la	- Habichteule	47
- Fichtenammer	155	Brachvogel	302		7	- flaffende Ohreule	
- Gartenammer	154	- große	302		242	- furjöhrige	41
- Goldammer	151	- tleine	284		172	- mittlere Ohreule	
- große Grauamme		The state of the s	59		65	- Echneeeule	46
— Lerchenammer	156		59	Droffel	66	- Sperbereule	46
- Rohrammer	152	- löffelschnablige	59		69	- 3mergeule	47
— Echneeammer — schwarzkappige	156		111	- von Reu: Guinea	72	- 3werg : Ohreule	51
— Spornammer	155			Droffel : Rohrfänger	100	Euphone violette	66
Anhinga schwarze	156	- Berg: Braunelle	112		72	8.	
Angeiger	343	- Seden: Braunelle	The second second	- Shild : Ming :			77
- weißschnablige	226	Buffarde - Huffard	51	Drossel	THE RESERVE	Fächerschwanz	62
Ara ganz blaue	227	- Mäuse : Bussard	35	- Echwarz : Droffel		Falcinellus Falte	305
— große rothe	233	- Rauchfuß: Buffare	34	- Wachholder : Drof:		- Braun : Falte	16
Arafari mit gefurch:	232	- Wespen : Buffard	34	- Bein : Droffel	72	- Blaufuß : Bürg:	19
tem Schnabel	0.7.	acipin Sullary	31	Drymophile	70 63.	falte	17
Araffari	231	C.		- Echleier : Drymo:	03	- Jagdfalte	16
Austerdieb	230			phile phile	63	— italiänische Falke	21
Austernfischer	286	Canarienvogel -	169		281	- rothfüßige Falte	20
andternitioner.		Cardinal : Finf	172		201	- Thurm : Falfe	21
	3	Cafuar	280	G.	9 4	- Tauben : Falte	17
23.	-	- gehelm te	280	Egrette 5	295	- 3wergfalte	20
The Hart Mark	N. N Brown B.	Chaja	310		Section 1	ajan	244
Bachstelje '	80	- graue		Eiderente 3			246
The state of the s		Cocorli		Eisvogel 2			244
	F-10-01-01-01	Solibri	199		808	- glangende Buid:	
	120				06	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	247
pr	110	- gemeine	20016	Sissturmvogel 3	31 .		247

Register.

	20			6	Seite. 1		Ceite.
	beite.		eite.	Jägereievogel		Läufer	287
Fafan, Gilberfafan	246	Geieradler, Bartgeier	11	- große	209	- ifabellfarbige	287 -
Federbuschreiher	294	- grave	13	- großschnäblige		Laufhuhn	265
Federschnabel .	190	- Greifgeier Condor		Jafamar	212	- fleine fampfende	265
— gritner	190	- Kanımgeier	12	- langschwänzige		Laufreiher	299
- meergrüner	190	- indische		Ibis	301	Langflauer	196
Feldhuhn	256	- Ohrengeier	10	- braune	501	- fpihschwänzige	196
- rothe	261	- weißtöpfige Girlis : Sanfling	169	- geheiligte	301	Larventaucher	325
Felshuhn	125 126	Goldhähnchen		Ibnau große	134	- Papageitaucher	326
Felsenhahn grüner	125	- feuertopfige	113			Leierschwang	79
- orangefarbener	261	- gelbköpfige	114	\mathcal{R}_{\bullet}		- prächtige	. 80
Felsenhuhn	328	Goldregenpfeifer		Kahnschnabel	292	Lerche	135
Fettgans, Pinguin	328	Goliath	234	Rafadu mit fcmefel:		— Allpenlerche	140
Fettaucher Fichten : Rreugschnabel		Grasmude	94	gelbem Federbufch	233	- Feldlerche	135
	157	- Garten : Gras:	Tra	- Temmindiche Ra=		- haubenlerche	138
Finte — Allpenfinte	163	mücte	109	fadu	233	- Beide : Lerche	139
— Bergfinke	162	- gemeine	109	Kamischi .	309	- Kalender : Lerche	140
_ Gartenfinte	162	Gymnops Dumonti	i 79	- gehörnter	309	- furgjehige	140
_ Jupiterfinte, Stieg		COES - COMP	4 10	Rampfhahn	306	Löffelente	350
	164	inner)		Rarmin : Gimpel		Löffelenten	350
lit Kitis : Laubvogel	116	చ్చు.	1	Raug gemeine		Löffler	300
Flache : Berg : Beifig	163	Habicht	26	- rauchfüßige	49	Löffelreiher	300
Flammant	316	- Fintenhabicht	27	Regelschnabel	177	Lory schwarzkappige	234
— rothe	316	- graufamer	27	Regelschnäbel	135		324
Fliegenfänger, feuer:		- Sühnerhabicht	27	Regelschnabel:Quiriva		- Brünnichische	324
rothe	62	Sadenfinte	176	Rernbeißer	170	The same of the same	
_ geflecte	59	Sadenternbeißer	176	Riebis	285	M.	
Fliegenfängerhähnchen	58	häher	187	- gemeine	285	Macrodactyli ga:	
- fleine	62	- Eichelhäher	187	- schwarzbauchige	285	mil. 5	309
— schwarzgraue	61	Sahn .	242	Riefern: Rreuffdnabel	175	Madenfreffer	227
— weißhalsige	60	- von Bankiva	244	Klaffichnabel	299	- großer	229
Tliegenschnapper .	58	- fupferfarbene	243	- blättchentragende	299	Mainate	74
- fabenschwänziger	59		245	Rleiber europäische	193	- iavanische	75
Fliegenschnäpper	58	1 1	243	Kletterschwanz	196	- indische	75
Rlossentaucher	329		284	Klettervogel	211 186	Maltoha	227
- gefledter	329		252	Rrahe glangende	288	- grüne	227
Franklin mit roftfars		Haus : Nöthling		Kranich — gemeine	289	Monatin eigentliche	126
bigem Halsbande	256		238	- weiße amerifa:	209	- Barimannchen	125
Fregatvogel	341	hotto	237	100	291	- fadenichwänzige	126
— große	341		237	Kranichgeier	28	Marial	238
Fregilus	201	Sornvogel abnffinische	227	Branichaeier ofrifanisc			196
Flughuhn			210	Kreusschnabel	174	tress limbered	196
- Lichtensteinische	256 256		014	0	222	Meer = Seeldmalbe	337
— spihschwänziges	230	- mit glattem horn	211	Later Charles and Control of the Con	222	- caspische	338
March - Committee		- rothhornige	211	-Y"manha	225	- peruanische	339
S.		Suhn	226		225		338
Att 2	346		255	6 (51	120	Meise	141
Gans Warrann			200		man	- Barmeise	148
- Grau : Merzgani		- 12 TO 12 T		e.	100	- Beutelmeife, Pe	
- Saat : Moorgani	9		20 -	Lamellirostres Fa:	An	bulin	149
Garten : Möthling	40	Control of the Contro	298		344		145
Geier	4	14 144		Langschnäbler	300		
Geierabler	1						

Register.

	,		W . ! & a W		Seite.		Seite.
	Seite.		Seite.	Rebhuhn gemeine		Schmudvogel rothe	63
Meise, Haubenmeise	144	Paradiesvogel, Königs:		Megenpfeifer		Schnapper	64
— Langschwänzige	160	Paradiesvogel ,		Reiher	292	- blaue	65
Meisen	147	— prächtige		Reiherden	299	Schnarrer	311
- Lafur : Meise	146	— sechsfadige — Paradies : Witwe	1	- grave	292	- Wiefenknarrer,	
- Rohlmeise	141 148	Papagei	231	- getiegerte	294	Wachtellonig .	311
- Rohrmeisen	147	— Almajonen = Pa=	-	- fleine		Schnepfe	300
- Schwanzmeise	144	pagei	234	Miesenvögel .		Schnepfen, eigentliche	302
- Eumpfmeise	143	- gefrönte	234	Rinnenschnabel	227	(Schnepfe), Bogen:	
— Tannenmeise	143	— rothschwänzige	234	- Neu Souandische	227	schnepfe	304
— Waldmeise	71	- weißtöpfige	234	Rohrdommeln	295	- große	302
Merle blaue — Stein : Merle	71	Barragua	238	Rohrdommel große	295	- Heerschnepfe	304
	334	Petitane	340	Rohrhuhu	312	- madagascarische	304
Meve	337	Pelifan gemeine	340	- grünfüßige	313	Schwalben	127
Mevenbüttel	336	Perlhuhn gemeine	241	- punttirte	312	- eigentliche	129
Meve große	335	Pfauenargus	247	None	191	— Felsenschwalbe	132
— Ladimere	335	Pfan wilde	239	- violette	191	— Hausschwalbe	132
Meve, Mantelmeve	336	Pfingstvogel	77	Nosengimpel	177	— Louisianische	132
Naubmeve	335	Philedon	74	Rothtehlden: Canger	87	— Rauchschwalbe	131
Silbermeve	29	- paradoxus	74	Ruderträger	65	Schwäßer	75
Milanen Milan kleine	31	Picoides	220			- Wasserschwäßer,	
	29	Pieper	122	6.		Wasserstaar	73
— rothe — fcwarzbraune	30	- Baum : Pieper	122			Schwan	344
, , ,	75	- Brach : Pieper	122	Sabelidnabel .	308	017	345
Mino Mornell	284	- Waffer : Pieper	125	- blaufüßige	309	- ftumme	344
	235		124	Säger, Tauchgans	353		346
Musophaga		Pirol	77		353	. ,	317
\mathfrak{N}_{\bullet}		Pitangua	58	- langschnäblige	354		330
Nachtigall : Sänger	95	1,	102		208	1 7	171
Nachtrabe	296		208	Salangane	132		334
Nachtreiher	296		209	Sandhuhn	315		
Nakhornvogel	209		135	- öffreichisches	315		320
Nimmerfatt	299		135	Sänger gelbbäuchige	114		323
- afritanische	299		238		103		323
Nußfnader	189		281	Sariama	287	Segler	127
(4)		Marmeiher	293	- geschopfte	287	— Mauerfegler, Thurmschwalbe	407
5.		Durpur : Gultanshuhi	n 313	Saxicola imitator	86		127
Ochsenhacker	177	- blaue	314	16 charve	341		63
- rothschnäblige	177		***	Scharben, eigentliche	341	Seibenschwanz Silberreiher, große	295
Onoré	294	R.		- Kormoranscharbe	298		294
Ordnung I. Naubvö	gel g		400	Schattenvogel	298		
— II. Sperlingsar		Rabe	180		~	- graue	233
ge Wögel	52				339		233
- III. Klettervöge			.180			Sonderling	305
— IV. Hühnerarti	ge	- Nebelrabe		Scheidenhuhn		Connenreiher	291
Wögel	236		181		OIO	Spaltschnäbel	127
- V. Stelzvögel	277		182	1 - 17 0 1	343	Specht	112
— VI. Schwimm:		Mate	190		116		
vögel	317		4.04	Schlüpfer	63		
P.		frahe		Schmudvogel	Ģ0	- größter	217
		Nalle	311		63		218
Paradiesvogel	194			_ Quereiva	63		
— große	19:	2 Naubvögel		- Wentellon			

Register.

	. ، ، بج		~ .		~ .		~
Specht, Grauspecht	Seite.		Seite.		Seite.	Waldhuhn, boppelflit	Geite.
	215	- marketting		Taube spanische, ro:		, , , , , , ,	
- Grünspecht	214		294	mische Taube	272		253
Spechtmeise	195	11211	204	- Trommel = Lated		— Mittel: Waldhuhi	
Specht, Mittelspecht	217	- prächtige	204	taube	272	Waldlaubregel	115
— Schwarzspecht	213	- folge	204	- Türkische	272	Wasserhuhn .	312
Sperber : Grasmiide	104		335	- Turtel : Tanbe	273	- schwarze Hurbel	314
Sperlinge eigentliche	157	- Verardische	333	— Wandertaube	275	Wasserhühner	514
- Feldsperling	159	Sturmtaucher nordi:		Tancher	320	Wasserläufer	307
- Haussperling	157	scher	353	Taucherhuhn	322	- grünfüßige	307
- Steinsperling	160		332	Taucherhühnchen fleir		Webervögel	157
Spihschwanz, gelbe	233		352	- Krabbentaucher		Weichschundel	65
— schuppige	233	- fleinste	332	Taucher surinamische	322	- Guira : Punga	65
Spornflügel. Jakana	309	Sturmvogel	331	Tinamu	266	Weiden : Laubvogel	116
- braune	309	Sui = Manga	199	- fálbe	267	Weihen	55
— mit großem Kamm		- ftolze	199	- fleine	266	- Korn : Weihe	55
Spornfudut	226	Sumpfläufer -	304	Tölpel	342	Weihe Mohrweihe	56
Sprosser : Sänger	98	- rostrothe	304	- weiße	542	- rostfarbene	57
Sprungtaucher .	328	Sumpfvögel-Ufervögel	277	Tord = Alf, Klubalk	. 327	- Eumpfweihe	57
— goldhaarige	328			Torotoro	208	- Wiesenweihe	56
Elaar	178	T.		Totipalmati Jamil.	3,559	Weißkehlchen, kleines	106
Staar-Umfel	75	~		Trappe	282	Weitmund	126
Ctaar : Doble zwei:		Talapiot :	196	- große	282	Wendehals	220
bindige .	178	Tangara	65	- fleine	282	- gemeine	220
rothflügelige	178	Tangara, rothhaubige	66	- Kragentrappe	282	Wiedehopf	201
Steigschnabel .	194	- fiebenfarbige	66	- Swergtrappe	282	- gemeine	202
- hoffmannbeggifche	194	Tannenhäher	189	Trompeter sogel	288	Miedehopf im engern	
Steindohle	76	Tauben	267	Tropifvogel	345	Sim	202
Steindohle, Allpenfrahe	201	Taube der Barbarei	272	- rothschwänzige	343	Wiesenschwäher braun	12
Cteinfeldhuhn	259	- Brieftaube	272	Truthahn gemeine	240	fehlige .	82
Steinpider, graurudige	84		271	- geäugte	241	— schwarzsehlige	82
Eteinrabe .	-76	- gehäubte	277	Tichitret	59	Würger	53
Steinschwäßer, weißlich	86	- Gewürztaube	277	Tufan	230	- afchfarbige, große	53
Cteißfuß	320	- Saustaube	272	- Tofo	230	- gehelmte	58
- gehäubte, Kronen:	:	- Helmtaube	272	- mehrfarbige	250	- fleine graue .	55
taudjer	321	- Holztaube	269	Tufnamcurvi	157	- rothtöpfige	56
- geöhrter, Ohren:	- 1	- Kronentaube		Turafo	234	rothrildige.	56
taucher	522	- Rropfinube	272	- guineische	235		
Stelzenläufer, Strand:		— Lachtaube	274	- rothhaubige	255	. 3.	
reiter	308	- Mähnentaube	273	Tyrannus		Bahnfchnäbler	55
— schwarzflügelige	308	- Mönchstaube	272		00	Bauenfönig	116
Steljvöget	277	- nicobarische	268	u.		Biegenmelfer	135
Stordy	296			Ufervögel	277		133
— schwarzer	297	- Pfauentaube	272			Bitronen = Beifig	168
- weißer	296	— Porphyrtaube	275	W.		Budervogel, Blumen:	100
Storche mit nadtem !		- prächtige Taube	275	Wachtel	262	sauger	197
Stropfstörche	297	- Purzeltaube	272	- gemeine	262	Zwergrohrdommel	293
Storch Marabu	297	- Reitertaube	272	- fleine	265	Zwergstrandläufer (Ca	
Strandläufer frumm:		- Ringeltaube	268	Waldhuhu -	248	lid. minuta)	305
fchnablige	305		273	— Auer = Waldhuhu		Swergstrandläufer (Sc.	
Strauß afritanischer	278	, ,	272		250	lopax pygmaea	306
- icanh uletenminger	0	- Capital change	24 6 24	- Sur zomeganja	. 200	ropax pygmaea	000

Einleitung.

Su der großen Abtheilung der Ruckgrat= thiere gehoren auch die Bogel, fie bilden die 2te Familie der Warmbluter. (Rach Linn. II. Rlaffe Aves.) Go wie die Fische Rinder des Waffers, so konnen die Bogel die Rinder ber Luft genannt werden. Gie find die aus= gezeichnetsten und gleichformigften Knochenthiere, unter einander sich fehr ahnlich, und es laffen sich keine llebergange, so wie etwa durch die Ballthiere (Ballfische) bei den Saugethieren zu den Fifden, nachweisen. Leicht find daher auch die Rennzeichen aufzusuchen, welche fie von den übrigen Sauptabtheilungen unterschei= den, als: der bewegliche, lippenlose Oberfiefer, die aftigen hautgewächfe (Federn), die Flügelform der Border= und die Fußform der hinterglieder. Dies wenige wurde fie ichon vor allen übrigen auszeichnen.

Thre luftige Natur fpricht sich durch ihr Klugvermögen, durch die ausnehmende Erweites rung ihrer Athmungsorgane, ihre doppelte Nespiration und Sirculation und überhaupt durch ihre Flugapparate unverfennbar aus, daher man sie auch wohl Luft=*) und Brustthiere nennt. — Nur an den eigentlichen Insesten sinden sie in obiger Hinsicht ihres Gleichen.

Was ihre nahere Organisation betrifft, so bemerken wir davon nur kurzlich Folgendes. Die Masse des Gehirns ist im Berhaltnis zur Große des Korpers beträchtlich. Was die Geruchsorgane betrifft, so sind die Nasenloscher fast immer seitlich und weit von der obern Kiefernspise entsernt, übrigens nach Verschieschneit der Bogelart auch sehr verschieden. Die Augen sind dagegen enorm groß und nur die Augen der Insesten gleichen ihnen an Umfang

und Maffe. In den Seiten der harten Uu= genhaut (sclerotica) befindet fich ein, aus fno= chigen Schuppen gebildeter Ring, welcher mit feinem vordern Rande fast bis zur Sornhaut reicht und bei ben Gulen gang besonders ent= wickelt ift. Außer dem obern und untern Au= genliede ift auch das dritte oder innere, Bling= oder Dicfhaut, fehr entwickelt. Gie ift halb durchsichtig und-zieht sich vom innern oder vor= dern Augenwinkel nach dem außern oder hin= tern, und fann immer das Auge vollig bedef= fen und schützen, ohne den Ginfall des Licht= ftrahls ganglich zu hemmen. — Das Dhr scheint minder ausgebildet als bei den Gauge= thieren, doch horen fie fehr leife und haben dabei eine fehr richtige Empfindung, fo daß fie Melodieen und Worte vollfommen nachah= men fonnen, was fonft außer dem Menfchen fein Thier fann. Die außere knorpelige Dhr= mufchel fehlt allen, und man bemerkt nur bei einigen, 3. B. bei den Gulen, Sautfalten um die Ohröffnung, welche mit Bulfe der im Rreife ftehenden Federn jenen Mangel erfegen. Die Bunge Scheint mehr Ingestions = als Ge= schmackborgan ju fenn, indem man fast gar feine Papillen mahrnimmt. Sinten ift fie ge= theilt; vorn aber bald einfach fpigig, bald ge= fpalten, bald gezasert, abgestumpft, mit Bor= ften befett zc. Bei einigen ift fie fehr furg, ob fie gleich lange Schnabel haben, wie bei den Storchen, Wiedehopf und Gisvogel. Die Bungenbeinhorner find bei einigen Gattungen ausnehmend dunn und lang; fie reichen dann von hinten nach oben wohl über den gangen Schadel hinmeg, laffen fich aber vorn, in ei= ner fleischigen Scheide verbunden, mit ber ei= gentlichen Bunge weit aus dem Schnabel her= vorschieben. Go ift die rinnenformige Gonell= junge bei Spechten und dem Drebhals. -Die Saut, als Organ des Gefühls, besteht

^{*)} Zwei Sperlinge confumiren eben fo viel reine Luft, als ein Meerfdweinden.

aus Ober=, Schleim = und Lederhaut. Die Haut des Schnabels ift bei einigen sehr weich und wegen vieler, unter ihr liegenden Nerven= warzchen sehr empfindlich; dies vielleicht das einzige Tafforgan. — Ift der hintere Theil der nachten Schnabelbedeckung etwas weicher und durch eine Falte oder Furche von dem vordern hartern geschieden, so wird dadurch die soge=

nannte Bachshaut gebildet.

Die haut aller Bogel ift bis auf wenige Stellen mit aftigen, pflanzenahnlichen Gebil= den oder Federn bedeckt. Diese Bedeckung ift den Bogeln allein eigen und fie fommt nirgends als etwa bei den Infeften vor. Gie find unempfindlich wie die Haare, aber doch meit vollfommenere Gebilde. Berftummelt er= feten fie sich nicht, ob sie sich gleich jahrlich 1 - 2mal gang neu bilden. - Gine vollfom= mene Feder beffeht aus: Stamm, Meften, Die Aleste sigen Strahlen und Zasern. zweireihig am Stamme, die Strahlen eben fo an den Ueften, und die Zasern an den Strah= len. Die Schnurrborften an den Backen oder Bugeln, oder am Rinne, bei einigen vorfom= mende Augenwimpern; die fachelartigen Ricle an den Flügeln des Rasuars und andere, ma= then hiervon eine Muenahme.

Uebrigens ift die Berschiedenheit des Do= gelgefieders unendlich groß. Bunachft theilen wir es in Flaum= und Conturgefieder. Erfteres liegt verdecft und im Dunfeln, ift fehr gart, die Strahlen deffelben find größten= theils fadenformig, fehr fein und von Abstand ju Abstand mit regelmäßigen oft schwarzen Rnotchen, dem bewaffneten Muge einen fcho= nen Unblick gemahrend, verfehn. Das Cons turgefieder ift im Gangen farter, ftraffer, fteht meift zu Tage aus und die Strahlen find mehr blattartig und verketten meift auf eine auffallende Weise die neben einander fte= henden lefte durch fehr feine Sachten; eine jum Fluge hochft wichtige Ginrichtung, die Luft ju ichlagen. Bei Bogeln, die nicht gum Flug bestimmt waren, fo wie an dem Flau= mengefieder fehlen diefe Sackchen. Die Contur= federn figen, zwischen fich Dunen oder flau= mige Federn habend, in regelmäßigen fich det= fenden Reihen (in quincunce) im Felle, mel= ches fie meift faft gang durchbohren. Gie mas chen die Borderglieder zu eigentlichen Flugor= ganen, indem fie an der Sand und dem Bor= derarme jedes Flügels an den Knoden der Flugel mit ihren Rielen beweglich angeheftet fich

fächerförmig ausbreiten und zusammenlegen las= fen. Oben und unten find die Schwungfedern mit einer Deihe ahnlicher, aber furgerer Deck= federn verfehen. Un den Schwanzwirbeln fte= hen abnliche lange Conturfedern, Steuer= Schwanzfedern genannt, beim Fluge von Bichtigfeit. — Die Federn find es übrigens, welche jene gefälligen, fanften Umriffe, jene oft prachtvollen Farben und Zeichnungen geben und verbunden mit ihrer Behendigfeit und man= nigfaltigen Stimme diefer Rlaffe einen Borgug geben, und fie bei vielen Menfchen gu Lieb= lingen machen. Bermoge eigener Muffeln fon= nen fie ihr Gefieder ftrauben. - In Bezug auf die Federn gedenfen mir noch der Bur= geldrufe, auf den Schwanzwirbeln aufliegend. Diefe Del = absondernde Doppeldrufe mit einer gemeinschaftlichen oder zwei fehr genaherten Deffnungen nach außen, dient den Bogeln, ihre Federn mit den bligen Absonderungen dar= aus einzufalben, um fich fo gegen Ragmerden zu schützen.

Werfen wir nun einige Blicke auf die Theile, die das Rnochengerufte bilden, und wodurch fie sich noch mehr von der Form der Saugethiere entfernen. Buerft bemerfen wir vollige Zahnlofigfeit der Riefern (denn die bei einigen Baffervogeln vorfommenden fogenann= ten Zahne werden nur durch die hornichte Be= deckung gebildet); die fehr großen Augenhöhlen; die Gange der Geruch=, Gehörorgane und die merkwürdigen Hebelapparate des Ober= und Unterfiefers. Die Hirnschale bildet bei ausge= wachsenen Bogeln (denn sie verwachsen sehr fruh), eine gang ungetheilte, fnocherne Rap= Die Riefern beffehen auch aus mehrern Anochen: sie bilden mit ihrem nackten Ueber= juge den Schnabel, der fehr verschieden an Große und Form nach der mannigfaltigen Nah= rung und Lebensart der Bogel eingerichtet ift, und bei Bestimmung ihrer Familien und Gat=

tungen fehr gute Rennzeichen abgiebt.

Un der Wirbelfaule der Bogel laffen sich nur die Regionen des Halfes, des Ruseschas, des Beckens und des Schwanzes deutslich unterscheiden, indem die Lendenregion mit der Beckenregion verschmolzen ift. Die Zahl der Halswirbel, die bei den Saugethieren nie über 7 steigt, beträgt bei den Bogeln 9 bis 32. Sie sind immer zu einer Sformigen Biezung des Halfes eingerichtet, sehr beweglich und verschieden gestaltet. Der Rückenwirbel, nach der Zahl der Rippenpaare bestimmt, fom

men 7 bis 11 vor. Beckenwirbel, 9—20 an der Zahl, verwachsen meift alle unter einander zu einem ganzen Stück. Die Schwanzwirbel 5 bis 9 sind alle meist sehr beweglich. Sede Rippe, auch abweichend von denen der Saugethiere gebildet, hat mit Ausnahme der letzen und ersten, einen schrägen nach hinten geshenden Aft, der sich auf die folgende Rippe auflegt und in der Jugend ein eigenes Knochenstück bildet.

Das Bruftbein ift durch feine Große und Gestalt sehr ausgezeichnet, um dadurch dem Bruftmustel eine ausgedehntere Flache zur Anfügung zu geben. In der Lange hat es noch eine oft sehr erhabene Leiste, die man nur bei nicht fliegenden vermißt. Nach dem Un=terleibe zu, bildet es meist jederseitig einen oder zwei Fortsabe. Daher obiger Name Bruft=

thiere.

Stark ausgebildet, auf das Flugvermögen beziehend, finden wir auch die Schulterknoschen. Alle Bogel haben Schluffelbeine von ausnehmender Starke, fehr fest und doch beweglich mit dem Bruftbein verbunden und überdem durch das fogenannte Gabelbein (furcula), das ein zu einem Stuck verwachsenes Paar Schluffelbeine darftellt, gleichsam verdoppelt. Die Schulterblatter find ebenfalls ffark, aber stets schmal, lang, gabelformig.

Die Borderglieder, die eigentlichen Flugorgane, zeichnen fich besonders bei allen fliegenden Bogeln durch betrachtliche Lange aus. Sie gleichen in ihren wesentlichen Ubtheilungen den Bordergliedern der Saugethiere, indem fie genau betrachtet aus Obers, Borderarm und

Sand befteben. -

Die Buft= oder Beckenknochen sind meift mit den übrigen Knochen, die die Rusfen=, Lenden= und Kreuzwirbel bilden, in ein

einziges Stuck vermachfen.

Die hinterglie der oder Füße von verschiedener Bildung und Länge theilt man in Obers, Unterschenkel, Untersuß oder Ferse und Zehen ein. Der Oberschenkelknochen, die Kniesschen im Ganzen denen der Säugethiere. Das Maximum der normalen Zehenzahl ist 4. Eine fünfte Zeh ist immer Monstrosität, und kommt bisweilen bei hühnern vor. Sind nur 3 Zeshen da, so sehlt fast immer der Daumen, seleten die äußere Sgliedrige Zeh. Zwei Zehen hat nur der Strauß. Selten sind alle Zehen nebst Daumen nach vorn gerichtet, wie etwa

bei unferer Mauerschwalbe. Bei Kletterfüßen hat sich die Sgliedrige Beh vollig nach hinten gewohnt, fo daß fie bald ruchwarts, bald vor= warts geschlagen werden fann. Einige haben Beben mit breiten Gaumen verfeben, Lappen= fuße, bei andern find fie durch Saute verbun= den, Schwimmfuße. Ginige haben auch fehr lange Behen, andere mieder furge. Ginige haben nur furze hautige Berbindungen, dere dagegen haben auch Fuße, die mit fehr fcharfen Rlauen zum Festhalten der Beute vers feben find. Much haben einige eine Urt Gpo= ren an den Fußen, die sie zur Bertheidigung ju gebrauchen miffen. Man hat diefe Ber= schiedenheit der Fuße auch mit als charafteri= ftifche Merkmale der Familien und Gattungen febr zweckmäßig benußt.

Bei mehrern Bogeln erweitert fich Schlund ichon vor feinem Gintritt in ben Rumpf in einen fogenannten Kropf, worin das Futter vorläufig erweicht wird, che es in den Vormagen und Magen fommt. Nach ges haltener Mahlzeit tritt er sichtlich hervor oder lagt fich doch leicht fuhlen. Der eigentliche Magen wird bei fehr vielen befonders forner= fressenden Bogeln von 2 bisweilen ungemein ftarfen, durch ftrahlige glanzende Schnen ver= bundenen Muffeln gebildet, indem er inwendig mit einer harten lederartigen haut ausgeflei= det iff. Bei den mehrften fleischfreffenden aber find die Bande fehr dann und hautartig. Das Gedarm ift im Gangen furger als bei Gauge= Der Maftdarm aller Bogel ift vor feinem Uebergange in den Ufter in eine Cloaca erweitert, in welche Geschlechte = und Urin=

werkzeuge sich offnen.

Bu den merkwurdigen innern Organen ber Bogel gehören auch noch die Athmungsor= gane, mit dem die Stimmorgane in un= mittelbarer Berbindung ftehen. Die Luftrohre oder Gurgel zeichnet fich faft immer durch gan= ge, meift fnochige Ringe und einen 2ten Rehl= fopf an ihrem untern Ende aus. Der obere Rehlfopf tragt wenig zur Bildung der Stimme bei, vielmehr der gang eigen gebildete zweite. Bei mehrern Wogeln, besonders aus der Fa= milie der huhnerartigen und Baffervogel, fins den fich eigene Biegungen und Erweiterungen der Luftrohre oder fnocherne Paufen am un= tern Rehlfopfe, die ebenfalls auf die Stimme Bezug haben, und meift bei den Mannchen angetroffen werden; auffallend bei mehrern En= tenarten. Die Lungen find fest an den hintern

Theil der Rippen und die Ruckenwirbel an= gewachsen; fie bleiben ftete auch bei der groß= ten Musdehnung weit vom Brufibein entfernt, fullen auch nie die Brufthohle aus, die auch nie von der Bauchhöhle getrennt ift. wurdig ift, daß die eingeathmete Luft feines= weges fich auf die Lungen beschranft, sondern durch mehrere Locher aus den Lungen her= aus in dunne hautige Bellen des Rumpfes geht, fo alle Eingeweide bespült und fogar bei fehr vielen Wogeln in die markleeren Sohlen meh= rerer Anochen, doch nie in die Federspulen dringt. Man findet in dem Bogelrumpfe meh= rere folder Luftzellen vertheilt. Die Luftmenge, die darin enthalten ift, tragt zu ihrer Stimme wefentlich bei, und die Luftrohre mit ihren verschiedenen Geftalten und Bewegungen gu Merkwurdig ift noch der ihrer Modification. Umstand: daß die Ropffnochen nicht von den Lungen, fondern gleich von der Rafe aus mit Luft gefüllt werden. Es ift alfo ein eigener Despirationsapparat im Ropfe angelegt und auf diefen beschrankt. Wie unterftuten nicht diese merkwurdigen Ginrichtungen das Flugver= mogen, besonders bei großern Bogeln! -Durch diese so ganz eigene Einrichtung wird das Blut 2mal, nehmlich sowohl in den Lun= gen, als auch außerhalb derfelben dem Ginfluß der Luft ausgesett, und mit Sauerftoff verfe= Daher ihr gesteigerter Puloschlag und Die Starke der Brritabilitat, worin fie alle übrigen Thiere übertreffen.

Das Herz liegt symmetrisch in der Mitte bes vordern Theiles der Bruft. - Die Le= ber ift groß, am größten aber bei Baffervo= geln, fie liegt in der Bauchhöhle. Die Gal= lenblafe fehlt nur felten. Die Milz, welche hinterwarts am Bormagen liegt, ift nur flein. Die Nieren find am größten bei Waffervogeln. Sie fangen vom hintern Ende ber Lungen an und nehmen den gangen Rudentheil des Befkens ein, indem sie seine großen Gruben ganz ausfüllen. Die harnleiter geben unmittelbar in die Cloaca; es mischt sich der falfige Urin mit dem Rothe und wird mit diefem zugleich ausgeworfen. Rur der Strauß hat eine Urt Barnblafe. Die Rebennieren find flein, gelb= lich oder orangefarben, unter dem vordern Ende der Nieren liegend.

Die beiden Gefchlechter laffen fich oft ichon von aufen unterscheiden; indem die ausgebilbeten Mannchen meift durch ichoneres und lebhafteres Gefieder fich auszeichnen; die Soden liegen in der Rumpshöhle, von Geffalt langslich, bisweilen auch rund; zur Begattungszeit besonders vergrößert. Die Saamgange gehen geschlängelt unmittelbar zur Cloake, wo sie neben den Harnleitern munden. Nur der Strauß und die Enten haben eine Ruthe. Die weiblichen Geschlechtstheile sind einfach und besstehen in einem traubenformigen, in der Lenzbengegend am Rucken sigenden Gierstock und einem geschlängelten, darmähnlichen Schlauch mit zwei Mundungen, von denen die vordere frei in die Bauchböhle geht, die losgerissenen Sier aufnimmt, die andere aber zum Ausfühzen sich in die Cloake öffnet.

Bis hierher betrachteten wir den Wogel nach feiner eigenthumlichen Organisation; jest aber wollen wir einiges von feinem außern Le= Gie bilden also die ein= ben fennen lernen. zige Gruppe der Rückgratthiere, welche durch= gangig blos mit den hintern Gliedern auftritt, und fo nahert fich ihre Stellung, mehr oder weniger, der aufrechten des Menschen. Die locomotiven Bewegungen der Bogel find der Gang, Flug und das Schwimmen. Die Be= wegung mit den Fugen ift verschieden, indem einige schreiten, andere hupfen, flettern u. f. w. Bei den lettern gebrauchen einige auch fehr ge= schieft den Schwang, fich damit zu halten, oder auch den Schnabel.

Co wie die Bewegung auf dem Lande und Baffer hochst verschieden ift, und die Gattun= gen und Urten sich dadurch auszeichnen, fo auch der Flug. Manche haben einen ichme= ren, andere einen leichten Flug. Manche er= heben fich durch einen Sprung in die Luft, manche nehmen dazu einen furgen Unlauf: Die Mauerschwalben konnen sich wegen ihrer kurzen Füße und langen Flügel gar nicht von der platten Erde erheben. Mus der Urt des Fluges fann man bei gehöriger Hebung die Urt erkennen, und es gewährt Bergnugen, dies zu beobachten, wie sich einige zu den Bolken in Kreisen erheben, andere gesellschaft= lich, wie die milden Ganfe, Rraniche u. f. m. regelmäßige Binkel beim Flug beobachtend hoch erhoben, den Flug dadurch zu erleichtern, gie= hen. Einige fliegen fehr schnell, so hat man 3. B. berechnet: daß eine nach Baufe eilende Taube in 5 Sekunden einen Raum von 100 Schritt durchflog; hiernach also 5 Meilen (die Meile zu 12,000 Schritt) in einer Stunde durchfliegen fann. Rur die neuen Dampfma= gen auf Gifenbahnen, die in der gleichen Beit

6 Meilen durchlaufen, wurden fie übertreffen. Wie schnell konnen sie sich also beim Zuge von einem Orte zum andern bewegen! — Die Außdauer des Fluges ist bewunderungswurdig. Sie seigen über die Meere und den Fregattvogel, den man nie auf der Wasserssäche sissend und schwimmend sindet, hat man in offner See 400 Meilen weit vom Lande angetroffen. Unsfere Mauerschwalben sliegen den ganzen Zag

faft ununterbrochen herum.

Ginige machen beim Fluge ein Beraufch, andere schweben fanft, ohne daß man es bort, porbei; zu den erfteren gehören z. B. die mil= den Enten, ju den andern die Gulen und Sag= Gine große Berfchiedenheit herrscht auch beim Schwimmen und Sauchen. Lestes res halten fie jur Bewunderung lange aus, theils Rahrung unter dem Baffer und auf dem Grunde deffelben zu fuchen, theils Wefah= ren zu entgehen. Einige find dabei fo blig= fcnell, daß fie dem Schuß entgehen, denn in dem Augenblick, da das Feuer von der Pfanne leuchtet, find fie auch ichon unter das Baffer und die ankommenden Schrote fchla= gen vergebens auf die leere Stelle. Um fchnell wieder die Oberflache des Waffers zu erreichen, fcnellen fie mit den farfen Schwanzfedern auf den Boden, wodurch sie denn sehr bald zur Dberflache fich erheben.

Die Bögel sind sehr empfindliche Geschöpfe, daher ihnen auch, wenn sie gleich zahm sind, die leiseste Berührung unangenehm ift. Diesses seine Gefühl und die auf sie so leicht einswirfende Luft veranlaßt, daß sie die Berändezrung der Utmosphäre voraussuhlen, was man auch aus ihrem Betragen leicht merken kann, denn Mangel an Eflust, und ungewöhnlich häussies Krähen unserer haushähne fündigt Negen

oder Sturm an. *)

Die Scharfe des Gesichts ift bei einigen außerordentlich, denn nicht selten sioft der an den Wolfen schwebende Naubvogel auf den Lockvogel, den der Bogelsteller zum Fang ahn= licher Bögelchen auf dem Heerde aufgestellt hat, von dieser Sohe mit Blisschnelle herab. Leise ift auch ihr Gehör, denn das kleinste Gezausch weckt ihre Ausmerksamkeit. Bei einigen ift auch der Geruch sehr scharf, so 3. B. witz

tert der Kolfrabe frundenweit Aas aus, und den Enten fundigt der Geruch den verborgenen Schügen in weiter Ferne an. Der Geschmackssinn scheint zwar nicht sehr ausgebildet zu senn; indessen sieht man doch, daß sie unter ihren gewöhnlichen Nahrungsmitteln eine Auswahl treffen.

Bas die Seelenfrafte betrifft, so sind eisnige sehr gelehrig, andere dagegen dumm. Das Gedachtniß scheint bei einigen sehr gut zu seyn und wollen wir mit Gall sprechen, so muß bel den Zugvögeln, die ihre alten Nester siets wieder aufsuchen und finden, der Ortssinn sehr entwickelt seyn. Ihre Phantasie ist lebhaft, was man bei ihrem Schlase bemerkt hat, instem sie oft lebhaft traumen. Ihr Schlas ist übrigens kurz und sehr leise. Die Baldvögel schlasen meist von der Abend sie zur Morgendammerung. Die Sumpf und Wasservögel gegen Mittag, da sie meist Nachts ihrer

Nahrung nachgehen.

Alle Bogel, so weit man fie beobachtet, fonnen eine Stimme von sich geben, die bei einigen oft fehr angenehm ift. Gie lernen auch, jung aufgezogen, die Stimmen anderer Wogel tauschend nachmachen, Stuckchen pfei= fen, ja Worte aussprechen, mas sich bei fei= ner andern Thierklasse findet. Um geschickte= ften find hierin die Mannchen. - Gie geben dadurch ihre Gefühle zu erkennen, besonders jur Beit ihrer Liebe. Ginige Stimmen fchei= nen auch allen Gefiederten verffandlich zu fenn, 3. B. der Ungftruf eines Bogele, der einen Feind erblickt, wie etwa einen Raubvogel, in= dem sogleich alle Sanger schweigen, bis die Gefahr vorüber ift, liefert hierzu den Beweis. So bemerkt man auch eigene Locktone auf ih= ren Reifen, um fich zusammenzuhalten, mas man fonft nicht hort. Einige fingen faft das gange Jahr hindurch, andere nur jur Begat= tungezeit. Um ichonffen ift dies mit Unbruch des Tages an einem ichonen Maimorgen, im Für einen gefühlvollen Menschen Laubholze. ein mahrer Genuß! - Den Unfang macht meift der Rufuf, ihm folgt der Pirol mit fei= nen Orgelionen und dann begrußen auch bald die fommende Morgendammerung taufend froh= liche Ganger im Bald und Felde.

Bas ihren Aufenthalt betrifft, so sind sie über alle bekannte Lander verbreitet und da am meisten, wo die verschiedenen Arten die reich= lichste Nahrung finden. Manche haben ein sehr eingeschränktes Baterland, andere find da=

P) Diefes Borgefühl, bas fie auch wohl beim ichneltern und langfamern Zuge leitet, veranlagte wohl ichon im grauen Alterthume ben Glauben, baß man aus ihrem Fluge und übrigen Betragen bie Zukunft enthüllen könne.

gegen fehr weit verbreitet und finden sich dann an den Orten, wo ihre Nahrung am meisten anzutreffen ift. — Einige leben einsam und nur die Begattungszeit eint Mannchen und Beibchen. Undere leben gesellschaftlich, ja sie leiden auch Nester ihrer Urt gern bei sich, z. B. die Saatkrabe. Dagegen leiden andere nicht gern ihres Gleichen zu bieser Zeit in ihrer Nahe.

Es giebt nun Stand=, Strich= und Die erftern bleiben, wie g. Bugvogel. B. unsere Sperlinge. Die andern finden fich in großern oder fleinern Gefellichaften gufam= men, halten sich da, wo sie Rahrung finden, einige Zeit lang auf und ftreichen dann wieder an einen andern Ort, z. B. Beifige, Rreuz= fchnabel u. f. w. Unter lettern verfteben mir aber folche Bogel, die der Kalte und Mangel an Nahrung wegen ihr Baterland verlaffen, und bei gunftiger Witterung und neuen Nahrunge= mitteln, zurückfehren. Der Bug geht nach Westen; bei Gil, wenn sie die Bitterung gum fchnellen Ubmarich drangt, oft von fruh an bis Nachmittags 3 Uhr, fonft nur bis gegen Mittag. Bei schlechter Witterung und widri= gen Winden halten sie sich oft lange auf und freffen fich fett, mas ihnen dann bei fchnellen und langen Reifen gut zu Statten fommt. Rommt im Berbft in der beften Buggeit ber Wind anhaltend aus Offen, so magern fie fehr ab. Der hauptzug der Bogel ift die Sag= und Nachtgleiche im Berbft und Frühling. Gi= nige ziehen aber schon im August, als: der Di= rol, die Mandelfrahe, Meerschwalbe u. f. w. Ginige gieben bei Racht oder am Tage, oft in großen Gefellichaften fort, und fommen fo auch wieder. Bum Abzuge aus marmen gandern mag fie wohl die fehr fark zunehmende Sige ju und gurucktreiben und der Trieb gur Begat= tung. Denn daß fie auch dort becfen follten, ift fehr unwahrscheinlich, da man doch die Jun= Gie maufern fich viel= gen bemerfen mußte. mehr in ihrer Ubwefenheit und fommen fo im Sochzeitfleide gurudt. Den Rudfjug vollenden fie in furgerer Beit, als den hingug. Die Mannchen erscheinen fast immer eber, als die Weibchen.

Die Borempfindung des Betters fcheint fich auf 24-36 Stunden zu erftrecken; denn nicht felten kommen fie bei gutem Better an, es erfolgt aber so rauhe Bitterung und Schnee, daß fie entweder zuruck muffen oder umkommen.

Die Nahrung der Bogel ift fehr verschieden, und es scheint dies in der hohen Bestimmung

der Natur zu liegen, welchen Endzweck sie das mit erreichen wollte, und so sehen wir welche allein aus dem Thierreiche, andere aus dem Pflanzenreiche, noch andere aus beiden zugleich leben. Zu den letztern gehören die Krähenarsten, die fast alles Genießbare verzehren. Eiznige fressen auch Veeren, die andern tödtlich sind, z. B. die Bachgrasemucke Veeren des Kellerhals (Daphne Mezereum).

Die Bögel verdauen übrigens schnell und haben guten Uppetit. Einige, wie der Seizdenschwanz, frift täglich so viel, als er wiegt. Einige, besonders fleine Bögel, konnen kaum einen Tag hungern, dagegen halten es große Raubvögel mehrere Tage aus. Ihr Getränk ist Wasser; die frisches Fleisch fressen, bedürzsen desselbigen nicht, wohl aber die andern. Auch Baden im Wasser, so wie bei manchen im Staube und Sande, gehört mit zu ihren Bezdürfnissen. — Einige Bögel, besonders Naubzvögel, wersen Haare, Federn und alles Unzverdauliche in einen Knaul geballt, aus, was die Jäger-Runstsprache: Bugen oder Gezwölle nennt.

Die eigentliche Begattungszeit ber Bo= gel ift das Fruhjahr und zwar bei uns die Monate Upril und Mai. Der Kreugschna= bel ichon im Jan., der Rolfrabe Ende Febr. Das Mannchen bestimmt den Brutort, bei de= nen, die gemeinschaftlich bruten und futtern. Bas übrigens vom Reftbau, Ungahl der Gier, Befchreibung derfelben u. f. w. zu merfen ift, empfehlen wir, um nicht zu weitlauftig gu werden, gur Rachlese und Belehrung: ,, Die Gier der Bogel Deutschlands von den herren Raumann und Dr. Buble. Salle bei Rummel." Durch naturliche, fo wie durch funftliche Barme werden die Gier entwickelt. Die Beit, in der das geschieht, ift sehr ver= Schieden. Gie fieht meift mit der Große der Bogel im Berhaltniß, fo daß die fleinen me= niger Beit gum Ausbruten ihrer Gier, als die Wenn daher die fleinen größern bedurfen. Singvogel 13-14 Tage bruten, fo braucht der Schwan 5 Wochen dazu. Gunftige Bits terung beschleunigt diefe Beit in etwas. -Einige werden blind gebohren, bedurfen oft gang nacht der Barme und Futterung, andere dagegen begleiten ihre Eltern gleich, die ihnen ihre Nahrung nachweisen. Ginige bringen auch fogleich ein Dunenfleid mit aus dem Gie, bei andern entwickeln fich nur langfam die Federn. Die Eltern, besonders die Mutter, lieben die

Jungen fehr gartlich und vertheidigen fie oft mit Wefahr ihres eignen Lebens. Schlechte und falte Witterung thut den Jungen viel Chaden. Bei ichonem Better verlaffen bie fleinen Singvogel ichon nach 8-10 Tagen ihr Reft. Die Futterung geschieht auf ver= schiedene Urt, einige preffen die Rahrung aus dem Rropfe in die geoffneten Schnabel der Jungen, die Infeften freffenden tragen die Rah= rung im Schnabel den Jungen gu. Die Fal= fen bringen die gemachte Beute in den Fangen bergu, zerftucfeln fie und werfen fie den Jun= gen vor. Don allen diefen macht bei uns der Rufuf, der das Musbruten und Auffuttern der Jungen andern überlaßt, eine Ausnahme. -Das Neft halten die Bogel reinlich. Die mei= ften Bogel machen nur eine Brut, und nur bei Wegnahme der erften Gier machen fie eine Die domefficirten, 3. B. die Sauben, machen davon Musnahmen. Monftrofitaten find bei milden Bogeln große Geltenheiten, nicht fo bei domefficirten, wo fie ofter vorfom= men. - Die meiften Bogel werden im erften Jahre mannbar. - Rach der Erziehung der Jungen halten fich die Parchen nicht mehr gu= Jedoch glauben mehrere, daß bei ber neuen Paarungszeit die Parchen wieder jufammen geben follen. Rach aufgelofter Che erscheint aber fur die Bogel die hochft traurige Beit ber Maufer (Maufter, Rauchen). Bei einigen geschieht dies jahrlich einmal, bei an= bern zweimal. Bei benen, die fich einmal maufern, geschieht es im Juli und Muguft, wie bei den Droffeln, Tauben, Baldhuhnern. Die Federn fallen aber nur nach und nach aus; mo dies aber zu schnell geht, wie bei den wilden Enten und Banfen, halten fich diefe unterdeffen in ichilfreichen Teichen auf, bis fie wieder fliegen fonnen. Da nun das Jugend= fleid, Sochzeit = und Berbfiffeid mit den Ue= bergangen oft auffallend verschieden ift, fo hat Diefer Umftand viele Bermirrung hervorgebracht, indem ein und derfelbe Bogel unter fehr ver= schiedenen Ramen angeführt, worden ift, bis man endlich dahinter fam. Bei denen, die eine doppelte Maufer auszuftehen haben, ver= jungen fich die Schwung = und Schwangfedern nicht zweimal. Giner folden Maufer ift auch das Oberhautchen an den Fußen, an dem Schnabel und andern fahlen Theilen untermor= fen. - Die Farbe der Schnabel und Beine wird fast bei allen Bogeln gegen das Fruhjahr hin lebhafter. Die Jungen erhalten auch erft

spåter ihr eigentliches Gesieder, dies gilt auch von der Negenbogenhaut im Auge (Iris), die oft erst nach mehrern Jahren ihre stete Farbe besommt.

Bur Begattungezeit erscheinen befondere die Mannchen in lebhaftern Farben, haben oft auch einen Schmuck, den fie bernach einbugen, wie g. B. der lange icone Schwang des Mann= chens von Fringilla caffra. Die Bierden: ber Ramm erscheint bei ihnen weit lebhafter; die Farbe der Fuße und Schnabel, eben fo die marzigen fah= len Augenbraunen der Baldhuhner werden gro= fer und die aufgeschwollenen Warzen berfelben viel rother. Die Wargen im Geficht der mann= lichen Streitschnepfen feimen, brechen hervor und verlieren sich erst nach der Begattungs= Es ist dies also die hochste Bluthe im zeit. Leben der Bogel, wo ihr ganges Befen auf= geregt ift und mas fich im Befang, Springen und in luftigen Geberden und Rampfen um die Geliebte, dem Beobachter fo verffandlich auespricht. - In diefer Periode erlegt oder ge= fangen, dienen fie in Rabinetten als vorzug= liche Bierden. Denn nachher verblaffen viele diefer Farben, ja garte Farbenanfluge verschwin= den gang, fo das fanfte Gelb des mannlis den Nachtreihers, desgleichen die fanften Ro= fenfarben einiger Baffervogel. (Ber über die Runft, felbit Bogel auszuftopfen und andere Thiere fur Rabinette aufzubemahren, Belchrung wunscht, dem empfehlen wir: "Fr. Rau= mann Tagitermie oder die Lehre, die Thiere aller Rlaffen am leichteften und zweckmäßigften für Kabinette zuzubereiten und aufzubewahren. Salle 1815. ")

Unter den Bögeln giebt es auch bisweilen Ausartungen (Spielarten, Barictaten), wozu die in der Regel nicht gesteckten und weißen gehören, wovon ich Fasane, Krahen, Sperslinge, Schwalben u. s. w. geschen habe. Bei ganz weißen bemerkte man auch, daß Beine und Regenbogen im Auge gewöhnlich fleischsfarben und die Pupille roth war. Sie führen die Benennung: Albinos oder Kaferlaken. Man halt es für ein Zeichen der Schwache, wozu der Umstand noch mehr berechtigt, daß, wenn man einem Bogel öfters den Schwanz außreift, statt der gewöhnlichen dunkel gefärbs

ten Federn weiße erscheinen.

Nach überstandener Mauser beginnt gewöhnlich der Zug der meisten Bogel. Die im Juli mausern, beginnen den Abmarsch schon in der Mitte Augusts. In der freien Natur geht dieser frankhafte Zuffand ohne Nachtheil vorüber; die armen Gefangenen aber unterlie= gen oft diefem Buftande. Die Drufe, welche eine Fettigkeit absondert und über der Schmang= wurzel fist, die wir ichon fennen, ichust das Gefieder gegen Raffe, tragt aber auch bei re= gelmäßiger Beschaffenheit viel zum Wohlbefin= den des Bogels bei. Ihre Berftopfung zicht die Darre nach fich, eine Krantheit, welche ber Auszehrung gleicht und den Tod berbei= führt, wenn man nicht Mittel gu ihrer Bei= lung anwendet.

Bur Lebend = Defonomie vieler Bogel gebort auch das Baden im Baffer, Sande, Staube, mas man daber auch den Gefangenen, follen fie gefund bleiben, nicht verfagen darf. -Gelten werden diefe harmlofen Thierchen von einer Krankheit in ihrer Freiheit befallen. Dem Mangel an Nahrung konnen sie durch ihr bald Beiterziehen entgehen, und wenn fie auch rauhe Bitterung und Unwetter niederfchlagt, fo weckt doch baid ein heiterer Sonnenblick ib= ren frohlichen Muth. In Ungft und Schref= fen fest fie die plogliche Erfcheinung eines Diaubrogele, doch faum ift die Gefahr voruber, fo fpringen, hupfen und fingen fie wie= Co viel man beobachtet, erreichen fie auch ein hohes Ulter, felbit in der Gefangen= Schaft; dies weiß man von Adlern, Papa= geien und Raben, die 100 Jahr und darüber gelebt haben. Bon Schmanen ergablt man gar: daß fie 300 Sahr gelebt haben follen .-Daß demohngeachtet die Klage über Mangel an diefen Thieren in einigen Gegenden gegen fonft nicht ungegrundet ift, bat man bewiefen. Die angegebenen Urfachen find mahrscheinlich: die Ausrottungen der Balder, Urbarmachung mehrerer Begenden, Austrocknung der Gum= pfe u. f. w., felbft das haufige Begfangen und muthwillige Berfforung ihrer Reffer. Sier= zu fommen noch große Rauber, als: Wolfe, Buchfe, Luchfe, Kagen und Marderarten, die gewaltig viel todten; auch werden die fleinern durch die Raubvogel ziemlich mitgenommen. Gelbft einige Umphibien und Fische machen Jagd auf die armen Befiederten. Roch haben fie auch mit verschiedenen Urten der Gingewei= dewürmer zu kampfen, ja einige haufen auf ihrem Korper als Schmarozer, die theils ihre Cafte, ja felbst Federn verzehren. Go hat fast jede Bogelart einen, auch einige von die= fen Gaffen zu ernahren.

Der Baffen, deren fich die Bogel bedie=

nen, find nur menige. Gie fcblagen mit den Flügeln, woran einige einen flumpfen harten Knoll oder einen Stachel haben, beifen und hacken mit den Schnabeln, verwunden mit ten scharf befrallten Beinen, woran einige auch noch als Baffe einen farfen Sporn haben. Ihr bestes Rettungsmittel besteht aber in ber Flucht, wo sie ihren Feinden am leichteften, durch Fliegen, Laufen oder Untertauchen, gu entgehen suchen. - Der Jager und Bogelfan= ger weiß fie aber doch auf verschiedene Beife in feine Gewalt zu befommen, und es macht dies eine eigene Runft und Wiffenschaft aus.

In der großen Saushaltung Gottes ift wohl fein Befchopf, mas nicht im Bangen ei= nigen Nugen hatte, wenn wir ihn ofters auch nicht einsehen follten. Go gewähren denn auch diefe Geschöpfe unverfennbare Bortheile. erhalten g. B. das Gleichgewicht durch ihre Nahrung, indem sie eine ungahlige Menge uns schadlicher Thiere aus allen Rloffen gu vermindern ftreben. Wer vermag die Ungahl der Infeften, ihrer Gier und Larven ju gablen, die sie vertilgen? indem einige blos von die= fen Thieren' leben. Huch die fo schädlichen Feldmäuse finden an mehrern Urten furchtbare Undere lieben Wefer und reinigen durch ihr Berzehren die Luft, die jene verpesten Bieles von dem fogenannten Unfraut würden. wird durch fie vertilgt, indem fie dies fleine · Much werden durch fie Gefame verzehren. manche Gewächse, Fifche und Muscheln in andere Gegenden verpflangt.

Die Menschen benuten von ihnen fleifch, Fett, Gier und Federn. Mehrere Insel= und Ruftenbewohner leben von verschiedenen Urten und treiben mit Fleisch, Giern, Federn und Reffern beträchtlichen Sandel. Die Federn werden befanntlich ju Betten, jum Schreis ben, Zeichnen, Berkielen musikalischer In-firumente, zu Pinseln und endlich noch zu Put angewendet. — Gern halt man sie auch als Gefangene, um sich an ihrem Gefange, schönen Unsehn und Betragen zu ergoben. Heber alles dieses und Universalfut= ter, um eine Menge bei weniger Muhe und Roftenaufwand zu halten, giebt Bechffein in feinem Buche: "über die Stubenvogel," hinlangliche Unweifung.

Ihr Schaden, der gegen ihren Nuten doch gering ift, ließe fich etwa auf Folgendes guruck= Einige schaden durch ihre Nahrung, indem fie uns nugliche Thiere fangen und

tobten, auch Pflanzen und Früchte uns megfapern; auch ihr Unrath verdirbt Baume und Gras, wie 3. B. dies der Fall ift bei den Reftern der Fischreiher und Krahen.

Noch muffen wir dagegen bemerken, daß sich einige auch zum Fisch = und Bogelfang, wie Kormorane, Falken u. s. w. abrichten laffen, was sonft als eigene Kunft, die Falkonir= kunft oder Falknerei, getrieben wurde.

Bas die Eintheilung oder Elassisie cation der Bögel betrifft, so hat man deren sehr verschiedene, je nachdem ihre Berfasser sie bald von diesen und bald von jenen, von ausgeren und inneren Theilen entlehnten. Wir wersden uns indessen bemühen, eine solche Eintheislung zu wählen, die bei einem leichten Uebersblick uns schnell die Gattung sinden lehtt.

Eintheilung der Classen der Bogel in Ordnungen.

Leicht laft fich aus dem Borhergehenden erfeben , daß unter allen Claffen des Thierreichs die der Bogel in hinsicht ihrer Totalbildungen als die abgeschloffenfte erscheint, und dadurch am deutlichften charafterifirt hervortritt. He= bergange zu andern Claffen fehlen daher faft ganglich , indem fich faft überall einerlei Stufe der Entwickelung zeigt. Den Grund diefer Erscheinung finden wir in der Uebereinstimmung der Lebensweise und des Alufenthaltes als Rin= der der Luft auf's Bestimmtefte angegeben. Diefer gleichartigen Bildung megen ift aber auch die Gintheilung derfelben in Ordnungen größern Schwierigfeiten unterworfen, als die Eintheilung der Caugethiere. Go wie indeffen bei diefen Freß = und Bewegungswerfzeuge deut= lich hervortreten, und auf ihr Treiben und Le= ben in dem Saushalte der Natur hindeuten: fo hat man auch bei diefer Claffe von diefen Theilen die Rennzeichen zu entnehmen fich be= muht. Den Borichlag, fie nach Bildung der Bunge oder des Bruftbeins zu ordnen, hat man, da er zu funfilich und erft bei genaueren Un= tersuchungen zu erkunden ift, mit Recht verlaffen. Syftem = und Ordnungskennzeichen muffen leicht in die Augen fallen, daher der Bau und Gestalt der Schnäbel und Füße bei den Bestimmungen und Ordnen den Vorzug verdienen.

Die Ornithologie (Bogelfunde) hat demnach auch bei den verschiedenen Unfichten mancherlei Unordnungen erfahren. Die natur= liche Gintheilung in A. Land= und B. Baf= fervogel haben Ginige in 3, Undere in 9, ja in 13 Ordnungen gebracht, die wieder mehr oder weniger Unterabtheilungen erforderten. Der Altvater der Raturforscher, Linné, ver= theilte fie in 6 Ordnungen. Geit diefer Zeit find viele Suffeme theils aus Neuerungsfucht, theils nothgedrungen bei den vielen gemachten Entdeckungen aufgestellt worden. Und hierüber weitlauftig zu verbreiten, ift hier ber Ort nicht, weshalb wir uns auch gleich an das neuefte menden, mas der berühmte Cuvier, der felbft fah, untersuchte und genau prufte, aufge= ftellt hat.

Erfte Ordnung. Raubvögel (Raptatores).

Sind, wie es ihre Lebensart erfordert, mit ftarken Schnabeln, wovon der Oberschnabel an der Spige gefrummt, mit scharfer, nach unsten gerichteter Spige über den untern überragt, verschen. Die Nasenlöcher liegen meist in einer Haut, welche die Schnabelwurzel besteidet und Waachshaut genannt wird. Die Musteln ihrer Schenkel und die starken Sehnen ihrer Untersuße besunden die Kraft ihrer Fange. Ihre Fußsohlen sind selten lang; alle haben 4

Behen, der Nagel des Daumens und der des innern Fingers sind die starkften. Die getheilzten Behen sind bei vielen unten rauhwarzig mit spigen scharfen Krallen versehen, und so mit Kraft, Muth und Schnelle ausgerüftet, stellen sie unter ihrer Classe das dar, was bei den Saugethieren die Reißenden vorstellen. Die Beibchen sind fast immer größer als die Mannchen, dagegen letztere meist schoner gesfärbt. Es sind einsame, ungesellige Bogel,

die paarweise leben und auf entlegenen hohen Orten nisten.*) Die weise Einrichtung der Natur gab diesen Naubern eine mindere Frucht= barkeit, als den übrigen, daher man 4, hoch= stens 7 Gier in ihren Nestern sindet.

Gie leben vom Fleische geraubter und ge= forbener Thiere, aus verschiedenen Claffen des Thierreiches. Haben guten Appetit; die gro-Bern fonnen dagegen aber auch, wie die Er= fahrung gelehrt, mochenlang hungern. und Saare, die fie nicht alle von dem Ge= raubten trennen fonnen, fcblingen fie hinter, mo es nach und nach aus dem Rropfe dem Magen zur Verdauung zugeführt wird. Unverdauliche sammelt fich in einen Ballen, und mird mit fichtbarer Unftrengung durch Er= brechen fortgeschafft. Richt felten findet man da, wo Raubvogel hausen, diese Ballen, die untersucht aus Saaren, Federn, Rnochen, Gra= ten und harten Infektenflugeln befteben und in der Jagersprache Gewölle genannt werden. Die Meiften trinfen im Freien nie, biemeilen aber in der Gefangenschaft bei schlechtem But= Bei Entledigung des Unrathe, der fluf= fig, dunn und weiß wie Ralch aussieht, ftrau= ben fie das Gefieder, und den Edmang auf= hetend, fprigen fie ihn um mehrere Tug weit weg. Die meift blind und nacht gebornen Jun= gen find geraume Zeit unbeholfen, mahre Neft= hocker. Gefangen find co rechte Wildfange, die fogar oft Nahrung verschmahen und sich durch den Tod in Freiheit feten. Demohngeachtet ift es aber doch bei mehrern der menschlichen Runft gelungen, fie ju gahmen und gur Luft= jagd so abzurichten, daß sie das Gefangene in die Gewalt ihres herrn bringen.

Um naturlichsten theilt man fie in Tag= und Rachtraubvogel ein.

Geier. (Vultur.)

Der Schnabel: ftark, an der Burgel eine Bachshaut (cera); Oberschnabel gerade, nur an der Spige hackenformig herabgebogen; Unterficfer gerade, an der Spige abgerundet; beide Riefern mit scharsschneidigem Rande. Ropf: kahl oder mit sehr kurzem Flaum beweckt; die Augenlieder bewimpert. Na fen loscher: frei, zur Seite des Schnabels, in schies

fer Nichtung, aufwärts, gegen ben Nand ber Wachshaut liegend. Füße: starf, nicht sehr hoch; die Krallen mittelmäßig, nur wenig gesbogen, am geradesten die der Mittelzehe. Flüsgel: merklich abgerundet.

Sie haben einen fleinen Ropf, großen Schnabel, einen langen, theils fahlen, theils mit kurzem Flaum bekleideten Hals, den sie in den Halskragen einziehen können; einen schwerfälligen Körper; große Flügel mit sehr langen Urmknochen. Der angefüllte Kropf tritt am Borderhalse facksörmig hervor. Sie haben eine übelriechende Ausdunftung und aus ihren Nasenlöchern fließt eine ftinkende Flüssiget aus.

Im schwerfälligen, langsamen, eine Schnesfenlinie beschreibenden Fluge erheben sie sich
zu einer unermestichen Huge erheben sie sich
zu einer unermestichen Huge erheben sie sich
zu einer unermestichen Hohe, von ter sie auf
eben diese Art wieder herabsteigen. Das Gesicht ist scharf, dies scheint auch der Geruch
zu senn; ihr Anstand ist traurig und ihr Betragen plump. Ost sieht man sie in großen
Schaaren beim Aas, fast ihrer einzigen Nahrung, wodurch sie jenen heißen Landern eine
Wohlthat werden. Sie nisten auf unzuganglichen Felsen, tragen den Jungen die Speisen
im Kropfe zu, und speien sie ihnen vor. Der
Unterschied beider Geschlechter ist im Aeußern
wenig bemerkbar.

Der weißköpfige Geier. (Lat. Vultur fulvus. Linn.; franz. Voutour. Griffon.)

Der Kopf und hals ift mit weißem Flaum bedeckt, an der halswurzel ein Buschel schmazler weißlicher Federn; das übrige Gefieder, bis auf die schwarzen Schwing = und Schwanzselern, vom blaffen Rothgelb bis zum duftern rothlichen Graubraun, mit hellern Federschäften; die Füße blautich.

Seine Lange wechselt von 45 bis zu 48 Boll, mit ausgebreiteten Flügeln 100—120 Boll, ja bis zu 12 Fuß Breite. Der Schwanz mißt 14—18 Boll und die in Nuhe liegenden Flügel bedecken über 3 seiner Lange. Die Schnabellange beträgt von der Spize bis zur Stirn 33 Boll. Seine Farbe ift blauschwarz, nach der Wurzel hellbläulich, die Wachshaut bläulich. Die Iris dunkelbraun. Ein fast kabeler bläulicher Fleck umgiebt die Augen. Die Augenlieder haben schwarzbraune Wimpern. Kopf und Hals sind mit einer sehr kurzen, aber dichten, schmuzigweißen Wolle oder haarahn-

^{*)} Mur bei Mas ober bisweilen auf dem Buge fieht man mehrere beifammen.

lichen Dunen besetht, die am Kopfe langer, haarahnlicher und hellbraun überlaufen sind. Die Halbsedern am Kragen des Unterhalses schmuzig zimmetsarben; in der Mitte jeder Fester ift ein heller Streif. Durch Clima, Rahsrung und Alter sindet man große Berschiedensheiten, so daß man sie hellsucheroth, licht= und dunselbraun, braungrau, bis zum Beislichen

gefarbt, antrifft.

Sein eigentliches Baterland ift Ufrica, das nordliche wie das sudliche, und das westsliche Afien. Bon hieraus besuchen sie unsern Erdtheil und gehen bis in die Pyrenaen. Sehr selten verirren sie sich in das faltere Deutschland. 1803 im Juni wurde einer im Naffau=Beilburg'schen gefangen. In Schlesien hat man heerden von ihnen bemerkt. Ihr eigentlicher Ausenthalt sind hohe weite Gebirge, von wo aus sie sich am Tage über die Ebenen verbreiten, ihre Nahrung suchend, die meist wohl aus gefallenen Thieren besteht.

Feigheit, Tragheit und Gefraßigkeit sind Sauptzüge ihres Charakters. Ein Geier nimmt oft so viel zu sich, daß er sich nicht erheben kann und so gefangen wird. Zur Bertheidizung bedient er sich besonders des Schnabels, mit dem er auch gefährlich verwundet. Den Nasenlöchern entquillt beständig eine flussige Materie und der ganze Bogel riecht wie Las, was man selbst noch bei ausgestopsten bemersken kann. Er badet sich gern in reinem Baseser; gegen Kälte ist er empfindlich. Angst und Schrecken pressen ihm einige heisere Tone aus, der Eselstimme nicht unähnlich. Ganz läßt er sich nicht zähmen.

In hohen Gebirgen, in Hohlen und Spalsten der Felsen trifft man ihre Nester, in Menge und in großer Unzahl an der sublichen Spige Ufrica's. Hier trifft man in einem Neste 2 bis 3 braunlichweiße Sier. Das Mannchen soll vor dem Neste, wenn das Weibchen brus

tet, Bache halten.

Ihr vorzüglicher Nugen befieht mohl in jenen heißen Gegenden darin, daß fie das die Luft verpeftende Mas verzehren.

Der graue Geier. (Lat. Vultur cinereus; franz. Vautour arrian.)

Der Sals über die Salfte gang nacht, blaulich; die zwischen den Salssedern hervorstehen= den Dunen bilden, bei eingezogenem und dadurch verstecktem kahlen Theile des Halses, vorn einen herzformigen Kragen, der einen dunkler besiederten dreieckigen Fleck einschließt; an jeder Schulter steht ein beweglicher Federsbusch; die Fuswurzeln sind über die Halfte herab besiedert, der kahle Theil schmuzig steisch=farben.

Die Lange des Bogels beträgt 46 bis 49 Boll, die Flügelbreite 100 - 115 Boll oder 9 Fuß und 7 Boll. Die fehr großen Flügel ha= ben fehr lange Urmknochen und reichen, in Rube liegend, mit ihren Spigen fast bis an das ftets verftogene und abgenutte Ende des jugerundeten, farffieligen, 14 - 161 Boll langen Schwanzes. Das Gewicht bes Bogels ift 14 bis 22 Pfund. Der Schnabel mißt im Bogen bis zur Stirn 43 Boll; von Farbe fcmarg, nach den fcarfen Schneiden zu ins Braunliche übergehend; die Bachehaut fehr blagblau, obermarts, wie die Mundwinkel, rothlichweiß. Die ziemlich großen Nasenlocher eirund; die Bris der fleinen Augen dunfelbraun. Ein fleiner Rreis um das Auge ift fahl, die Augenlieder mit schwarzen Wimpern verfehen; Bugel, Wangen, das runde offene Ohr und das Rinn find mit furgen braunlichen Dunen und dunkelbraunen haaren befett. Unter der Mitte des hinterhalfes fangt ein Rragen an, der in schiefer Nichtung nach dem Kropfe her= ablauft und fo die Balsmurgel umgiebt. Die= fer Federfragen ift bismeilen nicht bemerkbar, indem ihn der Bogel ofters glatt anlegt und unter den vordern Flügeldecken verbirgt. Hauptfarbe des Gefieders ift dunkelbraun, Bauch und Ufter heller, ja letterer hellbraun. Schwingen und Schwanzfedern fcmarg mit dunkelbraunen, grau überpuderten, außern Ran= ten. Das Weibchen ift gewohnlich etwas grofer als das Mannchen, und auch dunkler gefarbt.

In der warmern Bone der alten Welt kommt er allenthalben vor, doch nie in fo großer Menge, als der vorhergehende. In Europa bewohnt er die südlichen hohen Gebirge, feltner große Walder. In Schlesien, Sachsen und Franken hat man ihn auch angetroffen.

Diefer Geier hat einen traurig=gutmuthigen Blick; fein Betragen ift fill und ruhig. Alle feine Bewegungen find plump und ungeschiekt. Er ift langfam und trage, fitt lange mit aufgeftraubten Federn und hangenden Flügeln auf einer Stelle. Hat er sich fehr voll gefresen, laft er sich fo nahe kommen, daß man ihn ersichlagen, ja felbst oft greifen kann. Er geht,

wie die übrigen Geier, schrittmeise; erhebt fich auch, wie der vorige, in großen Schneckenli= nien zu einer ungeheuren Sobe. Gegen hiße

und Ralte ift er nicht fehr empfindlich.

Seine vorzügliche Nahrung ift Aas, fowohl frisches, als schon faulendes; nagt geschieft die Knochen ab, wo er das von Haarthieren anderem vorzieht. Das Unverdauliche wirst er wieder aus. Sie sollen nur frankelnde Thiere anfallen. Im schlesischen Carlsruh*) und im Schaumburgischen hat man einige erlegt. Sie leben übrigens gesfellschaftlich. Ein gesangener badete sich gern und trank auch oft. Auch dieser Geier verswundet sehr stark mit dem Schnabel.

Sie follen auf unzugänglichen Felfen horsften und 2 Gier legen. Schmarozerinfesten und Eingeweidemurmer plagen diefen, wie den vorigen Geier. Ihr Rugen besteht, wie bei

vorigem, im Berzehren des Mafes.

(Lat. Vultur auricularis; franz. Vautour Oricon.)

Begen der 4 Linien hohen haut, welche die Ohrenöffnung nach vorn umgiebt, und sich in gerader Linie bis auf den Hals verlangert, wodurch fich eine Urt Dhrmufchel von 4-5 Boll Lange bildet. Der Ropf und die Salfte des Salfes find nacht und fleischroth, um den Schnabel herum blaulich violet und um die Dhren weißlich. Die Gurgel fdwarz mit ffei= fen Schwarzen Saaren befest. Alle obern Theile Des Rorpers find dufter braun, die einzelnen Federn heller gefaumt. Der Federkragen besteht aus verfehrt ftehenden Federn, in welche der Bogel alle nackten Theile verbergen fann, mas besonders mahrend der Verdauung geschieht, wo dann bei den Geiern überhaupt diefer Rropf fehr hervortritt. Der Kropf unseres Bogels ift mit feinem Flaum bedeckt, glanzend, wie das Saar mehrerer Caugethiere. Die Federn des Korpers sind lang, schmal und abstehend, die Farbe hellbraun, weißgrau gefaumt. Der Schwang ift abgeftuft und am Ende, wie bei den vorigen Urten, durch das Geben auf der

Erde abgenuht; die Schenkel mit weißlichem Flaum bedeckt. Wachshaut und Schnabel horngelb. Die Füße ftark, mit großen brausnen Schuppen; Klauen breit, wenig gebogen, hornfarbig. Die Regenbogenhaut kastanienbraun. Die ausgebreiteten Flügel klaftern 10 Fuß.

Diefer Bogel bewohnt die Gebirge des fublichen Ufrika's. Die Racht bringen sie in felfigen Gegenden zu; bei Sonnenaufgang sieht man sie in großer Anzahl die Gipfel der Berge

umidmarmen.

Huch feine Nahrung beffeht besonders in Mas, und er wird daher nur laftig, indem er erlegte Thiere fogleich verzehrt; dergleichen be= merft er aus einer Sohe, wo ihn das Men= schenauge faum noch entdecft. herr Bail= lant ergablt: daß er einft 3 Bebra erlegt, und da er etwa eine Stunde von feinem Lager ent= fernt mar, fei er fogleich umgekehrt, feine Beute abholen zu laffen. Allein die Geier ma= ren ihm schon vorangeeilt, denn sie hatten sich fcon in fo großer Menge dafelbft eingefunden, daß man nur noch die Knochen fand. Sat indeffen ein Lowe oder anderes Raubthier eine Beute gemacht, halten fie fich ferne, bis jenes gefattigt, wo fie dann das Uebrige ju fich neh= men. Ufrifa's Bewohner machen daber bei der erlegten Beute, bis fie abgeholt werden fann, oder verbergen fie vor ihren Blicken durch dar= auf gelegte 3meige oder Erde.

Im October findet man ihre Nester oft in Menge bei einander in Felsenhohlen, wo dann die Mannchen um die Nester der brütenden Weibchen freisen und sie so verrathen. Oft sind indessen diese Felsen unzugänglich, und werden dadurch noch beschwerticher zu ersteigen, daß sie wie mit Koth überzogen sind, der von dem fallenden Negen ganz schlüpfrig ist. Ein solches Nest ist nach den Berichterstattungen eine wahre Kloase, der man sich vor Gestankfaum nähern kann. Dennoch hat herr Baillant die Eier dieser und anderer Geier ausgessucht, gekostet und esbar gefunden. Die ganz jungen Bögel sind mit weißem Flaum bedeckt, später erhalten sie ein hellbraunes Gesieder.

Der indische Geier. (Lat. Vultur indicus. Lath.; franz. Vautour ou Changoun.)

Ropf und Hals nacht, doch bis ins Alter mit dunnem lockenformig ftehenden Flaum be= deckt; bei Jungen ift er viel dichter. Alle obern

^{*)} Der in Schleffen gefangene Geier verzehrte bei fartem Regenwetter eine Gans; eine vorüberges bende Frau jah ihn, näherte fich und da er keine Miene machte, zu entflieben, bedeckte sie ihn mit ihrer Schürze, band ihn und schleppte ihn fort, wo er hernach in die Menagerie des Herzogs von Burtemberg kam.

Theile sind grau, ind Isabellfarbne ziehend, braun und weißlich schattirt; die untern Theile hellfarben, ohne Flecken; die Bruft mit kurzem, dicht stehenden, glatten Flaum von dunkelbrauener Farbe bedeckt. Der Schnabel schwarz, die Spige desselben heller; die nackte Haut am Kopfe und Halfe rothgrau. Die Regenbogenshaut weißlich; die Beine schwarzgrau oder blaulich; der Schwanz ragt etwas über die Flügel hervor. Dieser Geier hat die Größe eines welschen Hahns.

Bei den Jungen Ropf und Hals mit hell= braunem Flaum bedeckt; die obern Theile des Korpers schmarzlich, desgleichen die untern, doch so, daß jede Feder einen weißen Schaft= fleck hat, der gegen das Ende der Feder brei=

ter mird.

Diefer Geier lebt in Indien am Geffade des Meeres von ausgeworfenen todten Fifchen und Aas, scharrt auch vergrabene Leichen aus. Der Flug ift schwer, obgleich die Flügel fark sind.

Rammgeier. (Lat. Sarcoramphus; franz. Duméril.)

Diese machen nach Cuvier die zweite Gattung aus. Gie leben in Amerika und zeichnen fich durch Fleischkamme aus, welche über die Bachshaut ihres Schnabels weggehen. Legeterer ift so ftart, wie bei den vorigen, aber die Nasenlocher sind eiformig und ftehen nach der Lange.

Der Condor, Cuntur, Greif, Greif=

(Lat. Sarc. Gryphus; frang. Le Condor.)

Seine Große übertrifft alle Arten dieser Gattung, doch ist er etwas fleiner, als die großen Geier der alten Welt und gleicht an Große dem Lämmergeier der Alpen. Auf dem Ropfe des Mannchens besindet sich ein knorpelartiger Auswuchs, welcher über einen grossen Theil des Schnabels hinreicht, und mit kleinen Warzen und Erhabenheiten bedeckt ift. Dieser Kanım ruht mit seiner Basis auf der Stirn und auf dem hintern Theile des Schnabels. Un der untern Kinnlade liegt eine schlaffe gefaltete Haut, wie beim Puter. Der ganze Hals und die Gegend um den Kopf sind nacht; die Haut ist runzelig mit kleinen kurzen dunzen Haaren besetzt, so daß man die Haut darz

Beim Leben ift die Farbe unter feben fann. ein blauliches Roth; fo fieht auch der Kamm. Um Unterhalfe haben beide Befchlechter eine fleine Bamme. Das Dhe ift nackt und offen. Ein halbband oder eine Palatine von weichen Dunen umgiebt den Nacken und die Geiten des Salfes; die Rropfgegend ift aber nacht und nur mit Saaren befett. Das gange Gefieder, das den Rorper bedeckt, der Schwang und ein Theil der Deckfedern der Flugel find ichwarz, grau überlaufen, die Schwungfedern tief die größten Deckfedern der Flügel schwarz, am außern Theile rein weiß: Go die Farbe des Mannchens. Beim Beibchen ift alles, mas bei jenem schwarz ift, braun, auch fehlt dem Beibchen der Ramm. Die Beine find ftart gefcuppt, aber nur mit fcmachen na= geln verfeben, von Farbe blaugrau, mit weis Ben Rungeln. Das in Wien fich befindende Mannchen mißt in der Lange 4 F. 4 3. 6 Lin., in der Breite 9 F. 5 3. Conft hatte man viel von dem Greifgeier gefabelt.

Der Aufenthalt dieses Bogels ift in den hohen Gebirgen der großen Andeskette von Sudamerika in Hohen von 12000 Fuß und höher.
Nur der Hunger treibt sie bisweilen auf die
Ebenen und an die Ruste der Sudsee. Sie
lieben Aas; doch greisen sie in Gesellschaft
große Thiere, z. B. Ochsen, an. Sie versolgen das Thier mit den Rlauen verwundend,
bis es ermattet fällt und schwer athmend die
Zunge ausstreckt, die sie lüstern ergreisen, sie,
so wie die Augen, dem armen Schlachtopser
ausreißen, wo es dann langsam verblutend die
völlige Beute der Rauber wird. In Quito
thun sie auf diese Art den Schafen und Ruh-

heerden viel Schaden.

Menschen sollen sie nicht angreifen; hum= boldt naherte sich oft einer Truppe von 3-4 Condors auf wenig Schritte, ohne daß sie ihn

verlegten.

Es ift übrigens ein trager Bogel, wie die Beier, und fist oft Sage lang auf einer Felsfenspige. Ift er hungrig, so erhebt er fich oft zu einer unglaublichen Sobe, von wo aus sein scharfer Blief Beute auffucht. Sie haben, wie jener Naturforscher bemerkt, ein gabes Leben.

Die Gier, etwa 2 an der Bahl, die weiß und 3-4 3. lang fein follen, legen fie ohne

Unterlage auf nactte Felfen.

Man fangt fie in Peru, Quito u. f. w. mit Schlingen, die man ihnen umwirft, wenn fie nach einer farten Mahlzeit fich nicht auf=

schwingen fonnen. In der Proving Niebamba werden giftige Kräuter in die Eingeweide der Thiere gethan, womit man sie anleckt; durch den Genuß werden sie dann wie betrunken und so leicht gefangen.

Außer dem Menschen und einer farten Einquartierung von einer eignen Urt Lausen, scheinen sie keinen Feind weiter zu haben.

Uadvogel. (Lat. Cathartes; Illiger.)

Der Ropf: longlich und nackt. Schnabel: lang, ziemlich dunn, etwas zusammengedrückt, gerade, nur an der Spige habenformig gefrümmt; von der Wurzel bis in seine Mitte mit einer Wachshaut bedeckt. Nasenlocher: in der Mitte des Schnabels, nahe am Nande des Oberkiesers, langlich gespalten, offen. Füße: stark, unbedeckt; die Mittelzehe sehr lang, die hintere ziemlich kurz; die mittelmäßigen Krallen nur wenig gekrummt. Flugel: etwas zugespigt.

Der schmuzige Aasvogel. (Lat. Cath. percnopterus; franz. Catharte alimoche Temm.)

Un Große gleicht er dem Fluß = oder Schrei= adler. Er mißt von der Schnabelfpige bis jum Ende des Schwanzes 2 Fuß, in der Breite 51 Fuß. Der Schwanz feilformig zugerundet. Die Flügel reichen in der Rube etwas über das Schwanzende hinaus. Der gange Ober= schnabel mift von der Wurzel bis zur Spige 3 3.; der Unterschnabel 21 3. Die Farbe der Bachshaut ift bei Ulten fafrangelb, bei Jun= gen graugelb; die Bris bei diefen braun, bei Alten gelb. Der ausgewachsene mannliche Bo= gel ift weiß mit ichwarzen Schwingen, der junge und der weibliche braun, Ropf und Sals= federn gespreigt und fpig. Schwanz fegelfor= mig und abgefruft.

Seine Ausdunftung riecht, wie bei den Geiern, unangenehm und est fließt aus feinen Nafenlochern eine haßliche Feuchtigkeit heraus. Er geht meift auf dem Boden, wie ein Nabe, ahnelt diesem auch im Fluge. Seine Stimme foll der des Bufards ahnlich sein. Gefattigt weilt er auch frundenlang auf einer Stelle.

Sein Aufenthalt ift die alte Welt, verzüg= lich die heißen Lander, die er vom Aas rei= nigt; hier ift er haufig. Er folgt in großen Truppen den Caravanen der Bufte, um alles, was stirbt, zu verzehren. Er verschmaht bei seinem Heißbunger nicht einmal den Unrath in den Gedarmeu todter Thiere, frist bei Manzgel Mist, allerlei Gewurme, Insesten, nackte Schnecken und kleine Amphibien. Bei den alten Aegyptern frand dieser Allfraß in hohem Ansehn, so daß man ihn auf ihren Denkmälern noch erbliekt. Auch jest noch giebt es fromme Muselmänner, die Bermächtnisse ausglehen, um eine gewisse Anzahl dieser Bögel zu unterhalten.

Er nistet bis in das südliche Frankreich und in der Schweiz. In seinem Baterlande ift er nicht scheu. Man findet sie 3. B. in Alexanstrien und Sairo, wo sie in Schaaren sich mit den Hunden um das Alas zanken. Sonft halsten sie sich paarweise zusammen.

Das Nest ift in Felsenhöhlen angelegt und man trifft darin 3 — 4 Eier. In Genf fand man sein Nest und nahm Junge aus. Das Futter sollen sie ihnen im Kropfe zutragen und es ihnen vorspeien.

Nugen durch das Bergehren des Aafes. Die Bewohner der Infeln des Archipelagus sollen sie häufig todten, die fehr starke Saut, auf der sie nur die Dunen lassen, gahr maschen und als ein zartes Pelzwert sie zu allerslei Zwecken benugen.

Bartgeier. (Gypaëtos. Storr.)

Der Kopf ist mit wolligen, langlichen Federn bedeckt, klein mit flacher Stirn. Sch nabel: stark, lang, der Oberschnabel anfänglich gerade, gegen das Ende hin aufgetrieben, in einem großen Hacken endigend, die Burzel des Unterficfers mit steifen Borsten beset; die Wachshaut undeutlich. Nasenlocher: lang-lich oval, (an der europäischen Art) mit steifen Borsten bedeckt. Füße: kurz; die Krallen diet und mäßig gekrummt, weder groß noch schaff. Flügel: lang; der Schwanz abgerundet.

In hinficht bes Fluges und ber Lebensart ftehen fie zwischen den Geiern und Falfen. Sie leben einzeln oder paarweise vom Naube und verzehren nur im Nothfall frisches Aas. Den Jungen tragen fie das Futter in den Rlauen zu.

Der bartige Ecicrabler. (Lat. Gypaëtos barbatus; franz. Gypaéte barbu.)

Bachshaut, Rafentocher und Conabelmur= gel mit farren borftigen Federn bedecft; am Rinn ein vormarts gerichteter Borffenbart. Die Schafte der Flugel und Schwangfedern weiß; Die Gufe graublau. Den großen Udlern und Geiern ficht er am Umfange des Rorpers nach, Da er schlanfer ift. Gein Gewicht beträgt et= wa 14 Pfund. Die Flugelmeite flaftert 91 F., beim Weibchen beinahe 10 F. Die Lange ift 4 F. Der 211 3. lange Schwang ift feil= Die Lange des Ednabels, von der flachen Stirn gemeffen, 5. 3. 5 Lin. Bon ber Mitte an fleigt ber Schnabel etwas aufwarts und endigt fich in einem großen bogenformigen Sacken. Die Schnabelicheide hat feinen Bahn. Die Farbe ift hornfarbig; die undeutliche Bachs= haut graublau. Die Bris der funkelnden, merk= wurdig gebildeten Augen hellgelb, am außern Rande mit einem feuerfarbenen Ringe umge= ben; die fahlen Augenlieder rothlichgrau. Die Buße verhaltnißmäßig flein; die Laufe bis auf die Beben befiedert, die graublau, die Raget aber hornfarbig find. Der gange Ropf ift oben flach, hinten breit und etwas erhaben. Geine Bedeckung besteht bis hinter die Mugen aus wolligen furgen Federchen, in eine furge Borfte fich endigend; auch find dergleichen an der Rehle. Das Federkleid der Jungen und Alten ift febr verschieden. Der gang junge Bogel ift nehmlich über den gangen Rücken schwarzbraun, nur zwifden den Schultern fteben weißgefleckte Federn. Bei den folgenden Maufern wird das Wefieder heller. Das bleibende Gefieder der Alten ficht febr fcon. Der Ropf wird weiß; von der Schnabelmurgel an durch die Mugen lauft ein schwarzer Streif, der einen unvoll= frandigen Rrang bildet. Dhrengegend und Gei= ten weiß, erftere mit einem ichmargen Bleck; Bart schwarz, hinterhals und Geiten mit ichmalen, langen, weißgelben Federn, Vorder= hals fchmuzig pomerangenfarbig; über die Bruft läuft von den Uchseln meg ein Krang von weißgelben, ichwarzgeflectten Federn. Unter= leib, Federhofen und Beine weiß, pomerangen= farben überlaufen. Schultern, Rucken und Deeffedern der Flügel fcmarg mit weißen Schafs ten, und an der Spige jeder Feder fieht ein weißgelber Schaftflecken; Schwung = und Schwanifedern mit weißen Schaften und fil=

bergrauen Fahnen. Die Mundoffnung ift ungemein weit, so daß sich der Schnabel 4 3. weit öffnen laßt; hierzu fommt, daß die obere Kinnlade noch beweglich ift, so daß man mit der Hand hineingreisen fann. Bei dieser Einrichtung fann er große Stucken Fleisch mit den Knochen verschlingen, die er auch gut verdaut.

Der Geieradter bewohnt nur Europa's hochsfie Gebirge, als die der Schweiz, Tyrole, Salzburge und Savonene. Doch foll er auch in andern Erdtheilen, auf den hohen Gebirgen Affiene und Alfrifa's vorfommen.

Nur in sehr kalten Wintern sieht man ihn in der Rahe der hohen Bergdörfer und in die höhern Thaler von seinen Berggipfeln herab=

fteigen.

Er ift ein furchtbarer, tuhner, fluchtiger Rauber, der, hatte er Adlers Fange und Schna= bel, noch gefährlicher fein wurde. Gleich dem ihm verwandten amerifanischen Greifgeier, schwebt er boch über den Schneeregionen mit feinen funkelnden Augen, die Velfen, Klufte und Thaler durchfpahend nach Murmelthieren, Gemfen, Biegen, Schafen und andern Thieren, auf die er pfeilschnell herabsturgt. Die am Rande eines Abgrundes weidenden Thiere er= greift er, und betaubend mit Flugelschlagen, ffurzt er fie in den Abgrund, wo er dann auf die zerschmetterten Schlachtopfer hinabschwebt und sie verzehrt. Die rothe Farbe scheint ihn ju reigen, fo daß er auf ein Rind mit einem rothen Rockchen befleidet fließ, wobei ihn aber deffen Bater erschoß. Daß einer dieser Bogel in der Schweiz ein halbjähriges Rind raubte und 1400 Schritte weit mit fortführte, ift Thatsache; das Kind wurde aber noch durch einen glücklichen Bufall gerettet. Go erzählt man auch: daß er einen hirtenknaben von ei= ner Felfenwand herabgesturgt und angefref= fen habe.

Rur wenn er zum Neftbau Materialien holt, fest er sich auf einen Baum, sonst nur auf Felfenabhange. Sein Gang ist schreitend, oft sehr schnell. Sein Geschrei vergleicht man mit den Sylben "Phippy!" In der Gefangenschaft laßt er nur ein leises Piepen horen.

Seine Nahrung besteht allein aus Fleisch, am liebsten frisches; im Nothfall geht er das Alas an, doch nicht ftinkendes. Kleine Saus gethiere verschluckt er ganz. Die Bogel frist er aber nicht mit den Federn, sondern schält sie aus. Ein gefangener Geieradter ließ kleine Bogel und Fische liegen, und fraß taglich 1

bis 1% Pfund Knochen ober Fleifch; die erftern jog er vor. Knochen von Kalbern jog er de= nen von Rindern vor. Er verschlang fauft= große Knochenftucke. In dem Dagen eines erlegten Geieradlers fand man ganze Fuchsteu= len, Fucheschwanze, Rippen, Suftknochen von Gie faufen felten Baffer, Ruben u. f. w. mohl aber Milch und baden fich gern.

Gie legen fruhzeitig Gier, an unerffeigli= den Felfenwanden trifft man ihr Reft. Es foll aus einer Unterlage von diefen Baumaften bestehen, auf welche feinere Reiser gelegt mer= den. Die 2-4 Gier find fo groß, wie Gan= feeier, von rauber Chale, entweder gang fcmu= gig weiß, oder nach Undern braun geflecft. Beide Gatten futtern die Jungen auf und ver= theidigen sie mit Muth, und verfolgen auch den Rauber, der fie genommen, frundenweit.

Feinde haben fie, außer den Menfchen, Laufen und Milben, vielleicht auch Gingeweide=

murmern, feine.

Man bemachtigt fich dieses vorsichtigen, li= fligen Bogels durch Flinten, wo man fie durch Fuchofleisch und auf den Schnee geschüttetes Blut anlocft; man muß fich aber fehr gut ver= borgen halten. Dies gefchieht im Monat Ja= nuar bis Marg, mo er fich mehr den bewohn= ten Begenden nabert. Buweilen wird er auch in Suchefallen gefangen, wo man ihn durch frisches Biegen = und Hammelfleisch anlockt. Man ftellt ihm fehr nach, da er gern uns nubliche Thiere raubt. In der Schweiz ift er deshalb auch fehr felten.

Falfe. (Falco.)

Ropf: mit Federn dicht bedeckt. Ihre 2lu= genbraunen bilden einen Borfprung, wodurch das Auge tief liegend erscheint und einen gang andern Gindruck als bei den Beiern macht. -Schnabel: furg, hafenformig von feiner Bur= gel an gefrummt, an der Burgel mit einer gefarbten Bachshaut verfeben; die untere Rinn= lade vorn ichief abgerundet; die Rander beider Riefern zuweilen nach der Spige ju ausge= fcmeift oder gezahnt. Rafenlocher: gur Geite des Schnabels in der Bachshaut liegend, gerundet, unbedecft. Bugel: faft immer mit furgen Flaumen und langen Borften bedeckt, der von Federn entbloßte obere Augenknochen über dem lebhaften Auge vorragend. mit Federn bedeeft, oder der Lauf nacht und dann geschildert; die Fußsohlen rauh und mar= gig; die fpigigen Rlauen fehr gefrummt. Die hintere und innere Borderzehe am größten; die langen Schenkelfedern herabhangend und foge= nannte Hosen bildend. Flügel und Schwanz lang.

The Flug ift fehr leicht, schnell erheben sie fich zu einer erftaunlichen Sobe. Gie leben einzeln und nur auf dem Buge fieht man fie oft in Gefellschaften. Gie leben vom Raube frischer Thiere, die sie mit den Rlauen ergrei= fen. Nur der Sunger treibt fie auf Mas. Gie fonnen lange hungern und im Freien follen fie nie trinfen. Die Beibchen find meift um 1 großer als ihre Dannchen. Gie bauen große kunftlose Refter, legen wenig rundliche, meift geflectte Gier. Gie leben in Monoga= mie, und forgen gemeinschaftlich fur die Jun= gen, welche Unfange mit weißem Flaum be= deckt find. Die Materialien jum Neftbau, fo wie den Raub fur ihre Jungen tragen fie in den Fangen zu. Gie maufern jahrlich nur einmal. Oft ift das Federfleid der Jungen fehr von dem der Eltern unterschieden. :-

Die meiften Knochen find markleer und nehmen Luft auf. Schlund; Magen und Bormagen find hautig, und fehr dehnbar; ihr Ma= gensaft icharf und fehr auftofend. Der Darm= fanal ift furg, die Blinddarme flein, die Leber zweilappig, die Gallenblase groß, die

Milz flein.

Die Bogel ergreifen sie meist beim Halfe und suchen fie zu ermurgen. Großern reißen fie mit dem Schnabel die Burgel beraus, fleis nern fneipen fie den Ropf ein. Manche fref=

fen audy Mas.

Die zahlreichen Arten, die es giebt, vers anlaßte, fie in mehrere naturliche Familien gu theilen. Wir heben davon die merfwurdigften Urten aus. Es find darunter gelehrige Bogel, wovon man einige zur Luftjagd, Falfnerei, ab= gerichtet hat.

Der Jagdfalfe. (Falco candicans L. Falco islandus Gm. Lin.)

Diefer gehört zu den Edelfalfen. Er hat fowohl im Lateinischen als Deutschen fehr ver= ichiedene Ramen, wovon wir nur einige, als: islandischer, gemeiner, edler, weißer und Baig= falte, anführen wollen.

Die Bachehaut, Augenfreise und die gros fen Fufe blau, im hohen Alter blafgelb; der Backenftreif undeutlich. Die Lange des Schwanzes, der über die in Ruhe liegenden Flügel binausreicht, 9—10 3. Er hat schwarze Schäfte und 12—14 dunkle Querbander auf lichtem Grunde; am jungen Bogel mit eben so vielen lichten Querfreisen auf dunklem Grunde. Seine Lange beträgt 25—27 3., seine Breite 54—58 3. Der alte Bogel ift weiß, oben braun gesteckt. Der des mittlern Alters oben graubraun, weiß gesteckt, unten gelblichweiß, mit braunen herz= oder lanzettsörmigen Fleken. Der junge Bogel sieht dagegen oben braun, unten weißgelblich, mit braunen Längössechen. Diese große Verschiedenheit gab daher auch mit zu jener Ramenmenge Veranlassung.

Es ift eine der größten und ichonften eins heimischen Arten. Der Schnabel ift furz, dief, scharf und doppelt gezahnt. Fuße ftart, Laufe furz und ftammig, die Behen außerordentlich lang mit hohen Ballen der Fußsohlen und ftarten scharfspigigen Krallen.

Das Baterland unseres Falken ift der hohe Norden von Europa, 3. B. Island, Norwegen u. s. w., auch das nordliche Amerika. In der Nachbarschaft der Kusten bewohnt er Gebirge, von wo aus er Jagd auf das arme Gestügel macht. Selten kommt er ins nordliche Deutsch=land.

Die eingefangen werden, ehe sie ein Sahr alt find, follen die gelehrigsten fein, die man auch am leichteften zur Jagd auf verschiedene Bogel und Safen abrichten fann. Diefer Falke lebt nur vom Raube lebender Thiere, Die er mit ungemeiner Gewandheit fangt. Leckerbiffen für ihn find: Suhner = und Taubenarten; in der Gefangenschaft frift er nur frisches Fleisch. - Gein Reft foll man mit Lebensgefahr nur in hoben Felfenfluften finden. - Man fangt diesen Falken in Naubvogelfallen und Schlag= negen mit lebenden Tauben. Gin abgerichteter gut gepflegter Falfe lebt in ber Gefangenschaft 10—12 Jahre. Sie wurden sonft häufig gur Jagd gebraucht und theuer bezahlt. Gegenwar= tig foll Dannemark jahrlich nur noch ein Schiff nach Island, um Falfen von dort zu holen, fdicken, die man aledann den Furften der Bar= baresten schieft. Die kofibaren Dunen, die im Sandel unter bem Ramen : "Falfenfedern" bekannt maren, entnahm man größtentheils von diesem Bogel.

Der Schaden, den er thut, besteht in fei= ner Nahrung.

Der Burg-Falle, Blaufuß. (Falco lanarius. Linn.)

Bachshaut, Augenfreise und Füße lichtsblau, im Alter gelb; ein deutlicher Backenftreif, im Genick ein dunkler Fleck; die Eckschwingen mit einem schmuzig weißen Saumchen; der Unsterleib gelblich oder weiß mit runden oder langlichen braunen Flecken; der Schwanz langer, als die in Ruhe liegenden Flügel, braun mit weißen Spigen und bei den Alten mit vielen rundlichen oder bohnenformigen Querflecken. Das M. ift 21 3. lang und 46 3. breit, das. B. 223 3. lang und 50 3. breit.

Der starke, im Bogen 11 3. lange Schnabel, blaulich, vorn schwarzbraun; der Oberkiefer mit einem scharfeckigen Zahne, nahe an der hakigen Spitze, der in einen Einschnitt der unztern Kinnlade paßt. Die Fris dunkelbraun. Die Füße stark mit langen geballten Zehen und mit hornschwarzen schon gekrummten Krallen versehen. Auch bei diesen herrschen nach dem Alter Berschiedenheit und viele Abwechselung im Gesieder. Im Alter ist das Gesieder weit heller. Die Hauptfarbe ist gelb und braun.

Auch dieser Falke liebt ein kaltes Klima. Im Sommer haust er in den Polarlandern, und im Winter zieht er sich nach Suden hersab. Um häusigsten findet man ihn in Sibizien und in der Tartarei.

Er ift gelehrig, weshalb ihn auch die Kalmucken, Tartaren und andere mongolische Bolefer häusig zur Jagd abrichten. Er lebt vom Raube, wodurch er schadet, und berührt kein Aas. Abgerichtet fangt man mit ihm Tauben, Rebhühner, Reiher, Kraniche und andere große Bogel. In der Gefangenschaft füttert man ihn auch mit großen Bogeln, Krahen, Dohlen u. s. w. Er brütet nicht in Deutschland, ift scheu und läßt sich nicht gut ankommen, wird aber wie der vorige in Raubvogelfallen, worin eine Taube frei herumflattert, gefangen. Schaden und Rugen theilt er mit den vorhergehens den Falken.

Der Tauben=, Bander=Falke. (Falco peregrinus. Linn.)

Wenn man die deutschen Namen bieses Falken überzählt, so bringt man 25 heraus, was schon auf seinen Farbenwechsel hindeutet. Die Kennzeichen dieser Urt werden demnach in folgenden bestehen: Bachshaut, Augenkreise

und Kuße gelb, in der Jugend aber grunlich; die Zehen sehr lang. In der Ruhe sitzend, ist der Schwanz mit den Flügeln von gleicher Länge; der Backenstreif sehr breit, und, wie der obere Theil der Wangen, schwarz; das Genick weiß gesteckt. In der Größe variren sie sehr, vorzüglich die Mannchen. In der Länge messen sie 16½ bis 18½ 3. und in der Breite 36 bis 45 3.; die Weibchen dagegen sind von 18 bis 21 3. Länge und 42 bis 48 3. Breite.

Die Farbe des alten Vogels ift oben afch= blau mit schwarzen Querflecken, unten roth= lich = oder blaulichweiß mit schwarzen Bellen= linien; der Schwanz mit 9 bis 12 schwarzen Querbinden. Der junge Vogel ift oben dun= kelbraun mit hellen Federsaumen, unten gelb= lich = oder braunlichweiß mit braunen Langs= flecken; Schwanz mit 7 bis 9 hellen Querflecken.

Der Schnabel ift furz, dief, sehr gefrummt, oben auf jeder Seite mit einem scharfen Zahn versehen, der in einen Ausschnitt des untern Schnabels einpaßt. Der Schnabel hellblau mit schwarzer Spige; die Iris nuß=, auch dunkelsbraun.

Durch ganz Europa, in den nördlichen Theislen von Affien, Afrika und Amerika trifft man diesen Bogel. Im herbst und Frühling sieht man mehre, doch sehlen sie auch den Winter nicht gänzlich. Im Sommer liebt er mehr die Wälder, zu andern Jahreszeiten trifft man ihn meist auf Feldern, wo er auf Hügeln, Erdsschollen und erhabenen Orten sissend auf Beute lauert. Zur Begattungszeit sucht er Wälder und felsige Gegenden auf. Er ist ein gewaltisger slinker Jäger, der durch seinen Körperbau sehr unterstügt wird. Auch ihn richtet man zur Jagd ab. Er ist ein sehr vorsichtiger Bogel und geht spat zur Nuhe, wozu er Nadelshölzer oder sehr hohe alte belaubte Baume wählt.

Seine Stimme, die er vorzüglich zur Begattungszeit hören läßt, ift farf und volltonend und flingt etwa wie: Kgiaf! fgiaf! oder Rajaf! fajaf!

Nur fliegende Bogel greift er. Nebhühner und Tauben haben den größten Feind an ihm. Er raubt auch andere von der Größe der Lerche bis zu der der wilden Gans, Land = und Wafs fervögel; daher suchen sie alle, wenn er sich nahert, zu entfliehen, sich zu verstecken oder durch Tauchen zu retten. Schief stürzt er auf seine Beute herab. Kleinere Bogel trägt er an eine bequeme Stelle, größere verzehrt er da, wo er sie fing. Bierfußige Thiere so wenig, wie Uas, mahlt er zu seiner Nahrung. Gin Gefangener fraß in einem Tage 3 Krahen, konnte aber auch eine Boche lang hungern. Rleine Bogel verschluckte er ganz, bei größern

ließ er aber die Eingeweide liegen.

Mehrere Raubvogel, g. B. der Buffard, die Gabelweihe u. f. w. jagen ihm oft feine gemachte Beute ab und zwingen ihn fo ju neuen Morden. - Geinen Borft findet man in gro= Ben Radelholzwaldern, auch in Kluften hoher unerfteiglicher Felfenwande. Man sieht schon vorher beide Gatten bei ichonen Tagen im Marg da, mo fie das Reft anlegen wollen, schone Schwenfungen machen und ihr Rgiaf! dabei oft wiederholen. Das Neft besteht blos aus fleinen und großen trocknen Reifern, mos rein das Beibchen 3-4 rundliche, gelbroth= liche, braun gefleckte Gier legt, die es binnen 3 Wochen ausbrutet. Wahrend des Brutens macht das Mannchen über dem Nefte in be= tradtlicher Sohe schone Schwenkungen, mit Geschrei begleitet, oder raubt für sich und die brutende Gattin große und fleine Bogel. Die Jungen geben oft zu zeitig aus dem Reffe und werden fo gefangen.

Berschiedenartige Schmarozerinsesten wohnen in ihrem Gesieder, so wie Burmer in ihrem Innern, z. B. eine Urt Fadenwurm (Filaria tendo), oft in sehr großer Menge. —
Selten laßt er sich schußmaßig ankommen. In Raubvogelfangen und Schlaggarnen, wo die Bögel flattern können, fangt man ihn; am besten wird er auf Rrahenhutten erlegt, wo er

dem Uhu mit Geschrei fart zusest.

Sonft gaben fich die Einwohner des Dor= fes Falkenswerth bei herzogenbusch im ehes maligen Flandern mit Abrichtung der Falken zunftmäßig ab und hielten die Dreffur derselben als ein Geheimniß. *) Sie reiften in andere

[&]quot;) Manche unferer lieben Lefer möchten wohl auch Einiges über Abrichtung biefer Bögel wiffen. Wir theilen ihnen daber gern das mit, was uns davon bekannt ift. Um liebsten wählt man zum Abrichten die Wildfange, d. h. frisch gefangene, nicht felbst aufgezegene, indem erstere schon praktische Jäger sind. Fortwahrendes Bachen und Hungern macht sie gahm. Das Erstere erreicht man dadurch, daß man sie, an einem Fuße gestesselt, an eine in der Schwebe hängende Stange befestigt, die immer in Bewegung gehalten, ihs nen keine Rube vergönnt. Eine Zeistang hinse burch abgemartet, nähert man sich. Lassen sie sich nur wilkig streicheln, so erhalten sie von ibzem Lehrer auch einvas Futter. Benehmen sie

Gegenden und fingen die Falken dazu ein, denn ein gut abgerichteter Falke wurde in den Falkenereien mit 300 hollandischen Gulden bezahlt. Doch die Zeit hat auch diese kostspieligen Luftsjagden begraben. — Als Näuber verfolgt man ihn sehr und in einigen Gegenden zahlt man 8 — 16 Gr. Schießgeld für die abgelieferten Fänge.

Der Lerchen=, Baum=Falke. (Falco subbuteo Linn.)

Gehort zu den edelsten seines Geschlechts und hat mit dem Taubenfalten an Körperbau und Lebensart die größte Aehnlichkeit, doch ist er viel kleiner, indem das Männchen nur 12 3. lang und 31 3. breit ist; das Weibchen gewöhnlich 1½ 3. länger und 2 3. breiter. Wachshaut, Augenfreise und Füße sind gelb; die Zehen sehr lang und dunn; über den 6 3. langen Schwanz reichen die Flügel beim Si

fid auch babei gabin, werden fie von der ichaus kelnden Stange genommen und eine Leine an eis nen Buß gelegt. Dun nimmt man fie in ein geräumiges Bimmer, wo man einen Bogel flicgen lagt, ben fie meift fchnell ergreifen. Man gieht fie nun fanft nach fich, indem man ihnen einen andern Lederbiffen vorhalt, nach dem fie auch faffen; unterdeffen entwindet man ihnen den Befangenen. Dieje Lection wird fo lange wieberholt, bis fie ohne Leine auf bloges Beichen oder Ruf es von felbft thun. Mun geht es erft ins Freie, wo fie anfänglich an der Leine ihre Runft ausüben muffen. Much bier bemahrt, jas gen fie feffellos. Daß bies Beit und Geduld tofiet, fann man leicht denfen, und nur die reiche Bablung fonnte die Menfchen gu biefer Abrichtung bewegen. Sonft hat man hierauf Taufende verwendet, und es war ein Soheiterecht, diese Jagd zu exerciren. Borzuglich brauchte man fie gut Reiherbeige. Die Reiher nahm man ihnen Tebendig ab. Diefen murbe bann ein golbener Ring, mit Ramen, Datum und Jahrzahl eingegraben, um den Fuß gelegt, und fie hierauf in Freiheit gefest. Dan hat Diefe Gefangenen nach vielen Jahren wieder erhafcht und gefunden, daß fie ein Jahrhundert Diefen Ring getragen hatten.

In alten Bildern sieht man noch diese Falfen auf Reisen sigen, welche die Falfoniere um sich hatten. Hier sigen sie versappt durch eine kleine Kappe mit einem Federbüschel, die ihnen nicht eher abgenommen wurde, bis sich ein Bogel, den sie verfolgen sollten, zeigte. Die Flüchtlinge wurden durch eine kleine Peitsche, an die man Taubenflügel band (denn Taubenfleisch lieben sie sehr), herabgewinkt und dann wieder verkappt und gefüttert, was sie unter der Kappe vor sich siehen und verzehren konnten. henden hinaus; der Backenstreif ift breit und von den weißen Wangen sehr abstechend; das Genick weiß gesteckt; die obern Theile des Körpers nebst der obern Seite des Schwanzes ungesteckt; die untere Seite des letzern schwalgerändert; Bruft und Bauch mit dunkeln Langsflecken; Hosen und After licht rostroth. Der alte Bogel ist oben einformig braunschwarz, aschblau überpudert; unten weiß mit schwärzlichen Längsssechen. Der junge Bogel oben schwarzsbraun mit gelbbraunen Federsäumen; unten blaß rostgelb, dunkelbraun gestreift; Wachshaut und Augenkreise weißlich = oder bläulichgelb.

Der Schnabel ift furg, fehr gefrummt, icharfecfig gezahnt. Ballen unter ben Fußen;

die Rrallen find fcmarz.

In Europa bewohnt er nur die marmern und gemäßigten Theile und geht nur hochstens bis ins fudliche Schweden. Er fommt zu uns im Upril und zieht dann im October ab. Er liebt das Feld und nur gum Bruten und gur Nachtruhe besucht er die Balder. Er ift ein fühner, gewandter und fchneller Bogel. Gern figt er auf Erdschollen, Steinen und Sugeln im Freien. Gein Gefdrei ift: gath, gath, In der Brutzeit hat er nebft diefer gath! oft ertonenden Stimme noch den Ruf: Rich, Die Lerchen haben einen großen Feind an ihm; man kann ihn zu ihrem Fange auch abrichten, da er gelehriger und folgsamer als 3m Winter muß man der Taubenfalfe ift. ihn aber gegen die Kalte ichugen.

Er jagt Wachteln, junge Rebhühner, Schwal= ben u. dergl. Oft jagen beide Gatten, fonnen fich aber felten um die gemachte Beute ver= tragen. Die Lerchen entgehen ihm, wenn fie fich bis zu den Wolfen erheben; da er ftets von oben auf feine Beute floßt, find fie fo nur ficher. Berfolgt er aber eine Lerche, fo wirft fich diefe nicht felten vor Menschen oder Thieren nieder, um fich dadurch zu retten. Ue= brigens jagen fie auch Beuschrecken, Maikafer und andere großere Infekten. Gie horften auf hohen Baumen. Das Reft besteht aus durren Reisern und ift inwendig mit Borften, haaren, Moos u. dergl. ausgelegt. Nicht felten rich= tet er sich auch ein altes Rrahennest dazu ein, das er, wenn er ungeftort gelaffen wird, wie= der aufsucht. Gie legen 3-4 fcmuzig wei= fe, rothbraunlich fart bespritte und verwaschen geflecfte Gier, die fie in 3 Bochen ausbruten.

Much diefer Falle mird von Bogellaufen geplagt. Er ift icheu und entgeht leicht dem Sager; boch wird er auf Lerchenheerden am erften noch gefangen und auf ber Rrahenhutte ge=

schoffen.

Sein Rugen besieht darin, daß man ihn abrichten kann. Ja mit einem unabgerichteten fångt man sogar Lerchen auf folgende Urt: Man bindet ihn an einen langen Faden und läst ihn beim Aufsteigen einer Lerche sliegen, die, sobald sie ihn sieht, sich gleich niederdrückt, und so kann man sie leicht mit einem Nege an einen langen Stock befestigt, überdecken. Sein Schaden besteht im Wegfangen uns nutz-licher Bögel.

Der rothfüßige, Rothfuß=Falfe. (Falco rufipes. Besecke.)

Mugenlieder, Bachshaut und Fuße mennig= roth, beim jungen rothlichgelb; die Rrallen gelbweiß, nur an den Spigen grauhornfarbig; Flügel und Schwanz gleich lang. Die Farbe des Mannchens ift ichieferblau; Sofen = und Ufterfedern dunkel roftroth; Schwanz schmarz= lich. 11 - 123 3. lang und 24 - 28 3. breit. Das Weibchen unten hellroftfarben, mit weißer Rehle und After; Rucken und Flügel dunkelaschgrau mit schwarzen Querflecken; Schwang aschblau, schmal schwarz gebandert. Es ift 113 - 123 3. lang und 24 - 28 3. breit. Der junge Bogel ift unten gelblichweiß mit braunen Langoflecken, von oben tiefbraun, mit roftfarbenen Federkanten; der Schwang weißlich rofibraun, ichwarzbraun gebandert.

Er ift unter den kleinen Raubvogeln einer ber schönften und zugleich einer der kleinfren unter den deutschen Falken. Der etwas diete Schnabel ift von der Stirne bis zur Spige im Bogen 10 Linien lang. Der Sacken scharf spifig; neben ihm befindet sich, wie beim Lerschenfalken, ein großer scharfeckiger Jahn. Die

Bris ift dunkelbraun.

Sein Baterland ift das öffliche Europa; in Rußland ift er ziemlich gemein. Ferner findet er sich auch in Polen und Ungarn, selten im Westen und Norden Deutschlands. Als Zug-vogel kommt er zu Ende Aprils und Anfang Mai's zu uns; im August und September kehrt er wieder zuruck.

Er ift nicht sehr schen, auch geselliger als die andern, indem ofters gange Familien mit einander giehen. Sein Ruf ift ein hellgellendes Ri! Er jagt auf den Feldern und übernach= tet auf durren Zacken hoher Baume. Seine

Hauptnahrung besteht aus Infekten, Rafern, Seufdrecken, Veldheimchen u. f. w., deren lieberreste man immer in seinem Magen fand; doch mag er auch Mäuse und kleine Bogel verzehren.

Man erlegt ihn mit Schiefigewehr. Uebrisgens ift er wegen Bertilgung ber Inseften ju

schonen.

Der Merlin=, Zwergfalfe. (Falco aesalon. Linn.)

Der Schwanz ift gebandert und etwas langer als die zusammengelegten Flügel; Bachs haut und Füße gelb. Das Mannchen ift von oben aschblau mit schwarzen Schaftstrichen und einer schwarzen Binde am Ende des Schwanzes; unten roftgelb mit braunen Lanzettssecken. Es ift um einen Zoll kleiner als sein Beibschen, das $12\frac{1}{2}-13\frac{1}{4}$ Z. lang und 26-27 Z. breit ift. Die Farbe desselben, so wie des jungen Bogels, ift oben graubraun mit roftsarbenen Fiecken und Federsanten, von unten gelblichweiß mit braunen Langössechen; Schwanz graubraun mit 5-6 gelblichweißen Querbinden.

Der Schnabel ift bei diesem fleinen Edels falken fanfter gebogen, als bei dem ihm vers wandten Lerchenfalken; im Bogen & Lin. lang.

Iris dunkelbraun.

Man trifft diesen Bogel in gang Europa bis Schweden hinauf. In Deutschland wird er allenthalben, doch nicht haufig, angetroffen. Much er liebt das freie Feld. Gern halt er in der Zugzeit feine Nachtruhe da, mo Riefern= und Sannen = Stangenholz freht, und halt fich auch zur Brutzeit mehr an den Randern der Balder und Feldhölzer, um gleich feine Jagd auf den Feldern halten zu fonnen, als in gro= fen Waldungen auf. Oft wird er mit dem Lerchenfalfen, mit dem er übrigens große Uehn= Er ift übribens be= lichfeit hat, verwechfelt. herzt, edel und wild, fliegt außerordentlich fchnell und ftreicht meift auf der Erde bin. Er ist scheu und vorsichtig, weshalb er auch, ehe er sich nach Sonnenuntergang zur Ruhe be= giebt, den Ort oft umfreift, wobei er feine helle Stimme: fi, fi, fi, fi! horen laft.

Wie der Lerchenfalle jagt er nur fliegende Bogel, auf die er in schiefer Richtung pfeilsichnell herabschießt. Lerchen, Schwalben, im Winter Sperlinge, Goldammern u. f. w. wers den seine Beute. Doch fangt er auch Maikas

fer und Seufdrecken, die er, wie die Bogel,

im Fluge erwischt.

Sein Neft macht er oft auf ein altes Rraben= neft, oder legt es auf den obern Zweigen ei-Man findet darin nes hohen Baumes an. 5 - 6 meifliche faftanienbraun marmorirte Gier, welche binnen 16 Sagen ausgebrütet merden. Wenn fie ausgeflogen find, halten fie fich noch 8 Tage in der Rabe ihres Reftes auf und wers den von ihren Eltern im Fange fleiner Bogel unterrichtet.

Außer den Feinden im Gefieder und in den Eingeweiden verfolgen fie nur die Rraben, und fibren fie fo bei ihrer Jagd. Muf dem Unftan= de, wenn fie gur Rube geben, fann man fie mit dem Gewehre am beften befchleichen, fo auch auf den Rrahenhutten. Oft merden fie auch durch die flatternde Ruhrlerche berucht.

Er laft fich auch zur Beize fleiner Bogel

abrichten.

Der Thurm=, Mauer=, Rirch= und Maufe=Falfe. (Falco tinnunculus Linn.)

hat gelbe Machshaut und Fuge, welche mit ichwarzen Rrallen bewaffnet find; jugerun= deten Schmang; roftfarbenen, ichmargeflectten Oberleib, und gelblichweißen, mit braunen Lan= gettflecken bezeichneten Unterleib. Beim Mann= den ift Ropf und Schwang afchgrau, letteret mit einer ichwargen Binde vor der weißen Spige. 15 3. lang und 29 3. breit. gufammengelegten Flugel reichen bis an das Ende des Comanges. Das Beibchen und der junge Bogel haben einen roffrothlichen ichmary= braun geflectten Ropf und rofffarbenen, fcmarg= gebanderten Schwang. Das Beibchen ift 143 3. lang und 31½ 3. breit.

Er ift ein gemeiner, aber angenehm geftal= teter, ausgezeichneter Bogel. Man hat ihn wohl mit dem folgenden verwechfelt, von bem er fich jedoch durch Große und besonders durch feine ftete fchwarzen Rrallen, die bei jenem ftets weiß find, hinlanglich unterfcheidet. Der Schna= bel ift im Bogen 10 Linien lang. Er ift vorn scharfectig gezahnt, febr frumm, an der fchar= fen Spige fcmarg, in der Mitte hellblau und

an der Wurzel gelb.

Man findet diefen Bogel in gang Europa; fo foll er fich auch im nordlichen Amerika und in Ufien finden. In gebirgigen Landern ift er am gemeinften, indem er überhaupt bobe Ge=

genden liebt. Felfenklufte, bobe Thurme, felbft alte Burgen und Ruinen in volfreichen Stadten (3. B. in Salle auf der Morigburg) tienen ihm jur Bohnung. Bei und ift er ein Commer= vogel, ber uns meift im Ceptember verlagt. Er liebt das Freie, übernachtet aber in Baldern.

Er macht einen naturlichen Uebergang von dem Edelfalten zu den Beihen in Sinficht feiner Sitten. Er ift zwar fcneller und gewandter als diefe, allein bei weitem nicht fo muthig, fo reißend ichnell in feinen Bewegungen, als jene. Seine helle Stimme flingt wie flieh, fli, fli! und ein fanftes Riddrif, fiddrif! und ein heiferes Ri, fi! laft er oft horen. Das San= gen und Flattern auf einer Stelle oder über eis nem Gegenffande, das man rutteln ober rid= deln nennt, hat ihm zu manchen Ramen ver= Dft fah ich dies artige Manover auf feinen Jagden auf den Feldern mit an. Er ift fehr vorsichtig, doch jung aufgezogen lernen fie ihren Barter fennen und follen fich zum Gin= und Ausfliegen, ja gur Beize auf Lerchen ab= richten laffen.

Seine Nahrung besteht vorzüglich in Feldmau= fen, fleinen und jungen Bogeln, Beuschrecken und andern Infeften, fleinen Frofchen u. f. m., die er ftete auf der Erde sigend oder laufend er= greift, nie im Fluge. Er fist daher gern hoch,

Beute aussphirend.

Das Weibchen legt meift 5-6 rundliche, weiße oder roftgelbliche, braunroth gefleckte und überall befpritte Gier, die in 3 Bochen ausge= brutet merden. Die Jungen merden mit Mau= fen und jungen Bogeln groß gefüttert, und diefe beginnen ihre erften Jagdversuche mit Infeften= fangen, die fie dann verzehren.

Die innern und außern Feinde ihres Kor= pers haben fie mit den vorhergehenden Falfen gemein. Um leichteften ichieft man diefen Fal= fen auf den Rrahenhutten, fangt ihn auch auf Lerchenheerden; denn den Lerchen und ihrer Brut thut er viel Schaden, nunt aber durch Bertilgung der Maufe und Infeften.

Der Rothel=, Stalianifchc=, Thurm= Falfe.

(Falco cenchris Frisch.)

Der Schnabel mit einem fehr fpigwinfli= chen Bahne, die furgen Beben mit dicfen, me= nig gefrummten, gelblichweißen Rrallen. Das Mannchen hat einen ziegelrothen ungeflecften Rucken; der Ropf, die großen Flugeldeckfedern,

die hintern Schwingen und der Schwanz afch= grau, letterer mit schwarzer Endbinde; die Bruft gelbrothlich mit einzelnen hirfefornformi= gen dunkelbraunen Flecken. Das Mannchen 12, das Weibden 123 3. lang und 26-28 3. breit. Das Weibchen ift oben roftfarben mit dunkelbraunen Querflecken, unten roftgelb= lich, an der Bruft mit braunen lanzettformigen, an den Schenfeln mit einzelnen birfefornformi= gen Flecken; der Schwang rothlichgrau, mit 6-9 fcmalen braunen Bandern und einer breiten braunen Endbinde. Der Schnabel mift im Bogen 8 Linien. Die Fris ift dunkelbraun; eine Stelle um das Auge unbefiedert und, wie die Wachshaut, Mundwinkel und Wurzel des Schnabels fcon gelb.

Dieser seltene Bogel kommt im südlichen Italien noch am öftersten vor, sehr selten im nördlichen Deutschland. Er liebt Gebirgsgegenzben, besonders wenn sie hohe schroffe Felsen haben; selten kommt er in die Ebene. Als beutscher Zugvogel kommt er im Mai und zieht im August und September wieder fort. In der Größe steht er zwischen dem ihm ahnlichen Thurm = und rothsüßigen Falken; mit ersterem ist er oft verwechselt worden. Er ist übrigens ein scheuer, leichtsliegender und gewandter Bogel. Nahrung und Fang seiner Beute ist wie bei dem Thurmfalken, mit dem er auch gleiche Brütörter wählen soll.

Die zweite große Abtheilung des Falkengeschlechts nach Euwier begreift die unedlen Falken, die man nicht leicht zu der Falknerei abrichten kann. Sie sind weit zahlreicher als die edeln, weshalb man sie auch unter mehserere Unterabtheilungen gebracht hat. Die langsste Feder ihrer Schwingen ist fast immer die vierte und die erste ist sehr kurz, weshalb sie am Ende schief abgeschnitten zu sein scheinen. Ihre Schnäbel sind auch weniger stark bewassenet, da der Seitenzahn an der Spise sehlt und nur der Länge nach sich ein kleiner Ausschnitt besindet.

adler. (Aquila. Briss.)

Gie bilden billig die erfte Abtheilung, ha= ben einen fehr ftarten, an der Bafis geraden Schnabel, der nur an der Spige gefrummt ift. Unter ihnen find die größesten und gemal= tigsten Naubvogel.

Der Stein=, gemeine, schwarzbraune Adler. (Falco fulvus. Linn.)

Füße bis an die Zehen hellfarbig befiedert, die Zehen mit 3 großen Schildern; Nafenloscher schiefliegend, kaum 4 Linien hoch; der Raden bis unter die Augen gespalten. In der Ruhe erreichen die Flügelspigen noch nicht das abgerundete Ende des Schmanzes; die schmal zugespisten Federn am Nacken und Hinsterhalfe rostgelb; Schultern ungesteeft; Schwanzweiß mit schwarzen Endbinden, bei sehr alten in der Mitte aschgrau bandirt; die Iris der schwen großen Augen goldsarbig oder braun.

Die Lange Diefes Udlers betragt 34-36 3., Breite 80-83 3. Der etwas abgerun= bete Cchwan; 14 3. lang. Die in Ruhe lie= genden Federn bedecken ihn nur auf 10 3. Der Schnabel ift hornblau mit fcmarger Spis be, Bachehaut und Mundwinfel gelb. Geine Lange beträgt im Durchschnitte 21, im Bogen aber 23 3. Der Oberschnabel ift von der Burgel an gefrummt, die Schneiden deffelben nach dem Sacken zu mehrentheils fanft ausge= schweift. Im Mittelalter ift die Bris ichon goldgelb, im hohen Ulter ift fie faft feuerfar= Das alte Mannchen fieht in der Ferne fast gang schwarz aus. Das alte Weibchen ift großer und hat im Gangen eben diefelben Farben, doch gewöhnlich lichter.

Man findet ihn in dem nordlichen Ufien, Umerifa und gang Europa da, wo es nur große Balder und maldige Gebirge giebt, in letteren am haufigften. In Deutschland durch= ftreift er im Winter die Felder; im Commer lebt er dagegen bei uns in einsamen Baldern und Gebirgen; er ift daher ein deutscher Stand= und Strichvogel. Liebt in feiner Rabe Gluffe und Geen; dagegen hauft er in der Schweiz auf den Ulpen. - Muth, Rraft, Raubgier, Gewandheit und Borficht blicken aus allen fei= nen Handlungen hervor, weshalb man den Ud= ler mohl auch den Ronig unter den Bogeln gu nennen pflegt. Denn sobald die Bogel = Ma= jeftat den armen Gefchopfen, die er gu mur= gen pflegt, fichtbar wird, oder fie boren feine helle Stimme: bia, - biah! oder giijah! fo überfallt fie alle ein Schrecken. Er hat ei= nen hohen majeftatifchen Flug; langfam fcme=

bend, dreht er sich ohne bemerkbare Flügelbe= wegung in Rreifen himmelan, und entzieht fich dem Forscher=luge fast gang. Rasch und ungeftum fioft er auf feine Schlachtopfer. Bisweilen fieht man beide Gatten jagen; doch find beide scheu und vorsichtig. Diche, Birschkalber, junge Schweine, Lammer, junge Biegen, be= fondere Saafen u. f. w. jagt er, fo wie auch alle Bogelarten, ale: Trappen, Ganfe, Rra= niche, Pfauen, Purer u. f. m. Oft jagt er auch andern, wie dem Banderfalfen, die ge= machte Beute ab. Die Waffervogel retten fich durch Untertauchen, die Saugethiere fuchen sich im Gebuich zu verftecken, oder fuchen ihr Seil in der Flucht. Oft frift er ichon von feinem Schlachtopfer, mas jammerlich fchreit, ebe er es noch getodtet. Im Winter geht er gern auf Mas, mas man auch, um ihn zu schießen, auf den Fuchshutten und in die Fuchseifen hinlegt. In der Gefangenschaft fauft er manchmal und foll 4-5 Bochen lang den hunger ertragen.

Schon im Mary bauet er feinen Sorft, wobei fich dann Mannchen und Weibchen in unermeglicher Sohe durch allerlei Schwenkun= gen im Fliegen zu ergogen scheinen. Damit Scheint auch das Mannchen allein das brutende Weibchen ju erfreuen. In großen weitlaufti= gen Balbern des nordlichen Deutschlands fin= det man fein Neft auf uralten Gichen und Riefern; im fudlichen Deutschland und der Schweiz aber fieht es in einer geraumigen Spalte unerfreiglicher Felfen. Es hat einen anfehnlichen Durchmeffer und ift aus großen Stef= fen und durren Zweigen unkunftlich geflochten und inwendig mit Beidefraut, auch Wolle und Saaren ausgelegt; übrigens fehr flach. Gier find fo groß, ale die einer Truthenne, doch runder oder furger, weiß mit fastanienbrauner Farbe gefleckt und bespript, oft 3 - 4 an der Bahl; doch find nur immer 2 Junge in einem Refte, die anfangs weißwollig erscheinen und von den Ulten mit allerlei Wildpret, das fie gerfleischt auf den Rand des Reftes ihnen bin= legen, gefüttert werden. Gie bedurfen biergu vieler Thiere. Richt gern leiden fie daher an= dere in ihrer Rahe und erweitern zu diefer Beit die Jagdreviere meilenweit. Gie verthei= digen ihre Brut tapfer, schlagen den sie ihnen nehmenden Menschen mit den Flugeln. Un= fanglich unterrichten die Eltern die Jungen im Rauben und Jagen. Werden sie in ihren Ne= ftern nicht geftort, fo fommen fie das andere Jahr wieder.

Sie felbft werden von Einquartierungen in

Federn und Eingeweiden geplagt.

In einigen Gegenden richtet man diesen Abler auf Antilopen, Hasen, Füchse, ja selbst
Wölfe ab. Dies geschieht vorzüglich von mehrern tatarischen Bölferschaften des nordwestlischen Afiens. Man hat den abgerichteten Adler vorn auf dem Pferde sigen, reitet dem
Wilde so nah als möglich, und läßt ihn dann
darauf los. Zur Besiederung der Pseile bedient
man sich auch ihrer Schwung= und Schwanz=
federn.

Schaden thut er durch seine Raubereien. Sa, aus der Schweiz wird berichtet: daß einer dieser Bogel ein Kind von 2 Jahren geraubt und in sein Nest geschleppt habe; der erzurnte Bater, der das Kind wiederholte, sand es so sehr verlegt, daß es bald darauf starb. Rach= her sing er diesen Rauber in einer Fuchsfalle, der sich zwar tapfer wehrte, doch aber mit

Bulfe Underer erschlagen murde.

Der Kaiser-, Königs-, Sonnen-Udler: (Falco imperialis. Bechst.)

Die Fufe find bis an die Zehen dunkelfar= big befiedert, die Mittelzehe mit 5 großen Schils dern; Rachen bis hinter die fleinen graugelben Augen gefpalten; Rafenlocher zwerg liegend, 1 3. hoch, der obere Rand mit einem Gin= fcnitt; Flügelspipen über den Schwang hinaus= reichend; die schmalen Federn um Nacken und Binterhals weißlich roftfarben, die Schultern weißgeflectt; der Schwang afchgrau gemaffert mit schwarzer Endbinde; am jungen Bogel ein= farbig braun. Geine Beffalt ift nicht fo fchlant, als bei dem vorigen. Er ift 2 F. 8 3. lang und 6 F. 4 3. breit; der Schwang 12 3. lang. Das Mannchen ift um einige 3. fleiner. Der blauhornfarbige, an der Spipe schwarze Schnabel ift im Bogen gemeffen 3 1/3. lang. Die großen Krallen find nicht fo fark gebogen, als bei dem Steinadler. Das alte Mannchen und Beibchen ahneln sich sehr; besto mehr weicht aber ber junge Bogel in hinsicht seines lichten Gefieders und rothlichbraunen Langoftrei= fen fo ab, daß man ihn fast für eine gang ei= gene Urt halten follte.

Diefer Bogel bewohnt die hohen Gebirge in Aegypten und Abyssinien; doch auch in den waldigen Gebirgen Europa's fin= det er sich. Er ift in Deutschland ein Stand= und Strichvogel, ber felten, und oft mit

vorigem verwechselt worden ift.

Starte, verbunden mit Muth, Rlugheit und Wachsamfeit, machen Diefen eigentlich zum Ronige ber Bogel. Er ift ein gefürchteter Th= rann, den Alles flicht; auch er schwingt sich über die Grenzen der Wolfen und ift gegen Sibe und Ralte unempfindlich. Geine Stimme, Die Achnlichkeit mit der des Kolfraben hat und von der eignen Bildung feiner Luftrohre ber= fommen mag, flingt tief und rauh, wie: Rra, - fra, - fra! - oder frau, - frau! - Bei Naherung eines ihm fremden Gegen= ftandes laßt er noch einige Tone, die wie ga, - ga, - gaf! flingen, boren. Go wie die Unfunft des Steinadlers bei den Thieren Schref= fen verbreitet, fo ift es bei diefem nicht min= der der Fall. Den Bogeln rupft er erft die meifen Federn aus, che er fie verzehrt. Dab= rung und Urt des Raubes hat er übrigens mit bem vorigen gemein.

In unzuganglichen Felfenkluften und auf alten Baumen legt er fein Reft an, worin fich etwa 2-3 Junge befinden. Er ift nur aus dem hinterhalte, als ein fehr vorfichtiger Bogel, wie der vorige, ju ichießen und gu fan= gen. Schaden thut er durch feine Rahrung.

Der Schrei=Udler. (Falco naevius Linn.)

Die Fuße bis an die Behen befiedert, die Fukwurzel auffallend lang, in der Jugend am Genick ein roftgelber Fleck; die hauptfarbe des Rumpfes dunkelbraun; der Schmang etwas ab= gerundet, mit vielen oft undeutlichen Bandern durchzogen. Die Krallen beschreiben einen fehr flachen Bogen; Bachshaut und Beben gelb; die Bris gelb, in der Jugend gelbgrau. ift 27 3. lang, 68 3. breit, der etwas gerun= dete Schwanz 11½ 3. lang. Die ruhenden Flügel reichen beinahe bis ans Ende deffelben, bei recht alten Bogeln oft noch etwas über daffelbe hinaus. Der Schnabel von der Spige bis gur Stirn, im Bogen, 2 3. lang, born= blau, an der Spige schwarz, schon halbbogen= formig gefrummt, mit langem Sacken, ohne Bahn; doch machen die Schneiden eine unglei= Die hauptfarbe des Bogels, ein che Linie. bunfles Schattenbraun, erscheint bald mehr, bald weniger mit lichten Flecken bestreut, bald gang ungefleckt. Die Mannchen feben der vie= Ien und größern Flecken megen viel bunter aus, als die Weibchen; sonft ift in der Farbe wenig Unterschied.

Diefer Adler bewohnt die Balber des fub= lichen und oftlichen Europa's, und das gange nordliche Ufien. In Rugland ift er ziemlich gemein; in Deutschland aber gehort er unter die Seltenheiten, und nur im Spatherbft und Win= ter hat man ihn bisweilen bei und erlegt, am ofterften noch in den Waldern lange der Elbe. - Gein Flug ift wie bei den übrigen Adlern. Gern fist er erhaben auf einem Baume oder Pfahle im Baffer, auf Beute lauernd; dabei ift er aber fehr scheu und vorsichtig. In der Befangenschaft foll er oft und flaglich ichreien, mas ihm obigen Ramen jugezogen hat; boch foll er auch darin fehr gahm und gutraulich werden, fogar verträglich mit anderm Geflugel und fich gern im Waffer baden.

Er ift übrigens fein fo graufamer, fühner Rauber, als die vorigen, dagegen jagt er alle größern Waffervogel , Waldhuhner, Gidhorn= chen, Maufe, Samfter, Maulwurfe u. junge Safen. Im Commer lebt er großtentheils von Inseften; auch foll er Umphibien freffen.

Gein Reft legt er auf fehr hohen Baumen an; man findet darin 3 weiße, roftrothlich ge= ftrichelte Gier. Rur mit großer Borficht fann man ihn ichießen, bisweilen ihn auch in Raub= vogelfallen fangen. Durch Bertilgung der In= feften und Maufe nutt er, und ichadet nur, daß er einige jagdbare Thiere und wegfapert.

Der gemeine, große Gifch=, Gee= Moler.

(Falco albicilla Linn.)

Schnabel in der Jugend schwarzlich, im Allter gelb; die Fusmurzel nur halb befiedert, der nackte Theil derfelben und die Behen gelb; die Sofen dunkelbraun, einfarbig, nur an jun= gen Bogeln geflecft; der feilformige weiße Schwang an diefen dunkelbraun geflectt, am Alten reinweiß. Er ift von gedrungenem Ror= perbau. Ropf = und Halbfedern find fcmal und fpigig; die Lange variirt von 32-36 3. = 3 F.; die Breite von 86-96 3. = 8 F. Die Spigen der Flügel, in der Rube liegend, reichen bis auf das Ende des 12 3. langen Schwanzes, deffen Federn frumpf und feitfor= mig zugefpitt find. Der Schnabel ift groß, ftart, von der Stirn bis in die Gegend der Rafenlocher faft gerade, dann in einem ichonen Bogen bis zur hakenformigen Spige gekrummt, und die Schneide des Oberkiefers nach dem Hacken bin sanft ausgeschweift oder flach geszahnt; Wachshaut und Mundwinkel ift in der Jugend schmuzig= oder blaßgelb, im Alter hochgelb mit weißer Spiße; über deren Bogen gemessen 3½ 3. lang. Die Fris in der Jugend lebhaft braun, im hohen Alter goldgelb. Die Mittelzehe mißt 3 3., ihre Kralle im Bogen fast 2 3; die Hinterzehe 1¾ 3. und ihre Kralle im Bogen 2½ 3. Das Weibchen ist auch bei diesem stelle etwas größer als das Mannchen, auch heller von Farben.

Er lebt im Norden von Europa, Usien und Amerika und ift in Deutschland überall bekannt. Er liebt die Seekuften, Landseen und große Flusse. Bei seinen Wanderungen, die er zur Winterszeit unternimmt, sieht man ihn sowohl in Sbenen als Gebirgen, doch gern da, wo Waldungen in der Nahe sind, worin er übernachtet. Bom October bis in den Marzist er in Deutschland einzeln anzutreffen.

Er ift ein farter Rauber, ben bas arme fleine Bild fehr zu furchten hat. 218 Befangener ift er unbandig und ziemilich plump, doch ift er gefellschaftlicher ale die andern Udler, da man oft mehrere beifammen fieht. Sat er fich voll gefreffen, fo ift er wenig icheu und laßt felbft den Schugen nabe beranfommen. Geine Stimme ift ein rauhes tiefes Rrauh, - frauh! mas weit tont und Schrecken unter die dem Rauber gur Beute Dienenden verbreitet. schwebt er fast unbeweglich über dem Baffer, flurgt fich bei Erblickung eines Fisches mit an= gezogenen Flugeln in die Fluthen und verfehlt felten die Jagd auf einen Bafferbewohner, den er dann, mohl gepackt, auf eine Unhohe tragt und ihn dafelbft verzehrt. Biemeilen überschatt er aber auch feine Rrafte und der frarfere Baf= ferbewohner fluchtet mit feiner Laft in die Tiefe, wo er dann umfommt; dies hat man oftere beos bachtet, ja bei Fischereien große Fische gefangen, die noch die halbvermeften Fange und anhan= gende Knochenftucke an fich trugen. Die rau= hen Scharfen Bargen feiner Fußsohlen unterftu-Ben diese Raubereien. Im Winter verfolgt er mehr Gaugethiere, als: junge Birfche, Riche, Größere wilde Schweine, Safen u. f. m. Thiere greift er oft in Gefellschaft an. beften scheinen ihm die Safen ju munden; er jagt indeffen auch Gefligel, ale: Trappen, wilde Banfe u. f. m. Gern geht er auch bas Mas an und auf ihn gilt vorzüglich jenes alte

Sprichwort: "Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Adler."

Er horftet in Sohlen, auf freien Borfpruns gen unzugänglicher Felfen, in der Rabe der Meerestuften oder in dem Gipfel fehr alter ho= ber Baume, in großen einfamen Baldungen und mafferreichen Gegenden nordlicher Lander. Gein Sorft gleicht dem des Steinadlers, feine Gier aber find großer und meift weniger ge= fleckt, abgerundet, weiß, bisweilen mit braun= rothlichen Flecken befprigt. Go waren die, welche ich von einem Weibchen, die fie in der Gefangenschaft gelegt, fah; 2-3 findet man in einem Refte, wovon aber meift nur 2 auß= gebrutet werden. Außer den, in und auf die= fem Bogel lebenden Feinden, verfolgen ihn Ra= ben und Rrahen und ganten fich oftere bei Acfern mit ihm herum. Man erlegt ihn mit der Rugelbuchfe, befonders auf Fuchshutten; fångt ihn auch in Fuchseisen.

Im Norden wird feine haut zu Rleidungsffucten verarbeitet und das Fleisch der Jungen
gegeffen; auch nutt man noch die Spulen zum
Schreiben und die Einwohner der Rurilischen
Inseln und andere Ruftenbewohner schäften die
Schwanzsedern ganz besonders zum Besiedern
der Pfeile, treiben sogar handel damit nach
Japan und andern sublichen Ruften.

Daß er der Jagd und Fischerei Rachtheil bringt, erhellt aus feiner Nahrung.

Der Fluß = Udler, Fischaar. (Falco haliaëtos. Linn.)

Bachshaut und Fuße lichtblau, die Tris gelb; die Beine auf der Borderfeite pom Fer= fengelenke herab nur etwas befiedert, ohne fo= genannte Sofen, rauh geschuppt, nebst den Be-hen sehr fart; die Sohlen scharfwarzig, die großen Krallen so recht zum Fischsang in einen Salbzirkel gefrummt; von den Mugen bis ju den Flügeln an beiden Geiten des Salfes herab ein breiter dunkelbrauner Streif; der Uns terleib weiß, nur an der Bruft mit einzelnen braunen Pfeilflecken; der Schwang mit 6 dun= feln Querbinden. Unter den Udlern ift er ei= ner der fleinften. Das Beibchen ift auch hier ftets großer ale das Mannchen; feine Lange beträgt 24-271 3. und feine Breite 58-72 3. In Rube figend reichen die Flügel mit ih= ren Spigen bis an das Ende tes Schwanges, deffen Lange 9-10 3. beträgt. Der Schna= bel ift fehr flach gezahnt, halbzirkelformig ge= frummt, mit fehr langen hacken, im Bogen gemeffen 2 3. lang, blau, von der Mitte bis an die Spige schwarzhornfarbig; die schmale Wachshaut graublau; die Iris goldgelb, in der Jugend blaffer. Um alten Mannchen ift der Schnabel weiß.

Der Flußadler ift fehr weit auf der Erde verbreitet; er findet fich in allen gandern der nordlichen Bonen ber alten und nauen Welt. Un fischreichen Gemaffern, großen Gluffen und Landfeen findet man ihn haufiger, als an den Meeresfuften; gebirgige Begenden und Bal= bungen liebt er in feiner Rabe. Fur Deutsch= land gehort er unter die Bugvogel. ein fehr scharfes Gesicht und ift nicht fo fcheu und graufam, als die vorhergehenden Adler. 3wifchen 8 und 9 Uhr Morgens, und Mit= tags zwischen 12 und 1 Uhr scheint er beson= bers feiner Lieblingenahrung, ben Fischen, nach= jujagen, dann aber fillfigend die Berdauung abzumarten. Dies geschieht mehrentheils auf Felfen, Bergen, Sugeln oder Steinen in der Mahe der Gemaffer. Er fchreit fanft: fai, fai-fai! Bei Schreck flogt er ein Begie= kere und auch zuweilen ein rauhes Krau! aus. Er raubt Fifche als feine vorzügliche und einzige Nahrung von 1 - 21 Pfund Schwere. Den Karpfen und Forellen giebt er den Borzug. Oft flattert er, um auf einer Stelle fich zu halten, und fturgt dann auf feine Beute. Dies geschieht mit angelegten Glügeln und ausgeftreckten Rlauen fenfrecht in die Bluth, fo daß das Baffer über ihm zusammenschlägt. hat er seinen Fisch gut gepacft, so erhebt er fich, fchutrelt im Fluge durch eine eigne Ben= dung das Baffer aus den Federn und verzehrt ihn auf dem Lande, wie der Secadler. Doch auch ihm widerfahrt bieweilen das Unglüch, daß ein zu großer Fisch ihn mit hinabzieht und er erfauft mie jener. Wie scharf er greift, be= weift der Umftand, daß er oft felbft feine Fange nicht herausziehen fann, fondern fie beim Frag erft los macht.

Er horffet in großen Waldungen, in der Rahe fischreicher Gemaffer, auf sehr alten hosen Baumen. Das Rest besteht aus starten Zweigen, Moos und dergl. und ist stad. Man sindet darin 3—4 weiße, rothbraun gesteckte Eier, die in 3 Wochen ausgebrutet werden. Die Ueberbleibsel der Nahrung im Neste, die aus Fischen bestehen, riechen sehr unangenehm. Das Mannchen ernahrt beim Bruten sein Weibschen; beide Gatten aber tragen den Jungen

Fische zu. — Schmarozerinsekten hausen auf seinem Körper und Rohrweihen und Rrahen verfolgen ihn erfolglos und genießen nur die Neberbleibsel seiner Beute. Man schießt ihn aus dem Hinterhalte und fangt ihn in Fuchse und Ottereisen, worauf man an flachen Stelelen einen lebenden Fisch befestigt. Jung aufgezogen soll man ihn zum Fischfang abrichten können. Mit der getrockneten haut seiner Küsekann man holz raspeln. Durch seine Nahrung thut er der Fischerei viel Schaden, daher auch auf Ublieferung seiner Fange, so wie auf die der übrigen Udler, die Obrigkeit Preise gesetzt hat.

Der neufeelandische Udlerhabicht, Traueradler.

(Falco novae zeelandiae. Polyborus caracara. Vieill.)

Un Große gleicht er unferm Schreiadler; der Schwanz ift schwach abgerundet, er wird gegen drei Biertheile von den angelegten Flügeln bedeckt; der obere Theil des Laufes ift mit Federn bedeckt, die Wachshaut zum Theil mit Haaren bewachsen. Das ganze Gesieder des alten Bogels tief schwarz, nur an den Halbeschern, dem Rücken und der Brust mit weis sen Langsftreisen, die Hosen lebhaft rostroth; die Wurzel der Schwungsedern weiß; die Spishen der Schwanzsedern rein weiß; Schnabel weiß, Wachshaut und Füße dagegen pomeranzzengelb. Die Jungen vom ersten Jahre schwarzsebraun. Sein Baterland sind: Reus Sceland, van Diemensland und die Falklandsinseln.

Habichte. (Astures.)

Schnabel: ftark, von der Burgel an gefrummt, der Oberkiefer mit einem großen, sehr
auffallenden Jahn. Nasenloch: fast eiformig.
Rurze Flügel, auf zwei Drittheile der Schwanzlange sich endigend; die erste Schwinge viel
fürzer als die zweite. Die Federn glatt anliegend und derb, die Riele ziemlich straff. Füge: mit langem Laufe und langen Jehen (befonders langer Mittelzehe), sehr hohen warzenähnlichen Ballen der Fußschlen und großen,
sehr gefrummten und sehr scharfen Krallen.
Flug: schnell, ohne viele Flügelbewegung,
meist gerade. Sie sind fühne und listige Rauber, die ihre Beute im Flug so wie im Sigen ergreifen. Große Walder, in deren Rate

Felfen, find ihr liebster Aufenthalt. Die 2 europaifchen Arten aus diefer Familie haben in der Jugend am Unterleibe herzformige oder Langoflecken, im Alter wellenformige Querlinien.

Der Tauben=, Suhner=Habicht. (Falco palumbarius. Linn.)

Wachsbaut, Augensterne und die großen farten Gufe gelb; über den Mugen ein weißer Streifen; Oberleib dunfelaschgrau oder dunfel= braun bei alten Mannchen; bei Beibchen und Jungen Unterleib weiß mit ichwarzbraunen wellenformigen Querlinien. Der junge Bogel rothlichweiß mit dunkelbraunen Langaflecken; Schwanz abgerundet 8-93. lang, meift mit 5 dunfeln Querbinden. Der Scheitel flach, die Flügel nach Berhaltniß furg, dagegen Bei= ne, Beben und Krallen außerordentlich groß und fart. Die Lange beträgt 21, die Breite aber 42 1/2 3.; der fehr gefrummte Schnabel mißt der Lange nach 11, im Bogen aber 23 3. Der Rachen blau, die Mundwinkel und Wachshaut gelb, fo auch die Bris; je alter der Bogel ift, defto schoner ift fie, beinahe orange.

Man trifft ihn in allen nordlichen und gemaßigten Climaten von Europa und Ufien, fo auch im nordlichen Umerifa und Er liebt die Ebenen wie die Berge, wenn fie nur Baldungen haben und mit Bie= fen und Feldern abwechseln. Bei uns ift er Bug =, Strich = und Standvogel, da man ihn faft das gange Jahr hindurch fieht. Er ift fcheu, beim Berfolgen aber defto dreifter. Gein Betragen übrigens wild und unbandig, und schon lange gehört diefer Flüchtling zu den Beigvogeln, mas man an feinem gangen Be= tragen leicht feben fann. - Geine Stimme bei Ungft und Schreck ift ein hohes Rirt, firf, firf! Sonft hort man auch noch ein farfionendes: Gia, giaf, giaf! mas er be= fonders im Streit mit andern boren lagt. Muf Baumen mittlerer Große ruht er aus, mahlt auch dergleichen gern zu feiner Rachtrube.

Den flichenden Bogel greift er von unten auf oder von der Seite; feinen Raub verzehrt er meift auf einem alten Baumstrunk. Er jagt Rebhühner, Tauben, Fasane, Rraben, Seber u. s.w., doch auch kleine Bogel: Finken, Stieg= lite u. s. w., junge Hafen, Hamster, Maufe, lettere nur im Nothfall. Alle diese furchten aber auch den Rauber so, daß sie oft vor Furcht sich nicht von der Stelle ruhren. Richt felten jagt er eine arme Taube, die vor Schreck in ein Fenster fliegt und es zertrummert. Die Bogel rupft er erst vor der Mahlzeit, fleine Saugethiere verschlingt er aber ganz; auf Aas

geht er nie.

Schon im Marg fieht der fleifige Beobach= ter der Natur bei ichonen Sagen Mannchen und Beibchen in unermeflichen Sohen fich dre= hen und fpielend über dem Orte, wo das Beib= den fein Wochenbettchen anlegen will, fchwe= Cie mablen dazu in unfern Baldern die hochften Baume. Der Borft beffeht aus dunnen Reifern, Moos u. f. m., ift febr groß und flach. Er enthalt 3-4 grunlich weiße, fparfam gelbbraun geflecfte Gier, bismeilen un= geflecft, von der Große der Suhnereier, mit ftarfer, etwas rauher Chale. Rach 3 200= chen findet man darin die mit weißen Dunen befleideten Jungen. Bahrend diefer Beit nahrt er fich, fein Weibchen und die Jungen von alten und jungen Baldvogeln_und besucht fel= Alte Rraben, Ringel= und ten das Feld. Turteltauben holt er nicht felten gu diefer Beit von den Reftern, wodurch er die Bruten perdirbt.

Außer den gewöhnlichen Bogelfeinden im Gefieder und in den Eingeweiden verfolgen ihn unaufhörlich die Krahen, als ihren Todfeind, meift in Gefellschaft, denn faßt er eine einzelne, so bußt sie gleich mit dem Tode. — Sehr gestättigt laßt er den Schüßen ziemlich herankomsmen. Man fangt ihn sonst auch oft in Raubsvogelfängen und auf Bogelheerden. Auch seine Fänge, als eines so gewaltigen Raubers, löst man gut aus. Denn einen Fasan frist er in einem Tage; nach diesem Berhältniß läßt sich leicht abnehmen, was iahrlich ein Parchen mit seiner Familie, um zu leben, abwurgen muß. —

Der grausame habicht. (Falco destructor. Harpyia destr. Vieill.)

Sat sehr muskulose Fuße und furchtbare Fange. Um hinterhaupte hat er einen nach hinten liegenden unbeweglichen Federbusch; seine Farbe ift schwarz, die Federn mit grauen Spisten. Ropf und Hals dunkelgrau; ein breites schwarzes halsband umgiebt den Nacken, sein oberer Theil vereinigt sich vorn am halse; der Bordertheil unter diesem halsbande, so wie übrigen vordern Theile rein weiß; an den hosen stehen auf weißem Grunde schwarze Duerbinden; der obere Theil des Korpers

schwarz mit graulichen Streifen, Flügel schwarz; am Schwanze 4 breite, schwarze, und 4 dunsfelgraue Bander, die Spige hellgrau; Bachsehaut und Füße gelb; der obere vordere Theil der Versen mit weißen Federchen bedeckt. Auch hier mag Alter und Geschlecht manche Abweischungen verursachen. — Die Länge beträgt 3 F. 2—3 S. Sein Baterland ist das südliche Amerika, wo er größere Säugethiere, besonders Faulthiere, zu seiner Beute wählt.

Der Sperber, Finken-Habicht. (Falco Nisus. Linn.)

Bris, Wachshaut und Fuße gelb, lettere mit langem dunnen Laufe und ichlanter Dit= telzeh, Schwang mit geradem Ende und mit 5 fcmarglichen Querbinden. Der alte Bo= gel: oben blaugrau, unten weiß mit braunen oder rofifarbenen Wellenlinien. Der junge Bogel: oben graubraun, unten weiß, an der Rehle und am Borderhalfe braun in die Lan= ge, am Bauche und an den Schenkeln in die Quere geflecht. — Un Geffalt ift er der Sih= nerhabicht im Rleinen. Mannchen und Beib= den find in der Rleidung, Große und lebens= art fo verschieden, daß man fie gar nicht für eine und diefelbe Urt halten follte. Das Mann= chen mißt in der lange 13, in der Breite 254 3. und ift oft fo schmachtig, daß es nicht fel= ten 5-63 Poth weniger als das Weibchen wiegt. Der Schwang 6 3. lang; die Flügel= fpigen reichen fehr wenig über die Mitte des Chwanges bin. Der fehr hackenformig ge= frummte furze blauhornfarbige gezahnte Cona= bel ift im Bogen gemeffen von der Stirne bis gur Spige 8 Linien lang; Fugwurgeln und Be= ben lang, dunn, geschmeidig und die Gefente der außern und mittleren Beben haben einige längliche Ballen an den Fußsohlen. Zwischen der außern und mittlern Zehe eine furze Spann= Das Weibchen ift 15-161 3. lang und 31 - 32 2 3. breit. Auch ter Schnabel deffelben mißt im Bogen 10 Linien.

In unfern Gegenden gehört diefer Bogel zu den gewöhnlichen Naubvögeln. Er zieht im September und kommt im Marz wieder. In der übrigen Zeit halt er sich besonders da auf, wo er brutet: nach der Ernte aber freift er umher auf Feldern und in Feldhölzern. Im Binter sieht man ihn auch in der Nahe der Oorfer, Garten und Busche durchstreichend, wo er besonders die Sperlinge heimsucht und sie

bis in ihre Schlupfwinkel verfolgt. Er ift in gang Europa, ja in den nordlichen und gemä= figten Zonen Uffens und Ufrifas zu finden. Er ift ein fuhner, beherzter und außerft ge= wandter Bogel, der jedoch, bei aller angebor= nen Scheu, doch leicht ju gahmen und ju Bogeljagden abzurichten ift. Gein Betragen ift fect und liftig, sein Flug schnell. Er schwenft fich febr geschieft und schlupft durch fleine Deff= nungen, pfeilfchnell gleichfam durch die Luft fchiegend. Bei Gefahren ift feine Stimme ein Gefdirfe, das wie die Gilbe: firf, firf, firf! flingt, auch bort man zuweilen ein fanf= tes: gu, gu, gu! besonders jur Paarungs= geit. Oft neckt er fich mit Kraben und andern Raubvogeln. Erft fpat geht er gur Rube, der er auf niedrigen Baumen des Stangenholjes, in Baumgarten und Bufchwerf pflegt. - Er nahrt fich von allerlei fleinen Bald = Gingvo= geln, Maufen und bisweilen auch von Infef= ten. Er jagt wie der Suhner= Sabicht, und verzehrt auch eben fo hinter einem Stamme oder Strauche in Rube die gemachte Beute. Den großern Bogeln rupft er fehr reinlich die meisten Federn aus, ehe er sie frift. Mannchen ift nicht fo fect, jagt vielmehr im Walde Finken, Meifen, Spechte und alle Ur= ten Rrammetevogel.

Im Upril einigen sich die Gatten und mah= len größere Waldungen, wo sie Nadelwaldun= gen vorziehen. Gie legen ihr Reft auf Baumen von mittler Große an, die dicht fiehen und bauen es von durren Reifern, inwendig mit Mood und Thierhaaren ausgelegt, flach, wie die meiften Raubvogelnefter. Oft bildet auch ein altes Krabenneft die Unterlage. Man fin= det darin 3-4, bisweilen 6-7 grunlich= weiße leberbraun und rofffarben befpriste oder ge= fleckte Eier, die binnen 3 Wochen ausgebrutet werden, mahrend welcher Zeit das Mannchen fein Beibchen mit Rahrung verforgt. weit beherztere Weibchen zeigt fich auch hier, wenn man ihm die Jungen nehmen will, mu= thig und fliegt schreiend nahe um den Ropf des Menschen berum, der ihm feine Rinder rauben will, indeffen fich das Mannchen in giem= licher Ferne halt. Die Jungen werden mit fleinen Waldvogeln, Maufen und Infekten

groß gefüttert.

Rrahenarten, Bachstelzen und Schwalben verfolgen diefen kleinen Nauber, dem fie doch nichts anhaben konnen, mit Gefchrei. Sonft plagen auch ihn die gewöhnlichen Bogelfeinde

in und auf feinem Körper. — Durch Gewehr und Raubvogelfallen, wo man kleine Bogel und eine Taube als Lockung anbringt, wird er leicht erhalten; das feigere Mannchen geht nehmslich nach den kleinen Bogeln, das Beibchen aber nach der Taube; auch wird dieser schnelle Räuber, indem er auf Heerden den Lockvogel holen will, östers erwischt.

Das Weibichen laßt sich jum Fang der Rebhühner, Wachteln, Lerchen, Sperlinge u. bergl. abrichten. Ein Freund von mir sing Sperlinge damit auf folgende Art: Er hatte ein Beibichen an einen langen Faden gebunden und damit begab er sich in einen hof, wo Sperlinge saßen. Plöglich ließ er das Weibschen, es am Faden haltend, fliegen; die ersschrockenen Sperlinge entwischten pfeisschnell in ihre Schlupswinkel, wo sie dann von seinen Begleitern hervorgezogen wurden. Die Fänge (Fisc) dieses Raubers werden auch von der Obrigkeit den Jägern ausgelöst. Seinen Nusgen und Schaden bekundet seine Nahrung.

Milanen. (Milvi.)

Schnabel: schwach, nach Proportion des Bogels flein, an feiner Bafis nur wenig ge= frummt; Ropffedern verlangert, in eine Spige auslaufend; Mund bis unter die Augen ge= Rafenlocher: schief, ihr angerer Rand mit einer Falte bezeichnet. Fuge: mit furgem, nur etwas unter dem fogenannten Rnie befiederten Lauf, und furgen, mit meni= ger gefrummten, nicht großen Rrallen bewaff= neten Beben. Schwang: mehr oder weniger gabelformig. Flugel: groß und lang, die erfte Schwinge viel kürzer, als die sechste; die vierte ift die langfte von allen. Das Befieder ift groß, ziemlich locker und abftebend; die Federn haben nicht allein am Ropfe und Salfe, fon= dern auch noch die Bruft herab eine schmale, jugespitte Form.

Sie gleichen in ihrem Betragen den Geiern, haben sigend ein ungeschieftes und trauriges Unsfelen, aber ihr Flug ift zierlich; sie gleiten ohne Alügelbewegung sanft durch die Luft, schwimmen gleichsam in derselben und beschreiben oft schone Kreise. Sie ergreifen ihren Raub nicht fliegend, sondern überfallen denselben an der Erde aus einer geringen Sohe herab. Sie fressen gern Alas.

Der rothe Milan, roftige und roths liche Beihe. (Falco milyus. Linn.)

Sauptfarbe roftfarben; der große, farf ga= belformige Schwanz unvollfommen gebandert; die außern Federn deffelben über 24 3. langer, als die mittelften; die Fußmurgeln halbbefiedert und gelb. Diefer bei uns oft vorfommende Naubvogel ift 25 3. lang und 60 3. breit; das Beibchen 28 3. lang und 66 3. breit. Die großen Flugel reichen fast bis an das Ende bes Schwanzes, wenn sie in Ruhe liegen. Der etwas in die Lange gezogene Schnabel ift fehr frumpf gezahnt, die herabgezogene Spige giem= lich furz und flumpf schwarz, nach der Bur= gel zu blaulich, bei recht Alten gelb; Bache= haut und Mundwinfel gelb; die Fris filberfar= ben, im hohen Alter blafgelb. Die Lange des Schnabels, im Bogen gemeffen, 11.3. Die wenig gekrummten schwarzen Krallen find nicht groß; zwischen dem außern und Mittelfinger eine, bis gum erften Gelenke reichende Spann= haut.

Das alte Mannchen hat etwa folgende Zeichnung: die Federn an der Kehle sind weiß und haben langs dem Schafte einen schwarzsbraunen Schmiß; die spießförmigen Kopfsedern sind weiß, hellrostfarben gemischt, in der Mitte mit einem schwarzbraunen Schaftstrich; die Halssedern mehr rostroth; Rucken = und Schulztersedern in der Mitte braunschwarz, breit mit Rostroth eingesaßt und weißlich gekantet; die großen Schwingen schwarz. Der Schwanzsammt den Steißsedern rostroth mit schwarzen Vederschäften; Brust, Bauch und Hosen rostroth. Das alte Beibchen ist etwas größer und

Man findet diesen Bogel in ganz Europa bis Norwegen hinauf, auch in Asien und dem nördlichen Afrika. In manchen Gegenden führt dieser bekannte Bogel den Namen: Sulewih, vermuthlich von den Borten: "Beihe, die etzwas holt," indem sie nicht selten junge Suhsner, Enten und Ganse dem Landmanne selbst vom Hose holt. Im Herbste sieht man auf ihren Zugen meist kleine, ja große Gesellschafzten zu 50 — 100 beisammen. Jur Brützeit suchen sie Balder auf, welche mit Feldern und Wiesen abwechseln, sowohl in ebenen als gezbirgigen Gegenden. Sonst ist es ein Feldvozgel, der nur zur Nachtzeit den Walo wählt.

- Uebrigens ift er ein trager schwerfalliger

hat fast gleiche Farbengeichnung.

Bogel, der auf Feldern auf Steinen und Erdsschollen sitt. Sein Flug ist langsam, fanft und schwimmend. Oft sieht man ihn auch in der Luft sich herumdrehen, ohne die Flügelbeswegungen zu bemerken, und zwar so hoch, daß er nur noch als ein Punkt erscheint. Sein Gang ist schwerfällig; Geruch und Gesicht scharf. Seine Stimme, die man nur selten hört, klingt wie: hiah! hi — hi — hiah! Bisweilen hört man auch noch angenehmere Tone, wie zur Begattungszeit, die eine Art Gesang bilden.

Außer den schon oben angegebenen raubt er nur, als ein träger Bogel, sigende und frieschende Geschöpfe, als: junge Hasen, Maulswürfe, Mäuse, Schlangen, Eidegen, Frosche, Heuschreiten, Käfer und Regenwürmer. Ersblicken ihn alte Enten, so machen sie durch ein mächtiges Geschrei Alles auf diesen Räuber aufmerksam, und die jungen Wasservögel such en in ihrem Elemente Schus. Auch franke und todte Fische verzehrt er; eben so besucht er fleißig die Schindanger, wo er es sich gut schmecken läßt. Dem Taubenfalken jagt er auch nicht selten seine gemachte Beute ab.

Im Fruhjahr fann man durch ichone Schwen= fungen beider Gatten, die fie in beträchtlichen Sohen maden, den Ort ahnen, den fie gur Unlegung ihres Reftes mablen werden. wählen dazu große Feldhölzer, auch andere Baldungen auf Ebenen oder Gebirgen. Ihren Borft tragen bobe Buchen oder Gichen, oder Die hochsten Fichten und Sannen. Er ift groß, aus trocknen Reifern flach gebaut, mit Sal= men, Moos und Bolle ausgelegt. - Man fin= det darin 3 weißliche, mit rothlichen Flecken beffreute Gier, die binnen 3 Bochen ausge= brutet merden. Das Mannchen verforgt un= terdeffen das brutende Beibchen mit Rahrung, die oft meilenweit herbeigeschafft wird. Jungen verrathen oftere durch ihr Gefchrei, mas fie bei Unfunft ihrer Eltern erheben, das Muf dem breiten Rande deffelben ger= fruckeln fie den Raub fur ihre Brut, von de= ren Heberbleibseln fich ein ftarfer Beruch ver= breitet .- Schmarozerthiere plagen auch diefen Bogel, fo wie ihn fleinere Bogel, als einen Raubvogel verfolgen.

Bill man ihm anschleichen, so muß es mit vieler Behutsamkeit geschehen. Um besten erreicht man seinen Zweck auf der Krähenhütte, wo er gern mit seines Gleichen aufbaumt. Bei Las, in Naubvogelfangen, so wie in Tellereisen, worauf man einen todten Bogel, Maul-

wurf u. dergl. bindet, ift er leicht zu bekommen. Sonft fing man ihn auch mit abgerichteten Falken, mas ein niedliches Schauspiel gewesen sein soll, woher er auch in Frankreich den Namen le Milan royal, königlicher Mislan oder Königsweihe, erhalten hat. — Sein Nuhen besteht in Bertilgung uns schadlicher Thiere und Berzehrung des Alases. — Einigen Schaden thut er dem Hausgesslügel und durch die Bertilgung der Eier und Jungen der auf der Erde nistenden Bögel.

Der schwarzbraune Milan. (Falco eter. Linn.)

Der Oberleib schwarzbraun; der Schwanz mit vielen schmalen schwarzen Querbandern be= zeichnet, nur etwas gabelformig; die außern Schwanzfedern nicht über 1 3. langer ale die mittelften. - Er ift übrigens frandhaft, fleiner und ichmachtiger ale der vorige, 20 bis 25 3. lang und 48 bis 50 3. breit. Die Flugelfpi= Ben erreichen in der Ruhe liegend das Schwang= Der Schnabel mißt im Bogen 1 3. Er erscheint febr geftreckt mit 5 -- 7 Linien. langem Sacken und frummt fich in einem fanf= ten Bogen fast von der Wurgel aus; die Farbe ift fdmarg. Bachehaut und Mundminfel oran= gegelb; die Bris in der Jugend dunkelbraun, im boben Alter gelblichgrau, fast wie in den Ragenaugen.

Um Mannchen find Ropf, Reble und Sals fcmuzig weiß mit dunkelbraungrauen Schaft= ftrichen; die Bruft rothlichbraun mit fcmalen, dunfelbraunen, lichter begränzten Schaftflecken; Sofen, Bauch und Ufterfedern heller als die Bruft, oder rofibraun mit schwarzen Schaft= ftriden; Rucken, Schultern, Steif und die Flugeldecffedern dunfelbraun mit fcmalen lichs tern Caumen; Edmingen braunschwarz. Der Schwanz braun, mit 9 — 12 schmalen schwarz= braunen Querbinden. — Much bei diefem ift das Weibchen großer als das Mannchen; im Gangen ift es dunfler und an den lichtern Stels len mehr mit roftbrauner Farbe übergoffen, die an den langen Sofenfedern befonders hervor= ftechend ift. Die Jungen haben ein einformi= geres Braun und Bachshaut und Fuße find bei ihnen heller gelb; der Schnabel ichmarg und die Bris dunfelbraun.

Diese Bogel bewohnen die warmern Sim= melöftriche der alten Welt; in den nordlichen Theilen nur im Sommer: im Winter weilt er im Suben. In Ufrita ift er gemein, hausfig im mittäglichen Europa, aber im nordlischen Deutschland schon feltner. Im Marg und October ift feine Zugzeit. Er liebt besonders solche Baldungen, welche Flusse und ftehende Gewässer in der Nahe haben. Um Tage hauft er mehr auf den Feldern und nur die Nuhe und die Brutzeit zieht ihn in die Balder zuruck.

Er ift übrigens weniger ichwerfallig, fein Flug auch leichter, als der des Borigen. Rubn erhebt er fich im Schneckenfreise ohne Flugel= fdwung zu einer unermeglichen Sobe. thut das Mannchen ofters auch über dem brii= tenden Beibchen, wobei es dann feine Stim= me, die mit der des rothen Milans Alehnlich= feit hat, boren laft. Bei feinen Raubereien bemerft man auch mehr Gewandheit, Borficht und Ruhnheit, als bei dem dummdreiften ro= then Milan. 216 Befangener benimmt er fich rubig und erträgt die Bitterung geduldig. Er hat die Rahrung des Borigen, Fifche und Frofche ichienen aber einem Gefangenen befon= bere ju behagen. Die Fische fangt er vorzüg= lich zur Laichzeit im flachen Baffer. Bogel aller Urt, Feld = und Waffervogel sind im Borfommer nebft Gifden und Frofchen liebste Rahrung; zahme junge En= ten und Ganfe raubt er auch, doch mit mehr Borficht ale der Borige. Gelbft todte Fische und las verfchmabet er nicht.

Die Wahl des Orts und die Urt des Rest= baues hat er mit dem rothen Milan gemein. Geine Gier find aber fleiner, an Bahl gewohn= lich 4. Der Grund ift meift graulichweiß und braun marmorirt oder dicht geflectt. Die Jun= gen find mahre Refthocfer, die mit Fifchen, Froschen und jungen Bogeln groß gezogen wer= den. Sie haben eine ahnliche pfeifende Stims me, wie die jungen rothen Milanen. Orte, mo fie einmal Beute machten, befuchen fie ofterer. — Feinde im Gefieder und im In= nern plagen ihn, wie den Borigen. Heberdem verfolgen ihn mit großem, angfilichen Be= fchrei und Biffen Riebige, Meerschwalben und Meven, wenn er fich ihren Reffern nabern, mo er dann meift fein Beil in der Flucht fucht. - Er ift fcheu und deshalb fchwer zu schiefen. Mit Tellereifen, ins flache Baffer gelegt und einen Fisch darauf befestigt, fangt man ihn am leich= teffen. Durch Bertilgung schadlicher Thiere nuft er, schadet aber dadurch, daß er viele Bruten der Feld = und Sumpfvogel gerftort,

junge Safen, domefficirtes Geflüget und Fi=

Der fleine Milan. (Falco Riocour. Vaill.)

Die Beine find furz und die Federhofen sehr stark. Die Form ift die der Milanen; der Schwanz stark gegabelt; die Flügel reichen bis zur Spaltung des Schwanzes. Alle obern Theile sind graublau; die Farbe ist etwas dunk-ler auf dem Rücken und auf den Schultern, als an Flügeln und Schwanz; die Spige aleler Schwungsedern der zweiten Ordnung ist weiß, die untern Decksedern der Flügel rein schwarz; Stirn, Zügel, Backen und alle unetern Theile rein weiß; der Schnabel schwarz, die Füße hellgelb.

Bei Jungen ift ber Schwanz weniger gefpalten, und am Unterleibe und den Schwungfedern bemerkt man eine leichte Noftfarbe. Er findet fich am Senegal.

Buffarde. (Buteones.)

Schnabel: fcmach, mit einem abgerun= deten, oft unmerflichen Bahn; der Ropf dict; der Rorper fart und plump. Tufe: mit mit= telmäßig farkem und kurzen Lauf, kurzen plum= pen Behen und nicht fehr großen wenig ge= frummten Rrallen. Flugel: von mittler gan= ge und mehr breit, die vier erften Schwingen ausgeschweift, die vierte am langften. Das Gefieder ift groß, weich und locker, die Riele fchwach und ziemlich fchlaff. - Gie haben eis nen tragen Flug, find muthlos und ungeschieft, leben von allerlei fleinen friechenden Geschöpfen und ob fie gleich geschickter als die Milanen find, fo fonnen fie doch nichts im Fluge fan= gen: fie erlauern ihren Raub vielmehr, auf einem Bugel, Steine oder Baume figend, oder nahe über der Erde hinfliegend. Gie fallen auch auf's las und trinfen in der Befangen= schaft Waffer.

Der Wefpen=Buffard, Bienenfalke. (Falco apivorus. Linn.)

Un ben Bugeln, fatt der Bartborften, mit bichtstehenden, derben, eiformig zugespisten Fc= derchen versehen; mit geftrecttem, flach gebo= genen Schnabel, in welchem am Gaume ein fleiner Bocker befindlich ift; mit langen fdma= len, Schiefftebenden Rafenlochern; mit unebe= ner, schwarzlicher, gelbgemischter (bei den Jun= gen gelber) Bachshaut; mit gelben Mundwin= feln und Augensternen (bei den Jungen grau= lich); mit vorn herab halbbefiederten Fufmur= geln; mit furgen, frarfen, raubbefchuppten Gu-Ben, die nur an den flachgebogenen Rageln einige große Schilder haben, und mit abgerun= detem, unregelmäßig gebanderten Schwange. - Die Lange des Mannchens ift 23 ! und die Breite 52 ? 3.; die des Schwanzes 11 3., wovon die in Ruhe liegenden Flügel 10 3. be= Der etwas geftrectte, fehr gufammen= gedrückte Schnabel befdreibt nur einen flachen Bogen und ift ungezahnt, ichwarz. Die mitt= lere Bebe ift 13 und die hintere 1 3. lang; 3mifchen der die Rrallen wenig gefrummt. außern und Mittelzehe ift eine furze Gpann= haut. Gie variiren in der Farbe des Gefieders ungemein. - Beim alten Mannchen ift ber gange Oberfopf icon afchfarben; Reble gelb= lichweiß mit wenigen schwarzen Federschaften; ber Rropf weiß, an der Scite lebhaft braun geflecft; Bruft und Seiten weißgelblich über= laufen, erftere mit fparfamen und fleinern, lets= tere mit größern braunen Querflecken fdwargen Federschaften bezeichnet. Die Schen= felfedern, die beinahe bis auf die Salfte des Laufes herabgeben, find fammt den Sofen gelb= lichweiß, lettere mit wenigen braunen Quer= flecken; der Bauch weiß, tesgleichen die lan= gen Afterfedern, die noch einige braune Quer= flecke haben. Der hinterhals und die langen Schulterfedern find tiefbraun, afchgrau über= flogen und mit weißen Endfantchen; desglei= chen die tiefbraunen Deckfedern, am Flugelbuge afchgrau angeflogen. - Die Beibchen find nur wenig größer ale die Mannchen, von de= nen fie fich auch in der verschiedenen Farben= zeichnung auszeichnen. Thre Hauptfarbe ift braun.

In Europa ist er ein bekannter Bogel; in Deutschland ist er fast allenthalben, doch nirzgends sehr gemein. In ebenen Gegenden, wo Bald, Wiesen und Gewässer mit einander wechseln, scheint er am liebsten zu hausen. Er ist ein Commervogel, der und vom August an bis in den October hin verläßt, im April aber wiederkehrt; zieht meist einzeln, seltener einige Familien zusammen. Er stiegt hoch und dreht sich oft ohne Bewegung der Flügel in einem Kreise herum. Sein langsamer Zug geht nach der Sonne Niedergang zu. — Er ist ein

sehr unedler, feiger, scheuer, trager Bogel. Gern sitt er auf Grenzsteinen, Feidbaumen oder am Rande eines Waldes. Er geht auch gut und geschwind und verfolgt so Insetten. Er straubt die Nackenfedern immer sehr auf, desgleichen die übrigen Federn des Korpers, was ihm ein eigenes großes Unsehn giebt. Zur Brutzeit laßt das Mannchen ein hastiges und oft wiederholtes Kick, kick, kick! horen.

Seine Nahrung befteht in Infeften, Re= genwurmern, Frofden, Schlangen, Gidechfen, Maufen, Maulmurfen, Ratten, Samffern u. bergl., die er jedoch nur fillfigend ju greifen weiß. Gang vorzüglich liebt und fucht er die Refter der hummeln und Befpen auf und lagt fich deren Brut vortrefflich fcmeden. Plun= derte er nicht anderer Bogel Reffer und raubte nicht zuweilen auch ein Saschen: fo fonnte man ihn unbedenklich zu den nuglichen Bogeln rechnen. Lagt er fich indeffen in der Brutgeit im Balde feben, fo fchreit das fleine befiederte Bolfchen unaufhörlich und fucht den Rauber dadurch und felbit durch Gewalt zu entfernen; besonders muthend feten ihm die Kraben gu. In feinem fleinen Magen fand man im Juni bei mehrern, die man erlegt, Bluthenfanden der Birfe, der Radelholzer u. dergl., ofters auch nur grune Raupen, mit einzelnen grunen Anofpen untermischt. Er foll auch Beeren freffen. - Frofche frift er gern, aber am lieb= ften Larven und Puppen aus den Summels und Wefpenneffern, die er, vielleicht durch Be= ficht und Geruch geleitet, fehr geschickt unter Gebuich und im langen Grafe aufzusuchen weiß. Oft spaziert er deshalb auf den Bies fen umber und lieft babei zugleich auch die an Blumen und Blattern figenden Infeften mit ab. - Im Mai legt er fein Reft in unfern Waldern auf den bochften Riefern und Laubs holzbaumen an. Es ift flach, außerlich theils aus grunen Zweigen, theils aus trocknen Rei= fern, inwendig mit Moos, Saaren und Fe= dern gebaut. Man findet darin 3, auf roft= gelbem Grunde fehr fart rothbraun gefleckte und mit diefer Farbe befpritte Gier, welche verhaltnismäßig flein und langlichter, als die gewöhnlichen Raubvogeleier find. Indeffen fin= det man darin doch nur 2, anfänglich mit Du= nen befleidete Junge. Buerft merden fie mit Daupen, Fliegen und andern Infeften gefut= tert, welche die Alten im Schlunde fammeln und ihnen vorfpeien; auch werden ihnen Scheis ben mit Brut von den Wespen vorgelegt. Werben sie größer, so erhalten sie Frosche, junge Bogel u. bergl. Es sind Nesthocker, die lange im Neste bleiben und sich futtern lassen.

— Auch sie werden von Schmarozern auf und in ihrem Leibe belästigt. — Als einen scheuen Bogel muß man ihn behutsam beschleichen. Mit einem lebenden Frosche ließe er sich vielsleicht auf einem Tellereisen noch am besten fans gen. Nuhen und Schaden ergiebt sich aus den oben angegebenen Nahrungsmitteln.

Der Rauhfuß=Buffard, rauhfußige Falte.

(Falco lagopus. Linn.)

Die Fuswurzeln find bis auf die Behen herab befiedert, diese nebst der Wachshaut gelb, der Rumpf auf weißem Grunde braungeflectt, an der Unterbruft ein großes dunfles Schild; der Schwang weiß, gegen das Ende hin mit einer dunflen Binde, bei altern Bogeln mit mehrern folder Binden; unter dem Flügel vorn am Daumengelent ein großer dunkelbrauner Fleck. — Lange 211 — 25 3., Breite 56 — 62 3. Die in Ruhe liegenden Flugel reichen mit ihren Spigen gerade bis an das etwas ab= gerundete Ende des Schwanges, der 8-83 3. lang ift. Das Gewicht beträgt gewohnlich 3-4 Pfund; das Mannchen wiegt meift 1 Pfund meniger, als das ffarfere und größere Weibchen. Der schwarze, an der Burgel blau= bornfarbige Schnabel ift flein, im Bogen ge= meffen 15 3., febr gefrummt und ungezahnt; der Rachen weit, Bachehaut und Mundwin= fel fchon gelb; der Augenffern lebhaft nußbraun, im Allter graubraun. Die scharfen Rrallen fchwarg, und zwifchen der außern und Mittels zehe ift eine furze Spannhaut. Die Beibchen find meift auf dem Ropfe und am Salfe mehr dunkelbraun gefleckt; auch ift der weiße Grund mehr braunlich überlaufen, der gange Mantel dunfler u. f. w.

Im Sonimer bewohnt dieser Bogel den Rorden der alten und neuen Welt. In Deutschsland findet man ihn besonders im Rovember und Marz, als seiner Zugzeit; im nordlichen Europa ift er ein bekannter Zugvogel, der sich im September einstellt, hier überwintert und im Upril wieder abzieht. Er streicht umher und bleibt da, wo er gute Nahrung sinder. Ebene Felder, die mit kleinem Geholze abwech-

feln, siebt er. Hier findet man ihn im Herbst und Winter allenthalben auf den Grenzsteinen, Feldhügeln und einzeln stehenden Baumen. — Er ist ein träger, schwerfälliger Bogel; sein Flug ist langsam und sanst; er kann sich ohne Flügelbewegung in einem Schneckenkreise bis über die Bolken erheben und sich so dem Auge des Forschers entziehen. Er ist sche und vorssichtig. Seine Stimme klingt hoch und hell: hüh! oder hiah! — Er sist mit aufgesträubetem Gesieder, wodurch er größer zu sein scheint. Gern wiegt er sich auf den hohen Spigen eiznes Baumes, wozu er dann die äußere Zehe zu der hintersten zurückschlägt. Nach Sonnenzuntergang fliegt er dem Holze zu, wo er Nachtzruhe auf einem starken Afte halt.

Seine Nahrung befteht in fleinen Thieren, als: Maufen, Maulmurfen, Samftern, Fro= fchen, Gidechfen, Infeften u. dergl.; er fangt auch zuweilen einen jungen Safen und franken oder gefangenen Bogel, auch angeschoffene Reb= hubner. Dem Saubenfalfen jagt er auch oft feine Beute ab. Ueber feinem Raube fieht er oft in der Luft flatternd oder ruttelnd, um ihn gewiffer zu greifen. Im Nothfall geht er auf Mas. - Er brutet nur im hohen Rorden, in Norwegen baufig, einzeln auf Rügen. In fei= nem Refte fand man 3 Gier; fie maren auf grunlichweißem Grunde hellbraun geflectt. -Mehrere Urten der sogenannten Bogelläuse und Eingeweidewürmer plagen auch ihn, fo wie auch die Rraben, die ihn frets verfolgen. -Bat man den Ort, wo er Rachtruhe halt, ausfundschaftet, fo fann man ihn leicht, be= fonders bei Mondschein, herabschießen. Leicht fchießt man ihn auch auf den Rrahenhutten, wo er dem Uhu fehr zusett. In Raubvogels fangen, worin man eine Taube hat, in Schlei= fen, die man an feine Lieblingsplage legt, des= gleichen in Tellereifen fann man ihn fangen. In bem Saushalte Gottes nugt er durch Bers tilgung schadlicher Thiere, g. B. der Feldmau= fe, wo man bei einem Gefchoffenen Ubends 5-6 Stuck in feinem Rropfe fand. Bierdurch wird er nuglich und verdient geschont zu mer= den. Bei diefer Rahrung wird er übrigens fo fett, daß es der Muhe lohnt, ihn auszubra= ten und das Fett als eine vortreffliche Leder= schmiere zu nugen, was ich auch bei einem meiner naturhiftorifden Freunde oft gefeben habe. - Man foll ihn übrigens auch gur Beige auf Safen abrichten fonnen.

Der Mäuse=Bussard. (Falco buteo. Linn.)

Die Bachehaut etwas aufgetrieben, nebft ben nacften Gugen gelb; Augenstern braun eder grau; die Schafte der Schwung = und Schwang= federn weiß; Glugelfpigen nahe an das Chwang= ende reichend; Schwanz wenig abgerunder, fast gerade, mit 12 dunfeln Querbinden. - Lange 22 bis 25 3., Breite 50 bis 58 3., der Schwang 9 3. lang. Der Schnabel furg, ge= frummt, frumpf gezahnt, ichmarz hornfarbig, unten und an der Wurzel grau = oder blau= hornfarbig, im Bogen 13 3. Die Behen furg, mittelmäßig dief und die außere durch eine fleine Spannhaut mit der mittleren verbunden. Die schwarzen Rrallen ziemlich groß, scharf, wenig gefrummt. - Das Befieder ift febr verschieden, denn man findet fie vom dunkels ften einfarbigen Schwarzbraun bis jum rein= fren Beif, mo man nun alle Ubftufungen je= ner Farbe zu diefer findet, fo daß man die gabllofen Uebergange nicht alle beschreiben fann. Bauptvarietaten find: der fcmarge, brau= ne und weißliche Maufe=Buffard.

Er ift über viele Theile der nordlichen Erde verbreitet: wird fowohl in Nordamerifa, wie im nordlichen Ufien und Europa angetroffen. Bei uns ift er ein Bug =, Strich = und Stand= Er zieht zu 50-100 zusammen ge= gen den Niedergang der Conne bin. Gie flie= gen boch, dreben fich in großen Rreifen und bewegen fich fo langfam fort. Diefer Bechfel dauert den gangen Winter hindurch bis in den Upril, mo er fich dann an feine Brutorter begiebt. Im nordlichen Deutschland ift er daber im Binter der gemeinfte Naubvogel. Er mablt porgualich folche Gegenden, mo Betreide-Felder und Baldungen in der Rabe find; im Grub= ling fucht er aber größere Waldungen. - Er ift ein trager Bogel, der lange an einer Stelle auf einem Steine, Erdhügel oder fonft auf ei= nem erhabenen Orte fist. Er ift furchtfam und in allen feinen Bewegungen tolpifd. Er über= nachtet in Feldhölzern, wo er gern einen far= fen Uft in der Mitte eines Baumes mablt. Seine Stimme gleicht aus der Ferne ber dem Miauen einer Rate und flingt boch: biah! In der Brutzeit, und wenn ihn fehr hungert, lagt er fie oftere boren. Er ift febr gefraßig, doch aber scheu.

Seine Sauptnahrung befieht in Maufen, Maulmurfen, Samfiern, Ratten, Frofthen,

Eidechsen, Schlangen, Regenwurmern, Infets ten, zuweilen auch in jungen Safen. Cobald das Feld abgeerntet ift, sieht man ihn auf Beute lauern. Im Berbfte lebt er faft allein von Maulmurfen und Maufen. Gefchieft gieht er den aufwerfenden Maulwurf hervor, indem er mit beiden Beinen durch die lockere Erde greift. Bei fartem Frofte muß er oft Noth leiden; dem Saubenfalfen jagt er aledann bau= fig die gemachte Beute ab. Rebbühnern in ben Schneehauben geht er nach und vergehrt fie, mas er aber dann felbft mit dem Leben . Wefangene Rrammetevogel, fo bugen muß. wie andere dergleichen lof't er aus den Doh= nen oder Schlingen aus und verzehrt fie. In den Raubvogelfangen frift er das gefeffelte Thier auf, che er an feine Befreiung denft. Mus Roth geht er aufs Mas, magt es auch, ein Suhn, das fich etwa in den Garten des Dorfes verlaufen, ju holen. Das junge Feder= wildpret, junge Baldvogel und Gier merden von ihm febr beimgefucht, wenn feine Brut= zeit ift. Ginen Beweis von feinem guten Up= petite hat man bei der Untersuchung feiner in= nern Theile gefunden, wo noch 7-8 Maufe unverdaut angetroffen murden. - 3m Darg Ueber dem Orte, mo paaren fie fich fcon. fie ihren Sorft anlegen wollen, fieht man fie oft ftundenlang fich in Rreifen zu einer großen Sohe aufschwingen und mit einander fpielen. Die bochften Baume in Baldern mablen fie dazu. Der horft ift flach und befteht auswen= dig aus farfen trocknen Reifern und inmendig aus Moos, Thierhaaren und andern Materia= Meift besucht er das alte Neft wieder, mas er ausbeffert, oder mablt dagu als Grund= lage ein altes Raben = oter Rrabenneft. 3 - 4 grunlichweißen, bellbraun geflecften Gier brutet das Beibchen in 3 Bochen aus. Jungen, mit weißem Flaum bedecft, merden anfänglich mit Inseften, dann Maufen, Um= phibien, jungen Bogeln u. dergl. groß gefut= Diefe fleinen Rofthocker bleiben lange im Sorfte, laffen fich auch nachher, wenn fie schon ausgeflogen find, von den Alten lange noch ernahren. - Die Feinde haben fie mit den vorigen gemein. Um beften ichieft man fie, wenn fie Nachtruhe halten; leicht fangt man fie auch in Raubvogelfangen und fchießt sie auf der Krähenhütte. Ihr Nugen besteht in Bertilgung einer großen Maufe = Menge, wovon fie fo fett werden, daß man fie ausbraten und das erhaltene Tett als eine fcone

Lederfchmiere benuten fann. Gie fonnen lange hungern. -

Der hacken=Buffard. (Falco uncinatus.)

Der Schnabel ift zusammengedrückt und von oben nach unten breit; die Seiten der Kinnsladen gerade, aber die Spige endet in einem langen gekrümmten hacken; die Läufte kurz, zum Theil besiedert. Das alte Mannchen ift einfardig bleigrau, die untern Theile etwas hels ler. Schwung = und Schwanzsedern zeigen dunskelbleigraue Bander auf hellerm Grunde; nahe an der Burzel des Schwanzes ist eine breite weiße Binde; die Füße pomeranzenfarben; die Augen weiß; vor den Augen ein nackter Fleck, schon pomeranzenfarbig.

Das alte Weitchen heller bleigrau, Schwungsfedern grau und schwarz gewellt, Bruft und untere Theile bleigrau mit weißen, weit aus einander fiehenden Querbandern. — Bei juns gern Bogeln ift Kopf und Backen graubraun oder schwarzlich, am Nacken ein breites roftsfarbenes Halbband, Rucken und Flügel dunkelsbraun mit rostfarbenen Kanten u. f. w. Lange 14—16 3. — Bon Rio-Janeiro an bis zum

trifft man diefen Bogel.

Beihen. (Circi.)

Rorden von Brafilien und in gang Gujana

Schnabel: flein, etwas zusammengebrückt; der Oberfiefer von der Burzel aus gekrümmt, worn mit einem frumpfen, wenig bemerkbaren Bahne, an der Burzel mit in die Hohe gebosgenen Bartborften besetzt, welche einen Theil der Wachshaut bedecken. Nasenlöcher: eisförmig. Füße: mit langem dunnen Lauf, nicht gar langen Behen, weniger gefrummten spigen Krallen. Körperbau: schlank, mit ziemlich langem abgerundeten oder geraden Schwanze. Flügel: lang, die ersten Schwungsedern sehr furz und wenig langer oder kaum so lang, als die 5te; die 2te etwas fürzer, als die 4te; die 3te die längste.

Ein Schleier, mehr ober weniger auffalstend, aus eigen gebildeten Federn bestehend, umgiebt den untern Theil des Gesichts. Das übrige Gesieder weich, am halse etwas locker, übrigens glatt anliegend, mit ziemlich schlaffen Federschäften. — Sie haben einen ungewissen

schwankenden Flug, und sind schneller und ges schiefter als die Milanen und Bussarde. Ihren Raub ergreifen sie an der Erde oder auf dem Basser. Sie jagen bis spat in die Abenddams merung und ahneln darin, so wie in der Gestalt ihres Kopfes, einigermaßen den Eulen.

Sie halten fich meift in ebenen Feldern, bei Geen und Moraften auf, wo fie auch brus ten. Wir fennen in unferm Baterlande 3 Urten.

Die Rorn= Beihe. (Falco pygargus. Linn.)

Ein beutlicher Schleier umgiebt ben untern Theil des Gesichts; die Flügel erreichen sißend das Ende des Schwanzes nicht. Der Schwanzist gebandert; die Bris gelb. — Das alte Mann chen oben licht aschblau, unten weiß; das Genick braun und unten weiß gestreift; die erste Schwinge schwarzgrau, die 5 folgens den schwarz, nach der Wurzel zu grau oder weiß, die übrigen aschgrau; der Schwanzschmal gebändert; Iris hellgelb. Das Mannschen 8 & 3. lang, 44 3. breit, der Schwanz 8 & 3. Der Schnabel mißt im Bogen 1 & 3.

Beibch en: oben dunkelbraun, rothlich= weiß gesteckt; unten weiß oder gelblichweiß mit dunkelbraunen oder hellrofifarbenen Lanzettsleksfen oder Langöffreisen; die Schwingen auf der untern Seite gebandert; Lange 21—21½ 3., Breite 46 3.; der Schwanz mit 4—5 breisten dunkeln Bandern; Tris gelb. Junge Bogel: oben dunkelbraun, rofifarbig gesteckt; unten gelbrothlich, mit braunen Langöflecken; Schwingen und Schwanz wie am Beibchen; Itis braun.

In Deutschland lebt biefer Bogel, den man auch in Ufrika und Umerika antrifft, meift in Ebenen, wo Sumpfe und große Getreidefelder mit einander abwechseln. Im Marz und Upril kommt er und im October zieht er wieder weg. Rur selten, in gelinden Bintern, bleiben eis

nige da.

Geine schlanke Gestalt berechtigt nicht, auf fraftige Schnelle zu schließen, da er in der That viel Phlegma besit. Meist nur niedrig fliegend, zieht er über Felder und Wiesen hin. Er ruht auf Steinen und freien fleinen erhas benen Orten; er schlaft niedrig in Feldhecken, langem Grase, Schilfe und Getreide, wohin er erst bei eintretender Nacht geht. — Selten ertont seine Stimme, die ein sanstes: Gagergäggäg! ift. In der Angst schiefert er

5 *

und beim Reffe bort man oftere ein durchdrin=

gendes Diepen.

Frosche und Maufe find seine gewohnlichfte Rahrung; er greift auch Bogel und Infeften, mozu er dicht über der Erde hinfliegt, unter fich fieht und dann ploglich auf das figende Geschopf losfturgt. Dies thut er meift nach Sonnenuntergang, mo jene Thiere, als Maufe, Samfter u. f. w. auszugehen pflegen. Bo= gel, Gidechfen, Infekten, junge Safen über= rumpelt er oft auf diefe Urt. Bogeleier und Die junge Brut nimmt er befonders in feiner Brutzeit fehr mit; dies empfinden vorzuglich die armen Lerchen und Rebhühner. 21as be= ruhrt er nicht. Seinen Daub verzehrt er meift gleich auf der Stelle. - In der Balfte des Mais findet man erft fein Reft, mas ftete nie= drig und in einem Strauche, im Rohre, Bei= dengebufch, auch in Rorn = und Rubfaatfrucken zu finden ift. Der horft besteht in einem gro= Ben Klumpen trockner Reifer, Gras, Robrhal= men, Mift u. dergl.; inwendig find Thier= haare, Moos u. f. w. Man findet darin meift 4-6 grunlichmeiße, ungeflecfte Gier; bismei= Ien find auch Buge und Flecken von einer schmu= zigen gelblichbraunen Farbe darauf. Gie mer= den in 3 Wochen ausgebrutet und die Jungen merden bann mit Infeften, jungen Bogeln, Maufen und Frofchen aufgefüttert. Gie pic= pen fast wie junge Suhner, doch ftarker.

Eingeweidemurmer und Schmarozerinseften plagen auch ihn, und Rraben, Bachftelzen, Schwalben und Ricbige verfolgen ihn mit gres fem Gefchrei. Man berückt ihn auf den Lerschenheerden, seltener auf der Rrabenhutte. 11es brigens ift er vorsichtig und man kommt felten

bei ihm zum Gouß.

Sein Nugen befieht in Vertilgung ber Feldsmaufe, Seuschrecken und anderer schädlichen Infetten. Auch sollen die Versuche, ihn zur Beize auf Nebhühner abzurichten, gelungen sein. Dagegen thut er den Bruten der Bogel, die im Freien niften, großen Schaden, z. B. Lerschen, Rebhühnern; auch junge hasen wurgt er.

Die Bicsen = Beihe. (Falco cinerasceus. Montagu.)

Der Schleier undeutlich; die Flügel fehr lang, mit den Spigen bis gegen und über das Schwanzende hinausteichend; Schwanz mit 4 — 5 dunfeln Binden. — Altes Mann= chen: aschblau, Bauch und Schenkel weiß mit

roftrothen Schaftstrichen; Schwingen erfter Ord= nung gang schwarz, die der zweiten lichtasch= blau mit einem schwarzen Querbande durch die Mitte; Bris hochgelb. Lange 17—18 3., Breite 46½ 3., Schwanz 8—9 3.

Altes Beib den und jungere Mannchen: braungrau; Scheitel roftroth und schwarz gestreift; Unterleib weiß mit fleinen undeutlichen rostfarbenen Flecken; Iris blaggelb. Das Weibchen nur einen Zoll größer, als das

Mannchen.

Junge Bogel: von unten durchaus rofffarben, ohne Flecke; von oben dunkelbraun mit
roftfarbenen Spigensaumen der Federn; unter
den Augen ein weißer Fleck und unter diesem,
auf den Wangen, ein großer dunkelbrauner;
der Bügel weiß; Schwung= und Schwanzsedern mit dunkeln Querflecken; Iris dunkelbraun.

Diefer Bogel ift in Europa, Ufien, Ufrifa und Umerifa zu finden. In Deutschland fin= det man ihn im Freien, befonders auf großen Biefen, langs Fluffen und andern Gemaffern, in weitlauftigen Moraften, die von großen Be= treidefeldern umgeben und hier und da mit Bufchweiden und Geftrauch befett find. Er liebt einsame Gegenden, die er gern auch durch= Als Zugvogel sieht man diefe Weihe fireicht. Unfange Mary ankommen und im Detober wieder abziehen. Sie fest fich eben fo felten als die Korn-Beihe und mablt, wenn fie ruht, gleiche Orte, auch gleiche Schlafffellen, hat überhaupt mit dieser vieles gemein. Im Fluge vermag auch fie feinen Bogel zu hafchen, nahrt sich aber eben von den Thieren, die wir bei der vorigen angegeben haben. - Die Wahl des Orts und der Bau des Horftes ift wie bei voriger; desgleichen hat fie auch die namlichen Feinde. Gie ift schwer zu schiefen, da fie fehr fcheu ift. - Rugen und Schaden hat fie mit der Rorn = Beihe gemein.

Die Rohr= Weihe. (Falco rufus. Linn.)

Warhshaut und Flügel blafgelb; Ropf weißlich; Schwung = und Schwanzfedern ein=

farbig, lettere felten dunkelgemaffert.

Beim alten Bogel: Bris gelb.; Kopf weiß, schwarzbraun gestrichelt; Schleier deutlich weiß und schwarz gefleckt; Hosen rofifarben; die zweite Ordnung der Schwingen aschgrau; ber Schwanz weißgrau.

Beim jungen Bogel: Bris nufbraun;

Sauptfarbe roffbraun ober bunfelchocoladen= braun; Scheitel und Rehle gelblichweiß oder roftgelb; Schleier dunkel und 'undeutlich.

Diefer Bogel weicht eben fo, wie feine Borganger, in den Farben des Gefieders fehr ab. Das alte Weibden mißt in der Lange 22-23 3. und in ber Breite 53 3. Das Mannchen ift weit schlanfer und schwacher; 21-22 3. in der Lange und 49-52 3. in der Breite. Die Flügel reichen bis an das Ende des 10 3. langen Schwanges. Der Schnabel ift flach gezahnt, blaulich, an der Spige fcmarg, auf dem Bogen gemeffen 11 3. Die ichmargen Rrallen find lang und fpi= pig, wenig gebogen; die Laufe im Berhaltniß der Beben febr lang. Bu den vielen Abande= rungen im Gefieder fann man auch noch das Abreiben und die Ginmirfung der Luft rechnen, wodurch er oft unfenntlich wird, mas wenig Bogel mit ihm gemein haben.

Diefer Bogel ift febr weit verbreitet; in Europa fast überall, wo nur fumpfige Gegen= den find. Als Bugvoget fellt er fich im Marg bei uns ein, wo man ihn dann über Feldern, Biefen, Gumpfen und Teichen fchweben fieht. Im October ift er wieder verschwunden. Fluge und Betragen hat er viel Uchnlichfeit mit der Rorn = Beibe. Er geht Abends fpat gur Ruhe, die er im Schilfe, Rohre und Bei= dengestrauche halt. Das Beibchen schreit hell: pis, - pis! und piep, - piep! Mannchen dagegen laßt in der Brutzeit einen Son horen, dem Mauen des Holzhehers ahn= Un schönen Frühlingstagen ertont auch oft aus hoher Ferne von ihm der Son: Reu

oder feih! -Ihre Rahrung besteht meift in Basser= und Sumpfvogeln; fehlen diefe, in Umphibien, In= Mues dics feften und fleinen Gaugethieren. rauben fie nur figend, die fliegenden entgehen Großere Gier faufen fie aus, ihren Rlauen. fleinere verschlucken fie gang. In Bruden und Rohrteichen thun fie ben Reffern der wilden Enten und Banfe fchrecklichen Schaden, denn mabrend ihrer Brutzeit nahren fie fich blos aus den Neftern diefer Bogel; meshalb fie auch be= fondere von Riebigen und Meven mit flagli= dem Geschrei und grimmigen Biffen verfolgt werden. Bilde Enten und Ganfe bedecken, wenn fie nach Rahrung ausgehen, forgfaltige ihre Gier mit Reftmaterial gegen Diefen Rauber. Unter den jungen Waffervogeln, nach denen diefe Weihe fammtlich jagt, leiden be=

fonders die Surbeln (Fulicae), die bei Erblif= fung derfelben fich mit haftigem Gefchrei ichnell jufammenrufen und fo dem nachfren Schilfe queilen. Dagegen vertheidigen bie alten Enten und Banfe ihre Brut muthig gegen diefen Rau= Fifche und Infetten frift er auch. Feld= maufe, Maulmurfe und Samfter, felbft junge Safen jagt und verzehrt er, meift gleich da, wo er fie fangt, mas auch von den Feldvogeln

gilt, die er ermischt.

Wenn im Dai das Rohr zu machsen ans fangt, fucht fich die Rohr= Beihe ein Plag= chen jum Bau ihres Reftes aus. Das Rohr (Arundo), Rolbenschilf (Typha), oder auch ein ins Baffer hangendes Beidengebufch werden dazu benutt. Das Reft ruht oft auf alten Schilffturgeln, fo daß es darauf fcmimmt. Es besteht aus Rohrstengeln, Schilfblattern, Bin= fen und einigen trocknen Reifern und ift flach. Man findet darin 4-5 den Suhnereiern abn= liche, nur rundere und etwas fleinere, grin= lichweiße Gier, die das Weibchen allein binnen Das Mannchen Scheint 3 Wochen ausbrutet. ihm unterdeffen durch mancherlei Schwenfun= gen in hoher Luft und traurig angenehme To= ne die Beit zu verfurgen, weiches Spiel oft ffundenlang fortgefeht ju merden pflegt. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Fro= fchen, Infeften u. dergl. aufgezogen, welche fie oft einige Meilen weit herbeiholen.

Der Fischaar, Baffer = und Sumpfvogel find feine vorzüglichen Feinde; auch die Rraben verfolgen ihn. Uebrigens haufen auf und in feinem Rorper Feinde. - Er ift fcmer gu fcbiegen, am beften durch Ueberrafchung und auf der Rrabenhutte. Mit Fallen, die man ins Baffer fellt und wo man einen Sumpf= oder Baffervogel jum Roder nehmen muß, er= halt man ihn leicht. Im Gangen schadet er mehr, als er nugt, durch Bernichtung fo vie= ler Bruten, und es ift deshalb Recht, Lofe=

geld auf feine Fange zu feben.

Die Gumpf = Beihe. (Falco palustris.)

Das alte Mannchen, 18 3. lang, ift an der Gurgel, am Geficht, der Bruft und allen untern Theilen rein weiß, nur bei jun= gern find die untern Theile burch fcmarge, mehr oder minder große und dunfle Striche und Blecke bezeichnet. Der Unterhals vorn, Scheitel und alle obern Theile des Rorpers und die Deckfedern der Flügel find ichon ichmarg; die größten Deckfedern find mit breitern blaugrauen, und ichmalern ichmarzen Bandern bezzeichnet. Bachohaut und Fuße gelb.

Das Weibchen, 20 3. lang, hat an den untern Theilen immer mehr Schwarzes, so daß oft diese Theile ganz schwarz = und weiß= gesteckt erscheinen; die Federhosen sind roftsar= ben gesteckt und die schwarzen Binden am Schwanze geben auch mehr ins Rostfarbene über.

Die Jungen find am gangen Unterleibe hell rofifarben mit braunen und schwarzen Flef= ken. Kopf und halb rofifarben, gelblich und schwarz gemischt; der Mantel schwarz, die Fezdern rofifarben fantirt; die Schwanzbinden roftsteben. Baterland Brasilien.

Die rofffarbene Beihe. (Falco rutilans. Temm.)

Dhne Schleier, der Körper menig schlank, der Schwanz furzer; dagegen die Flügel etwas länger, als bei den übrigen Weiben. Er ift ein Uebergangs = Vogel von den Buffarden zu den Weiben.

Mannchen und Weibchen an den obern Theilen lebhaft rofiroth mit Goldglang; auf dem Kopfe mit fleinen dunflern Schaftslecken; auf Rucken und Flügeln stehen große, braungraue Flecken; Halb, Brust und Bauch mit einer großen Menge schmater, schwarzer Querebinden; Hosen und Innered der Flügel rostsfarben; die Schwung und Decksedern der zweisten Ordnung sind rostroth, schwarz gewellt, an der Spise schwarz; der Schwanz schwärzelich, in der Mitte mit einer einzigen weißen odergraulichen Binde. Wachshaut und Füße gelb. Länge 18—20 3.

Das Baterland die feuchten Gegenden Gudamerifa's. Gie leben von Allen, Neptitien, Schnecken und großen Insekten, welche fie im Fluge fangen. Nach Agara sind sie in Paraguan sehr häusig, ob sie gleich nur 2 leberfarbene, mit blutrothen Blecken besprifte Gierlegen.

Diefe Bogel versammeln sich bisweiten in großen Schaaren mit einigen andern Naubvo=geln, um auf den ausgetrockneten und versbrannten Feldern Schlangen zu jagen.

Rranichgeier. (Gypogeranus. Messager.)

Der Schnabel furger als der Ropf, Dick, fart, hackenformig, fast von der Burgel an gebogen; an der Schnabelwurzel eine Baches

haut, etwas gewolbt und an der Spihe zusfammengedrückt. Beine sehr lang, dunn, Schens fel besiedert, der Lauf lang, unten etwas duns ner glo oben; Zehen kurz, unten mit Warzen versehen, die vordern an der Basis mit einer. Haut verbunden, die Zehe mit dem Laufe verstiedert; Flügel lang, die 5 ersten Schwungsfedern sind die langsten; an den Flügeln stumpfe Sporen. Es giebt nur eine Urt.

Der afrikanische Kranichgeier. (Gypogeranus africanus. Falco serpentarius.)

Das Gefieder diefes merkwurdigen Bogels ift am alten Mannchen: Ropf, Sals, Bruft und der Obertheil blaugrau, auf den Deckfedern ber Flugel mit einem leichten rofffarbenen Un= fluge; die großen Comungfedern fcmarg; Gur= gel und Mittelbruft meiß; die untern Decffe= dein des Schwanzes schmubigmeiß oder hell roft= farben; der Unterleid fcmarg; die Schenfel haben feine Sofen, ihre Farbe ift fdmarz. Der Schwang fart abgefruft, ichwarg, ins Graue giebend; die beiden mittlern Federn def= felben reichen weit über die andern hinaus; der Boget fann fie nach Belieben aufftellen und mit ihnen fpielen. Er hat auch am Salfe eine Urt Mahne von langen Federn. - Das Beibchen ift reiner grau, der Federbufch ift furger, der Unterbauch weiß und die Schenfel braun und weiß gebandert; die Mittelfedern des Comanges furger.

Rur alte Bogel haben am Flügel einen frumpfen Sporn. — Un Große gleicht diefer Bogel dem grauen Kranich, denn er mißt 3 F. 2 — 3 3. Er bewohnt die großen dursten Ebenen vom Cap, landeinwarts bis zum Lande der Kaffern, und das Namagua-Land.

Er ift scheu und schwer zu schießen. Mannschen und Weibchen halten sich meift beisammen. Jung gefangen taßt er sich leicht zahmen und aufziehen; ja bei hintanglicher Nahrung kann man ihn mit dem Hausgeflügel auf dem Hofe zugleich halten. Tritt aber Mangel ein, so greift er junge Hihner und Enten an; sonst ift er nicht bose und macht sogar den Friedenssfister, wenn jene unter einander zanken. Rateten, Mäuse und Schlangen vertreibt er aus den Huhnerhosen und frist sie. Er läuft sehr schnell, was er sogar dem Fliegen vorzieht.

Deptilien find feine Sauptnahrung. Schlans gen, giftige und giftlofe, greift er an. Er vers folgt fie; richten fie fich gegen ihn auf, fo

macht er ftarte Sprunge nach allen Geiten bin. Ihren Ungriffen fest er besonders feine Flugel entgegen, wo fie dann in den Federn ihren Gift entleeren und fodann unter feinen Blugelfchlagen betaubt hinfinfen; der frumpfe Sporn am Glugel dient ihm hier auch als fraftige Baffe. Den Betaubten gerbricht er durch einen farten Schnabelhieb den Schadel und schlingt fie, wenn fie nicht zu groß find, binab: fonft gerftuckett er fie. Rebft diefen vergehrt er noch Gidechsen, fleine Schildfroren und Infeften, befonders Beufchrecken. Baillant ift fein Appetit außerordentlich, in= dem er in dem Rropfe eines erlegten Bogels 21 fleine Schildfroten von mehr als 2 3. Breite, 11 Eidechsen von 7 - 8 3., und 3 Schlangen von Daumensdicke nebft einer Menge von Beufdrecken gefunden haben mill. - Begabint nimmt er alle Urten von Fleifch, felbft Fifche ju fich. Junge Suhner und fleine Bo= gel verschluckt er gang mit den Federn.

Im Juli beginnen die heftigen Kampfe der Mannchen um die Beibchen, welches dem fiarfeften folgt. Das Nest findet man in den diekten und höchsten Buschen, von Form platt, Im Durchmesser, von den Zweigen des Gebusches selbst vom Beibchen niedlich geflochten. Inwendig ist es mit Bolle und Federn ausgesüttert. Die Zahl der Gier ist 3-4, weiß, rostfarben punktirt, rundlich, von der Größe der Ganseeier. Die Jungen sind lange unbeholsen und lernen erft nach 4-5 Monatten schnell laufen; bis dahin gehen sie auf den

Läufen und frügen sich darauf. Neuerlich hat man es verfucht, ihn auf Martinique zu vermehren, um daselbst durch Bernichtung der dort so gefährlichen Lanzenvi= pern den Bewohnern eine Wohlthat zu erweisen.

Wenn wir vor dieser neuen Abtheilung der nachtlichen Raubvögel etwas verweilen und unsern Blief zurück auf das Borhergehende richten: so ist die weise Einrichtung, die auch jene bestiederten Rauber ins Leben rief, unverkennsbar. — Denn wie viele Aeser werden durch sie verzehrt, die die Luft verpesteten! Wie viele schädliche und durch ihre unendliche Bermehrung lästige Thiere werden durch ihre Raubsgier und Gefräsigseit eingeschränkt und verstilgt! — Dies scheint uns ihr Beruf in der Haubhaltung Gottes zu sein. Wie bewundernswurdig die Einrichtung hierzu, diesen Endzweck

ju erreichen! - Alles, mas die Beisheit des Mumachtigen hervorgebracht, hat feine beffimmte Stelle in dem großen Ringe der Befen; eins ift um des andern willen da, ob wir gleich nicht immer im Ctande find, den Grund baz von anzugeben, warum es gerade fo und nicht anders fei. - Rur ber Menfch, als Egoift, legt einen andern Maafitab an : die Frage, ob das Thier nuge oder ihm fchadlich fei? Denn nur barnach fpricht er fein Urtheil. - Doch auch hierin ift es beffer geworden, indem ter neuern Beit eine befonnenere Prufung gie Theil Man fprach gelindere Urtheile nach genauerer Untersuchung aus, und übersah bei einem fleinen Rachtheile den größern Rugen nicht, bedenfend, mas jene biblifche Stelle uns guruft: "Du follft dem Ochfen, der da dri= fchet, nicht das Maul verbinden." Dies lagt fich auf mehrere der nachtlichen Raubvoget, die und mehr Rugen als Schaden bringen, in mancher hinficht anwenden, wie ihre nabere Betrachtung lehren mird.

Eule. (Strix.)

Schnabel: von der Burgel an fark ab= marte gebogen, mit hadenformiger Spige und einer Wachshaut, ohne jahnformigen Musfchnitt. Beide Rinnladen fehr beweglich, die Wurgel derfelben, fo wie beinahe die gange Bachshaut wird von fteifen borftigen Federn perdeckt. Ropf: groß, febr dicht befiedert, eis nem Ragenfopf nicht unahnlich. Uugen: febr groß, in einem aus ffeifen Federn beftehenden Rreife liegend, meift vormarts gerichtet. Dh= ren: febr groß, mit gang eigen gebildeten Fes Fuße: dicht be= bern, ichleierartig eingefaßt. fiedert; die Beben ziemlich furz; die außere Borderiche vor = und ruckwarts beweglich, eine fogenannte Wendezehe; die Krallen nicht fart gefrummt, dunn und fehr fpig.

Ein Kranz oder Schleier, aus dichten absgerundeten Federn bestehend, umschließt das Gesicht, ift aber am deutlichsten an den Ohzen, wo er die sehr große Spalte des außern Ohres besonders einfaßt und die große Ohrmusschel bedeckt, sichtbar. Un den großen, gegen starkes Licht empfindlichen Augen sieht man sehr deutlich das mit dem Athemholen und der Bewegung der Lungen harmonirende Erweitern und Berengen des Sehlochs im Stern, so daß die Pupille bald groß, bald klein erscheint.

Der Kopf ift sehr beweglich. Die Flügel sind von betrachtlichem Umfange; die großen Gamin= gen ziemlich breit, am Ende abgerundet, ihre Schafte gebogen. Die vorderfte Schwungfeder, auch mohl die zweite und dritte noch, haben einen fammformig gegabnelten außern Rand. Die Schwanzfedern bei den meiften Urten mit abwarts gebogenen Schaften, mober es fommt, daß der Schwang fast lothrecht herabhangt. Das Befieder an den übrigen Theilen des Ror= pers ift groß, weich und fehr elastisch, fast im= mer tocker vom Korper abstehend; bei etwas Derbem Betaften fnickert es unter den Sanden. - 2118 nachtliche Raubvogel fliegen die Gulen meift nur in der Abend = und Morgendamme= rung und bei mondhellen Rachten. Wenige rauben am Tage, befonders bei trubem Bet= ter, doch nie bei fockfinsterer Racht. Ihr Flug ift fehr teife, fo wie ihr Behor; das Geficht fcharf. Um Sage figen fie gang fill mit an= gezogenen Federn an einen Baumffamm, Stein oder Erdscholle angelehnt, wodurch fie oft dem Sonft lieben fie ungeubten Auge entgeben. faft alle die Ginfamfeit und leben gern an schauerlichen Orten, in finftern Balbern, al= ten hohlen Baumen, Felfenkluften, alten Ge= bauden, Ruinen von Schlöffern, Thurmen u. Alle scheinen faft Strichvogel zu fein; felten ftreichen fie paarmeife.

Unter allen Bögeln machen fie die drollige ften Posituren, wozu selbst ihre sonderbare Gestalt viel beitragt. Dies geschieht meist bei Ersblickung eines unerwarteten Gegenstandes, wo sie sich drehen, wenden und bucken. Die oft schauerlichen Orte, wo sie hausen, ihre nachtsliche Erscheinung und selbst ihre oft so eigene Stimme gaben dem Aberglauben einen großen Spielraum, daher die Namen: Sodtens oder Leichenhuhn u. s. w. Dagegen war bei den Alltvordern die Gule der Gottin der Weisheit

(Minerva) geheiligt.

Rriechende oder schlafende Geschöpfe wersten ihre Beute. Nur die Tageulen rauben bei trübem Wetter am Tage. In bequemen Rachten rauben sie sehr eifrig und tragen die gemachte Beute in ihre Schlupswinfel, damit sie bei ungunstiger Witterung zu leben haben. Größern Thieren reißen sie zuerst den Ropf ab und schälen dann erst das Fleisch aus der Haut. Konnen sie nicht alles bezwingen, so wieleln sie das Fell wieder zusammen und fropsen es, zu einer andern Mahlzeit aussparend, in einen Winfel, wodurch es zugleich gegen Schmeiß-

fliegen und das Austrocknen gesichert ift. Kleis pere Wefchopfe gerknirschen fie mit dem Schna= bel und schlingen sie ganz hinunter. Im Noth= fall gehen fie auf 2las. Das Unverdauliche geben fie in langlichrunden Ballen (Gemolle) Ihren falfartigen, weißen, wieder von sich. fluffigen Unrath fpriten fie bei aufgehobenem Schwange weit von sich, mas man an ihren Wohnungen, wo er herabgefloffen, oft feben fann. - In den Sohlen der Baume, in al= ten Bebauden, Felfenfpalten u. dergl. findet man ihre funftlosen Refter, feltner bedienen fie fich dazu der Erde und alter Bogelneffer. Ihre weißen Gier find beinahe fugelrund. Ihre Jungen vertheidigen sie muthvoll, ja in einen Rafig gefperrt, futtern fie diefelben noch lange.

Fast alle Bogel sind ihnen feind und versfolgen sie am Tage mit Geschrei. Man schießt sie am leichtesten, wenn man das Pfeisen der Mäuse des Abends, wern sie fliegen, gut nachs machen fann; sonst werden sie auch in Naubs vögelfallen mit lebenden Mäusen leicht gefanzen, denn diese Thiere scheinen sie vorzüglich mit zu vertilgen und dadurch dem Menschen besonders nüglich zu werden, weshalb man sie auch schonen sollte.

Mehrere anatomische Eigenheiten finden sich

im Baue ihres Knochengeruftes. -

Man hat diese Gattung in mehrere Famis lien eingetheilt, wovon die Eintheilung in Sage, Ohreulen und Kauze die zwecknäßigste zu sein scheint.

Die mittlere Ohreule, Wald=Ohreule. (Strix otus. Linn.)

Un jedem Federbusche zeichnen sich vorzügslich 6 Federn durch ihre Größe aus. Der Schnabel ift schwarz, die Iris hochgelb; der Körper oben rofigelb und weiß, mit grauen und schwarzbraunen Flecken und feinen Zeichs nungen. Die Brust heltrofigelb, mit schwarzsbraunen Langöstreifen und Pfeilstecken, welche sich auf ihren beiden Seiten in Zickzacklinien verlaufen.

Das außere Ohr ist bei dieser Eule größer, als bei den übrigen Arten. Die Lange der sogenannten Federohren beträgt 1½ bis 2 3. Die Lange dieser Eule beträgt 14—15 3., die Breite 36—38 3., Schwanz 5½ 3. Die ruhenden Flügel reichen noch über das Schwanzs ende hinaus. Der Schnabel im Bogen 1½ 3. lang. — Die Füße durchaus, nur die 3eh=

fohlen ausgenommen, mit einem kleinen flaus migen Gefieder bicht bedeckt, der kahle Theil der Beben graugelb, die dunnen, nadelspigen, nicht fehr fart gefrummten Krallen brauns

schmarzlich.

Das Mannchen ift ftete fchlanter und et= mas fleiner als das Beibchen. Diese Gule ift in gang Europa, Afrifa, Afien und im nordlichen Umerifa ju finden. Waldungen in Ebenen oder auf Bebirgen, wenn fie nur nicht ju licht find, gewähren ihr einen Aufenthalt. Um Tage ift fie gern in einem dicht belaubten Baume, dicht an dem hauptstamme auf einem Backen figend, angelebnt, fchlafend. Im Com= mer trifft man fie einzeln in Baldern, fo auch im Winter; allein im Berbfte und im Grub= linge vom Februar bis in den Upril bin, ift fie haufiger, fo daß man fie ju 10 - 16

Stud beifammen findet.

Diefe Ohreule ift nicht wild, wird leicht gabin und vergnügt mehr als andere burch ihre poffierlichen Gebehrden. Um auffallendften geschieht es durch eine vorgehaltene Rage. Thre gewohnliche Stimme flingt wie: Suuf! Gelt= ner hort man den hohl = und dumpfflingenden Son: Bumb, - Bumb! der Stimme der großen Rohrdommel aus weiter Ferne nicht un= ahnlich. Im Borne lagt fie ein Blafen oder Fauchen horen, fnappt auch wie andere Gu= len mit dem Schnabel. - Ihre Rahrung be= fteht vorzüglich in Bald =, Feld = und Baffer= maufen, Maulmurfen, Thaufrofchen, großen Infeften, jungen und alten Bogeln, die fie im Schlafe zu überfallen pflegt. Bei anbre= chender Abenddammerung fangt die Jagd an, und dauert, ift die Racht nicht gu finfter, bis nach vollendeter Morgendammerung. Bei tic= fem Schnee im Binter fangen fie auch gro= Bere Bogel, die vor Ralte und Sunger ermat= tet find, als Rebhuhner. - Diefe Dhreule be= gieht gur Brutgeit in unfern Begenden ein als tes Bogelneft , 3. B. eines Buffards, einer Rrabe, Ringeltaube u. f. w.; da hinein legt fie im Mary 4, faft runde weiße Gier, Die das Weibchen in 3 Bochen allein ausbrutet und mahrend diefer Beit vom Mannchen reich= lich mit Speife verforgt wird. Bu Unfange fe= hen die Jungen weißlich aus; fo wie das Flau= mengefieder aber großer wird, befommen fie eine, mit dunfelbraunen Bellenlinien durchgo= gene, braunlichgraue Farbe; das Geficht mird gang fcmargbraun und an der Stelle der Fe= derhosen fteben 2 Buschel braungestreifter Du=

Sie feben febr abentheuerlich aus. -Bu ihren Feinden fann man alle Baldvogel gablen. 3m Befieder mohnen Comarogerin= feften, im Innern Gingeweidemfirmer.

Gie find leicht zu ichiefen, wenn man nur ihre Aufenthaltsorter auszufpuren verfieht; auch in den Raubvogelfangen mit lebenden Maufen leicht ju fangen. - Ihr Rugen befteht in Bers tilgung der Maufe, auch bedient man fich ih= rer, andere Bogel anzulocken. Den Schaden, den fie durch das Wegfangen halbverhungerter Rebhühner thun, und daß fie auch mohl einen gefangenen Bogel aus den Dohnen holen, darf man ihnen daher nicht fo hoch anrechnen.

Die furzohrige Ohreule, Sumpf= Ohreule.

(Strix brachyotos. Lath.)

Der Ropf etwas flein, die Federohren nur aus 2 - 4 febr furgen beweglichen Federn be= ftehend; der Schnabel und die Augenfreise fcmary; die Bris hellgelb; der Oberleib roft= gelb und weißlich, mit dunkelbraunen Flecken und groben Beichnungen; der Unterleib hellroft= gelb mit einfachen dunfelbraunen gangeflecfen und ichmalen Schaftftrichen; auf der Unters

feite der Flügel 2 fcmarge Felder.

Die fehr nahe beifammenftehenden und oft juruckgeichlagenen fleinen Federchen murden oft von dem Richtkenner überfehen. 3hr Ropf ift indeffen viel fleiner und die Flügel verhaltniß= maßig langer als bei den übrigen Urten. Die Lange beträgt 143 - 151 3., die Flügelbreite dagegen 44-46 3.; der Schwang ift 6 3. lang. Die Flugelfpigen reichen weit uber das Schmanzende hinaus. Der ungezahnte Schnabel mißt im Bogen 14 3. Die Fuße find bis an die Ragel mit dichten, furgen Febern bedeckt, fo daß nur die Unterfeite der Beben frei davon ift. Das Geficht hat durch den fehr deutlichen Schleier eine faft runde Geftalt. - Das Beibchen unterscheidet fich vom Mannden blos durch die ansehnlichere Große und durch ein fcmuzigeres, dunfleres Colorit feines Gefieders.

Diefe Gule icheint eben fo weit verbreitet, als die vorige. Im Norden von Europa ift fie ge= mein, befonders in ebenen Sumpfgegenden, die wenig oder gar feine Baume haben; das her in den Marfchlandern des nordlichen Deutschlands und in Solland ein fehr befannter Bogel. Gie fist am Tage jederzeit an der Erde zwischen kleinen Buschen, Disfteln, Reffeln, Rohr; im Herbst in Kohls und Kartosselackern u. f. w. Zu dieser Zeit wandert sie südlicher als die Waldohreuse. Im September und October, so wie im Marz und April, sieht man sie in unsern Gegenden am häusigsten, zu 10—16 Stuck in der Zugzeit bei einander. Eingefangen wird sie leicht zahm und sitt stets mit niedergelegten Federohren auf dem Boden ihres Käsigs. Ihr Flug ist am Tage sanft, langsam, schwankend, meist niederig; ihre Stimme klingt fanft und angenehm wie: kam, — kaw! Im Zorne bringt sie mit Zusammenschlagen des Schnabels ein laustes Knappen hervor.

Rach Untergang ber Conne erscheint fie in ihrem Wirfungefreise, bei trubem und fchlech= tem Wetter noch zeitiger. - Die Nahrung hat fie mit voriger gemein, und besucht dabei Gumpfe, Biefen und Felder. - 3hr Reft fin= det man in dem langen Grafe der Biefen auf Schilf= oder Binsenkufen, doch frete an trock= nen Stellen. Es befteht meift aus einer Sand= voll unordentlich hingelegten trochnen Miftes, durren Stoppeln u. dergl. Die 3-4 Gier find faft rund und rein weiß. In 3 Bochen fommen die Jungen aus, die anfänglich mit fcmuzigweißen Dunen befleidet find. Gie ba= ben mit den Borigen gleiche Feinde, werden in= deffen nicht fo fehr wie jene von andern Bo= Das Schießen und Fangen ift geln verfolgt. wie bei Boriger. Ihr Rugen ift unverfennbar in Bertilgung der Maufe = Urten und Infeften, weshalb man fie auch fchonen mußte.

Die gemeine Schleier=, Perleule. (Strix flammea, Linn.)

Mit weißlichem Schnabel; fehr dunkelbrausnem Augensterne; weißem, um das Auge hers um rothlichen Gesichte; rofigelbem Untertheile; aschgrau gewässertem, mit schwarzen und weissen Tropfen oder perlähnlichen Flecken geziersten Oberleibe; sehr wenig besiederten Zehen und einer am innern Rande gezähnelten Kralle der Mittelzehe.

Unter den einheimischen Raugen ift er eis ner der schönften und daher leicht zu unters scheiden. Beim lebenden Bogel bildet der Fes derkrang eine Herzsorm. Die Flügel sind lans ger als der Schwanz beim ruhenden Bogel. Das außere Ohr ift außerordentlich groß und die vordere Salfte ber Ohrmuschel bildet einen beweglichen Deckel oder Rlappe.

Die Lange des Bogels beträgt $14\frac{1}{2}-15$, die Breite 39 3.; der Schwanz 5 3. Bei dem in Ruhe sigenden Bogel reichen die Flüggelspigen $1\frac{1}{2}$ 3. über den Schwanz hinaus. Der Schnabel ist $1\frac{1}{3}$ 3. lang, nach der Spige zu schön hackenförmig gekrummt, stark abwarts gebogen, von Farbe weiß. Die Augen liegen tief, der Stern dunkelbraun, die Pupille blausschwarz. Die Krallen sind nadelspig. Männschen und Weibchen sehen einander sehr ähnlich, doch ist letzteres etwas größer und plumper, auch dunkter von Farbe. Das Männchen hat übrigens die weißen Perlen an den untern Theislen so schol wie das Weibchen, jungen Bogeln aber sehlen sie. Man hat ganz weiße.

Diese Eule ift sehr weit verbreitet in Usien, Ufrika und Umerika, die kalten Klimaten außzgenommen. In unsern Gegenden gehört sie zu den gemeinen Urten, die meist in Städten und Obrfern auf Thurmen, Kirchen, in alten Mauern, Scheunen, Taubenhäusern u. s. w. wohnen. Den Tag bringt sie schlafend zu, des Nachts schwarmt sie aber auf den Feldern, in Gärten und Wiesen umber. — Sie ist ein Standvogel, der immer bei uns bleibt. — Der lebende Schleierkauz hat ein possirliches Unsehen; sein Gesicht gleicht dem eines Uffen. — Jung aufgezogen wird er sehr zahm. »)

In meiner Jugend erhielt ich von vier aus bem Defte genommenen Schleierenten eine. Gie fraß fcon allein und erhielt mit verschnittenen Flügeln ihr Logis unter einem alten Schranke. Rachts lief fie im gangen Saufe berum, ichredte die Ragen und fing an ihrer Stelle Maufe. 3ch hatte ihr den Ramen Sans beigelegt, auf melchen Ruf fie auch kam und das Futter aus meis ner hand holte. Ihre eigentliche Pflegerin war aber eine alte bei uns bienende Rindermuhme, Die Jahr aus Jahr ein eine Pelamuge trug und mit ihrem Faltengefichte etwas Eulenahnliches Diefe feste fich unn täglich Abends bei einer Lampe fridend oder nabend an ein Caals fenfter. Cobald Dies mein Sans bemertte, fam er hervor und feste fich ju ihr in das Fenfter, wo fie ibn freundichaftlich anredend fütterte. Rach= her aber hielt fie nach Urt alter bute ein Gelbfts geiprad, mobei fie dann ihren Kopf bin = und herbewegte, und Sans, der dies bemerfte, machte Dieje Manvenvres treulich nach. Bufallig hatte ich fie aber babei fiberraicht und es den fibrigen Sausbewohnern mitgetheilt, Die dann oft Die schwerhörende Frau belaufchten und fich an die= fer Ropfpantomime ergogten. Sans ichredte inbeffen öfters burch fein nachtliches Berumschweis fen die Rachts fpat Unfommenden, weshalb er

Sein unangenehmer Son laßt fich nicht gut mit Gylben ausdrucken, etwa: drruuh; auch bort man oftere ein Schnarchen und Schnau= ben, dem Tone eines mit offenem Munde fchla= Im Fruh= fenden Menschen nicht unabnlich. jahre und vor ihren nachtlichen Musflugen hort man diefe Sone am haufigften. Das Schnie= ben oder Schnarchen gefchieht in Paufen, ge= rade wie von einem gefunden Menfchen, mas dem Aberglauben viel Stoff, indem - es bei Furchtfamen Furcht und Grauen erregt, gege= ben bat. 3m 2iffeft fnappt auch diefe Gule, wie die übrigen Urten. - Ihre nachtlichen Jagden beftehen in Maufen, Ratten, Gpig= maufen, Maulmurfen, Rafern und fleinen Bos geln. Gie fliegen in die Taubenschläge, ohne Diefen Thieren ju fchaden, ja diefe leiden es, daß fie darin niften. Ift ihre Jago gut, fo tragen fie ein, um bei fchlechter Bitterung, die sie mahrscheinlich vorher empfinden, nicht Roth zu leiden. Schlafenden fleinen Bogeln, felbft den in Bauern gehaltenen, ftellen fie nach, nehmen auch gern gefangene Bogel aus Dohnen und Schlingen aus. Ungefrellte Ber= juche haben gelehrt, daß ein Schleierfaug in einer Racht 15 Feldmaufe verzehrte. In Beit der Roth freffen fie auch 21a8. -

Bu Ende Marz tritt die Begattungszeit ein, wo man sie in Dorfern, doch noch mehr in Stadten, schreiend, jagend und spielend von Thurm zu Thurm fliegen sieht. Das Weibschen legt seine 4—5 weißen, etwas langlischen Eier ohne Unterlage in die Hohlen der angesgebenen Ausenthaltsörter. Die Jungen werden in 3 Wochen ausgebrutet; sie sehen anfangstich, mit weißen Dunen bekleidet, ziemlich häßelich aus. Die Alten tragen ihnen, wenn man sie nicht zu weit davon einsperrt, noch Raherung zu. — Shre Feinde sind die der übrigen

Schollen trug, die seine Gegenwart bekundeten.
— So weit ging nun alles gut; als aber meine Ettern zur Miethe zogen, bat die Bestigerin, die nun auch von Hansens Einzug Kunde bekommen, diesen Unglick bringenden Wogel ja abzuschaffen. Mein friedliebender Water sah sich daher genösthigt, mir dazu den Schreckensbesecht zu ertheisten. Mir Tyränen nahm ich sodam von meinem besiederten Freunde berzilichen Abschied, und als ob er es merkte, drückte er sein Köpfigen an meine Brust. So übergab ich ihn einem Unsern. Bald aber erhielt ich Nachricht von seinem Tode. — Bar dieser nun aus Sehnsucht oder das lasse ich ununsichieden.

Dr. E. A. B.

Arten. Leicht kann man sie schießen, auch fangen. — Man mochte sie aber lieber schosnen, indem sie eine unendliche Menge Mäuse vertilgen. Nach einer mäßigen Berechnung werden durch eine dieser Eulen 2190 Stuck Mäuse jährlich getödtet.

Der Baum=, Bald=Rauz. (Strix aluco. Linn.)

Der Ropf groß; der Schnabel blaggelb; der Augenstern dunkelbraun; an den Schulter= federn eine Reihe birnformiger weißer Flecken; der Unterleib auf lichtem Grunde, mit brau= nen Schaftflecken, welche auf beiden Geiten in Bicfgacflinien auslaufen ; der Oberleib mit vielen Punften, abgebrochenen Bellenlinien und unordentlichen Flecken von dunfler Farbe. -Much diefe Gulenart icheint großer als fie ift, wozu das aufgedunsene Gefieder die Beranlaf= fung giebt. Ropf und Sals find fo dick, bag fie faft von gleicher Starte mit dem Rumpfe ju fein icheinen. Das Geficht groß und faft rund; die Mugen von ungewöhnlicher Große; Die außere Ohroffnung dagegen nicht groß. Die vordern Schwingen haben einen fageartig ge= gahnelten Rand. Die Lange Des Bogels 16-17 3., die Breite 39-40 3., Schwang-Lange 7-8 3.; die Flügelspigen ragen nahe bis an fein Ende. Der ziemlich große, farte, fehr gefrummte Schnabel mißt im Bogen 11 3., von Farbe ichmefelgelb; Die Bachshaut über den runglichen Rafenlochern aufgeblafen und gruntich ; der Augenftern tief dunfelbraun; die Pupille blaufchwarz. Die Fuße find etwas furg, beinahe bis an die Rrallen mit dichten, wollichten Federn befleidet; die Krallen ziemlich groß, fpig, nicht fehr fart gefrummt.

Mannchen und Beibchen unterscheiden sich im Gesieder nicht so sehr im Alter, als viels mehr in jungern Jahren von einander. Alle Farbenverschiedenheiten beziehen sich bei dieser Eulenart nur auf die Grundsarbe, denn die Flecken behalten stets dieselbe Form und sind auf gleiche Weise vertheilt, ob sie gleich bei einigen sehr deutlich, dagegen bei andern verzwischter erscheinen. Das Weibchen ist stets etwas größer und dieser als das Mannchen. Bei dem jungen Weibchen ist das Gesieder wie mit rostrother Farbe übergossen. Dies hat zu vieslen Irrungen Veranlassung gegeben.

Diefe Gule ift über gang Guropa verbreistet; auch im nordlichen Affen wird fie gefuns

In Deutschland findet man fie überall, wo es nur Baume und Balder giebt. Den Eichen = oder Buchenwaldungen, wenn fie alt und gut befranden find, auch viele hohle Baume haben, giebt fie den Borgug. In den Commermonaten hauft der Baldfaug tief im Balde; vom Berbfte bis zum Fruhjahre aber fucht er fleine Feldholger, und im Winter große Baumgarten bei den Dorfern auf. Um Lage fist er fchlafend am liebften in den Ueffen ei= nes dicht belaubten Baumes. In den übrigen Jahreszeiten fucht er hohle Baume und Fel= fenhohien, verftecft sich auch wohl in abgelege= nen, alten, muften Thurmen und Ruinen. Er ift übrigens ein deutscher Stand = und Strichvogel. Gern fliegt er nach den nacht= lichen Feuern; fein Flug ift außerordentlich leife und gerauschlos. In der Gefangenschaft wird er bald gahm, befonders jung aus dem Refte genommen. Er bringt verfchiedene Sone hervor, bald ein heiferes Rreifchen, wie: rrahi! bald ein beffer flingendes : Ru, fühitt, fum= fitt, mas bismeilen wie fafit oder wie gi= witt lautet. Gine noch andere, in den Bal= dern fürchterlich wiederhallende Stimme ahnelt dem Jauchgen eines betrunkenen Menschen und flingt hoch: Suh — huh, — Suhu, huhuhuhuhu! mas am Schluffe auch einem heulenden Gelächter nicht unahnlich ift. Diefe lette Stimme icheint nur dem Mannchen ei= Außerdem lagt ber Baldfaug gen zu fenn. im Affekt ein dumpfes Fauchen oder Blafen horen und knappt dabei mit dem Schnabel. Er theilt mit feinen Geschlechtsverwandten die Hauptnahrung: Maufe, frift auch Frofche, Gi= dechfen, Rafer und andere große Infetten, zuweilen auch gang junge Safen, Raninchen, fleine Bogel; befonders holt diefe Gule die Be= fangenen aus Dohnen und Schlingen. hierzu benutt fie die Morgen = und Abenddammerung und helle Rachte. Bei großem Sunger jagt fie auch am Tage; nimmt auch mit Mas vorlieb.

Im Marz macht sie Unstalt zur Brut; sie wahlt dazu weite Baumhohlen, wo sie meist etwas Moos, Geniste und Federn einträgt und darauf 4—5 rundliche weiße Gier legt, worüber sie über 3 Wochen brutet. Die Junzgen sind mehrere Tage blind, ihre diesen rozthen Augenliederrander sehen aus, als hatten sie entzündete Augen. Ihre Bekleidung sind übrigens graulichweiße Dunen. Ihr Geschreiklingt fast wie ein starkes Zähneknirschen. Sie

find mahre Refthocker, die felbst ausgeflogen lange noch von den Alten gefüttert merden.

Federinfesten und Eingeweidewurmer suchen auch diese Art beim. Abends, besonders wenn man das Mäusepfeifen in ihrer Rahe nachmacht, oder in der Paarung auf der hohelen Hand ihren Ruf nachbildet, kommt sie leicht schuftrecht. Lebend erhält man sie auch im Raubvogelfange. Ihr Nuben wird durch ihre Nahrung bestimmt. — Im Binter bei starkem Hunger überrumpelt sie wohl manchemal ein Rebhühnchen.

Der große Schuhu, die Uhu=Ohreule. (Strix bubo. Linn.)

Die obern Theile dunkelrostgelb und schwarz geflammt, die Rehle weißlich, die Federbufche fast ganz schwarz, der Augenstern pomerans genfarben. - Unter den deutschen Gulenarten ift diese Ohreule die großeste. Das lockere Ge= fieder, meift vom Rorper abfiehend, giebt ihr eine noch icheinbarere Große, als fie wirklich Ihre Lange beträgt 24 - 25 3., die Breite 68-70 3.; der Schwanz ift 10-10-3. lang. Die jusammengelegten Flugel bedef= fen ihn bis auf & feiner Lange. Der fcmar= ge, ftarte, ungegabnte Schnabel ift über dem Bogen gemeffen 23 3. lang. Die runde Dhr= offnung ift verhaltnismäßig nicht fo groß, wie bei andern Gulen. Die Fugwurgeln und die obere Seite der Beben find dicht befiedert, die Zehensohlen rauhwarzig von braungrauer Farbe. Die Rrallen find groß, icon gefrummt, fart und dunkelbraun. Heber den Mugen erhebt fich ein Buschel 31 3. langer, schwarzer, seitwarts gelbbraun gefleckter und geftrichelter Federn, die aufrecht fiehen, sich jedoch etwas ruckwarts frummen und Hornern ahnlich feben. Schwingen find am Ende abgerundet, der aufere Rand der 3 vordern fagenartig gegahnelt, mit braunlichschwarzen und roftgelben, dunfel= braun befprigten, gleich breiten Querbinden durchzogen. Die Rehle ift weiß. - Das Mann= den ift fleiner als fein Beibchen; feine Dh= renfedern find dagegen an 4 3. lang.

Auch diese Eulenart ift weit verbreitet: in Europa, Afien, Afrika, Sud = und Nordame= rifa; in Deutschland ift sie jedoch nirgends sehr zahlreich. Sie liebt felsige und gebirgige Waldungen und besucht nur selten die Ebenen. Sind darin noch schroffe Felsen, mit tiefen Bergschluchten wechselnd, auch wohl Ruinen

alter Burgen und hohen verfallene Gebaube, fo gieht der Schubu dies allem vor; deshalb ift er auch mehr im füdlichen ale im nordlichen Deutschland. Im Thuringer Balde und auf dem Barg ift er überall befannt. Der Schuhu ift meift ein Standvogel. - Er fieht figend mit den großen Glogaugen und feine Bewegungen ma= chend fehr abenteuerlich aus. Wird er bofe, fo fcheinen feine großen Mugen ju funteln, er ffraubt das Befieder, faucht und fnappt mit dem Schnabel und fahrt dann muthend auf feinen Wegner los. Er ift überhaupt fuhn und beherzt und oft muß der Steinadler im Rampfe ihm unterliegen. Um Sage ift er meift mun= terer als die übrigen Gulenarten, und nimmt in der Gefangenschaft in diefer Tageszeit auch Rahrung ju fich. - Schon in den alten Bei= ten haufte er in den Thurmen alter bewohn= ter Burgen und Balofchioffer. Damals fpielte er schuldlos die Rolle der Gespenfter und in den Ergablungen vom wilden Jager fpielte er durch fein Berumfdwarmen und Schreien mit Rur jur Begattungszeit fin= die Sauptrolle. det man mehrere beifammen, fonft lebt er ein= Gein gewöhnliches Gefchrei ift: Puhu! und Puhuhe! es tont weit und flingt in je= nen Ginoden wiederhallend, furchterlich. Diefe Stimme wird mit einem etwas hohern Su! untermischt, fo daß burch noch mehrere 21b= wechselungen bald ein schallendes Sohngelach= ter, bald ein Rlaffen und Seulen von Sun= den, dem Jauchgen von Jagern, dem Wiebern von Roffen und dergl. abnitch, von diefen Racht= fcmarmern weit ertont; fo daß mohl ein aber= glaubifder Menfch in Furcht und Schrecken dadurch gefett werden fonnte. Jung aufgezo= gen merden fie oft febr gabm.

Der Uhu nahrt fich von allerlei fleinen Thie= ren; als: Samftern, Maulwurfen und Maufen, Schlangen, Gidechfen, Frofchen und aller= lei großen Rafern; aber er erhascht auch Birich= und Dichfalber, Safen, Raninchen, Muers, Birf- und Safelhuhner, Fafanen, Rebhuhner, Rraben, Beber und dergl. Den fleinen Thie= ren und Bogeln gerfnicft er mit dem Schna= bel erft den Ropf und die übrigen großen Kno= den, und verschluckt fie dann gang: größern Bogeln reift er den Ropf ab, entbloft die Saut etwas von den Federn, reift nun das Bleifch in ziemliche Studen und verschlingt et. Das Unverdauliche wirft er in Ballen (Be= wolle) durch den Schnabel aus. Großern Thieren reift er die Saut auf, frift das Fleisch

heraus, und kann er es auf einmal nicht aufzehren, legt er das Fell wieder zusammen und schiebt es, bis neuer Appetit eintritt, in einen dunkeln Winkel. Im Winter geht er aufs Nas. Er fliegt zeitig aus, bei trübem Wetter oft noch vor der Abenddammerung, und geht auch des Morgens erst spat zur Ruhe.

Ber einen Schuhu halten will, thut gut, einen jungen fich aufzuziehen. Man futtert ihn mit allerlei Geffugel, im Rothfall mit frepirtem Bieh. Gin fleiner Stall mit darin angebrachten Gigftangen, der etwas dunfel ift, Man gebe ihm nie zuviel, etwa fo viel als eine Rrabe beträgt. Er fann felbft einige Tage hungern, ja 4 bis 5 Bochen, mas aber graufam ift. - Saufen bedarf er nicht. Geinen Behalter muß man rein halten, meil er fonft unangenehm riecht. Man bringe auch den Behalter an einem einsamen Orte an, ba= mit er nicht fo oft geftort werde. - 3hr Reft, wozu fie ichon in der Salfte des Marges Un= ftalt machen, findet man aus vielen Stecken und durren Reifern und inwendig mit trochnem Laube und Genifte ausgelegt; es ift fehr groß, meift in einer Rluft zwischen Felfen oder alten Ruinen, felten auf abgeftutten Baumen. Bu= weilen findet man auch die 2, 3 hochftens 4, faft runden weißen Gier mit grobforniger Scha= le, etwas großer als ein Bubnerei, in Stein= hohlen, ohne ein Reft. Das Beibchen bebrus tet fie drei Wochen lang, bringt aber felten mehr als 2 Junge aus, die mit gartem lockerem Flaume befleidet find. Gie laffen beftandig ein ftartes Bifchen und zuweilen hellpfeifende Tone horen, wodurch fie fich oft verrathen. Alten futtern diefe Refihocker febr gut, indem man immer Borrath antrifft. Die alten Bruts ftellen fuchen fie gewöhnlich wieder auf.

Alle Bogel hassen ihn, am wenigsten noch die Sumpf= und Basservogel. Seine argsten Feinde sind aber die Krahen, die er auch am liebsten frißt, die ihn selbst durch ihren Geruch auß= wittern, und ihn so den Jagern verrathen. — Mebrigens hausen auch in seinem Gesieder Schmarozerinsesten, in seinem Innern aber Einzgeweidewürmer. — Sie lassen sich schwertschen, und oft nur mit Lebensgesahr kann man die Jungen aus den Spalten schroffer Felsen holen. Sie werden mit 10 Thaler daß Stuck bezahlt, um sie auf der Krahenbutte zu gebrauchen, wodurch eine Menge Krahenarten und viele Naubvogel, die anderem Gestügelschählich, geschossen. Die Krahenhutte

legt man unter der Erde, an einem erhabenen Orte an, fo daß man wie in einen Reller hineingehen und fich dafelbft aufhalten fann. Mehrere Schiefilocher find daselbft angebracht und auch einige durre Baume hingeftecft, worauf sich die durch den Schuhu herbei gelockten Bo= gel fegen, (aufbaumen) und dann herabge= Schoffen merden. 12-15 Schritt von diefer Butte errichtet man einen 3 Fuß hohen Ra= fenhugel, auf demfelben aber ein Rreug, worauf ber Bogel an den Fugen gefesselt aufgestellt Sier muß er fo fteben, daß man ihn von der Sutte aus gut feben, und an feinen Bewegungen schon vorher die ankommenden Bogel errathen und fich schuffertig machen fann. Es gewährt dies viel Bergnugen. Dies fein Rugen, fo wie die Bertilgung mehrerer uns fchadlichen Thiere. - Gein hauptschaden ift in der Brutzeit, wo er auch uns an nut= lichen Thieren des Waldes gewaltigen Scha= den thut, weshalb auch die Obrigfeit an man= chen Orten feine Fange (Gufe) mit 12-16 Grofden ausloft.

Die Rausch=, flaffende Ohreule. (Strix strepitans.)

11m & fleiner als vorige, doch fast mit eben fo ftarfem Schnabel und Rlauen verfeben. Die innere und mittlere Behe gleich lang, die außere dagegen viel furger. Dies und die fur= zern Flugel im Berhaltniß zum Schwanze, find mehrern indischen Gulen eigen. Die Fe= berbuiche fangen am hintern Mugenwinkel an, fich feitwarts ausdehnend. Gie befteben aus langen ichwarzen Federn, hinter denen fürzere, braun und weiß gestreifte liegen; alle obern Theile und die Flügel sind schwärzlich, und mit roftfarbenem Biefgack gezeichnet; die der Flugel find breiter und weißlicher. Die Schwung= federn haben breite Binden; der Schwang ift eben fo hell, mit gahlreichen Bandern an der innern Fahne, an der außern mit gietzactfor= migen gegiert; Backen, Bauch und Unterleib haben auseinanderstehende Querffreifen, welche an der Bruft naher geruckt find; die Bruft ift braun und weißlich roftfarben, die Laufe bis auf die Behen befiedert, weiß und braun ge= fireift; die Behen gelblich; der Schnabel weiß= gelb; die Ragel weißlich mit braunen Spigen. - Sava ift ihr Baterland, mo fie in dichtem Gebuich wohnen und eine angenehme Stimme haben foll. - Ihre Lange beträgt 19 Boll. -

Die jungen Neftvogel fitte gang weiß, mit feisnen braunen Querbandern.

Die Sperber=, Falken=, Trauereule. (Strix nisoria. Wolf.)

Mit gelbem Schnabel und Augenftern; braunem, weißgeflecktem Oberleibe, weißem, braungrau in die Quere geftreiftem (gefperber= tem) Unterleibe; der feilformige Edmang fehr lang mit 9 fcmalen weißen Querbandern. -Diefe Tageule gleicht in hinficht ihrer Geftalt am meiften dem Weihen. In der Lange mißt fie 16-17, in der Breite 31-32 3., der feilformige Schwanz aber 7½ 3., wovon die Flügelspigen die Balfte bedecken. Der icone halbzirfelig gefrummte Oberschnabel mißt im Bogen 1 Boll. Die Augen find nicht fo auffallend groß, wie bei den übrigen Gulenarten, und haben eine hell= oder fchwefelgelbe Tris. Die Fuße find nebft der obern Geite der Bes ben, dicht befiedert; die langen, ichon ge= frummten, dunnen und fpigigen Rrallen ichmarg= Der Rragen oder Schleier, welcher bei andern Gulen das Geficht umgiebt, fehlt, nur an den Ohren bemerkt man davon etwas, welches daselbft in Geffalt eines ichwarzen Halbmondes erscheint; die Rehle ift weiß. Mannchen und Beibchen unterscheiden fich nur wenig. - Diefe Gule gehort dem Norden an, in Rordamerika ift fie gemein. Gie findet fich auch im nordlichen Deutschland, in dem mitts lern aber gehört sie unter die Seltenheiten. Bei und ift sie nur Zugvogel. Sie ist zwar Waldvogel, zieht aber die fleinen Feldhölzer und sumpfigen Solzungen ten eigentlichen gro= fen Waldungen vor. — In ihrem Betragen ähnelt sie den Tagraubvögeln mehr, als irgend eine andre Urt. In ihren Bewegungen ift fie rafch und gewandt, fast wie ein Sabicht oder Falfe, wovon fie jenen Namen Sperbereule verdient; denn fie jagt und fliegt am Tage bei Gigend trifft man fie bald in Connenschein. einem niedern Bufche, auf einem Stamme, auch in boben 3meigen. Fruh und Abends jagt fie am meiften, dann ruht fie bis gur Morgendammerung. Leicht foll man fie gah= men fonnen. Thre Stimme flingt fanft und angenehm: fi, fi, fi, fi, fi!

Auch fie liebt alle Maufearten, greift auch Bogel von der Erde und foll den Rebhuhnern schaen, nimmt die Bogel gern aus den Schlingen und verzehrt Kafer und andere Inseften.

Sie follen auf einen Baum bauen und 2 weiße Gier legen. — Sie ernahren übrigens auch außere und innere Feinde, lettere hausen theils in der Bruft, theils in den Eingeweiden. Bogel versfolgen auch sie, doch nicht so arg wie die vosrigen, da sie ihr nicht recht zu trauen scheinen. — Sie ist nicht scheu, daher auch nicht schwer zu schießen. Der Ruten und in der That wenige Schaden, liegt in ihrer Nahrung. —

Die uralische Tageule, Sabichteeule. (Strix uralensis. Pall.)

Schnabel gelb; Augenftern dunkelbraun; die Pupille blauschwarz; der Unterleib gelitich weiß, mit fcmalen frummen Langoflecten; der feilformige Schwang 10-11 Boll lang, mit 7-9 hellen Querbandern. - Gie gehort mit ju ben größten. Das Gefieder ift groß, febr diet und weich; in der Lange mißt fie 26, in ber Breite aber 45 3.; die in Ruhe liegenden Flügel bedecken noch nicht die Salfte des Schwanzes. Der Schnabel mißt im Bogen 13 3. und ift icon halbzirflig gefrummet. Die Bufe find groß; die Laufe, fo wie die obern Seiten der Beben dick befiedert; die Seiten und Sohlen der Beben aber unbefiedert, gelb; bei Jungen gelbgrau; die außerordentlich großen, dunnen, mittelmäßig gefrummten und nadel= fpigen Rrallen gelblich fleischfarben oder gelb= braun, an den Spigen dunfelbraungrau oder fcmarglich. - 3m Gangen genommen hat Diefe Gule in der Farbe einige Uehnlichfeit mit der Sumpf = Ohreule. Das Gesicht dagegen groß und platt, die fchleierartige Ginfaffung deutlicher und großer als an den übrigen Sag= Die 4te und 5te Schwungfeder find die langften; die 3 erfren, am außern Rande, fageartig, die 4te auch etwas gezähnelt. -Die jungen Bogel find viel dunfter, mehr braun und gelb, unregelmaßiger und dichter geflecft, modurch fie fich fehr von alten Mann= den und Beibden unterfcheiden, die übrigens einander fehr ahnlich find. - 3hr Baterland ift mehr das öftliche als das nordliche Europa. In Rufland ift fie gemein, vorzüglich im afia= tifden, befonders auf dem uralifden Be= birge. Rur ale Geltenheit fommt fie bis in unfere Begenden. Gebirgsmalder find ihre Mu= fenthalteorter. Ihr Blug ift raufchend, giem= lich rafch, und fcmebt mitunter wie ein Buf= fard und treibt den gangen Sag ibr Befen; das Freie befucht fie mehr in der Dammerung,

wo sie sich dann sehr rauberisch zeigt und große Bogel, wie einen Mausebussard und selbst einen Reiher, ftark verfolgend beobachtet wurde. — Ihre Hauptnahrung sind Mause; sonst auch junge Hasen, Kaninchen, Birk und Schnees hühner, sehr gern deren Jungen; allerlei kleine Bogel, die sie im Sigen ergreift und die sie am Tage, wie in der Dammerung, jagt. — Uebrigens soll sie in Velsenspalten, nach ansdern in großen weiten Baumhöhlen niften und 3—4 weiße Eier legen. — Rugen und Schasden ergiebt sich aus ihrer Nahrung.

Der Zwergfaug, die Sperlings= Eule. (Strix acadica Linn.)

Der Ropf flein mit schmalem Gesicht und undeutlichem Schleier, die Flugel furz und die Beben dicht befiedert; Schnabel und Augen= fterne gelb; Oberleib braun mit weißen Punt= ten; Unterleib weiß mit braunen Langoffrichen. Der 21 3. lange Schwanz mit 4-5 fcma= len weißen Bandern versehen. Die Lange des Mannchens 6-7, Breite 12-123 3.; bas Beibchen meift um 1 3. großer. Der Ropf diefer fleinen Tagecule gleich dem einer Beihe, und der das Geficht jumgebende Schleier ift wie das einer jungen Rohrweihe. Die Federn des schmalen Gesichts find glatt anliegend, da= her der Schnabel mehr vorstehend; die vorder= ften Schwungfedern nur fehr fdmach gezähnelt. Die geringe Große, welche mit den Federn faum die einer Rothdroffel überfteigt, unter= scheidet fie hinlanglich von dem ihr in der Farbe ahnelnden Stein= und Tengmalmefauz. - Der ziemlich diefe ftarfe Schnabel frummt fich oben in einem Halbgirfel, ift hellgelb, bismeilen orangegelb; der Oberfiefer im Bogen gemeffen & 3. lang; die Bris hochgelb. Die 3 3. hohe Sufwurzel ift dicht befiedert, Die Oberfeite der braunlichgelben Beben mit einer abnlichen bichten Bedeckung. Die Rrallen find groß, ziemlich fart, fchen gefrummt und na= delfpipig, fcmarzbraun. - Das Beibchen ficht dunfler aus als das Mannchen, und die braune Rückenfarbe ift olivenfarbig überlaufen, beim Mannchen dagegen fast roffbraun, ohne jene Mi= fcung. — Much diefe Gule gebort der falten Bone an. In Rugland ift fie faft gemein, auch in Ungarn murde fie gefchoffen. Deutschland ift sie dagegen hochft felten. liebt einfame maldige und gebirgige Wegen= den, daher fie dem Beobachter leicht entgeht.

Es ift ein niedliches Bogelchen, dem feine possierlichen Gulengeberden einen eigenen Reig geben. Gein kleines Ropfchen gleicht einem Uffengesichten mit ichlauem gutmuthigen Blick, ftatt daß in den übrigen Gulengefichtern ein fdwermuthiges, fchlafriges Wefen unverfenn= Rommt diefer fleinen Gule bar hervorblickt. ploblich etwas ins Gesicht, so ftreckt fie den Ropf vor und die Federn des Schleiers heben sich etwas, fo daß man sie, fluchtig betrach= tet, für eine Ohreule mit fehr furgen Ohrfe= dern halten follte; fo macht es auch der Teng= malmsfaug, ohne Federohren zu haben. Der Flug ift rafch und gewandt, fie fliegt am Tage ohne vom Connenlicht geblendet zu merden; jagt jedoch am liebften in duffern Baldungen, im Schatten der Baume, auch in der Mor= gen = und Abenddammerung. Es ift ein fchnel= ler aber auch icheuer Bogel. - Die man im Rafig hielt, liegen die Stimme: firr! firr! horen. Sie waren lebhaft, ohne wild zu fenn, fletterten gern und viel im Rafig umber und hingen sich fogar an die Decke desselben. Che fie einen Bogel verzehrt, rupft sie ihn nach Urt der Falken; Mäuse zerreißt sie in ver= schlingbare Biffen. Gie leben besonders von großen Infeften, als: Rachtichmetterlingen, Rafern, Soufdrecken und dergl., die fie meift in der Dammerung fangen, aber auch von fleinen Bogeln und Maufen.

Sie soll in hohle Baume oder Felsenlöcher nisten und 4 weiße Eier legen. In Deutsch= land hat man sie in dieser Hinsicht noch nicht beobachtet. — Auch auf sie sind außere und innere Schmarober angewiesen. Kleine Bögel verfolgen auch diesen Näuber mit klagender und neckender Stimme, doch huten sie sich, ihm nicht zu nahe zu kommen, da ihm auch am Tage nicht zu trauen ist. — Man erlegt sie mit der Flinte, besonders auf dem Schnespfenanstande. In Dohnen und Schlingen, aus denen sie gern die kleinern Bögel auszulösen pflegen, fangen sie sich oft selbst. — Ihre anz gegebene Nahrung deutet mehr auf Nutzen als Schaden.

Die Schnee=, islandische meife Gule. (Strix nyctea. Linn.)

Mit weißem Gefieder, schwarzem Schnasbel, gelben Augensternen und dicht befiederten Fußen. Die jungen Bogel mehr oder wenisger gefleckt, sehr alte rein weiß. — Sie hat

unter allen deutschen Gulen den fleinften Ropf, und das ichmalfte Geficht. Gie ift überhaupt von schlanker Geftalt, ohngefahr wie ein Buf= fard, auch ift von der gewöhnlichen schleierar= tigen Ginfaffung des Befichts feine Gpur vor= handen. Un Große fieht fie dem Schuhu nur Die Lange ift 27 bis 281, um etwas nach. die Breite aber 60 - 63 3. Der etwas ab= gerundete Schwang 10 4 3. lang, wovon die in Ruhe liegenden Flügel faft 3 bedecken. Der hornschwarze Schnabel ist stark, schon halbzir= felig herab gebogen, im Bogen gemeffen 17 Die großen runden Nafenlocher liegen in einer dunnen Bachehaut, die fcmarg ift und Die Bris der großen Mugen ift prachtig gelb. -Fuße und Beben find fo dicht befiedert, daß fie faft wollig erscheinen, und unter denen die ftumpfen Spigen der großen, ichwargen mit= telmäßig gefrummten und ftarfen Rrallen, wie Ragenfrallen, aus diefen wollichten weißen Saarflumpen hervorragen. Bei recht alten Bogeln ift das gange Gefieder blendend weiß, ohne alle Flecken. Jungere Bogel haben gelb= braune Flecken und Wellenlinien. Beide Gat= ten find meift von gleicher Zeichnung und Große. - Das gange Gefieder ift harter, qu= mal die Schwingen, welche auch nach vorn hin schmaler find und spigiger enden, als bei den Nachteulen; auch ift der uns ichon be= fannte gezahnelte Dand der vorderften Schmin= gen faft gar nicht bemerfbar. Diefe große schone Gule ift in der falten Bone von Europa, Ufien und Umerifa zu Haufe, wo fie bis zu den hohen Breiten von Gronland, über die Hudsonsban hinauf, bis zu dem Fluffe der Rupferminen und in Ufien bis ans Gismeer hinauf gehet. Im Winter geht fie etwas fud= In der hundsonston, im nordlichen licher. Sibirien und in Ramtichatfa ift fie fehr ge= Gehr felten besucht fie das nordliche Deutschland. In den nordlichften Landern von Ufien und Umerifa halt fie fich in der Rabe menschlicher Wohnungen auf, bei und hinge= gen nur in einsamen gebirgichten maldigen Be= genden. - Die Schnee=Gule ift ein Scheuer Bogel bei und, in ihrem eigentlichen Bater= lande foll fie dagegen die Jager begleiten und nicht felten das Erlegte fortichleppen. Stimme wird bald mit dem Grungen der Schweine, bald mit den Rlagetonen eines fich in Gefahr befindenden Menschen verglichen. Sie ift gewandt wie ein Tagraubrogel, und gleicht im Fluge mehr diefem als den Gulen.

Sie fliegt rauschend und fcnell, ift ben ganzen Sag munter und fliegt felbst bei heißen Commertagen nach Nahrung aus. Die Ge-

fangenschaft ertragen fie nicht lange.

Sie fdwebt und flattert am Tage, wie ein Buffard, über Felder, Wiefen und Gebufch, und treibt ihre Jagd bis in die Dammerung Huch bei hellem Mondschein foll fie Bafen, Kaninchen, Maufe= zuweilen jagen. arten, allerlei Geflugel, befondere Bald = und Feldhühner, im Norden Schneehuhner, auch fleinere Bogel, die fie in ichiefer Richtung herabschießend ergreift, werden ihre Beute. Es ift ein gefräßiger Bogel, der in Ermangelung frifder Beute, auch auf Mas geht. - Gie foll auf Belfen, auch auf der platten Erde ni= ften. Schon in Liefland foll fie bruten. Gie legt 3 - 4 meiße rundliche Gier, moraus fie aber auch nur 2 Stuck ausbringen foll. In den nordlichften Gegenden fonne fie erft fpat bruten und da follen die Jungen folder Bruten erft im September flugge werden. - Gefahr= lich ift ihnen der weiße Fuche (Canis Lagopus), der ihre Gier und Junge raubt. Man fchieft fie in jenen Gegenden. 3m Rorden ift man ihr weißes Fleifch fehr gern, befon= ders gegen den Binter, wo es fehr fett ift. Durch Bertifgung der Maufe, befonders ber Schadlichen Lemminge, wird fie nuglich. Da= gegen ichadet fie durch den Raub ber fur Mens fchen nuglichen Thiere.

Der rauchfußige=, ber Tengmalme=

(Strix Tengmalmi Gmel. Linn.)

Mit gelbem Schnabel und Augenftern, beutlichem, das Gesicht umgebenden Federkranz, längern Flügeln und Schwanz und mit dicht besiederten Füßen und Ichenrücken; die dritte Schwungseder ist die längste. — Alter Bogel: Gesicht weiß, vor dem Auge eine schwarze Stelle; der Federkranz weiß, braungesteckt; der Oberleib braun, mit weißen tropfenartigen Vlecken; Unterleib weiß, hellbraun gesteckt. — Junger Bogel: fast einfarbig kaffeebraun, nur Schwung- und Schwanzsedern mit weißen Fleckenbinden.

Der ansehnlichern Lange der Flügel und des Schwanzes wegen, sind die Ausmeffungen etwas beträchtlicher, ob er in der That wohl kleiner ift, als der ihm sehr ahnliche Steinskaus, von dem er sich auch noch durch den

schlankern Körperbau und die wolligten Fuße unterscheibet. Die Lange beträgt 10 — 10½, die Breite 23 3., der wenig abgerundete Schwanz aber 4 3., den die in Ruhe liegenden Flügel bis auf 1 Zoll seiner Lange bedecken. Das außere Ohr ift so außerordentlich groß, daß man, wenn man es von einander flappt, den Lugapfel in seiner Höhle zur halfte sehen kann.

Der ftart gefrummte, ungezahnte, hellgelbe Schnabel ift, über bem Bogen gemeffen, bei= nabe 1 3. lang, die Bris fcon fcmefel= ober gitronengelb. - Die Gufe und Beben find bicht mit langen dunenartigen Federn befleidet, fo daß man nur die fehr langen nadelfpigigen, fcmargen Rrallen, aus denfelben hervorragen fieht und die fahlen gelblichen Fußsohlen faum Mannchen und Beibchen gleichen bemerkt. einander; bei letterm ift der Unterleib mehr und farter braun geflectt; es ift etwas dunt= ler, auch die Grundfarbe an den obern Theis len brauner, als beim Mannchen. Die Jun= gen find dagegen in allen Theilen fleiner, die Fuße weniger wollicht befiedert; die fchleier= artige Ginfaffung noch fehr undeutlich, faffee= braun, über den Augen etwas weiß geflecft; der gange Bogel übrigens dunfel faffee= braun. - Das Gefieder ift außerordentlich fein, weich und locker.

Man findet diesen Bogel in Deutschland, doch nie häusig. Er lebt im Balde, entwes der im dichten Stangenholze, im duftern Gesbusche, nahe am Boden, auf einem alten Stamsme, oder in einem hohlen Baume und Obstsgarten versteckt. Gebirgswalder und darin Nasdelhölzer soll er lieben. Im herbst und Frühzighr streicht er, wo man ihn denn auch öfter trifft; er überwintert aber auch bei uns, ift also auch ein deutscher Stands und Strichvogel. Selten sindet man ein Parchen beisammen.

Gein Naturell ift sanft und weniger wild und ungeftum als der ihm so ahnliche Steinsfauz. Um Tage sist er still am Baum gelehnt, oder in einer Baumhohle schlafend, seleten laßt er sich selbst mit halbgeoffneten Ausgen aufjagen. Er ist eingefangen geduldig, und wird bald zahm. Er macht wunderliche Eulenposituren, wobei er oft den Gesichtssichleier so ausdehnt, daß über den Augen auf jeder Seite ein erhabener Bulft gebildet wird, wobei man abgestumpste Federohren zu sehen glaubt; dies geschieht im Affeste. Seine Stimme gleicht einigermaßen der des Steins

kauzes. Er ruft, wie diefer, einigemal: Reum, — feum! Diefem folgt ein 3 — 4maliges, fanfteres langes Kuuk! Bur Begattungszeit laßt er noch fanftere flotende Tone horen, die wie kuk, kuk, kuk! flingen und oft Minueten lang ununterbrochen hintereinander ausge= rufen werden.

Seine Hauptnahrung sind auch Mäuse al= ler Urt, fetbit auch Fledermaufe, dazu fleine Bogel und alle großere Infeften. Er jagt wie Die eigentlichen Gulen, mit einbrechender Dam= merung die hellen Rachte durch, bis die Mor= gendammerung ihn wieder in feine Schlafftelle verweift. - Un Gefangnen bemerfte man, daß sie wenig auf einmal freffen; dem fleinen Bogel vor dem Berfruckeln erft die meiften Fe= dern ausrupfen, auch Maufe nur fruchweis verzehren. Rleine lebende Bogel fangen fie bald, ermurgen und freffen fie. - Diefer Raug foll in hohlen Sannenbaumen der großen Ra= delmaldungen bruten und 4 fast runde, weiße Gier legen. - Außer Schmarogerinfeften und Eingeweidemurmern verfolgen ihn auch am Tage die Bogel. - Er wird geschoffen, auch in Fallen gefangen.

Durch Bertilgung ber Maufe wird er sehr nuglich. Auch bedient man sich seiner, andere Bogel damit, vermöge der Leimruthen, zu fansgen; im sublichen Deutschland, in der Schweiz und Italien ein beliebter Fang. — Es ist ein nuglicher Bogel, der viele schädliche Thiere verzehrt und deswegen ihm auch das Ausnehmen einiger Bogel aus Dohnen und Schlingen nicht so hoch angerechnet werden sollte.

Der gemeine Raug, Stein=, 3merg=, Sperlingseule, Leichenhuhn. (Strix noctua. Retz.)

Schnabel und Augenstern gelb; ber das Gesicht umgebende Federfranz sehr undeutlich; Flügel und Schwanz sehr furz; die Zehen sast nacht, nur auf ihrem Rücken mit dunnstehenden haarahnlichen Federchen; die erste Schwungsfeder furz, die 4 folgenden, sast von gleicher Länge, reichen weit über sie hinaus. Der Oberleib ist graubraun, mit tropfenartigen weisen Flecken, die Schwingen mit 5—6 Reishen weißer Querflecke; der Unterleib schmutig weiß, mit unordentlichen dunkelbraunen Längssssechen.

Er hat ein plumpes, ja bei Aufstrauben des Gefieders ein fast fugelartiges Unfehn.

Das außere Ohr ist nicht auffallend groß. Seine Lange beträgt 9\frac{3}{4} — 10\frac{1}{4} \ 3., seine Breite 21 — 22\frac{1}{2} \ 3.; der kaum 3 — 3\frac{1}{4} \ 3. lange Schwanz ist am Ende gerade, und die Flügel endigen sich in Ruhe gelegt, noch \frac{3}{4} \ 3. vor der Schwanzsspie. Der ungezahnte, starke, im Bogen \frac{3}{4} \ 3. lange und sehr stark herabgefrümmte Schnabel ist blaßgelb; die Bachshaut schmußiggelb, bisweiten grünlich; die Tris schon schwesfels, fast eitronengelb. — Das Beibchen ist etwas größer als das Mannchen. Die jungen Bögel sind den alten Herbstwögeln sehr ahnslich; doch sind an ihnen die weißen Flecke der obern Theile größer, und die Schwanzbinden auffallender.

Unfer Raugden fommt in gang Europa, ben hohen Norden etwa ausgenommen, nicht felten vor. Indeffen scheint doch das gemas figte und sudliche Europa fein mahres Bater= land zu fenn. Es lebt in der Rabe der Men= fchen, aber doch an einfamen Orten, oft mit= ten in den Stadten, auf Thurmen, Rirchda= dern, in Gewolben, Begrabniffen, Rigen und Lochern der Stadtmauern zc., auch in Bal= dern, doch mehr noch in lichtern Holzungen in der Rahe der Felder, als in tiefen Bal= dungen. - Im nordlichen Deutschland ift es ein Strich = und Standvogel, daber man fie im herbst und Fruhjahr am haufigsten sieht. Im Commer lebt das Raugden einfam und von Menschen entfernt, immer nur einzeln oder hochftens ein Parchen beifammen.

Uebrigens ift es ein fleiner, unruhiger und ziemlich unbandiger Bogel, der alt eingefan= gen, nicht leicht gahm wird. Um Tage figt er ruhig ichlafend in feinem Schlupfwinkel, schlaft aber nur leife und fliegt, sobald er ge= ftort mird, fogleich meg. Er fliegt ruchmeife in fallenden und fteigenden Bogen, wie ein Specht oder Wiedehopf. Gang anders und viel gewandter fliegt er dagegen des Nachts, und gern nach dem Lichte, mobei er denn feine Stimme fleißig horen laßt und Furchtfame Rach den Beobachtungen Mehrerer fdrectt. foll er angelockt durch die Ausdunftungen und von feinem Geruch geleitet, an die Fenfter der Rranfenstuben fliegen, wo Menfchen mit bos= artigem Friefel, Faulfieber, Pocten und dergl. liegen; hier halt er sich an die Fenster an, fchlagt mit den Flugeln und ruft oftere dabei. Abergläubische halten dies für ein untrügliches Beichen, felbft ichon ihr Schreien, daß nun Einer fterben muffe. Daß man feine Stimme,

wenn man bei geliebten Rranten wacht, eher als fonft hort, ift febr begreiflich; daß fie aber ftete den Sod ankundige, ift unvernunftig ju glauben. Indeffen hat es doch unferm unichul= Digen Bogelchen die Ramen: Todtenvogel, Leichenhuhn u. f. w. zugezogen. Bald fchreit er, fliegend oder figend, fauchend und mit ge= bampfter Stimme: pupu, - pupu! bald laut und hell tonend: quem, - quem! oder quim! bald angenehm: quiutt, oder: fus witt, - fuitt!; im Frubling besondere noch ein gedehntes: Ruuf, abulich dem der Bald= obreule oder des Tengmalme Rauges. Diefe werden oft noch durch feine Stimmor= gane und die Luft fo modulirt, daß Aberglau= bifche die Borte: Romm mit, - fomm mit, auf den Rirchhof, - hof, - hof, von diefem unschuldigen Todespropheten ju ver= nehmen glauben.

Mit anbrechender Abenddammerung beginnt feine Sagd, ift die Racht hell, bis gur Mor= gendammerung, wo das Morgenroth, das andre weckt, ihm aber zur Ruhe leuchtet. Maufe find auch feine Lieblingenahrung, doch auch Rafer , fleine Bogel und felbft Fledermaufe. Die fleinen Bogel überrafcht er im Schlafe. Bu einer Mahlzeit braucht der fleine Freffer 5 - 6 Feldmaufe. Er tragt fich auch Borrath ein, um bei schlechtem Better nicht hungern ju durfen. Den Sauben fliegt er in den Schlag aus und ein, thut ihnen aber feinen Schaden, nur anfanglich, ebe fie diefen fleinen Befuch fennen, thun fie fehr furchtfam. - In der Begattungszeit ift unfer Raugchen besonders unruhig, ichreit und larmt viel, lagt feine Stimme fogar bisweilen am Sage boren. -Gie niften bei une in Stadten und Dorfern, in verfallenen Gebauden, Steinbruchen, in Feldbaumen 2c. ohne ein eigentliches Reft ju bauen. Die Gier liegen in einer fleinen Ber= tiefung, meift 4-5, fast rund, weiß von Fabe. Sie werden in 14 - 16 Tagen ausgebrutet. Seine Jungen erscheinen anfanglich in weiße und braungeflectte Wolle gehullt; fie merden mit Maufen, fleinen Bogeln und Infeften groß gefuttert. - Der Buhnerhabicht ift fein argfter Feind, der ihn fangt und frift; auch Rrahen Die Biefel fellen feinen Giern nach. und andere Bogel verfolgen ihn am Tage, mo er fich nur feben laft. Eingeweidemurmer und Federinseften qualen ihn auch. Man Schießt und fangt fie wie die Schleiereule; auch fangen

fic fich zufällig, wenn fie Bogel aus Dohnen und Schlingen austofen wollen.

Als Maufejager find es fehr nugliche Bogel. Jung aufgezogen werden fie auch leicht jahm, und machen fehr poffirliche Geberden und Stellungen. Man braucht fie auch beim Bogelfang zum Unlocken, wo dann die ankommenden mit Leimruthen gefangen werden.

Die braune Eule. (Strix castanoptera.)

Die Geffalt hat fie mit voriger gemein. Die Flügel bedecken einen großen Theil des Comanges, deffen Federn gleich lang find; die Laufe find mit Flaum, die Behen aber blos mit haaren bedecft. Gie ift durch das ichone Raftanienbraune, in Purpur Schillernde, zu er= fennen, welches Rucken, Blugel und Schwang bedeckt; Ropf, Nacfen, Geiten und Border= hale, auch die Bruft, find abwechselnd mit braunen und gelblich rofffarbenen Bandern ge= giert; die Seiten haben die Farbe des Ruckens, an den Schenfeln finden fich einige purpur= braune Flecken; alle übrigen untern Theile find Auf den Schulterdecffedern der rein weiß. Flugel find einige weiße Flecke; Chwung= und Schwanzfedern aber find roftfarben geban= dert, und der Comang hat eine rofigelbe End= binde. Lange 7½ 3. Ihr Baterland ift Java, Banda und Sumatra.

Die 3merg = Ohreute, Poffeneule. (Strix scops. Linn.)

Die Federohren, aus mehrern fehr furgen Federn beftehend, fonnen niedergelegt merden; die Laufe dunn, mit fehr furgen Federchen be= fleidet, die Beben ganglich unbefiedert; die Bris gelb; die Farbe des Befieders ein Gemifch von Grau, Beif und Roffgelb, mit fehr feinen braunen und fcmargen Beichnungen. Länge 83.; Breite 201 3.; Schwang faft 3 3. Sie ift fleiner ale der Tengmalmefaug, ja entfedert, faum großer ale eine Gingdrof= fel, In der Zeichnung des Gefieders ahnelt fie aber mehr bem Bendehals oder bem Tagichlafer, ale einer andern deutschen Gulenart. Die außere Ohröffnung faum gro= fer als bei andern Bogeln. Die Flugelfpigen reichen etwas über das Ende des Schmanges. Das Weibchen ift 1 Boll großer und breiter. -Der ftarte, fehr frumme, etwas herabhangende Schnabel, im Bogen & 3. lang, ift von Farbe dunkelbraun mit schwärzlicher Spite, so auch die Bachshaut über den runden Nasenlöchern. Die Zehen sind ohne alle Bedeckung von Feedern oder Haaren, oben geschildert, unten seine warzig; die kleinen, flach gekrümmten, aber sehr spitgen Krallen braunlichgrau, mit schwarzebraunen Spitsen. Es ist ein sehr niedlicher Bogel. Die langste Feder, in den sogenannten Federohren, ist & 3. lang. Bon den Schwungsfedern sind einige der vordersten fast unmerkelich gezähnelt.

Die Zwergohreule findet fich in gang Gu= ropa, den hohen Morden etwa ausgenommen, im nordlichen Umerika, in Ufien und Ufrika. Sie lebt indeffen mehr im Guden; denn im nordlichen Deutschland ift fie schon eine Gel= tenheit. In Frankreich und Italien ift fie fcon nicht felten. Man hat fie auch fchon im Berbft in unfern Gegenden geschoffen. liebt vorzugsweise gebirgige Waldungen und foll fich gern in Felfenspalten verftecken. und trifft man fie am Tage in den Zweigen dicht belaubter Baume, oder auch in Baum= hohlen an; denn fie fist, wenn fie nicht ge= ffort wird, den gangen Sag an einer Stelle und fchlaft bie gur Abenddammerung. ein Bugvogel.

Diefes niedliche Bogelchen gezahmt, ergogt burch seine brolligen Posituren, legt auch oft seine Federohren nieder, mas auch im Tode zu geschehen pflegt, so daß man sie nur mit Muhe findet. Sie fliegt leife und schwankend,

boch ziemlich schnell. Mit der Waldohreule, die wir schon kennen gelernt haben, hat sie gleiche Sitten und Lebensart, wird jedoch leichster zahm als diese. Sie fangt sich Mäuse, kleine Bogel, kleine Frosche, Heuschrecken, Nachtschmetterlinge, Mais und Mistkafer. Die anbrechende Abenddammerung ruft sie zu ihren Geschäften, die sie bei hellen Rächten bis zu Ende der Morgendammerung treibt. Man will sie indessen zuweilen bei trüben Tagen auch am Tage, kleine Bogel jagend, bemerkt haben. Die Mäuse reißt sie in Stücken, um sie zu verzehren; so auch kleine Bogel, denen sie zus vor die meisten Federn abgerupft hat.

In den gebirgigen Waldungen Deffreichs hat man sie brutend gefunden. Ihre 3-4 weißen runden Gier foll fie in Baumbohlen, aber auch in Felfenlocher legen, und die Jun= gen, welche anfanglich mit meifgrauen Dunen bekleidet find, gewöhnlich mit Maikafern auf= füttern. Die Jungen verrathen fich durch ein lautes Bifden, werden aber bald jahm und laffen fich dann mit gefochtem Fleisch, Rafe, Rartoffeln und dergl. groß futtern. Uebrigens findet man fie auch alle Jahre in der Schweig, in mehreren Gegenden niftend. - Much auf dieser Eule findet man Bogelinseften, und auch sie verfolgen feindlich die kleinen Bogel. foll fich leicht schießen laffen. Ihre gahm ge= machten Jungen braucht man gum Fang flei= ner Bogel, die herbei gelocft, mit Regen, Leimruthen und Kloben gefangen werden. Dann nuten fie auch noch durch Bertilgung der Maufe.

3 weite Ordnung. Sperlingsartige Bögel (Passeres).

Dies ift die jahlreichfte Ordnung, die eine fehr große Menge Gattungen und Arten diefer Claffe in sich faßt. Nur nahere Bergleichungen laffen eine große Uebereinstimmung des Baues und unmerkliche Uebergange einer Gatztung zur andern bemerken, so daß es oft schwer fallt, die Unterabtheilungen zu bilden.

Betrachtet man sie im Allgemeinen, so zeizgen sie weder die Heftigkeit der Naubvogel, noch die befrimmte Lebensart der hühnerartigen oder der Wasservogel. Das Thierz und Pflanzenreich giebt ihnen Nahrung. Je diefer ihr Schnabel, desto mehr fühlt man sich zu dem Schluß berechtigt, das Saamen ihre Haupt=

nahrung ausmache, je dunner er ift, je mahrs scheinlicher ift es, daß sie von Insesten und Gewürmen leben. Die mit starkem auch wohl etwas gekrummten und bisweilen gezahnten, verfolgen felbst auch kleine Bogel.

Ihr Magen ift muskulos, und fie haben zwei kleine Blinddarmchen. In diefer Ord= nung finden fich die Singvogel und die complicirteften Geftalten des unteren Laryng.

Die verhaltnigmaßige Lange ihrer Flügel und die Ausdehnung ihres Flugs find fo verschiedenartig, wie ihre Lebensweise.

Shr Brufibein hat im ausgewachsenen Bo= gel gewöhnlich nur einen Ausschnitt auf jeder

Seite des untern Nandes. Indeß finden fich bei den Mandelfraben, den Eisvogeln, den Bienenfreffern auch deren zwei, dagegen bei den Mauerschwalben und Colibris, die alle bierzu gerechnet werden, gar feiner.

Die erfte Eintheilung wird nach Cuvier nach den Fußen, fur die folgenden werden die

Schnabel mit zu Gulfe genommen.

Die erfte, aber gablreichfte Abtheilung umfaßt die Geschlechter, deren außerer Finger mit dem innern blos durch ein oder zwen Glieder verbunden ift.

Erfte Familie. 3 a h n f ch n a b l e r. (Dentirostres.)

Der Schnabel zur Seite der Spige, einen Ausschnitt. In diefer Familie befindet sich die größte Anzahl der Insesten fressenden Bogel. Doch fressen sie auch Beeren und andere zarte Früchte.

Die Geschlechter bestimmen sich nach der allgemeinen Gestalt des Schnabels. Er ist start und von den Sciten zusammengedrückt, bei den Bürgern und Drosseln; platt gesdrückt bei den Fliegenschnappern; rund und dich bei dem Tangaras; dunner zugesspitt bei den Sangaras;

Würger. (Lanius. L.)

Schnabel: mittelmäßig, fart, fehr gu= fammengedruckt, von der Burgel an gerade, mit herabgebogner Spite des Oberfiefers. Gleich an der Spige befindet fich oben ein fleiner fcharfecfiger Musschnitt oder Bahn, und an den Mundwinkeln fteben feche ftarte Borften. Ra= fenlocher: nabe an der Schnabel=Burgel. Fuße: mittelmäßig, mit nicht gar langer Sar= fe, vierzehig. Flugel: furg. Der Schwanz Dagegen lang, bei den deutschen Urten breit, am Ende farf abgerundet, oder feilformig. Es find muthige, fuhne, manche fogar raub= füchtige Bogel. Gie ahneln in Lebenbart und Betragen bald den Raubvogeln, bald den Rra= hen, bald den Singvogeln. Beshalb man fie auch bald zu diefen, bald zu jenen gezählt hat. Die unferigen nabern fich fehr den Bebern. Sie find ungefellig , haben einen unregelmäßi= gen Flug und hupfenden Gang. Gie bewoh= nen bei und lichte Balber und folche Gegen= den, welche Secten, niedriges Bufdwerf und

einzelne Baume haben; lieben befondere Dorns

bufche, und find meift Bugvogel.

Ihre Nahrung besteht in Infetten, fleinen Caugethieren, Umphibien, auch fleinen Bogeln. Sie fangen ihre Beute meist mit dem Schnabel, die größeren wohl mit Schnabel und Füßen; werfen sie dann in eine Klemme, oder spießen sie auf Dornen und spigige Ueste, wo sie sie bann verzehren.

Bei uns kennt man sie unter bem Namen: Reuntodter, glaubend: daß sie erst 9 Thiere wurgten, ehe sie dieselben verzehrten. Wenn dies übrigens so buchftablich nicht zu nehmen ift; so steht doch das fest: daß sie mordsuchztig genug sind, mehr zu todten, als sie auf einmal zu fressen im Stande sind. Das Uns

verdauliche werfen sie wie die Raubvogel in

fo genannten Buten oder Gewölle aus. Ihr nicht unkunftlich gebauetes Reft fins bet man im Dorngebufch oder auf nicht gar hohen Baumen. Die Eier sind meift schön gesteckt. (Siehe Naumann's und Buhle's, schon angeführte Eier-Hefte. Lan. excubitor, minor etc. Heft III. Taf. V. VI. Fig. 3. 11. 12.

Heft V. Taf. X. F. 15.)

Der große asch farbige Burger, Rriefelster. (Lan. excubitor. Linn.)

Dben hell aschgrau, unten schmubigweiß; die Stirn weißlich; auf den schwarzen Flügeln mehrere weiße Flecke, von welchen der größte, an den Burzeln der Schwingen, doppelt zu sen scheint. Weib chen und Junge: am Unterleibe mit dunkelgrauen Bellenlinien.

Er ift 10\frac{1}{4} 3. lung und 15 3. breit. Unster den deutschen Burgerarten hat er die fürszesten Flügel, dagegen den größesten Schwanz, wovon die zusammengelegten Flügel nur ein Drittheil seiner Lange bedecken. Sein Schnabel ift schwarz, sehr gestreckt, bis über die Mitte gerade, und biegt sich dann allmahlig nach der ploßlich gefrummten hakensormigen Spipe, der Oberkiefer hat nahe an der Spipe einen kleinen scharfen Zahn. Der Augenstern ift schwarzbraun.

Diefer Bogel ift weit verbreitet, in Deutschland überall befannt, bei und felbst im herbst und Winter nicht selten. Ihr Zug fangt schon Unfangs September an, und dauert bis im November; benn nur einzelne bleiben im Binter hier und halten sich um die Dorfer herum, auf Feldftrauchen oder einzelnen hohen Baumen auf Beute lauernd. Im Berbft fieht man fie familienweife beifammen, im Upril begeben fie sich aber an ihre Brutorter. hier trifft ihre Wahl besonders große Feldhölzer, die Rander und lichtern Stellen großerer Baldungen, mo fie dann wilde Birnbaume und Dornbusche gur Unlage des Reftes mablen. Inwendig ift das Reft gut gebaut, und mit Bolle und haaren dicht ausgefüttert. Die 5-7 trubmeißen Gier find überall mit matt olivenbraunen und afch= grauen Flecken und Punften bestreut, und mer= den in 15 Tagen ausgebrutet. Die Jungen werden mit Infeften mancherlei Urt aufgezo= gen, und lange noch von den Ulten gefüttert. Manchmal follen fie in einem Commer 2 Bru= ten machen.

Diefer Burger ift außerft muthig und fect, indem er jeden vorbeifliegenden Bogel, selbst Adler und Buffarde neckend, verfolgt. Durch feinen Warnungsruf zeigt er den übrigen Bo= geln den nahenden Raubvogel an, mas ihm ben Ramen: Bach ter zugewendet hat. Dies thut er befondere in der Brutzeit, wo fich feine Rrabe und fein Rabe feinem Standort nabern darf. Deshalb sieht man ihn oft auf der hoch= ften Spige eines Strauches oder Baumes figend, fich überall umschauend. Gie find das bei fo fchlau, daß fie recht wohl den Ucfer= mann und Wanderer leicht vom Jager unter= fcheiden, und lettern nie nahe fommen laffen. Im Uffeft und sigend schlägt er den ausge= breiteten Schwang heftig auf und nieder. -Gein Geschrei flingt: Schad, fcad! Die Locfftimme: truit! Bei iconen Bintertagen, befonders aber im Frubjahre, lagt er auch eine Urt von Gefang boren, der aus vielen leifen, fchirfenden Tonen beftebt. In Diefen mifcht er fehr drollig die Stimmen der um ihn wohnenden fleinen Bogel, ja felbft Stro= phen aus ihrem Gefange ein. Much das Beib= then fingt, doch nicht fo anhaltend, als das Mannden. Ihre Locfstimme ift: gihr, -Leicht laffen fie fich gahmen und felbft schon alt eingefangen, sollen fie fich gur Jagd auf fleine Bogel abrichten laffen. 218 Gtu= benvogel laffen fie fich an das Univerfal= futter*) gewohnen; wobei sie je zuweilen Fleifch, Maufe oder kleine Bogel bekommen muffen. Unter andere Stubenvogel paffen fie nicht, weil fie diefe bald murgen und freffen. Man muß ihm auch Baffer jum Saufen und Baden hinsegen.

Thre Nahrung besteht: in Rafern, Seus schrecken, kleinen Froschen, Bogeln und Feldsmäusen, testere fast die einzige Winternahsrung. Rleine Bogel, besonders Junge, die diesen Burger gar nicht zu fürchten scheinen, überrumpelt er, theils im Sigen, theils auch im Fluge. Wie ein Habicht weiß er sie von der Seite zu packen. Sein Muth geht so weit, Krammetsvögel, ja selbst Nebhühner in Schneehauben gefangen, anzugreisen. Seinen Naub, wie schon bemerkt, klemmt er zwischen Steine oder Gesträuch, oder spießt ihn auf, um ihn zu verzehren, bedient sich dabei aber nicht, nach Art anderer Naubvögel, der Fänge.

Sabichte und Sperber fangen ihn zuweis len. Schmarogerinsetten wohnen in feinem Gefieder und Naben und Rraben leben mit ihm in fteter Fehde.

218 vorsichtige Bogel laffen fie fich fcmer ankommen, am besten auf der Rrahenhutte. Lebend fangt man ihn mit Sprenkeln, wenn man nehmlich einen Bauer, worin ein fleiner lebendiger Bogel ift, dahin hangt, wo er oft figt, und diesen Bauer dann mit Sprenkeln oder Leimruthen belegt. Roch leichter auf Bo= gelheerden, wo er auf die Laufer fallt. -Sein Fleisch ift wohlschmeckend, die Fange werden dem Jager von der Obrigfeit ausge= lofet. Gein Ruben beffeht noch in Bertilgung vieler und schadlichen Infeften und der Feld= maufe. In manchen Gegenden follen fie bes fonders die Fatkenfanger halten, indem fie einen herannahenden durch ihr eigenes Beneh= men verrathen. Schaden thun fie auf den Wogelheerden und durch Fangen fleiner Bogel und Plundern der Refter.

^{*)} Wir theilen davon zweierlei mit: a) Man nehme zwey Theile auf einem Reibeisen gerieoner Mohrtübe, zweh Theile Gerftengrüße, und einen Theil eingequelltes Weißenbrod; b) Semmel ober Gerftengrüße in Milch gequellt. Erfieres paßt

mehr für Beeren und Insekten fressende, legteres sin blos Insekten fressende Bögel, die man anfänglich mit-Ameiseneiern und dergl. dazu zu gewöhnen sucht. Auch in der Folge giebt man ihnen dergleichen dann und wann mit. Auf diese Art kann man 30—40 Arten mit ein und demfelben Futter erhalten. Nur muß man es togelich frisch zubereitet, ihnen reichen; da es sonst leicht verdiebt und dann schader. Gut ist es, wenn man dazu irdene lange Krippen wählt, damit zugleich mehrere fressen können.

Der fleine graue Burger. (Lan. minor Linn.)

Der Oberleib hell aschgrau, der Unterleib weiß, an der Bruft rofenroth überlaufen; Stirn und Augengegend schwarz; auf den schwarzen Flügeln nur ein einfacher weißer Fleck. — Das Weibchen ift mehrentheils etwas größer, der schwarze Streif durch die Augen schmaler, der Rücken schmußiger, die Bruft auch weniger rothlich, und auf der Seite des Schwanzes befindet sich nur eine ganz weiße Feder. — Bei jungen Bögeln ift die Stirne schmußig weiß, der Unterleib gelblich weiß mit grauen Wellenkinien; die Flügelfedern mit weißen Spigenrandern. Uebrigens gleichen sie den Jungen des vorhergehenden sehr.

Die Lange beträgt 83, die Breite aber 15 Boll; der Schwanz 4 3. Die Flügel bedecken in der Nuhe die Halfte des Schwanzes. Der schwarze Schnabel ift diet, sehr start, scharf gezahnt, aber nur mit einem kleinen haken verfehen. Die Mundwinkel sind mit schwarzzen borftigen Barthaaren besetzt.

Es ift ein deutscher Jugvogel, der sich zu Unfang Mai bei uns einstellt, hier brutet und Ende August wieder fortzieht. In unsern Gegenden lebt er nahe an Dorfern; liebt Gareten, die nahe an das Feld floßen, und vorzüglich Wiesen, die mit Gestrauch und einzelenen Baumen abwechseln. Sigend, fliegend, selten hupfend, findet man ihn frei, in den Gipfeln der Baume. Sein Flug ist leicht und fanft, oft durch die Luft, ohne Flugelbewegung, eine Strecke hinschwimmend.

Uebrigens ift er sehr zänkisch, beißt sich immer mit andern Wögeln herum, und schreit dabei: äathätätät oder grafreckreckreck! Seine gewöhnliche Stimme klingt: kjack, kjäck! oder schäck! seine Lockstimme: kwia! — kwiell! — kwiell! und perletsch! — hrolletsch! auch scharek, scharrek! Einizge bewundern seine Gelehrigkeit, womit er im Stande seyn soll, den Gesang vieler kleinen Singvögel ganz ohne Unstoß nachzusingen. Undere verneinen es, und geben es nur von einigen Tonen und Strophen zu.

In der Brutzeit eingefangen, überleben fie ben Berluft der Freiheit nicht lange, indem fie gewöhnlich nicht ans Futter geben. Man erzreicht es am besten sie zu erhalten, wenn man sie jung aus dem Reste nimmt, mit Insesten und Fleisch aufsuttert und nachher sie an ein

Universalfutter gewöhnt. Doch darf man auch diese nicht unter andere Bogel lassen, indem sie dieselben murgen.

Im Freien nahren sie sich von Schmetters lingen, Rafern, heuschrecken und noch andern Insetten, deren Larven und Puppen. Sie vertilgen davon täglich eine große Menge theils als Nahrung, theils aus Mordlust. Den Rasfern reissen sie erst die harten Flügeldecken ab, ehe sie dieselben verzehren. Nur junge Bogel sollen sie rauben. Selten spießt dieser Bürger seine Beute auf, sondern halt sie mit den Füßen.

Gie niften auf abgefopfte Baume, auch in den Gipfel eines jungen Baumes von mitte= ler Sohe, oder auf ftarte Mefte der Birn= und Mepfelbaume, vorzüglich auf die, welche nahe Das Reft ift groß, befteht am Felde ftehen. aus Klumpen trocfner Burgeln, Reifern, Beu und dergl., inwendig ift es mit Bolle, Saa= ren und Federn ausgelegt. Gie legen 6-7 grunlich = weiße oder auch blos grunliche Gier, die an dem ftumpfen Ende mehrentheils einen unregelmäßigen Rrang, von grunlich braunen Flecken haben, und auch noch übrigens mit der= gleichen, und mit einzelnen violettgrauen Flef= fen bestreut und punktirt find. Beide Gatten bruten fie mechfelemeife binnen 15 Sagen aus, und futtern die Jungen mit Infeften auf. Die Jungen machfen zwar schnell, werden aber noch lange von den Alten gefüttert, wobei fie ihr flagliches Geschrei: Giah, giaf, gafgack= gact! horen laffen und fich dadurch felbft ver= rathen. Bei truber oder regenichter Bitterung, wo fich nur wenig Inseften fehn laffen, fan= gen fie junge Bogel, mit denen fie dann die jungen Schreihalfe futtern.

Raben, Krahen und Elftern zerftoren trog ihrer Gegenwehr, ofters ihre Brut. Auch jasgen sie die habichte und operber als ihre Haupteinde; nebst diesen hausen auch feindlich Schmarogerinsekten in ihrem Gesteder. Leicht lassen sie sich schieben und fangen. Letteres geschieht dadurch am besten, daß man auf die Plate, wo sie sich aufhalten, einige etwas über Mannshohe lange Stangen steckt, und oben einen Sprenkel oder eine Leimruthe darauf macht. Indem sie nun dahin fommen, um sich nach Insekten umzusehen, werden sie leicht gefangen.

Sie verzehren viel ichabliche Infeften, tod= ten auch viele aus Muthwillen. Ihr Fleifch, befonders ber Jungen, schmedt angenehm. Sier und ba werden ihre Fange noch ausgeloft.

Der rothfopfige Burger. (Lan. rufus Briss.)

Auf dem zusammengelegten Flügel, an ben Burgeln der großen Schwingen, fieht ein meis Ber Bleck, die Schultern find weiß, oder doch Der alte Bogel ift oben auffallend weißlich. fdmarg, unten weiß; der hinterfopf und Da= Bei jungen Bogeln find den roffrothbraun. die weißlichen Schultern schwarz geschuppt; der Oberleib aber auf braungrauem Grunde mit Schmarglichen und schmußigweißen Mondflecken gezeichnet; die Bruft gelblich weiß, schwarzlich gefchuppt. Er ift 8 3oll lang und 13 3. breit. Die jufammengelegten Flügel bedecken etwas mehr als ein Drittheil der Schwanzlange. Der Schnabel ift oben blaulich fcmarg, nach der Spipe gefrummt, und merflich gegahnt.

Diefer Bogel findet fich in allen Theilen bes warmern und gemäßigtern Europas, felbft in Ufrifa. Er liebt Feldhölzer und Laubholz= walder, am liebsten die an Feld und Wiefen foßende Rander haben, große Baumgarten und Biehtriften, mo einzelne Baume und Dornge= buich fich befindet. Es ift ein deutscher Bug= vogel und weilt nur fo lange bei und, als die Erziehung seiner Jungen dauert. Er ift, wie feine Gattungevermandten, ein ganfifcher Hebrigens macht er fich nicht fo be= Bogel. merklich wie der Borige, denn er fist nur auf der Spipe niederer Baume und Straucher. Gelten hupft er, fliegt abmechfelnd, bald flatternd, bald ichusweis. Er ift vorsichtig. Seine Stimme ift ein rauhes Rrahts, -Frahts! und sein Ungstgeschrei klingt wie: grack, fjack fack! Es ift ein fleißiger Gan= ger, und ahmt die Loctione und Gefange vieter um ihn wohnender Bogel taufchend nach. Er wird gahm, lagt fich aber nur mit Muhe an ein Universalfutter gewöhnen. Um beften gelingt dies noch bei den Jungen. In der Gefangenschaft würgen fie gern andere Bogel und hacken ihnen das Gebirn aus.

Die Hauptnahrung besteht, wie bei Borigen, aus Insekten, deren Larven und Puppen, auch Regenwurmern. Bei naßkalter Witterung plun= dert er gerne die Nesker kleiner Bogel, fangt auch deren ausgeflogene matte Jungen, die er theils verzehrt, theils auch seinen Jungen zu= schleppt. Seinen Borrath und Ueberfluß von Nahrungsmitteln fpießt er gern an bie Dors nen. Badet fich auch gern.

Er niftet in Garten, lichten Balbern und fleinen Holzungen die ans Feld granzen, auf junge Baume, auf die abgefopften und gut be= machfenen Ropfe und Mefte derfelben. Reft ift ziemlich dicht und nett gebauet. Es befteht außerlich aus durren Stengeln, auch grunen Pflanzentheilen, fie follen dazu weiche, moblriechende, 3. B. Thymus-Urten, mahlen, außerdem Wurgeln, Baummoofe und Baum= flechten, inwendig ift es mit einzelnen Federn, Borften, Bolle und Thierhaaren ausgefüttert. Man findet darin meift 5-6 grunlichweiße, meift nur am ftumpfen Ende olivenbraun ges flectte und übrigens mit aschgrauen und braun= lichen Punkten befpritte Gier. Beide Gatten bruten fie binnen 14 Lagen aus, und futtern dann die Jungen mit Rafern und andern In= feften auf. Die Ulten lieben ihre Jungen fehr und schreien, wenn man fich denfelben nabert: gract, gract! den ausgebreiteten Schwang von einer Geite gur andern ichlagend.

Die Feinde hat er mit den Borigen ges mein. Es halt nicht schwer, ihn zu schießen. Mit Sprenkeln und Leimruthen laßt er sich auch wie der Borige fangen; auch fangt man ihn auf Trankheerden gewöhnsich gegen die Mittagszeit. Sie und da werden noch seine Fange ausgelbst. Sein Rugen besteht in Berstigung der Maikafer, Maulwurfsgrillen und anderer schällichen Insekten. Uebrigens vers gnügt sein Gesang, auch giebt sein Fleisch einen guten Geschmack.

Der rothrückige Würger, Neuntödter, Dorndreher. (Lan. collurio Briss.)

Der Kopf und Purzel des Manndens aschgrau, durch die Augen einen schwarzen Streif,
der Rucken braunroth, die Brust schwach rosenroth. — Bei den Beibchen und jungen Bogeln geht ein brauner Streif durch die Augen,
der Oberleib ist licht rostbraun, weißlich und
dunkelbraun gewässert; der Unterleib gelblich
weiß, an der Brust mit braungrauen Mondfleckchen oder Bellenlinien versehen. Es ist
bei uns die kleinste Art, 7½ 3. lang und 12
3. breit. Der zugerundete Schwanz ist 3½ 3.
lang. Der schwarze Schnabel ist an der Spisse
start gekrümmt und scharf gezahnt.

Diefer Bogel bewohnt Europa, Moidame= In Deutschland ift er rifa und gang Ufrifa. ein überall befannter Commervogel. Unfanas Mai fommt er und zicht schon zu Unfang Uu= guft wieder weg. Man findet ihn, wo viel Dorn= bufche im Felde liegen, oder auch auf jungen Solgichlagen und Garten, befonders da, mo Menger, Felder und Biefen grangen. Er fist meift auf der Spige niederer Baume, von wo er fich nach Beute umfieht und feine Stimme boren laßt. Supft aber auch oftere in den Zwei= gen umber als die Borigen, benen er jedoch im übrigen Betragen fehr abnlich ift. Das Berab= fenten im Fluge hat er mit den übrigen Burgern gemein. - Seine gewohnliche Stimme flingt wie: gact, gact, gact! feine Locfftimme wie: fram, oder tang! Er ahmt indeffen meifterlich die Stimmen und Befange ber um ihn wohnenden Bogel nach. Geine eigenen To= ne, und Theile aus den Befangen der ihn am nachften wohnenden Bogel, bilden die Bafis bie= fes Gefanges; das augenblickliche Nachahmen der Stimmen vorüberfliegender Ganger, find Bariationen, die Frohfinn oder Muthwille mit binein zu weben pflegt. Auch im Rafig treiben fie diese Runft, wenn sie sich nehmlich alt einge= fangen, an das Universalfutter gewohnen. Bef= fer gelingt es, fie jung aufzugiehen; boch burfen auch fie nicht, als Mordsuchtige, frei unter an= In den Stuben dere Bogel gelaffen merden. fangen fie Fliegen weg, und ftellt man ihnen einen Dornzweig ober einen andern Zweig mit durchgesteckten Nadeln bin, fo fann man genau feben, wie fie Fliegen daran ju fpiegen verfteben.

Seine vorzügliche Rahrung besteht aus In= feften, auf welche er, auf den durren Spigen der Geffrauche figend, lauert. Er ift ubrigens weit graufamer und rauberifcher als die beiden vorhergehenden Burger, indem er alte und junge Bogel wurgt; felbft die in Sprenkeln gefangenen überfällt und verzehrt er. / Er hat die befondere Bewohnheit, alles Gefangene erft auf einen Dorn, oder sonftigen spigen 3meig zu ftecken und es fo wie von einer Gabel, fruckweise abzureißen und zu verzehren. Ift er gefattigt, fo benft er auf Borrath, den er bei eintretendem Sunger wieder auffucht. Bei gutem Better findet man nichts als Infetten und fleine Frofche, bei faltem bagegen, oft gange Gehecke junger Bogel, an Die Dornen gespieft. Das Gehirn berfelben fcheint ihm Leckerbiffen ju fenn, weil man die Aufgespießten immer enthirnt findet. Stort man ihn indeffen bei feiner Mahlzeit, fo lagt er

alles freden und verdorren. Er badet fich gern,-Sein Reft findet man in Feldhecken, Feldbuz fchen, in Beiß= und Schwarzdornbufchen der Biehweiden und Triften, frete in dichtem Bufchwerke, etwa 2-8 Fuß von der Erde. 1 2ub= wendig befreht es aus groben trodfnen Stengeln, Burgeln und Moofe, inwendig mit Saaren und Bolle ausgefüttert. Das Beibchen legt 5-6 ftumpfe Gier, welche von alten Beibchen andere, ale von jungern Beibchen aussehen. Bon erftern find fie nehmlich auf einem rothlich= oder gelblich= weißen Grunde fcon rothbraun und afchgrau punftirt, welche Punfte am frumpfen Ende in Geftalt eines Rranzes faft zusammenfließen, sol= che findet man oft 7 Stuck in einem Refte. Bon den jungern Beibchen meift nur 5; fie find auf einem gelblich = oder grunlich weißen Grunde gelbbraun oder hell olivenbraun geflecft und afchgrau punktirt, und die braunen Flecke bilden oft am ftumpfen Ende einen ahnlichen Rrang, wie bei Borigen. Gie weichen auch oftere in der Form ab, mas dann zu vielen Bermechfe= lungen Beranlaffung gegeben hat. Das Beib= chen brutet die Gier allein binnen 14 Sagen aus, mogegen das Mannchen für Futter forgt, mel= ches es in der Rabe des Reftes auf Dornen fpießt, wovon ce von dem hungrigen Beibchen abgespeift wird. Die Jungen futtern fie mit In= feften auf, wobei die Alten den Rafern die hars ten Flügeldeden und find fie groß, auch die Beine Bei guter Bitterung machfen fie abbeißen. fcnell heran. Beim Futtern, wenn fie feinen Menschen bemerken, machen fie jedesmal ein flagliches Gefchrei, bas wie: giaf, giacf, gafz gafgaf! flingt. Dabert fich ein Feind, fo fommen beide Alten , breiten den Schwang aus, fchlagen damit von einer Geite nach der andern, dabei fcreiend: gaf, gaf, gaf! und fram, fram! Berden Gier oder Junge geraubt, fo machen fie eine zweite Brut, wo man bann aber nur 5 Gier findet; begiehen aber das alte Reft nie wieder. - Schmarozerinfeften, Gingeweider murmer und die Feinde der vorhergehenden Ur= ten schaden auch ihnen, doch halten die dichten Dornen, in denen fie niften, auch manchen Feind von ihren Neftern ab. Mit Sprenkeln und Leimruthen fann man fie leicht fangen, indem man diefe da anbringt, wo man fie ofters figen fieht. Much auf Trantheerden, wohin fie gegen Mittag jum Baden fommen, werden fie gefangen.

Man fann fie effen, befondere die Jungen im Berbft ichmecken fehr gut. Huch laffen fie

sich zahmen und mit Inseften und Fleisch an das Universalfutter gewöhnen. — Ihr Nuben besteht im Wegfangen mancher schädlichen Inseften, wogegen dann der Schade, den sie etwa thun, nicht zu rechnen ift.

Der gehelmte Bürger. (Lan. frontatus. Temm.)

Mannden und Weibchen haben einen starken aber kurzen Federbusch. Der Kopf, Stirn,
Scheitel, hinterhaupt, Gurgel und ein kleiner Theil des Borderhalses, sind am Mannchen
schön schwarz; ein dergleichen Streif läuft vom
hintern Augenrand bis zum hinterhaupt, zwis
schen zwei weißen sehr breiten Bandern; das
Kinn grau; Kehle und Oberhals dunkelgruns
lich; Nacken, Rücken, Burzel graugrun,
Schwanz und klügel grau; Brust und Bauch
schwanz und klügel grau; Brust und Bauch
schwanz und klügel grau; Brust und Bauch
schwanz und klügel grau; Brust und
klüße grauschwärzlich. Beim Weibchen ist der
Federbusch kleiner und das Schwarze weniger
rein. — Sein Baterland, der östliche Theil
Neuhollands.

Fliegenfchnapper. (Muscicapa. Lin.)

Sie haben einen horizontal niedergedrückten Schnabel, der an der Basis mit Borften besetztift; die Spige des Schnabels ist habig und ausgeferbt. Die Lebensart haben sie mit dem Borshergehenden gemein, und leben nach Berhaltnis ihrer Größe von kleinern Bögeln oder Insekten. Nach Cuvier zerfallen sie in mehrere Unterabtheilungen, wovon wir einige hier folgen lassen.

Tyrannus. Cuv.

Mit geradem, langem, fehr ftarkem Schnabel; die Füße gerad ftumpf; die Spige schnell in einen Haken übergehend. Ihr Baterland ift Umerika; sie haben die Größe unserer Burger, mit denen sie auch den Muth theilen, indem sie Udler und andere große Räuber von ihren Restern verjagen. Die größern Urten nahren sich von kleinern Bogeln und verschmahen selbst Uas nicht.

Der Pitangua. (Musc. Tyr. Pitangua.)

Der gange Oberleib ift roftgelb; das hinter= haupt fcmarg, mit orangefarbenen Federn; um ben Kopf lauft eine weiße Binde; der Unterleib rein gelb; der Schnabel sehr breit und
platt. Es ift eine der größten und starkften Arten, deren Baterland Sudamerika ift. Die
Länge seines Körpers soll 8½ 3., die Breite (mit
ausgebreiteten Flügeln) 13½ 3. betragen. Der
dicke Schnabel ift braun; Füße und Klauen aber
schwärzlich.

Fliegenschnapper, (Muscipeta.)

Schnabel sehr platt, breiter als hoch, oft in den Seiten erweitert; die obere Kinnlade mit deutlicher Firste, mit einer hakensormigen gegen die untere gebogenen Spige, fast immer ausgesschweift; die untere Kinnlade gleichfalls sehr platt, am Ende spigig. Un der Schnabelwurzel Borsten, welche oft sehr lang, und nur leicht die Rasenlocher bedecken. Füße und Flügel mittelsmäßig lang. Sie leben meist nur von Insetzten. Euwier bringt sie unter mehrere Unterabstheilungen.

Das Fliegenfängerhähnchen. (Muscip. alector.)

Bon der Große eines Sperlings. Mannchen: Stirn und Backen weiß und fcwarz gemischt; gleich nach der Maufer mit Braun gemischt. Rehle und alle andere untern Theile weiß; die Schwanzfedern schwarz. Sie stehen, wie beim Haushahn, in die Sohe. Die inneren Barte aller diefer Federn find um das Doppelte breiter als die außere Fahne. Die innere Fahne ift viel furger, und die Barte fteben gedrangt, wie bei andern Federn; aber die Spige lauft in einen verlängerten Faden aus, der etwa 1 Boll vorfteht. Der Oberschnabel ift braun, der Unters schnabel weiß. — Das Beibchen ift fleiner, bat feinen fo eigen gebildeten Schwang, auch fehlen die beiden breitern mittlern Federn gang. Alle obern Theile find dufter braun und jede Feder roffbraun gefaumt; die Rehle ift weiß, der halbe Gurtel roftfarben, und alles übrige ift weißlich roftfarben oder schmubig ifabellfarben.

The Waterland ift Brofilien und Paraguan; hier leben fie in der Nachbarschaft des Waffers auf freien Plagen, auch im Schilfe fliegende und laufende Inseften fangend. Sie kommen dort im September an und ziehen den May wieder fort. Das Mannchen steigt oft 30—35 Fuß hoch und fällt dann wieder schief auf eine

Wafferpflanze nieder. Es schlägt babei mit den Flügeln und hebt dabei den Schwanz hoch auf, fo daß es auf die Urt mehr einem Schmetterling als einem Bogel ahnelt.

Fadenschwänziger Fliegenschnapper. (Musc. filicauda.)

Große einer Schwalbe. Die Stirne meißsgrau, der übrige Körper gang schwarzbraun, die beiden mittlern Schwanzsedern verlangert, und meit über die übrigen vorstehend, sehr schmal und gegen das Ende ruderformig. Füße und Schnabel schwarz. Lebt in Brasiliens Geholzen.

Der Eichitref. (Musc. cristata. Vaill.)

Große eines Sperlings. Kopf, Hals und Bruft fahlblau, erfterer mit einem Federbufch von derfelben Farbe; Unterleib weißlich; Rucken, Flügel und Schwang lebhaft roffroth; die beiden mittlern Chwangfedern beim Mannchen fehr lang, die übrigen feilformig abgeftuft, fo baß die außerfte Feder die fleinste ift; Schnabel blau= fdmarz; Tuße fcmarz. Beim Weibchen sind alle Farben blaffer. — Sie finden fich haufig im füdlichen Afrika, vom Cap bis ins Land der Gie leben immer paarmeife beifam= Raffern. Treffen ein Paar Mannden zusammen, fo greifen fie fich an und reißen fich die langen Edmangfedern aus. Den obigen Ramen ha= ben fie von ihrem fo flingenden Gefdrei. 3br funftliches Reft bildet einen Cact, welcher unten trichterformig enger wird, und mit feiner Spige fich wie ein horn umbiegt. Es ift von einem feften Gewebe von Baft gebildet, offen an der Gabel eines Baumes hangend.

Breitschnabel. (Platyrhynchus.)

Schnabel breiter als die Stirn, an den Seiten erweitet, noch einmal so breit als dief; bis zur Spige sehr platt, diese ift gekrummt und ausgeschweist; die Schnabelfirste niedrig und undeutlich, die Mundwinkel mit langen Borsten besetz; die hörnerne Schnabelwurzei besiedert; Nagel der hinterzehe start und gekrummt. Diese etwas plumpen Bögel leben in den warmen Theilen Umerikas meist von gestügelten Insekten. Sie haben einen angenehmen Gesfang.

Der Löffelschnabelige Breitschnabel. (Platyrh. cancromus Temm.)

Auf dem Scheitel ein schon gelber dichter Federbusch, aus langen zerschliffenen Federn; Stirnfedern, olivenbraun, eben so die Augensbraunen und alle obern Theile; die Bugel und Kehle weiß; Bruft braungelb, Mitte des Bausches gelblich; 3½ 3. lang. Baterland Brafilien.

Der grune Breitschnabel. (Platyrh. olivaceus. Temm.)

Die obern Theile bes Kopfes, Salfes und bes Korpers find dunkelgrun, olivenfarben überslaufen; Rehle, Borderhals und Bruft find helsler grun; Bauch und Unterleib graugelblich; die Deckfedern der Flügel haben breite Rander von grunlichem Ockergelb, die Schwungfedern braunsschwärzlich, hellgrun gefäumt. Die obere Kinnslade des fehr breiten Schnabels schwarz, die unstere weiß. Länge 6 3. Baterland Brafilien.

Die jest folgenden gehoren nach Cuv. zu den eigentlichen Fliegenfangern (Muscicapa). Thre Schnurrbarte sind fürzer und der Schnabel schmaler als bei den vorigen; doch ift er noch immer niedergedrückt, hat oben eine deutliche Firste, gerade Seiten, und eine etwas weniges hacige Spige.

Der geflectte Fliegenfanger. (Musc. grisola. L.)

Der Oberleib mausegrau, der Unterleib schmußig weiß, vor der Brust mit braungrauen Langssslecken. — Es ist die größte Art unter den deutschen Fliegensangern. Seine Lange beträgt 5\frac{3}{4}\ 3., die ausgebreiteten Flügel messen 10—10\frac{1}{2}\ 3.; den 2\frac{1}{4}\ 3. langen Schwanz bedecken die ruhenden Flügel bis auf ein Drittheil. Der Schnabel ist \frac{1}{2}\ 3. lang, in der Wurzel sast \frac{1}{4}\ 3. breit. Er ist schwanz, Mundwinkel und Rachen gelb; Iris dunkelbraun, über dem Auge ein weißlich verloschener Strick.

Mannchen und Beibchen unterscheiden sich wenig von einander. Die Jungen sehen, von oben betrachtet, grau und weiß getropft, und dunkelbraun geschuppt; auch der weiße Streif über dem Auge ift dunkelbraun geschuppt. Die Jungen mausern im August, die Alten aber

Sn Deutschland ift es ein gemeiner Bogel, ber, wo Baume und Busche sind, sich oft ein=

8 *

nistelt. Gern wohnt er in der Nahe der Mensichen; am liebsten da, wo Teiche, Wassergrasten oder sließend Wasser ift. Als Zugvogel kommt er meist schon in den letzten Tagen des Aprils. Er zieht Nachts und verläßt uns meist schon Ende Augusts familienweise wieder. Geswöhnlich halt er sich in der mittleren Sohe der Baume auf. Sein Flug ist flatternd und schwesend. Gegen seines Gleichen ist er neidisch und zänkisch.

Auf dem Zuge, so wie zur Begattungszeit, läßt er oft seine Lockstimme horen. Es ift ein schiefchender Son wie: tschie, tschie, tschie, tschie, tschie, tschieret, tschie=reck, teck, teck! was sie mit Flügelschlägen begleiten. Der Gesang der Mannchen ift schlecht, und besteht aus lauter

girpenden leifen Tonen.

In der Gefangenschaft wird er fehr zahm, und reinigt am schnellften die Stube von den laffigen Fliegen. Um nun die Ctube durch fie nicht beschmuten zu laffen, nehme man ein Kaff= chen mit Sand gefüllt, worin ein 4 Fuß hohes Stauchen mit einem Querholze befoffigt wird, und fege es nicht weit von der Thure bin, wo er gern auf die hereinkommenden Fliegen lauert. Sier fist er meift immer, und verunreinigt fo n cht die Stube. Tritt Mangel an Fliegen ein, fo giebt man ihm Solunderbeeren, auch Regen= wurmer, und gewöhnt ihn an Semmel in Milch Bon der Rinderliebe diefes Bogels gequellt. erzählt mein Freund, der berühmte Ornitholog Berr Raumann, Folgendes: Ein Knabe nahm ein Reft mit kaum halbfluggen Jungen, wo bei er das Weibchen mit fing, in feine Stube, wo die Mutter anfänglich aus den Fenftern zu ent= flieben ftrebte. Da dies aber mißgluctte, fügte fie fich in ihr Schieffal und entvolferte gar bald die Ctube von der laftigen Fliegen = Menge. Bei diesem eintretenden Mangel fahe fich der Knabe veranlaßt, fie dem Nachbar zujuführen. sie auch hier bald reine Bahn gemacht, und die fleinen Schreier von der Mutter reichlich gefüttert wurden, fo trug fie der Knabe, Mutter und Rinder, von Saus ju Saus in dem Dorfchen Endlich traf die Reihe auch meinen berum. Freund. Bei der vollen Rahrung maren die Kleinen nun fo weit gefommen, daß fie fich felbft Fliegen fangen fonnten, mas ihn bewog, der gangen Fliegenfangerfamilie, aus Danfbar= feit, die Freiheit zu ichenken.

Gie nahren fich besonders von Fliegen, hauptfachlich aus den Linneischen Gattungen

Musca und Conops, von Bremen, Bremfen, Mucfen, Schnacken, Schmetterlingen, fleinen Beufdrecken, Libelten zc. die fie behende aus der Luft hinmeg schnappen, weshalb fie auch ftets auf freien Zweigen, trocknen Spigen, Pfab= len und Stangen ju figen pflegen. Das Neft findet man im Mai in Obftgarten, in Beiden= baumen bei Dorfern und in Stadten; beide Gat= ten verfertigen es aus trocknen, feinen Wurgeln und grunem Moos, inwendig mit Bolle, ein= zelnen Pferdehaaren und Federn ausgefüttert. Im Juni findet man 4—5, stumpf eiformige Gier, welche auf einem blaugrunlich weißen oder fehr licht blaugrunen Grunde, mit hellroftfarbi= gen Flecken bezeichnet find, unter welchen fich dunklere und blaffere, oft auch violettgraue Puntte finden, die oft am stumpfen Ende einen Rranz bilden. Gie variiren oftere fehr. Mannchen und Weibchen bruten fie wechselsweise bin= nen 14 Tagen aus. Nur beraubt, machen fie 2 Bruten.

Schmarozerinsetten leben auf ihnen, da fie aber nur selten ins Freie kommen, haben fie von den Raubvögeln wenig zu befürchten, mehr aber ihre Brut, die ofters Kagen, Mardern, Wiesfeln, Natten und Mausen zur Beute wird; auch nehmen lose Buben, das oft so wenig versteckte Nest aus.

Leicht laffen sie sich mit Sprenkeln und Leime ruthen fangen. Ihre Bleisch ift wohlschmeckend. Sie nügen durch Wegfangen der schädlichen Ins sekten, fangen auch wohl Bienen, doch wahrs scheinlich nur die stachellosen Drohnen.

Der weißhalfige Fliegenfanger. (Musc. albicollis. Temm.)

An den Burzeln der großen Schwungfedern steht ein, auch auf dem zusammengelegten Flüsgel sichtbarer weißer Fleck, und auf dem hintein Theile des Flügels ein weißes Schild. Das Mannchen ift schwarz und weiß, mit einem weis fen Halbbande. Weithen und junge Wögel: oben braungrau, unten schmuzigweiß, ohne Halbband.

Diese Bögel mausern jährlich zweimal, was zu verschiedenen Berwechselungen Beranlassung gegeben hat. Das zweifarbige Mannchen sieht am schönften im Frühling in seinem Hochzeitstleide. Die Länge beträgt $5\frac{1}{2}-5\frac{3}{4}$ 3., die Breite $10\frac{7}{4}-10\frac{1}{2}$ 3. Die Rügel bedecken mit ihren Spisen den 2 Zoll 2 Linien langen Schwanz über 2 Drittheile. Der Schnab 4.4

Linie lang, an den Mundwinfeln farre fdmarze Bartborften; die Bris ift dunfelbraun. Berbftgemand des Mannchens erfcheinen alle obern Theile fcmarglichgrau, auf dem Unter= rucken am lichteften. Die fonft fcone weiße Stirn nur fcmuzig weiß; alle untern Theile weiß, an den Seiten der Bruft roftgelb überflo= Die obern Theile des Weibchens find braungrau, auf dem Scheitel und Oberructen am dunkelften, alle untern Theile ichmutig weiß, an der Oberbruft und an den Seiten gelblich= grau überflogen. Much fie haben einen weißen, doch viel fleinern Flügelfleck als das Mannchen. Die Schwingen find fcmarzbraun und haben ebenfalls nur einen Burgelflect, der aber auch fleiner ift ale beim Mannchen. Im Berbft feben die alten Beibchen wie die jungen Bogel aus, und find dann vielmehr braun, als grau.

Er gehort nur dem marmern Europa an, bei und gehort diefer Bogel zu den feltenen Erschei= nungen. Es ift ein Zugvogel, der mahrschein=

lich nach Ufrifa zieht.

Im Sigen bewegt er beständig Flügel und Schwanz. Gern sigt er auf Pfahlen und durs ren Aestchen, sich frei nach seiner Nahrung, die in Insetten besteht, umsehend. Die Nahrung hat er mit dem Borigen gemein, frist auch Holuns

der= und Faulbaumbeeren.

Er nistet im südlichen Deutschland, nach Bechstein auch in Thuringen, tief in den Walsbern, besonders aber auf den waldigen Donausinseln. In seinem aus Moos und Thierhaaren versertigten Neste sindet man 4—6 Eier, diese sind etwas kurz, an dem einen Ende meist ziemlich spisig, von einem blassen Blaugrun, oder sehr lichter Grunspanfarbe. — Kleine Raubvögel und Raubthiere sind ihre Feinde. Im Spatsommer fangt man sie in Sprenkeln mit Hollunderbeceren. Ihr Fleisch ist wohlsschmeckend, und ihr Rugen besteht in Bertilsgung uns schädlicher Insekten.

Der schwarzgraue Fliegenfänger, Trauervogel. (Musc. luctuosa. Temm.)

Auf den zusammengelegten Flügeln ift an den großen Schwungsedern, wenn man ihre Deckfedern nicht verschiebt, kein weißer Fleck sichtbar. — Das Mannchen oben schwarz oder schwarzlichgrau, an der Stirn und am ganzen Unterleibe weiß, an den Flügeln hinters warts nur Ein weißes Schild. Weibchen und

junger Bogel: Dben braungrau, unten fchmus gig weiß; die vordere Schwungfeder einfarbig fcmarzbraun, die drei hinterften weiß gefaumt; die drei außerften Schwangfedern nur auf der Außenfahne weiß. Sonft wurde diefer und der Borige mit einander verwechfelt. Uuch diefe Urt erscheint im Sochzeit= und Berbfifleide. Der Schnabel ift bei diefer Urt ichmacher, als bei der vorhergehenden, mit der fie auch glei= the Lange hat, aber nur 91 - 91 3. breit iff. Den 2 3. langen Schwanz bedecken die Flus gelfpipen bis auf zwei Drittheile. Der 41 Li= nie lange Schnabel ift an der Burgel breit, Dem alten Mannchen die Bris dunkelbraun. ift in feinem Fruhlingofleide dem Schwarzen immer etwas Grau und Braungrau beigemischt. Die Stirn ift in Form zweier runder an ein= ander hangender Flecke, nebft Reble und allen Scheitel, Ban= untern Theilen, fcneeweiß. gen, Oberrucken und die andern Schwangdedf= federn fohlichwarz, Racten und Unterructen aber graufchwarz. Um jungern Mannchen ifi der Stirnfleck fleiner.

Diese Art ist über ganz Europa verbreitet. In Griechenland, Italien und Frankreich ist sie gemein. Es ist ein Zugvogel, der Anfangs Mai ankommt, die Mannchen gewöhnlich einige Tage früher, als die Weibchen und Jungen. Im September ziehen sie wieder ab; meist in kleinen Gesellschaften des Nachts. Im Somsmer bewohnen sie gewöhnlich Eichen und Buschenwaldungen. Im nördlichen Deutschland ist er in den Wäldern der Auen großer Flüsse. Es ist ein sehr lebhafter Wogel, immer in Beswegung, ruckt mit den Flügeln, oder schlägt mit diesen und wippt zugleich mit dem etwas ausgebreiteten Schwanze auf und nieder.

Seine Locfftimme ift ein fanfter, furg ab= gebrochner Son: bitt - bitt! oder: mettwett, er hebt dabei den Schwanz und schlägt jugfeich mit den Fligeln. Auf den Wanderun= gen hort man ein laut ichirfendes: Schriht! -Das Mannchen fingt fehr angenehm, mobei es immer auf einem durren 3meige, meift in den obern Meften hoher alter Baume fist. Der Gefang hat etwas Melancholisches, befondere ift darin eine auffallende Strophe, die hellpfei= fend wie: wu, timu, timu! flingt, charaf= Es find fleifige Ganger, die fcon teriffifch. vor der Morgenrothe anfangen. Man fann ihn in Stuben, wie den gefleckten Fliegenfanger, halten, und eben fo wie diefen, die lafti= gen Fliegen wegfangen laffen. Die Rahrung hat er mit bem Borigen gemein. Bon großen Infeften Schlägt er erft Flugel und Beine an den Zweigen ab, che er fie verzehrt. Frift auch allerlei Beeren, ja im fudlichen Frankreich foll er Weinbegren und Feigen freffen, wobei er fehr fett werden foll. Rach und nach ge= mobnt er fich an das Universalfutter, und lernt feinen Boblthater fennen und das Futter aus deffen Sand nehmen. Er niftet in unfern Laub= holzwaldern, befonders wo alte Gichen, Bu= den und Mefpen, die Sohlungen haben, find, darinnen legen fie ihr Reft an, auch dicht am Schafte der Baume. Es ist aus Moos und feinen Burgeln gebauet, und mit Federn, Bolle und haaren ausgelegt. Gie legen 5-6 furg geformte, gartichalige Gier von einer fehr blaf= fen Grunfpanfarbe, merflich fleiner und blaf= fer als die des Borigen. Man findet sie meist erft im Juni; beide Gatten bruten fie binnen 14 Tagen aus.

Sie beherbergen Schmarozer im Gefieder und auch innerlich Wurmer, und haben mit dem Borigen die Feinde gemein. Man fangt sie leicht mit Sprenkeln, Leimruthen, auf Trank-beerden, in Nachtigallenfallen ze. Im Herbst geben sie eine delikate Speife, und werden dasher in Menge gefangen und verspeist. Noch nathen sie durch das Wegfangen und schadlicher

Infeften.

Der kleine Fliegenschnäpper. (Musc. parva. Bechst.)

Oben braungrau; die Gurgel roftgelb; die Schmanzfedern, bis auf die vier mittelften, von der Wurzel an bis über die Halfte weiß; die Flügel ohne weißes Abzeichen. Seine Lange beträgt nur 4% 3., die Flügelbreite 8½ bis 83

3., der Schwang 2 3oll.

Der Schnabel ift im Berhaltniß zur Größe des Wogels starker als bei der vorigen Art, rundlich, an der Wurzel breit, etwas über 4 Linien lang, schwarz. Nachen gelb; über den ovalen Nasenlöchern siehen borstige Federchen, und die Schnabelwurzel, vorzüglich an den Mundwinkeln, ist mit vielen schwarzen Borstenhaaren besetz. Beim Mannchen sind Züzgel und Augenlider schwungig rostgelb; die Kehle rostgelblich weiß; die Wangen röthlich grau, rostgelb gemischt; Gurgel und Kopf schwungig rostgelb; die Brust weiß=rostgelblich überlausfen. Alle obern Theile rothlich braungrau. Die Weibchen sind an der Kehle ganz weiß, nur

in ber Kopfgegend schmach roftgelb. Un jungern Bogeln ift ber Ropf nur roftgelb besprift, bie Seiten der Bruft grau, Gurgel und Reble

schmutig weiß.

Sein Baterland scheinen nur die süblicher gelegenen Lander zu seyn, und die Grenzen Deutschlands, nach Norden zu, nicht zu überschreiten. Er gehört zu den seltenern Bögeln. Als Zugvogel kommt er im Mai, und zieht im August wieder weg. Zur Brutzeit lebt er in den Borwaldungen, wo er sich in Baumskronen aushält, auf durren Zweigen sicht, und unablässig das Dunkel der Bäume durchflattert.

Er schlägt sigend, wie seine Geschlechteverwandte, beständig mit Flügeln und Schwanze
und ist immer in Bewegung. Sein Gesang
flingt angenehm. Seine Nahrung ist die der
vorhergehenden Arten, auch Beeren. — Das
funstlose Nest besteht aus Baummoos, Bolle
und Haaren, und ist zwischen Nigen zweier
aneinander gewachsenen Fichten, oder auf einem
verkrüppelten starten Affe, dicht am Schafte
eines Baumes, angebracht. Sein Rusen besteht in Bertilgung vieler schädlichen Baldinseften. Bisweilen fängt man ihn in Sprenfeln mit Holunderbeeren.

Der Fächerschwanz. (Musc. flabellifera.)

Olivenfarb an ben obern Theilen; Hals weiß, mit einem schwarzen Halsband; die untern Theile restfarben, Bauch weiß; die Seiztenfedern des Schwanzes weiß, die übrigen mit weißen Spigen und weißen Schäften. Die Figur des Schwanzes ift feilsbrmig, der Bogel breitet ihn im Fluge sachersormig aus. — Waterland Neusceland und Neuholland, wo er so wenig scheu ift, daß er die Insesten vom Kopfe der Menschen wegfangt.

Der feuerrothe Fliegenfänger. (Musc. flammea. Temm.)

Beim Mannchen: Ropf, Kehle, Nacken, Rucken und ein Theil der Flügel schwarz; Bruft und alle untern Theile, die obere Salfte der Flügel= und Schwanzsedern, so wie der Burzel, sind sehr lebhaft orange= oder feuerroth; Schnabel und Füße schwarz. Beim Weibchen sind alle die Theile gelb, welche am Mannchen orangesarben sind. Das Vaterland ift Sumatra und Java.

Drymophile. (Drymophila. Temm.)

Der Schnabel stark, die Oberkinnlade fast dreieckig, mit in ihrer ganzen Länge vorsprinsgender Firste, an der ausgeschnittenen Spise etwas gebogen. Die Unterkinnlade bildet einen Winkel. Nasenlächer eisörmig, gänzlich mit den sammetartigen Stirnfedern bedeckt. Die Füße sind kurz, dunn, der hinternagel sehr stark gebogen. Die Flügel mäßig lang, die erste Schwungseder sehr kurz, die dritte und wierte die längsten. Muf den Sunda-Inseln, den Molimsen und Neuholland sind sie sämmt= lich anzutreffen.

Der Schleier = Drymophile. (Drym. velata. Temm.)

Eine schwarze Binde bebeeft die Stirne, die Rehle und Backen, und bildet so eine Art von Schleier. Worn am Halfe und der Bruff fieht ein Fleck von kaftanienbrauner Farbe; alle andern Theile, Flügel und Schwanz sind hellblau aschgraulich, die innern Fahnen der Schwung= und Schwanzsedern sind schwarzslich; die Federwurzeln und der Flaum am Bauche sind weiß, wovon sie weißlich erscheinen. Schnabel und Füße schwarz. Länge 7 3. Beim Weibchen fehlt der schwarze Schleier und der kaftanienbraune Fleck, dagegen sind diese Theile schmuzig grau, etwas bläulich. Man sindet diesen Vogel auf Tima, auch paars weise auf Java.

Cotinga. Schmudvogel. (Ampelis. L.)

Sie haben ben niedergedruckten Schnabel der Fliegenschnapper überhaupt, aber nach Bershaltniß ift er etwas furger, ziemlich breit und leicht gebogen. Auch diefes Geschlecht zerfällt in fieben Abtheilungen. Wir merken davon:

Der rothe Schmudvogel. (Ampelis carnifex.)

Fenerroth; die Scheitelsedern am lebhaftesften und glanzend roth; am Rucken rothbraun, am Bauche blutroth. Das Weibchen mehr rostsfarben; der Unterbauch aber gelb; die Stirn rothlich; der Schwanz mit einer gelben Binde. Baterland: Brafilien und Gujana.

Der Pompadour=Schmudvogel. (Amp. Pompadora. L.)

Der ganze Bogel ift sehr lebhaft karminz roth; die Schwungfedern aber weiß; die mittelern Deckfedern der Flügel hangend auß struppigen steisen Federn bestehend. Beim Beibeden sind die Schwungfedern zur Halfte, die Schwanzfedern aber ganz schwarz; das übrige Gesieder aber mattroth, unten rosenroth und weißlich. Die Gier sollen ganz weiß seyn. Baterland: Gujana.

Der Schmudvogel, Quereiva. (Amp. cayana.)

Das alte Mannchen ist am ganzen Körper schön blaugrun, auf dem Kopfe und Rucken sind einige schwarze Flecken, da die Federn am untern Theile schwarz sind; die Decksedern der Blügel sind schwarz, graublau gesäumt, die Rehle purpurroth; Flügel und Schwanz schön schwarz. Das junge Mannchen am Bordershalse, an Brust und Seiten hellbraun, die Federn rostfarb gesäumt; Bauch und Ustergesgend ziehen ins Rostbraune, die obern Theile dunkelbraun, rostfarben gesäumt, Flügel und Schwanz braunschwarz. Im mittlern Alter ist die Kehle purpurroth; Kopf, Brust und Bauch spielen vom Braunen ins Grüne. Gemein in Gujana.

Seidenfdwanz. (Bombycilla Briss.)

Ihr Kopf ift mit einem Federbusch geziert. Fast alle haben das Eigene, daß ihre zweiten Schwungfedern ein verbreitetes Schaftende, in eine fleine eiformige, glatte rothe Scheibe übersgehend, haben. Europa besitzt davon folgende Urt:

Der Seidenschwang, Peftvogel. ([Amp.] Bombyc. garrula.)

Rothlich grau, mit einem Federbusche auf bem Scheitel; der Bauch silbergrau, der Ufter braunroth; die hintern Schwungfedern mit schwanzspigen, pergamentartigen Unhangseln; Schwanzspigen gelb; ein sanstes, seidenartiges Gesieder.

Seine Lange beträgt 8 bis 83 3.; die Flüzgelbreite 14½ bis 15 3.; die in Ruhe liegenden Flügel laffen von dem 23 — 2½ 300 langen

Schwanze zwen Funftheile unbedecft. Der furge Schnabel ift faum 6 Linien lang, fart, oben gewolbt, an den Mundwinfeln 5 Linien breit, Daher der weite Rachen. Die Farbe der Bris bei jungern Bogeln nugbraun, bei alten Mann= den ichon rothbraun, faft blutroth. Die bor= ftigen Nafendecffedern, die Bugel, ein Streif durch das Auge bis zum Genicf hin, wo er fpigig endet, und die Rehle find fammetschwarz und icharf begrengt, erffere von der obern Geite mit iconer dunfler Rofffarbe. Die feinem rothen Siegellack ahnlichen Fortfage ber Federschäfte, von hornartiger Substang, find an der Bahl hochstens 9, gewohnlich aber nur 6-7. Much finden fich dergleichen scharlach= rothe Fortfate an den Spiken der Schmang= federn, bei fehr alten Mannchen. - Die alten Beibchen gleichen den Mannchen febr, nur find ihre Farben minder lebhaft.

Gie wohnen im hohen Rorden Europas, und halten fich im Commer nur innerhalb bes arktischen Rreises auf, von mo fie Ralte und Schnee in die benachbarten Lander treibt. Dies geschieht meift von der letten Salfte des No= vembere bis in den Marg. Rommt Rahrunge= mangel noch dazu, fo gehen fie immer fudlischer und weilen oft in Menge da, wo fie ihren Sunger am leichteften ftillen fonnen. gab dem Aberglauben viel Ctoff, und man prophezeite daraus in fruhern Beiten, fchwere Rriege, Peft, Theuerung und andere Landpla= gen, daher denn auch jene Ramen: Deft=, Sterbevogel ic. Daß fie auch nur aller fieben Jahre ju uns fommen follen, ift Fabel; denn oft beobachtete man fie zwen Sahre hin= tereinander, und das dritte Jahr fab man fie nicht. Es find alfo Bugvogel, doch haben fie feinen regelmäßigen Bug.

So schon übrigens der Seidenschwanz ausfreht, so ift er doch ein dummer, träger und
gefräßiger Bogel, dabei aber doch gutmuthig
und geduldig. Sie sind sehr zutraulich und so
wenig scheu, daß sie in die Dorfer kommen
und sich auf die Baume sepen, auf denen sie
etwas zu fressen sinden. Sie sind auch sehr
gesellig und verträglich. Selten besuchen sie
die Erde, was meist nur an Bachen und Duellen zu geschehen pflegt. Die Stimme gleicht
einem seinen Triller, der etwa wie: rhieß,
klingt; außerdem hort man noch bisweilen einen
flotenden Ion. Bei ihrem Gesang schlagen
sie den Federbusch auf und nieder, was auch

die Beibchen, nur mit sanfterer Stimme, thun. Leicht trägt er das Soch der Gesangenschaft, verzehrt die ihm vorgelegten Beeren und sitt dann ruhig; auch gewöhnt er sich leicht au das Universalsutter. Die häusigen Exfremente verursachen indessen einen unangenehmen Geruch, weshalb man seinen Kasig oft reinigen muß. Um besten erhält man ihn in einer Kammer, frei herumsliegend. Wärme verträgt er nicht; er lechzt und keucht dabei, trinkt dann ungewöhnlich viel und badet sich auch gern.

Seine vorzüglichfte Nahrung beffeht in Bedren aller Urt: Ebereschen, Bachholder, Miftel, Rreugdorn 2c. Bei großfernigen Beeren fpeit er Kerne und Sulfen in langlichrunden Bugen wieder von fich. Um beften befommt ihm in der Gefangenschaft flein geriebene Mohrrube, (Daucus Carotta L.), in Baffer gequelltes Baigenbrod und etwas Gerffengrupe. Er foll taglich fo viel freffen, als er schwer iff. Sat er nicht immer vollauf in feinem Rapfe, fo Die große verschlingt er seinen eigenen Unrath. Gefräfigfeit und ichlechte Berdauung giebt man dem Baue feiner Gingeweide, befonders der Gedarme, Schuld, die bei ihm von ungewohnlicher Rurge und fast gleich weit find. Gie meffen nur 11 3. in der Lange, und der 3wolffingerdarm ift faft & 3. weit.

Sie werden ftark von Naubvögeln verfolgt. Wenn sie in Gesellschaften bei einander sind, lassen sie in Gesellschaften bei einander sind, lassen sie sich leicht schießen; einzeln schwerer. Auf Bogelheerden und in Dohnen werden sie auch häusig gefangen; auch in Sprenkeln, an die man Ebereschbeeren aushängt. Ihr Fleisch schwarzt sehr gut, etwas gewürzhaft und bitzter, meist sind sie fett. Sonst brauchten auch die Federschmucker die schöngesärbten Flügelzund Schwanzsedern zum Put.

Schnapper. (Procnias.)

Schnabel breit, breiter als die Stirne, hart, ftark, ganz hornern, an der Basis niedrig, an der Spige sehr zusammengedrückt, diese schwach ausgeschweist, an der Schnabelwurzel eine niedrige Firste. Nasenlöcher etwas rohrensformig, und mit einem hautigen Kreise ums geben. Die erste Schwungseder ist fast so lang als die zweite und dritte, welche die längsten sind.

Der blaue & dnapper. (Procnias ventralis. Illg.)

Scheitel, Hals, Rucken, Bruft, Seiten und Flügel himmelblau; Schwanz und Schwungsfedern schwarz, an der schwalen Fahne himsmelblau; Unterleib rein weiß, mit feinen blauen Bandern. Schnabelwurzel, Augenring, Kehle, Schnabel und Kuße schwarz. Das alte Weitschen ist graßgrun, eben so glanzend, wie das Mannchen blau; die Rehle ist grau, graugrunslich besprengt. Länge, 6 Joll; Baterland, Brazsilien, wo er nicht selten zu senn scheint. Sein starter Schnabel scheint ihn geschieft zu maschen, die größten und stärksten Kaser bezwinsgen zu können.

Beichschnabel. (Casmarhynchos. Temm.)

Schnabel breit, sehr niedrig, weich und biegsam in der Burgel, zusammengedrückt und hornartig an der Spige; Rasengrube sehr weit; Spige der obern Kinnlade ausgeschweist; die dritte und vierte Schwungseder sind die langesten. Ihre Stimme hat man mit den Ionen eines Hammers oder einer Glocke verglichen. Sie halten sich in Gebüschen, nahe an Gewässern oder Sumpsen, auf. Sie sollen sich von Insesten und weichen Früchten nahren.

Der Beichschnabel, Guira=Punga. (Casmarh. variegatus. Averano Guira-Punga. Temm.)

Das Mannchen dieses schönen Wogels hat im Hochzeitkleide eine Haube auf dem Kopfe, an Farbe dem spanischen Tabak gleichend; der hintere Theil des Halfes und seine Seiten, Rucken, Schultern, Schwanz und alle untern Theile sind weiß, leicht hellgrau überlaufen; Gurgel und Borderhals nackt, und an diesen Theilen hangt ein Bundel fleischiger, wurmsförmiger Unhänge von dunkeler Farbe. Schnasbel und Füße schwarz. Das Weibehen grünslich, ihre Kehle ist besiedert, ohne Unhänge. Lebt in Brasilien, ist aber selten. Im Decemsber und Januar hort man die starke Stimme des Mannchens: tok, ziell auch für, für, kur!

Drongo. (Edolius. Cuv.)

Sie find den Fliegenschnappern vermandt. Ihr Schnabel ift ebenfalls niedergedruckt und

am Ende ausgekerbt; ihre obere Firste deutslich, was sie aber unterscheidet, ift, daß ihre beiden Kinnladen in ihrer ganzen Lange leicht gebogen sind. Ihre Nasenlöcher sind mit Fesdern bedeest, und sie haben außerdem noch lange Haure, die einen Schnurbarrt bilden. Un den Kuften des indischen Oceans sind sie ziemlich zahlreich. Im Allgemeinen sind sie schwarz und haben einen Gabelschwanz. Ihre Nahrung besteht aus Insesten; einige sollen einen Gestang wie die Nachtigall haben.

Der Ruderträger. (Edol. remifer. Temm. Lanius malabaricus Linn.)

Der Schwanz besteht aus vollsommen gleich langen Federn, die außere Feder jeder Seite aber verlängert sich in eine sehr lange Schaftzsafer, welche nur gegen die Spitze Bartsasern trägt; diese Bartsasern entstehen schon 3 3000 vor dem Ende, so daß diese Berlängerung die Gestalt eines Nuders einer indischen Pirogue hat. Dem Weibchen sehlen sie. Das ganze Gesieder ist schwarz, in's Stahlblaue glänzend. Die Federn an der Schnabelwurzel sind aussterhend vorwärts gerichtet, sammetartig. Länge von der Schnabelspise bis zum Schwanzende 9 301. Länge der Schwanzsasern 6 301. Basterland Java und Sumatra.

Zangara. (Tanagra. Linn.)

Mit fegelformigem, an der Basis dreieckis gem Schnabel, der an der Firste leicht gebosgen, an der Spitze ausgekerbt ift. Die Schwinsgen und der Flug sind kurz. Sie gleichen in den Sitten unsern Sperlingen, suchen Korner, Beeren und Insekten. Sie zeichnen sich in den Sammlungen durch lebhafte Farbe aus. Man hat auch sie in mehrere Unterabtheilungen gebracht. 3. B. in eigentliche Tanzgaras, in Gimpel=Tangaras, Dicksschnabel, Cardinal=Tangaras 2c.

Es sind meift schon gefarbte Bogel, von der Große eines Zeisigs bis zu der eines Staars. Sie leben einzig im marmern Amerika, wo sie zahlreich gefunden werden. Ihr Aufenthalt ift verschieden. Ihre Nahrung besteht in Fruchten und Samereien, wodurch sie nicht felten der Dekonomie schällich werden; sie freffen auch Insekten; geben aber keinen Gesang, viele

mehr ein unangenehmes Gefchrei von sich. Sie laffen sich leicht gahmen, und legen in ihr kunftloses Neft meift nur zwei, auf weißen ober blauen Grund, geflectte Eier.

Die violette Euphone. (Tanag. violacea. Temm.)

Die obern Theile des Mannchens dunkel violettblau, metallisch glanzend, Borderkopf, bis auf die Mitte des Auges und alle untern Theile lebhast orangegelb; Schwungsedern schwarzbraun, außere Federn violett gerandet, in der Mitte der innern Fahne seder Feder ein weißer Fleck. Das Beibchen ist schwuzig olivengrun, Stirn und die untern Theile gelbzgrun. Lange: 43. Breite: 73. Er sebt in den südlichen Gegenden Brasiliens. Nahrung: mancherlei Früchte, besonders Orangen, Bananen 20.; auch Reis, wodurch sie schädlich werden.

Die siebenfarbige Sangara. (Tanagra tatao.)

Bei dem Mannchen Schnabel schwarz; Iris graubraun; Beine bleifarbig; Rehle bis zum Unterhals, Mittelrucken und Schulkerfezdern sammetschwarz; Kopf, Kinn und ein Theil der Zügel schon seladongrun, ins Blaue schillernd; Unterhals, Brust, bis gegen die Mitte des Bauches, eben so ins Ultramarinblaue ziezhend; unterer Theil, Seiten des Oberhalses und der Oberrücken glanzend gelbgrun; Schulztern und Flügeldecksedern ultramarinblau; Unzterrucken lebhaft seuersarben; obere Schwanzedecksedern, Bauch, Seiten, Uster und Steiß lebhaft glanzend grun; Schwungz und Schwanzsfedern braunlich schwarz, an der außern Fahne mit grunen Rändern.

Die Farben des Weibchens sind eben so, doch weniger rein und lebhaft. Baterland: ein großer Theil Sudamerikaß, in Brasilien häusig in der Nähe der Flusse und Bohnungen. Sie leben von allerlei Fruchten, und lieben besonders Orangen. Sie werden leicht zahm, und in Kafigen wegen ihrer Schönheit gehalten.

Die rothhaubige Sangara. (Tanagra cristata.)

Schwarg, an Schwungfedern und Schwang etwas ins Braune giebend. Unterrucken und

ein Streif an der Kehle falb rothlich gelb; der Bauch braunlich überlaufen, der obere Flügelzrand weiß; auf dem Scheitel ein Federbusch von glanzend feuerfarbnen, oder aus dem Oranzgenz ins Zinnobetrothe ziehenden Federn. Iris braun; Beine fleischfarben. Länge: 6 Zoll 3 Linien. Das Weibchen rothlich braun, auf Stirn und Unterrücken mehr rothlich, an der Kehle blaßgelb, Schwungsedern graubraun.— Waterland, die großen Wälder Brasiliens. Rahrung, Früchte und Insekten.

Droffel. (Turdus. L.)

Schnabel zusammengedrückt und gebogen, die Spige bildet keinen Hacken, und die Kersben in demselben bringen keine so ftarke Bahsnung hervor wie bei den Wurgern; dennoch lassen sich llebergange von den einen zu den andern Arten nachweisen; woshalb man auch hier mehrere Unterabtheilungen gemacht hat. Die erste Schwungseder ift meist in den Flügeln sehr klein, oder doch nur von mittlerer Lange, bei einigen Arten ist die dritte, bei andern die vierte die langste.

Ihr Fleisch ift meift von fehr angenehmen Geschmack. Rur zur Zugzeit trift man fie in Schaaren, sonft leben fie einsam. Sie lieben Beeren, doch fressen fie auch Insetten und Gemurme.

Der Name Droffel fommt vom Erdroffeln her, weil man sie gewöhnlich in Dohnen
erdroffelt, fangt; ber altere Name Krammet svogel fommt von den bekannten Bachhols
derbeeren her, die sie fressen, und die an einis
gen Orten Kranewets-, Krammets-Beeren genannt werden. Die europäischen Urten sind
meist alle Zugvögel. Diese Gattung ist überhaupt über alle Klimate der Erde verbreitet.

Die eine Abtheilung, die man Balddrofsfeln genannt hat, bewohnen die Dickichte der Balder, Gebusche und dichte Gesträuche. Auf ihren Banderungen im herbste leben sie meist allein von Beeren, im Fruhjahre und während der Brutezeit von Insetten und Burmern. Die harten Flügelbecken, so wie der harte Kern der Beeren, werden als unverdaulich abgesondert und als länglich runde Busen wieder ausgeschrochen, wodurch die Unpflanzung beerentragender Holzarten befordert, und an entsernte Orte gebracht wird.

Die andere Abtheilung bewohnt felfige Gegenden, oder Ruinen und alte Mauern, lebt einsam und niftet in Telfenspalten, sich meift von Insetten, weniger von Beeren nahrend.

Die Droffeln beleben durch ihren herrlichen Befang die Balber, und find nur mit den eigentlichen Gangern zu vergleichen. follte hier nicht der mannigfaltige Gefang der Umfel und Gingdroffel beifallen? Die Meis fterin darunter ift aber, nach Pennant und Bilfon, der amerifanifche Spottvogel (Turdus polyglottus), indem ihm fein anderer Bogel in Unschung der Ausdehnung und Man= nigfaltigfeit der Stimme gleich fomint. ihm eigenthumlichen Strophen find ausnehmend reich und melodisch, und außerdem befift er die Faligfeit, bie Stimme aller übrigen Bogel, vom Colibri bis zum Adler, nachzuahmen. Rach Pennant fogar das Miauen einer Rage und das Quifen einer Betterfahne, mas er bei einem im Rafig gehaltenen Befangenen in England felbft beobachtete. Bahrend des Ge= fange breitet er feinen ichonen weißen glangen= den Schwang aus, Schlagt mit demfelben den Saft, dreht fich wie verzuckt im Rreife und freigt am Zweige auf und nieder, je nachdem fein Gefang fich hebt oder erffirbt.

Die Umfel, Schwarz = Droffel. (Turd. merula. Linn.)

Das Mannchen schwarz, mit gelbem Schnabel und Augenliedrandchen. Weibchen und junger Bogel: schwarzbraun, mit weißgrauer Rehle und undeutlichen dunkeln Flecken am Borderhalse. Lange 10—10½ 3.; Ftügelbreite 16—16½ 3011; der Schwanz 4½ 3011 lang; Schnabel 9—10 Linien lang. Rachen und Zunge hochgelb; Fris dunkelbraun.

Gie bruten jahrlich zweimal, und wenn ihr ein Gehecke zerfiort wird, wohl dreimal. — Man hat unter ihnen mehrere Spielarten gesfunden, ale: eine weiße, eine perlgraue ze.

Dieser Bogel sindet sich in allen kandern des gemäßigten Europas, ift auch bei uns bestannt, doch trifft man sie nie heerdenweiß an. Ihr eigentlicher Aufenthalt ift in Waldungen mit dichtem Gebusch, am liebsten an Flussen, vorzüglich wenn sich Dorngebusch und Wachsholderbusche daselbst mit befinden.

Die Schwarzdrosseln find: Stands, Strich= und Zugvogel. Ersteres sind die, welche in Schwarzwaldern, die reichlich mit

Bachholdergebuschen versehen sind, wohner, das zweite sind die alten Bogel, die in Laubshölzern gebrütet haben, und im Winter, aus Mangel an Nahrung, ihren Aufenthalt veransdern und bald da, bald dort Nahrung aufsuchen. Biele, besonders die Jungen, sind wahre Jugvögel, die von der Mitte Septembers bis zu Anfang Novembers fortziehen, und Ende Marz zurücksehren. Die Alten troffen schon Aufang dieses Monats, da wo sie brüten wolzlen, ein. Sie ziehn des Nachts, doch nie in

großen Befellichaften.

Es ift ein febr vorsichtiger Bogel, ber in feinem gangen Wefen viel Munterkeit und Rraft verrath. Erblieft er etwas unerwartet, fo mippt, er mit dem etwas ausgebreiteten Schmange aufwarte, und rucft dabei mit den Flugeln, mobei er auch meift feine Stimme horen lagt. Man findet fie meift nur im duftern Gebufch. Treffen fich zwei Mannchen gur Brutgeit, fo beißen und jagen fie fich, mobei fie Strophen ihres Befanges ausfroßen. Ihre Lockstimme ift ein trillerndes: frii und frifrii, auch tad! tad! tud! tud! Beim Unfang ihres Gefangs hort man die Gilbe: tig! Das Mann= chen gehort übrigens mit zu den vorzüglichften Singvogel bei und. Gie fingen vom Mary bis Juli ununterbrochen, vorzüglich Abende. Gie laffen fich, jung aus dem Refte genom= men, wenn ihnen die Riele ausspringen, gut abrichten, und lernen mehrere ihnen vorgepfife fene Urien auswendig und vergeffen dabei ihren Baldgefang; dergleichen fingen das gange Jahr hindurch, die Mauferzeit ausgenommen. lernen auch Worte nachsprechen. Reinlichkeit und ein geräumiger Rafig gehören dazu, wenn man fie lange am Leben behalten will, auch muß man fie fich oftere baden laffen.

Ihr Futter suchen sie meift auf der Erde, und wenden deshalb Moos und Laub um, um Burmer, Insesten und deren Larven, auch nackte Schnecken aufzusuchen, und dadurch nüßen sie. Begierig verzehren sie die Puppe der Ameissen, und halten sich auch gern an Quellen, Waldbächen und auf feuchtem Boden auf. Auch gehen sie nach Kirschen und Beeren, besonders Ebresch und Wachholderbecren. Die gefangenen Alten werden mit Beeren oder Regenwürsmern an das Universalfutter nach und nach gewöhnt. Die Jungen füttert man mit in Milcheingequellter Semmel auf und gewöhnt sie dann an das gewöhnliche Futter, aus Gerstengrüße, eingeweichtem Weißbrod und flein geriebene

Mohrruben bestehend. Gie niften in den dich= teften Baldungen, am liebften da, wo Baf= fer in der Rabe ift. Gelten legen fie das Reft uber Mannshohe an; inwendig ift es bedeu= tend weit, und tiefer als eine halbfugel. Das Meußere befreht aus feinen Burgelchen, Sten= geln und durrem Grafe; Die innere Glache ift dagegen mit fetter feuchter Erde ober Schlamm (nie mit faulem Solze), glatt ausgeschmiert. Es find barin 4-5 ziemlich große, etwas langlichte, blag blaugrunliche, mit hell zimmt= farbigen oder matt rostfarbigen, fleinen Flek= fen, Schmigen und Punften über und über beffreute Gier. Gie bruten Diefelben in 15-16 Tagen aus. Das Mannchen brutet taglich nur einige Ctunden, boch futtern fie gemein= schaftlich die Jungen mit Burmern und In-Gie bruten meift zweimal feftenlarven auf. des Jahres, machen aber ftets dazu ein andres Reft, worin man aber weniger Gier als das erste Mal findet. Das Parchen halt fich das gange Sahr zusammen.

Auf ihnen wohnen Schmaroberinfeften und in ihnen Burmer. Ihr Aufenthalt im diefen Gebusch fchuft sie gegen die Naubvogel, das gegen leidet ihre Brut viel durch Marder, Iltiffe, Biefel, Kagen, Sichelheher und felbst Schlangen, weshalb ihre Bermehrung auch unbedeutend ift.

Sie laffen sich schwer schießen. Auf Bo= gelheerden und in Dohnen werden sie gefan= gen, doch nicht haufig, desgleichen auf Trank= heerden, am leichteften noch in Laufdohnen.

Thres wohlschmeckenden Fleisches wegen wurden sie schon von den alten Romern in großen Bogelhausern funftlich gemaftet. Ausgerdem vertilgen sie durch ihre Nahrung schalliche Insekten und Burmer, und erfreuen durch ihren Gesang.

Dem Jager sind sie verhaßt, theils weil sie im Dohnstege viele Beeren, ohne sich zu fangen, wegstehlen, theils weil sie den nach Wild schleichenden Jager, durch ihren War-nungeruf, den das Wild versteht, diesem anzeigen; sie pflanzen auch die schädliche Mistel, eine Schmarogerpslanze, mit fort.

Die Schilde, Ring = Droffel. (Turd. torquatus. Linn.)

Der gange Bogel mattschwarz, mit weißs grauen Federrandern; an der Oberbruft ein großer halbmondformiger, weißer oder weißlischer Fleck; ift 11—11\frac{3}{4}\frac{3}{4}\tag{-18}\tag{-

Man findet diese Drossel in ganz Europa; in der Schweiz ist sie gemein, aber in Deutschsland gehört sie zu den seltner vorkommenden Bögeln. Es ist ein Gebirgsvogel, der bergichte Baldungen bewohnt und daselbst auch nister. Im herbst kommt er in die Thaler herab und bringt den Binter als Zugvogel unter einem gelindern himmelöstriche zu. In den ersten Sagen des Octobers ziehen sie bei uns durch und kehren im Marz und April wieder zurück. Beides geschieht zur Nachtzeit.

Es ist ein einsamer Bogel, ist jedoch nicht scheu, vielmehr etwas dumm. Sie hüpfen mehr auf der Erde, unter dem Gebüsche herum, als im Freien. Bei etwas Unerwarteten maschen sie es, wie bei der Amsel gesagt ist. Ihre Lockstimme klingt wie: Tock! tock! tack! tack! schnell auf einander solgend. Ihr Gesang im Frühjahre ist eben nicht sonderlich. Sie werzden auch leicht zahm und zutraulich, und haleten sich lange, wenn man sie in einer Kammer herumstliegen läßt.

Thre Nahrung befieht in Negenwürmern, Insestenlarven, nackten Schnecken und kleinen Kafern; die sich unter dem Gebusch aufhalzten. Im herbste aber suchen sie Beeren, besonders die Ebreschen auf Wachholderzbeern, fressen auch gern Kurschen. Es sind starke Fresser, die sich gar bald mit untermingzten Beeren oder Negenwürmern an jedes Universalfutter gewöhnen lassen. Sie trinken auch wiel und baden sich gern.

In Deutschland findet man fie nur felten niffend. Ihr Reft, das fie mannshoch anlegen, foll, nebst Giern, denen der Umfel gleischen. Auch die Feinde hat fie mit diefen gesmein. Uebrigens werden sie leicht geschoffen, auf heerden und in Schlingen gefangen. Im Fruhjahre kann man fie auch unter Gebufchen

und Secten, auch in Laufichlingen fangen. Ihr Bleifch ift wohlschmeckend.

Miftel = Droffel, großer Krammetevo= gel, Schnaar, Biemer. (Turd. viscivorus. L.)

Dben hellolivengrau; die drei außern Schwangfedern an der Spife weiß, desgleichen der Unterleib, an der Gurgel mit dreieckigen, an der Bruft mit ovalen oder nierenformigen braunschwarzen Flecken; die untern Bligeldecks federn weiß, die obern mit weißen Spigen. Gie ift die größte unter den einheimifchen Ur= ten, faft von der Große einer Turteltaube; am baufigften fommt fie von folgender Große vor: Lange 11-114 3., Flugelbreite 19-19½ 3., der Ochwang 4-43 3., movon die ruhenden Stügel 2 Boll unbedecht laffen; der etwas abmarts gebogene Schnabel 10-11 Linien lang. Rachen und Bunge gelb; bas fable Augenrandchen ichmutiggelb, im Fruh= jahr rothlich gelb.

Dieser Bogel bewohnt einen großen Theil von Europa, besonders dessen nordliche Lansder. Rur in den nordlichsten Theilen ist es ein Zug=, sonst nur ein Strichvogel. Unsfangs September fangt ihre Strichzeit an, die aber füdlicher wandern, ziehen im October und November bei uns durch. Im herbst ziehen sie meist einzeln oder nur familienweis, aber auf der Ruckreise suchen sie gern die Gesellsschaften der Wackreise suchen Tage, theils auch des Nachts; im Frühling aber stets nur am Tage, so daß sie schon Ende Februar an ihren Brutplägen angesommen sind und daselbst ihren

Gefang hören tassen.
Diese Bögel lieben das dichte Gebusch gar nicht, und ähneln darin den Wachholderdrosseln; ziehen aber das Nadelholz dem Laubholze vor, und bewohnen am liebsten Hochwaldungen, wenn sie nur hin und wieder lichte Stellen, Wiesenssele und andere freie Plaze haben. Hier sind sie im Sommer gemein. Im Herbst bes geben sie sich aber in die lichten Laubwälder. Bei strenger Kälte und vielem Schnee suchen sie das junge Nadelholz und die Wachholdersbusche auf.

Hebrigens find fie gankifch, futterneidisch und ungesellig gegen ihres Gleichen; dagegen icheu, mißtrauisch und flug, hupfen meift im Freien umber, wodurch sie im Stande sind,

leicht eine Gefahr zu bemerken. Ihr Flug ift femerfallig.

Ihre Lockstimme ift fcnarrend: Schnarrer! eifrig lockend: Schnarrr = ratatatrarrr! Wenn man fie fangt, ertont, wie bei allen Walddroffeln, ein hellgellendes Schirfen. Das Mannchen hat einen gang vortrefflichen, lauten, etwas melancholifchen Gefang, aus 5-6 vollen flotenden Tonen bestehend. Es fingt vorzüglich in der Morgen= und Abends bammerung vom Februar an, etwa 3 Monat hindurch, meift dabei auf ber obern Spige einer Riefer, Fichte oder eines andern Baumes figend. In der Gefangenschaft benehmen fie fich ans fanglich fehr unbandig und fforrig, gewöhnen fich aber nach und nach, und man fann fie dann an 12 Jahr haben, und fie als Ganger und gute Lockvögel auf Bogelheerden gebraus den.

Co lange fie Regenwurmer und fogenannte Erdmaft (es find dies Larven, mahricheinlich von Zweiflüglern, die unter feuchtem und faus lenden Moos und Blattern leben), finden fonnen, ziehen fie dies allem andern vor. Des= halb fieht man fie auch foon am fruhen Mor= gen Rafenplate, Biefen und Triften befuchen, um die fich im Thaue badenden Regenwurmer ju fangen. Beufchreckenlarven, Schnecken und Rafer lefen fie als Rahrung auf der Erde auf. Bedeift die Erde Schnee, fo suchen fie die offnen Quellen. Im Berbft freffen fie verschiedene Urten von Beeren, besonders Ebrefdy= und vorzüglich Miftelbeeren im Spatherbft und Winter, mober obiger Rame, Mifret-Droffel. Findet man daher diefe Coma= rogerpflanze haufig auf den Baumen, fo fann man auch auf die Gegenwart diefes Bogels. ficher fchließen. Die Kerne von diefen Beeren werfen fie größtentheils in Bugen oder Ge= wolle durch den Schnabel wieder aus, nur wenige gehen durch den Ufter ab, doch immer noch von einem Theil des fie einhallenden ga= ben Saftes umgeben, wesmegen fie auch an den Weffen und 3meigen ankleben und fo die Berbreitung der Pflange befordern, indem viele Kerne, fo verbreitet, anmachfen. Bu Diefer Sahreszeit fieht man daher auch diefe Rerne in Menge an den Zweigen hangen, wo der jahe Gaft lange Faden bilbend, den Daran hangenden Rern, wie eine Spinne am Faden schaufelt. Beil man nun aus diefen Beeren den besten Bogelleim bereitet, um damit Bogel ju fangen, so gab dies schon bei den Alten Ber= anlassung zu dem lateinischen Sprichworte: Turdus sibi ipse cacat mortem.

Mit Beeren oder Burmern untermengt, geswöhnt man sie an Gerstenschrot oder Beizensfleie, mit Milch oder Basser angeseuchtet; besser noch bekommt ihm das schon angegebene Drosseluniversalsutter, (aus, auf einem Reibseisen geriebenen gelben Rüben (Daucus Carrota), Gerstengrüße und in Wasser eingeweichtem Beizenbrod zusammengesetzt.) Sie baden sich gern.

In Deutschland niften fie in großen Bal= dern, vorzüglich von Radelholz in gebirgigen Gegenden. Ihr Neft findet man auf Riefern, oft in beträchtlicher Sohe. Das Reft befieht aus Reiferchen und Stengeln von Beidefraut, mit untermengten Flechten und Baummoos, dann folgen gewöhnlich Erdmoofe, garte Wur= geln 2c. Das Innere mit trodfnen Grasblattern, Salmchen und Rispen ausgelegt, die innere Flache meift glatt und nett. Gie legen 4-5 fcon einformige, glattschalige Gier, die auf fehr blag meergrunem oder blaugrunlich weis fem Grunde, einzelne violettgraue, grobere ober feinere Punfte und Flecke, bann aber, besonders am flumpfen Ende, noch mehrere Punkte und größere Flecke von einer rothbrau= nen, oter bell faffanienbraunen Farbe haben. Punfte und Flecke find übrigens nicht fehr gablreich, und die größeren haben haufig einen blafferen Rand und fehen wie Brandflecke aus. Gie niften zweimal; bei der 2ten Brut findet man meift nur 3, felten 4 Gier. Gie bruten 16-17 Tage. In den Mittageftunden lof't das Mannden das Weibchen ab. Die Jun= gen futtern fie gemeinschaftlich mit Regenwurs mern, Infetten und deren Larven auf.

Schmarogerinsekten plagen sie; Falken und Habichten werden sie auch oft zur Beute; ihre Brut leidet aber durch Marder, wilde Kagen, Eichhörnchen und Saselmäuse. — Sie sind scheu und vorsichtig, daher schwer zu schießen. Auf Bogelheerden, in Dohnen, Laufschlingen und auf dem Trankheerde werden sie gefanzen. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend. Ihr Gesfang und die Bertilgung vieler Insekten macht sie schähbar. Die Berpflanzung der Miftel (Viscum album. L.) rechnet man ihnen aber als besonders schädlich an.

Sing=, Bein=Droffel. (Turd. musicus. L.)

Oben olivengrau; unten gelblichweiß mit dreieckigen und ovalen braunschwarzen Flecken; die untern Flügelbeckfedern blaß roftgelb, die obern mit schwuzig roftgelben Spigenfleckchen; der Schwanz einfarbig. Sie ist 8\frac{3}{4} - 9 Boll lang, Flügelbreite 14\frac{3}{4} - 15 3., der Schwanz 3\frac{1}{4} 3. lang; der Schnabel 7 - 8 Linien lang; Mundwinkel, Nachen und die Wurzel der Unsterfinnlade gelb.

Diese Droffel bewohnt ganz Europa, den hochsten Norden etwa ausgenommen. Sie bes wohnen die Laubs und Nadelholzer, wenn es in selbigen nur Dickicht von jungem Holze und hin und wieder Wasser giebt. Bon der Mitte Septembers bis Mitte Octobers verlassen sie uns meist einzeln oder in kleinen Gesellschafsten, und im Marz oder Unfange Upril, nach Beschaffenheit der Witterung, kehren sie in größern Gesellschaften wieder zurück. Sie zieshen des Nachts. Zum Zuge muntern sie sich durch ein eigenes Geschrei auf.

Im Berbft gieben fie nach beerenreichen Baldungen, bei marmer Witterung suchen sie jedoch auch Nahrung nnter Gebufch und auf freien Es find muntere, gewandte, scheue Bogel und wenig gesellig. Gie lieben das dichte Gebufch, durchfriechen ftill und ruhig die Becfen. Ihre Lockstimme ift ein zischendes oder heiser pfeifendes, eben nicht weit borbares Bipp! Bei einer Gefahr, auch wenn fie angfilich find, rufen fie: dack, dack, dack! oder: dock, doct! Das Mannchen hat einen portrefflichen Gefang, welchen es vom Marg, bis tief in den Sommer hinein, vorzuglich des Morgens und Abends, in Baldern horen laßt, dabei ftets auf der Spipe der hochften Baume figend. Che die Rahrungsforge fur die Jungen fie druckt, fingen fie viel am Tage.

Alt eingefangen, benehmen sie sich sehr wild, weshalb man ihnen anfänglich die Flügel binden muß, schreien auch, wenn man sich dem Käsige nähert. Jung aufgezogen, werden sie zahmer. Ein Drosselfäsig, worin sie sich gut halten sollen, muß gehörig weit seyn und auch am Boden Sprossen haben, damit der Unrath durchfällt, der durch den Geruch unangenehm ist, auch dem Bogel selbst schädet. In einem Bogelkammerchen halten sie sich mit anzdern Singvögeln am besten. Jung aufgezogen lernen sie auch Lieder nachpseisen.

Thre Nahrung befieht den Sommer hindurch in Regenwurmern, Infestenlarven, kries chenden Infesten und nackten Schnecken, die sie unter Blattern und Moob aufsuchen, wels ches sie deshalb umwenden. Sie gehen auch den reisen Kirschen nach, so fressen sie auch heidels, Preußels, Iohanniss, rothe und schwarze Holunderbeeren, endlich Beeren vom Faulbaum (Rh. Frangula) und Hartriegel (Cor. sanguinea. L.), welche sie nachst den Ebreschs oder Bogelbeeren am liebsten fressen, doch diese

allen andern vorziehen.

Sie baden fich fehr gern, befonders fruh und Abende. Schwer laffen fie fich mit Bee= ren oder Burmern ju dem angegebenen Drof= felfutter gemobnen. - Wo fie niften wollen, da ertont ichon im Marg ihr herrlicher Ge= fang, und zu Unfang Uprife fliegt oft ichon Die erfte Becke aus, wo fie dann zu einer zweiten Brut Unffait machen. In den Elbauen, da fie feuchten Boden fehr lieben, findet man oft mehrere Refter nicht weit von einander. Sie mablen dazu das hohe, dichtstehende Un= terholz, bobe Dornen, dichte Bufdmeiden zc. In der Regel fteht es nicht viel über Manns= hohe. Das Reft ift ziemlich groß, besonders inwendig, fo daß es einen Rapf bildet, melther mehr als die Salfte einer Rugel aufneh= men fann. Die inwendigen Bande glatt, etwas feucht; übrigens aus durren Stengeln, Gras= halmchen und vielem Erdmoos beffehend, alles dicht in einander verwebt. Die gange innere Seite besteht aus flar gebiffenem faulem Solze, welches durch eine flebrige Materie (vermuth= lich dem Speichel des Bogele) verbunden, mit dem Schnabel durchfnetet und fehr glatt ge= frichen wird; bisweilen eine geringe Mischung thoniger Erde beigefellt. Gie legen 4-6 Gier von etwas furger Beffalt, an einem Ende viel dicter als am andern. Die Farbe ift ein scho= nes Meergrun oder blaffe Grunfpanfarbe, mit mehreren feinen und weniger großen Punkten, oder rundlichen fleinen Flecken von ichwarger oder fcmargbrauner Farbe beffreut, am haus ... figften find die großen am frumpfen Ende. Zuweilen sind auch einige aschgraue Fleckchen ju feben, feltner die großen faft fcmargen, rothbraunen, noch feltener find fie ungeflecft, oder nur mit fehr feinen Punftchen fparfam be= ffreut. Die Schale ift glatt, ziemlich glanzend. Sie bruten die Gier mit 16 Tagen aus, mogu das Mannchen nur taglich einige Stunden ver= wendet, übrigens es dem Beibchen überlaßt.

Thre Jungen fattern fie gemeinschaftlich mit Insfekten, beren Larven und Burmern auf. Sos bald die Jungen Ende Aprilo flugge find, bauen fich die Alten zur 2ten Brut auch ein neues Reft, worin man aber meift nur 4 Gier findet.

Schmarogerinfeften und Gingeweidemurmer plagen auch fie. Uebrigens machen Sabichte und Sperber auf fie Jagd. Dagegen wird ihre Brut haufig von Ragen, Mardern, Biefeln, Safelmaufen, Gidbornden und Schlangen zerftort; auch thun das befonders noch die Eichelheher. - Gie find fchwer zu fchießen, werden dagegen in den Dohnen, wo Eberefchbeeren vorgehangt find, haufig gefangen. Gerathen diese Beeren nicht, fo ift auch der Fang diefer Bogel fchlecht. Leicht fangen fie fich auch in Laufdohnen, die man unter das Gebufch ohne Beeren aufstellt. Much auf den fogenanns ten Strauchheerden werden viele gefangen, mogu man aber gute Loctvogel haben muß; desglei= den fann man fie auch auf den Tranfheerden fangen. Ihr Neifch ift moblichmedend, daber im Berbft, wo fie oft recht fett find, viele Cau= fende verspeift merden. Wo viele gefangen und ju Markt gebracht werden, zahlt man fie unter die Salbvogel, von welchen 4 Stuck auf einen Clubb gehen.

Uebrigens vertilgen fie viele nackte Schnecken und schadliche Insekten, pflanzen auch beerenstragende Holzarten fort, und erfreuen im zeitis gen Frühjahr, da es noch an Sangern fehlt, durch ihren Gesang in den Waldern und denen, welche auf den Unfrand nach Schnepfen und dergl, gehen, verfürzen sie dadurch die Langes

meile#).

^{*)} Es giebt eine große Menge Droffeln. vier finden wir davon 70 Arten beschrieben, da= ber wir bier nur noch einiger furg gedenfen wollen. 1.) Die Stein . Merle (Turd saxatilis Lath.). Am etwas. furjen Schwange find Die zwei Mittelfedern dunkelbraun, die übrigen bell roftfarben und nur vor der Spige, auf der Mugenfahne, mit einem fleinen braunen Striche verfeben; die unteren Glagelbedfedern bleich rofffarben; Flügel dunkelbraun, mit braunlich weis Ben Gaumen; Lange 8 Boll. Mannchen: Kopf, Sals und Reble afchblau; der Unterleib hell roft-farben. Weibchen und junger Bogel: Kehle weißlich; Unterleib dunkel rofigelb, mit fchmarglichen Bellenlinien. Es ift ein Gebirgevogel des füdlichen Europas; j. Naumann's Raturgeich. b. Bögel Deutschlands, Ed. II. Taf. 73. - 2) Blau-Merte (lurd. cyanus, Linn.). Mannchen: fchieferblau, Flügel und Schwangfedern blan gefaumt. Beibden: braungrau, an ber Reble mit licht roftbraunlichen , ichwargbraun

Umeifenfänger. (Myiothera III.)

Sonft gablte man auch diefe mit zu den Droffeln, indeffen zeichnet fie ihr furzer Schwanz und die hohen Beine davon aus. Man findet fie in beiden Continenten.

Ihre Hauptnahrung find die weißen Umeisfen, Termiten; diefe verfolgen fie, und werden, diefe Plage mindernd, eine Bohlthat der warsmen Lander. Diefe merkwurdigen Insekten bauen fich eigene Wohnungen, merkwurdiger als bie unferer Umeisen. Sie wurden ganze Provinzen bedecken, waren diese Bogel ihnen nicht zur

gefaßten Fleden, ber ubrige Unterleib mit bunfelblauen Fleden und braunlich weißen Fe-derkanten; Flügel und Schwanz dunkelbraun, 8-81 3. lang und 14-16 3. breit. Gin fud. licher Gebirgsvogel. G. Maumann's 2c. B. II. Taf. 72. M. 1. 28. 2. - 3.) Die Bachhole Der = Droffel (Turd. pilaris, Linn.). Ropf und Burgel afchgrau; ber Oberruden fchmugig taffanienbraun; Schwang ichwarg, die außerffen Febern mit einem weißlichen Randchen; ber Unterleib mit langlichen und breiedig fpigigen Fletfen; die untern Dedfedern weiß. Lange 11 3. Breite 173 3. Bewohnt den nördlichen Theil Europas, und mird bei uns befonders Rrammetevogel genannt. Man veripeift fie; Dft. preußen foll jährlich 600,000 Paar verfpeifen und vericier, Dangig mit feinen Umgebungen jährlich 60,000 Paar, und in Thuringen fangt mancher Bogelfieller in einem Jahre 20-40 Schode. Much Dieje Art wurde von den Romern gemaftet. Maumann's 2c. Bd. II. Taf, 67. Fig. 2. — 4.) Die Roth . Droffel (Turd, iliaens. Linn.). Der Oberleib olivenbraun; ber Linterleib weiß, mit olivenbraunen gangefleden; über dem Auge ein hellgelber Streif, an den Seiten des Salfes ein dunkelgelber gled und die Unterflügel roffrorh. 83 3. lang und 143 Boll breit. Wohnt im nördlichen Europa. Man gahlt fie beim Berfauf unter die halbvogel und gablt 4 Stud auf einen Clubb. Gie merben auch in Menge gefangen, und als belifates Wildpret verspeift. S. Maumann's ic. Bd. II. Taf. 67. Fig. 1. — Endlich fuhren wir noch an: 5) Die Droffel von Ren . Guinea (Turd. gularis Lath.) In Sinficht des Gefieders mohl (Sinige haben fie unter die Paradie fconfte. Dicevogel gefiellt: Paradisea nigra Gm.) 3hr Schwang ift breimal langer ale ihr Korper, auf dem Kopf einen doppelten Federbuich (wie zwei Muichelichalen, beren Concavitat nach außen gerichtet ift). Diefer Prachtvogel ift von obenher purpurichwarz; vom Angenwinkel geht eine hya-einthrothe Binde, wie glübende Roble, herab, die fich im Salbgirkel unter der Reble endigt. Die Scheitelfedern endigen imaragdgotben, juvot im hyacinthroth. Die gange Unterfeite ift maladjitgrun.

Geite geffellt, um ihre Bermehrung ju jugeln. Ihre Wohnungen faffen gahllofe Individuen, fie felbft verheeren Balder und Felder, überrafchen die Thiere im Schlafe, und dringen in die Bob= nungen der Menschen als schreckliche Bermufter. Daher find mehrere Thiere, felbft Gauge= thiere, 3. B. die Gattung Umeifenfreffer (Myrmecophaga). In Ufrika und Indien leben die Schuppenthiere und Umeifenscharrer (Manis und Orycteropus), die auch auf jene Bermuffer angewiesen find. - Ihre furgen Flugel machen ihren Flug ungeschieft, fie fliegen daber niemals weit; find aber dennoch fehr lebhaft. Gie leben gefellschaftlich an einsamen Orten, in dichten Behölgen, und man ficht fie immer auf den großen Umeisenhaufen figen, die oft 20 Jug im Durchmoffer haben, und in der Ferne fleinen Butten gleichen. Gie bauen ihr Reft ins Bebufche, 3-4 Fuß vom Boden; es ift an zwei Seiten aufgehangt, bestehend aus durrem Bras, ift dunne gewebt, halbkugelformig und 2-4 3. im Durchmeffer. Gie legen 3-4 faft gang Das Fleisch der meiften hat einen runde Gier. unangenehmen Gefdmad.

Der gezäumte Ameisenfresser. (Myothera [Turd.] capistrata Temm.)

Bon der Basis des Schnabels verbreitet sich eine schwarze Binde bis in den Racken; von beis den Seiten mit einer rostbraunen Linie einer faßt; die Rehle ist rein weiß und bildet einen kurzen Schnurrbart am Schnabelwinkel; die Backen sind grau; alle obern Theile des Korpers und des Schwanzes sind olivenbraun; die Schwungsedern rostfarben gesäumt; die untern Theile braunroth, Seiten und Unterleib mehr braun; die Füße braun. Das Baterland ift Java.

Der große Umeisenfresser. (Myoth. [Turd.] Andromedae Temm.)

Die Lange 8 3. 4—5 Linien. Die obern Theile braunblaulich, auf dem Rucken ftehen einige halbmondformige schwarze Flecken an der Spige der Federn; die Flügel sind braunlich olivenfarb; die Schwanzsedern sind gleich lang, mit dem Rucken von gleicher Farbe; an den Zügeln ein langlich weißer Fleck; die Augengegend ift nackt; an den Ohren sind die Federn weiß und schwarz gefleckt, so daß sie auf beiden Seiten einen langen Backenbart bilden; die Brust grau; die Rehle und die Mitte des Bauches rein weiß,

an den Seiten find die blendend weißen Federn schmarz gerandert; Schnabel schwarz; Fuße braun. Baterland: Java und Sumatra.

Schwätzer. (Cinclus. Bechst.)

Man gablte fie fonft zu den Droffein, wohl auch ju den Staaren, mit denen fie in der That noch mehr Uehnlichfeit haben. Der Schnabel faft grade, nur wenig aufwarts gebogen; die Epipe des Oberschnabels faum etwas langer als Die untere, merflich abwarts gebogen, mit einem feichten Musschnitt auf der Schneide; übrigens schmat, befonders nach vorn zu fehr jufammengedructt, und hier die Schneide merf= lich eingezogen. Bunge: langettformig, fcmal, mit hornartiger, getheilter, feitmarts borftig Rafentocher: feitlich, am gerriffener Cpige. rigenformig, verfchließbar. Schnabelgrunde . Guge: fart, eben nicht furg. Bon den drei vordern Beben die außere und mittelfte im Grunde ein wenig verwachfen; alle mit farfen, febr frummen, ichmalen, unten zweischneidigen Rägeln bewaffnet, an der Hinterzehe der farkfte. Flügel: flein, furg, etwas gewolbt; die vor= dern Schwingen ein wenig fabelformig gebogen, fcmal; die erfte fehr flein. Schwang: fehr furt, mit breiten, weichen Federn und geradem Der Körper ist diet, rund, dicht und Ende. lang befiedert; der Ropf flachfirnig, schmal und fpigig. - Ihr dicter und dichter Federpels charafterifirt, fie fogleich als Baffervogel, ja felbft der Schnabel hat etwas Saucherartiges, doch find die Guge wie bei einem Gingvogel. Die wenig hierher gehörigen Urten leben am Waffer von Infeften und Burmern. eigentliche Waffervogel zu fenn, halten fie fich nicht allein an demfelben auf, fondern fcmim= men und tauchen felbit meiffeihaft, fturgen fich in die braufenden Strudel, um ihre Rahrung vom Boden herauf zu holen; niften auch in Soh= len an den Ufern, in der Rabe des Baffers, und bauen ziemlich funftliche Reffer.

Der Waffer = Schwäher, Bafferstaar,
Bafferamfel.
(Cinc. aquaticus Bechst.)

Mit weißer Rehle, Gurgel und Oberbruft, dunkel schiefergrauem Unterleibe, welcher an der Bruft in Roftbraun übergeht, bei den Jungen aber weiß und schwärzlich besprift ift. Der Bogel

mißt in der Lange 7½—8 3., in der Breite 12— 13 3.; Schwanz nur 2 3oll; Schnabel 8 Linien lang. Augenstern lebhaft hellbraun.

Beim alten Mannchen ift der ganze Oberfopf, Zügel und Wangen, Genick, Hinterund Seitenhals umbrabraun, nach dem Rücken
herab dunkter oder schwärzlich überflogen; alle
übrigen obern Theile schieferfarben, braunschwarz
geschuppt. Die Rehle, der ganze Borderhals
und Kropf, bis auf die Oberbruft herab, rein
weiß. Die großen Flügeldecksedern fahlschwarz,
mit dunkelaschgrauen oder schieferfarbenen Kanten. Die Schwanzsedern fahlschwarz mit schieferfarbenem Ueberflug auf den Außenfahnen.
Das alte Weibchen ist von ihm wenig verschieden.

Dieser Bogel bewohnt die kaltere und gemäs
higte Zone, und findet sich im nordlichen Usien
und Europa in vielen Landern. Ueberall liebt er
aber Gebirge mit rauschenden Bachen und andern
klaren Bassern, die besonders auch zur Binteres
zeit offen sind. In Deutschland ist er ein Stands
vogel. Die Strichzeit der Jungen ist im Herbst,
der October und November; im Fruhjahre, der Marz. Ihre Nachtruhe halten sie an überhans
genden Usern und in Userhöhlen, dicht am Basser. Plostich hier ausgescheucht sturzen sie sich
nicht selten, wie die Basserratten, gleich in das
Basser, gehen eine Strecke unter selbigem hins
weg, kommen wieder herauf und fliegen dann
erst sort.

In seinem Betragen ahnelt er fehr dem ge meinen Gisvogel. Es ift ein munterer, hurtiger und immer frohlicher Bogel, lauft fehr behend und mit häufiger Bewegung des hinter= leibes und des Echmanges. Cucht er gerade feine Nahrung, fo fift er oft lange an einem menig erhabenen Orte über und an dem Baffer, auf Steinen, Pfahlen, Behrbalten zc., ift dabei aber ichen, ungefellig; lebt einfam und nur zur Begattungezeit treibt fie die Liebe gufammen. Gein Treiben in dem Saushalt der Natur ift hurtig und geschickt auf dem merfmurdig. Lande wie im Baffer, madet er in das Baffer, fturgt fich auch wohl von einem erhabenen Dite in daffelbe oder thut dies im Ueberfliegen, ver= fdwindet fo, und fommt dann erft nach einiger Beit, oft an einer gang andern Stelle, ffrom= aufwarts jum Borfchein. Im flaren Baffer fahe man, wie er beim Sauchen die Flügel als Ruder gebrauchte, wie dies mehrere Baffervo= gel thun, ja wie er auf dem Boden des Baffers hinlief, als mare er auf dem Lande. - Gein

Blug gleicht gang dem bes Gievogele. - Die Stimme, die er meift im Auffliegen boren laft, flingt wie: zerb, zerb! in einem hohen hellen Tone. Außerdem hat das Mannchen einen lau= ten und fo abmechselnden Gejang, daß er ein Gefdmag genannt werden fann, woher auch wohl der obige Rame. Zwischen vielen leife fcnarrenden und zwitschernden Sonen fommen nehmlich auch laute Strophen und hellpfeifende Tone vor, die ihn recht angenehm machen, be= fondere noch dadurch, daß man ihn nicht auß= fchließend im Fruhjahr und jur Begattungszeit, fondern auch im Winter felbit auf dem Gife hort, dabei auf einem Steine oder einem Behr= balfen ze. sigend, mobei er ftete die Reble ftark aufbläßt.

Geine Rahrung machen allerlei Infekten, deren Larven und Puppen, die im Baffer oder in der Rahe derfelben leben, aus, als: Phry= ganeen, Safte, Mucken, Schnecken, Rafer= den und allerlei Burmchen. Wie bei den Strandvogeln, findet man auch in feinem Magen immer etwas groben Sand und fleine Ricsforn= den. Diefe feine Rahrung erhafcht er laufend, fpringend, ja felbft darnach untertauchend und schwimmend. Im Binter fieht man ihn an offnen Stellen und warmen Quellen der Gemaf= fer oder an den ins Gis gehauenen Lochern. Er badet fich gern, felbft in der ftrengften Ralte und ift dabei immer lebhaft und frohlich. lagt fich, wiewohl mit Muhe, durch Fliegen, Umeifen und Mehlmurmer an das Nachtigallen=

futter gewohnen. In Deutschland finden wir ihn an den oben angegebenen Lieblingsorten niffend, ftete in der Rabe des Baffers, bei Bafferfallen, Dubl= wehren zc. Das Reft fteht ftete in einer Soble eines Felfens, in einem hohlen vom Baffer be= fpulten Baumframme unter Brucken, ja felbft in den Schaufeln alter unbrauchbarer, oder lange Beit fill geftandner Muhlrader. Decfe von oben muß ce immer haben, und biefe ift in fehr weiten Sohlen oft funftlich. Eingang ift ftete enge, nur der Große des Bo= gels angemeffen und feitwarte, mahrend es in= wendig einen halbkugellichen Rapf bildet. Es hat Uehnlichfeit mit dem Nefte des Baunto= nigs; die Bande find aber immer fehr dick, aus trodinen Pflanzenftengeln, Salmen, Burgeln, durrem Gras, Stroh und dergleichen, mit oder auch ohne eingewehtes Moos, inwendig mit durrem Laube und Salmchen ausgelegt. Die Ungahl der Gier beträgt 4-6, die bald etwas

furzoval, bald auch langlicher, zuweilen an dem einen Ende auffallend dick und frumpf, am entgegengefegten ziemlich fpig, gart = und glatt= fchalig, mit febr bemerkbaren Poren, übrigens einfarbig weiß. Frisch fieht man den Dotter hindurchschimmern; auch glangen fie etwas, boch nicht fo wie die vom Gievogel, tenen fie fonft, bis auf die etwas fpisigere Form, ahneln. In den Sammlungen verlieren fie den Glanz nach und nach gang. Nach 14 - 16 Tagen schlupfen die Jungen aus; fie werden von den Eltern fehr geliebt und gut genahrt. Dicht felten laßt fich das Weibchen darüber figend fangen. Die Jungen find mahre Refthocker. - Man findet jahrlich meift zwei Bruten, das erftemal im Mary, das zweitemal im Juni.

Bu ihren Feinden gehört der Sperber. Die Jungen werden ofters die Beute der Itiffe, Bieseln und Wasserratten, auch schnell anschwellendes Wasser vertilgt sie ofters. Die Alten sind schee und deshalb schwer zu schießen. Leimeruthen und Fußschlingen an ihre Lieblingspläße gelegt und vorsichtig darnach hingetrieben, bringt sie noch am besten in unsere Gewalt. — Ihr Fleisch schweckt angenehm; ihr Gesang und ihr munteres Wesen erfreut; auch nußen sie noch durch das Berzehren mancher schädlichen Insesten. Daß sie Forellen= und andere Fischbrut verzehren sollen, ist noch unerwiesen*).

Das 10te Genns nach Euwier ift Mainate (Enlabes Cur.). Sie fichn dem Philedon sehr nabe; der Schnabet fast der einer Droffet; ihre Rasenlöcher rund, glatt; sie zichenen sich durch große nachte Fleischlappen am Sinterkopse und einem nachten Fled an der Bade aus. (Linne verwechselt zwei Gattungen unter dem gemein-

^{*)} Um unferm Gubrer tren gu bleiben, wollen wir ftets die Genera, die theils gang neu, oder neu gemacht find, mit anführen. Go ernahrt Afrifa und die Ruffen des indifchen Meeres ein ben Droffeln vermandtes Bogelgeichlecht, bas man Philedon genannt bat. Ihr Schnabel ift gufam. mengedrudt, in feiner gangen Lange leicht gebos gen, nabe an der Spige ausgeferbt; Die Rafenlocher find groß, mit einer Knorpelichuppe bededt, und ihre Bunge in einen haarpinfel endis gend. - Die hierhergezogenen Gattungen zeichnen fich burch irgend eine Conderbarfeit aus, fie find von den Ornithologen in faft allen Ars ten von Geschlechtern bin verfest worden. Einige haben an Der Bafis des Schnabels Fleifchflunfern. - Phil. paradoxas, graubraun gefledt, untenher weißlich, in der Mitte Des Baudes weiß. Gine enlindrijde, 1 Boll lange Fleifch. flunker von orangengelber Farbe, bangt jur Seite des Salfes herab. Un den Secufern Deus feelands. - Undere Arten haben wenigftens einige nadte Sautstellen auf den Wangen.

Mino. (Gracula, Cuv.)

Ein den Droffeln verwandtes Gefchlecht, bas Ufrita und die indischen Ruffenlander be= Ihr Schnabel ift jusammengedrückt, fehr wenig gebogen, leicht ausgeferbt; feine Commiffur bildet einen Binfel wie bei den Faft , immer find ihre Ropffedern Staaren. fcmal, und ein nachter Roum um das Muge. Cie abneln den Staaren in ihren Sitten, leben in Schaaren und jagen Infeften. Die nachft folgende Urt fommt bismeilen nach Europa. Bor einigen Jahren murde ein lebendes Mann= chen bei Salle mit einer Menge Ctoare jugleich gefangen, wobei ich Belegenheit hatte, es felbit Leider entwischte es nach mit zu beobachten. einiger Beit feinem Befiger wieder aus dem Rafig.

Rofenfarbige Staaramfel, Beufchred-

(Gracula rosea; Merula rosea; Turdus roseus).

Rofenroth; Ropf, Flugel und Schwang fcmar; erfferer mit einem Federbufch. jungen Bogel feben braungrau (faft wie junge Staare); Rehle weißlich; Bruft undeutlich ge= fleckt; der Federbusch fehlt. - Diefer schone Bogel hat die Große und Geftalt des gemeinen Staars, doch ift der Schnabel anders gebildet, auch hat er ein weicheres, fanfteres Gefieder, mas nur am Federbufche der alten Bogel fehr schnial und linienformig, an allen übrigen aber abgerundet ift und in diefer Sinficht dem der Droffel gleicht. So ftehen sie denn als Mittel= gattung zwischen Ctaar und Droffel, und mur= den bald des droffelartigen Schnabels megen ju Droffeln, bald zu Staaren geftellt. Lange des Bogels ohne Schnabel gemeffen 9 3., die Breite 151 - 161 3.; der 31 3oll lange Schwanz ift beinahe gerade, von den Flügeln bis auf & 3. bedeckt. Der 7 3. lange Schnabel ift groß und ftart, nach vorn mehr jufammenge=

famen Namen Gracula religiosa.) Wir merfen hiervon: die indische Mainate (Eul.
indious); Größe einer Amset, schwarz, mit einem
weißen Fleck gegen die Basis der großen Schwungsfedern hin. Füße, Schnabel und die nackten
Theile gelb. An diesen schließt sich noch an: Eul.
javanicus, vorigem sehr ähnlich bis auf den Schnabel, wodurch er sich mehr an die Coracias anschließt. Dieser Bogel wird dadurch merkwützbig, daß er unter allen Bögeln die menschliche
Sprache am vollkommensten nachahmen soll.

drückt, als bei den Droffeln, schwach gebogen; die Schnabelip be fast weißlich. Die Füße sammt den Krallen groß und stark. Bei alten Männchen hängt der Federbusch über das Genick hinab; weil die langen sehr schwalen seidensartig weichen Federn, woraus er besteht, bosgenformig nach hinten gekrummt sind.

Die alten Beibchen unterscheiden sich von den Mannchen durch einen fürzern Federbusch, durch ein matteres Roth und durch ein weniger glanzendes Schwarz. Luft und Sonne wirken sowohl bei den lebenden als ausgestopften Bogeln so ein, daß das herrliche Rosenroth nur noch fleischfarben, ja nach und nach nur noch

rothlichweiß erscheint.

Im füdlichen Ufien und in einem großen Theile von Ufrifa wird tiefer Bogel in Menge gefunden. Um Aleppo hat man ihn im Juli und August in großen Schaaren gefeben. Bon dort aus besucht er Griechenland, das fiid= liche Italien und Spanien. In Deutsch= land finden wir ihn aber nur als Geitenheit, und meift nur in Gefellichaft der Ctaare. Er. hupft nicht, fondern geht fchrittmeife. bier eingefangene benahm fich gegen andere Wildfange nicht fehr icheu. Man gab ihm an= fanglich Tecken und Solzbocke von Schafen ab= gelefen, die er auch frag und, wie ce fchien, fich auch an das gewohnliche Staarenfutter gewohs nen wollte; allein feine eigene Befreiung entzog und leider! alle weiteren Beobachtungen.

Thre eigentliche Nahrung besteht in Inseften, Bei den deren garven und Riegenwurmern. Biebheerden, die fie begleiten, fangen fie Bres men, Stechfliegen und dergl., und dem Rinde vieh, Schafen und Schmeinen, auf beren Ruf= fen fie fich fegen, lefen fie Laufe und andere Gins quartirung diefer Urt ab, die fie deshalb auch geduldig mit herumtragen. Raferlarven und allerlei Infetten fuchen fie im Difte, doch ma= den ihre Lieblingespeife Beufdrecken aus, deren verheerende Buge fie durch gange gander begleis ten. Gelbft die Gier derfelben, fo mie die ans berer großer Infetten fuchen fie in der lockern Erde, im Mifte der Thiere, fo wie auf Dungs statten auf.

Rach den Berichten der Reifenden follen fie in Baumhohlen, Felfenspalten und in Mauers lochern, besonders aber in alten Ruinen niften

und etwa 6 Gier legen.

Im Gefieder und im Innern werden auch fie von den gewöhnlichen Bogelfeinden geplagt. Die übrigen Feinde haben fie mit den Staaren

gemein. Sie find übrigens nicht iche und lafe fen fich leicht ichiefen. Bieber fing man fie zugleich mit den Staaren. — Sie vertilgen übrigens viele Inselten; werden aber vorzüglich das durch nüglich, daß sie in den heißen Landern die so verheerenden heuschreckenschwarme verfolgen, und diese Landplage vermindern helfen. Desehalb sind sie auch dem Turken heilig, so daß sie niemand tödten darf. — Ihr sehr fettes Fleisch wird als sehr delikat gerühmt.

Steinrabe, Steinfrabe. (Pyrrhocorax. Cuv.)

Sie haben den zusammengedruckten, geboge= nen und ausgeferbten Schnabel der Droffeln; aber ihre Nasenlocher sind mit Federn, wie bei den Raben, bedeckt, mit denen fie bieher ver= einigt maren.

Schnee=, Alpen=, Berg=, Steindohle. (Pyrrh. alpinus. Cuv. Corvus pyrrhocorax Linn.)

Schwarg, mit gelbem Schnabel und rothen Fußen, der Schnabel furger als der Ropf. Junger Bogel': mit vorn ichmarglichem Schnabel und braunen Fußen. Die Geffalt des Bogels ift fchlant, die mittelmäßig großen Glugel ziemlich fpißig, das Gefieder fohlschwarz. Ihre Lange beträgt 153-163., die Breite 32-Der am Ende nur wenig abgerundete Schwang ift 6-64 3. lang, und die in der Ruhe liegenden Flugel laffen davon 1-11 3. unbedecft. Die vierte Schwungfeder ift die langfte. Der Schnabel 1 & 3. lang. In Bergleich mit den Schnabeln der Rabenarten etwas flein und schmadlich, an dem etwas langern und an der Spige mit einem frumpfen Musfcnitte verfebenen Oberficfer fanft abwarts ge= bogen, der gange Schnabel aber von den Seiten etwas zusammengedrudt und ziemlich fpigig. Die Bris dunkel = oder nufbraun. In Sinficht der Guge gleichen fie dem Seber oder der Elfter. Die Rrallen find ziemlich groß, fart gefrummt, febr fpigig und unten fchneidig, fcmarg, die Gufe aber fcon glangend hell Bin= noberfarbe, oftere dem Mennigroth fich nahernd, mit fcmarglichen Behfohlen. Das gange Be= fieder wie schon angegeben bedeckt ein dunke= les Schwarz mit einem fdmachen Schimmer, an den Flügein und am Schwanze von fahle . gruner, am Ropfe und Salfe von blauer Farbe,

ben man nur bemerkt, wenn man den Bogel nach dem Lichte dreht. Um Beibchen ift von diesem Metallschimmer meift keine Spur, ja das Schwarze zieht sich an den Schwungsedern und an den untern Theilen vielmehr oft instiese Braun, auch ist oft der Schnabel blaffer. Doch giebt es auch vielleicht alte Beibchen, die den Mannchen sehr gleichen. Un den jungen Bögeln ist das Gesteder schwarz, ohne Glanz, unten und an den Flügeln braunschwarz, der Schnabel schwärzlich, blos an der Burzelhälfte der Unterfinnlade gelb, die Füße braunschwarz mit gelben Sohlen.

Dufer Bogel ift weit verbreitet; doch be= wohnt er fets nur die hochften Gebirge. In Europa die Ulpen der Schweig, die Upenni= nen und Pyrenden. In den Sochgebirgen des fudlichen Giberiens, auf dem Caucafus und den Perfischen Gebirgen, auch in Me= gupten 2c. In der Schweig ift er ein ges meiner Alpenvogel und ift daselbft ein Stand= vogel. Im Binter fcheint er aber ein Strich= vogel zu fenn; indem fie in großen Schaaren rach Futter umberfuchen, doch nie weit von ihren eigentlichen Wohnorten im Sochgebirge fich entfernend. Im Commer bewohnen fie dies ausschließlich, fast immer in einer Sobe von 4000 bis 5000 Fuß über der Meeres= flache, fo auf der Bobe Des Gemmi, des Sim= plone, des Furfa, des Gotthards 2c. bevorstehendem Riegen oder Sturm fommen fie tiefer berab, eben fo menn es fcneiet. Da= ber halt man auch ihre Erscheinung in niedern Gegenden als Borboten eines einfallenden Un= wetters. Im Winter freichen fie in den bo= hern und tiefern Bergthalern Nahrung fuchend umher, übernachten aber immer in den Be= birgen. In Geoßen Ebenen fieht man fie nicht.

Hebrigens ift es ein munterer, unrubiger, außerft geschmäßiger, und fo geselliger Bogel, daß man, die Begattungszeit ausgenommen, nur felten ein einziges Parchen ficht. Dage= gen schwarmen fie in Schaaren oft ju 5= und mehreren hundert Stuck umber, ganfen und necken fich beständig, jagen einander im Fluge wie im Laufen mit großer Bebendigfeit, dabei unaufhörlich fdreiend und larmend. Mit den Doblen haben fie in ihrem Betragen viele Uehn= lichfeit. Im Binter find fie gabiner und laf= fen fich nabe ankommen, im Commer dagegen Ihr Flug ift rasch, meift schwebend fdjeuer. oder fdmimmend, in Schneckenfreisen, wenn fie berab oder auch hinauf fliegen. Bei bei=

term himmel und Ralte fliegen fie hoher, wenn es aber schneiet und warmer wird, ganz nies brig. Man halt fie in der Schweiz für sichere Betterpropheten. Ihre Erscheinung in den Thalern fundigt bald Negen oder Schnee an, und haben sie im Fruhlinge schon das hochs gebirge bezogen, kehren aber wieder zuruck, so

erfolgt ficher Schnee.

Ihre Ctimme bort man in den Ulpen uns aufhörlich, fie ahnelt dem Gefchrei der Dob= len und flingt wie: fru, fru, furi! auch jaif, jaif! Sat fich ein Schwarm Rahrungs= mittel ju fuchen gelagert, fo bort man nur das legtere einzeln, denn ichwagen muffen fie Bei einer nahen Gefahr nun einmal immerfcreien fie plotlich auf und begeben fich fo= gleich mit larmendem Gefchrei auf die Flucht. Raubthiere werden von ihnen mit Gefchrei gange Strecken weit verfolgt. - Jung auf= gezogen werden fie leicht gahm, lernen menfch= liche Worte nachsprechen und vergnügen durch ihr Betragen; fiehlen aber auch wie alle ihre Gattungeverwandten allerlei glangende Dinge und verftecken fie, ja man will Beifpiele ha= ben, daß fie eine glubende Roble megtrugen und dadurch eine Feuersbrunft veranlaften.

Im Sommer besteht ihre Nahrung in Insesten und Burmern, besonders in Seuschrecken, weshalb sie abgemähete Biesen besuchen, auch in Kasern, Naupen, Negenwurmern und kleinen Schnecken mit und ohne Schalen. Nesbenbei fressen sie auch Getreidearten, besonders Hanssamen, ja schon gekeimte Korner hacken sie wieder auß der Erde. Begierig sind sie auch nach Kirschen. Im Binter fressen sie dagegen alle Urten von Beeren, als Brombeczren, Heidelz, Preußelz und Bogelbeeren 2c., durchsuchen auch den Mist der Thiere auf den Straßen nach Kornern, im höchsten Nothfall bei strengen Wintern Baumknoppen und Sanz

nennadeln.

Sie niffen haufig in Gefellschaften, in geringer Entfernung von einander, wie die Dohlen, aber allezeit auf den höchsten Klippen,
in den schröfften und unzuganglichsten Felfenwänden, in Felfrigen und Löchern, wo fein Mensch hinfommen fann. Das Rest steht stets
unter einem Absabe oder in einer Felsenbohle.
Die Alten verrathen es durch ihr unauswörliches Geschrei den sich ihnen nahernden Menschen. Nach Aussage der Jäger soll es groß,
aus einigen Reisern, Pflanzenstengeln oder Seu
gebauet seyn, und 4-5 rundliche, weiße,

fcmußiggelb oder gelbbraun geflectte Gier ent= Der Taubenfalte und Suh= halten. nerhabicht verfolgen und todten fie. Marder plundern aber ihre Reffer. Meußer= lich werden fie von Schmarozerinfeften und innerlich von mehreren Urten der Burmer ge= plagt. Mit der Flinte erlegt man fie am leich= teften, wenn fie die Guffirschbaume plundern. Sat man einen aus einem Schwarme erlegt, fo fommen die andern meift wieder guruck, fo daß man mit einer Doppelflinte noch einen Schuß anbringen fann. - Ihr Rugen be= fteht in Bertilgung einer großen Menge uns schädlicher Insetten und Burmer. 3hr Fleifch, besonders der Jungen, ift wohlschmeckend; auch beleben fie auf eine angenehme Urt die Boch= gebirge. - Schaden thun fie vorzüglich dem Banf und plundern die Rirfdbaume.

Pirol. (Oriolus. Linn.)

Schnabel fast wie bei den Drosseln, nur etwas ftarfer; Fuße etwas furger und die Flusgel nach Berhaltniß etwas langer, sind unges sellige Bogel. — Sie leben von Insesten, Berren und allerlei weichen Fruchten, bauen sehr fünstliche Nester, welche sie oft sehr funstlich an den Baumen aufhängen. Es sind Beswohner heißer Länder und nur die nachstsolgende Urt ist in den Sommermonaten in Deutschland, nämlich:

Der Kirsche Pirol, Golddroffel, Pfingfie vogel, Schulz von Bulow, Biedemall. (Oriolus galbula. Linn.)

Benn wir unfern Lefern alle oft fonders bar in manchen Provingen theils durch feine Stimme veranlagten Ramen anführen follten; fo wurden wir weit über 50 anführen muffen, fo wollen wir uns aber mit den oben angeges

benen begnugen.

Die untern Flügeldeckfedern und die Schwangs fpige find schon gelb. Mannchen: hochgelb; Zügel, Flügel und Schwanz schwarz. Beibe den und junge Bogel: oben zeisiggrün, unsten weißlich, mit schwarzlichen Schaftstrichen; der Schwanz olivengrun. Es ift ein schoner Bogel, dessen Länge 9-9½, und dessen Flügelbreite 18-18¾ Joll beträgt. Die Länge des am Ende fast geraden Schwanzes 3½ 3., die in Ruhe liegenden Flügel bedecken davon

drei Biertheile. Der ftarke Schnabel ift etwas über 13. lang, an der Burgel 5 Linien breit, nach vorn kegelformig zu gespiht und im Ganzen nur wenig abwärts gebogen. Die Farbe desseben ift verschieden, vom blassen Braunroth bis zum matten Schwarz, so auch die Bris, vom tunkeln Carmin= oder Blutreth bis zum graulichen Dunkelbraun.

Das alte Mannchen ift nur gang einfach gelb und schwarz gezeichnet; doch giebt das schone fast orangegelbe Gefieder ihm ein hert= liches Unfeben. Die Bris ift bei ihm dunfel blutroth, der Echnabel braunroth und die Fuße bleifarben; die Bugel, der Theil der Schulter= federn zunachft dem Flugel entlang, die Flugel felbit und der großte Theil des Edmanges fammetichwarz. Das alte Weiben unterfdei= det fich dagegen fehr von dem Mannchen. Bei Diefem ift der Schnabel fcmarglich rothbraun, der Augenffern nußbraun, nut die obern und untern Decffedern des Schwanges, die untern Flügeldeckfedern und die ichmalere Comangfpige ichon gelb; die obern Theile des Rorpers hell olivengrun oder zeifiggrun, ein etwas lich= ter Streif geht über das Muge bin, die Bugel dunfelgrau; Reble, Borderhals und Bruft fcmu= Big weiß, die erftere ungeflectt, die übrigen mit fleinen schwarzbraunen oder braunschwärzlichen Schaftstrichen; die Mitte der Unterbruft und des Bauches meift rein weiß.

Diefer Bogel bewohnt im Sommer nicht allein das fudliche und mittlere Guropa, fon= bern auch einen großen Theil des nordlichen, bis nach Schweden und Finnland hinauf. Im herbst fommt er im nordlichen Ufrika an, geht aber von da ins Innere diefes Erd= theils, um dort zu übermintern. In Deutsch= land findet man ihn in den Commermona= ten allenthalben, wo Balder find, vorzüglich Laubholzwalder und große Baumgarten, die an jene grenzen, am liebften wenn auch Waffer in der Rabe ift oder wenigstens Baffergraben fie durchschneiden; fo liebt er auch fehr mald= begrengte Flufiufer. Im Commer befucht er die Rirschgarten und großen Unpflanzungen von diefen Baumen, befonders wenn fie in der Rabe eines Waldes liegen. Bei uns kommt er erft im Mai an und verläßt und im August Schon wieder. Gie gieben des Nachts und fommen einzeln oder paarweise an. Rach der Brutzeit halten fie fich aber meiftens familiens weise zusammen und verschwinden Unfang Qu= gufte icon wieder.

In mancher Sinficht gleicht unfer Pirol den Droffeln wie den Fliegenfangern, weicht indeffen in vielen Stucken auch wieder von ihnen ab. Es ift indeffen ein icheuer, wilder und unftater Bogel, der fich den Mens ichen entzieht, ob er gleich in ihrer Rabe mohnt. Immer hupft und flattert er in den am dich= teffen belaubten Baumen umber, weilt indeffen auch hier nicht lange, indem er unruhig bald da bald dorthin eilt; felten fieht man ihn im niedrigen Gestrauch, seltener noch auf der Erde. Es ift ein muthiger und gantischer Bogel. fliegt gern, ftreift weit und viel umber, und man fieht oft, wie einer den andern Biertel= ftunden lang und weit jagt und unablaffig vers folgt, mobei fie ihre Stimme fleißig horen Ihre gewohnliche Locfftimme ift ein helles eben nicht unangenehmes Giaf, jaf, jaf! und ein raubes Rraef oder Schraaf, fein Ungfigeschrei aber ein haflich schnarrendes Thre oder Querre. Dies thut befonders das Beibchen, wenn fich ein Feind ihrem Reffe nabert. - Das Mannchen lagt dagegen, vorjuglich- jur Begattungezeit, eine berrliche flos tende Stimme, welche den Gefang vorftellt, aus voller Rehle horen. Gie flingt abwechs felnd: gidleo, - gitatidlio, - gidilio, clavigo, - gipliagiblio, - gidleah! Man hort ihn weit, und die Tone flingen wie Tone auf einer fleinen Orgel; die Gilben find fo fprechend, daß felbst die Rinder der Land= leute fie auf mancherlei Beife nachsprechen, 3. B. Pfingften Bier hol'n, aussaufen mehr hol'n! oder: Beft du gefopen, fo betahl oh, herr von Bulow! 2c. oftern bort man diefe Tone an beifen Tagen, wenn die Luft schwill und eleftrisch ift. figen dabei meiff in einem dicht belaubten Baume. Roch vor der Morgenrothe hort man ichon feine flotende Stimme, die fo angenehm den Bur Beit ber Begattung bort Bald belebt. man noch ein fanftes Sio und Bublo, mo= durch fich beide Gatten gartlich gurufen und mas vom Beibchen in einem hohern Tone be= antwortet wird.

Eingefangen überlebt er selten den Berluft der Freiheit lange. Unfänglich muß man ihm die Flügel binden und nur mit Muhe gewöhnt man ihn mit Insesten, Kirschen und Beeren an das Universalfutter. Besser thut man mit den Jungen, die man halb flugge aus dem Resse nehmen muß. Man futtert sie mit Insesten und gewöhnt sie nach und nach an Sems

mel in Mild geweicht ober auch an ein andes res Universalfutter. Ihr Kafig darf nicht zu klein fenn, beffer ift es, wenn man fie in einer Bogelkammer bei ben andern Bogeln mithalt. Sie laffen fich abrichten und lernen furze Mes

lodien und Atrien pfeifen.

Sie fressen Insetten, allerlei weiche Baumsfrüchte und Beeren, am liebsten jedoch Kirschen. Er fängt im Mai ankommend Maikafer, Nauspen, Schmetterlinge, vorzüglich glatte grüne Raupen, die'er bei fehr gutem Appetit in Menge von den Blattern ablieft. Giebt es aber erst Beeren, so zieht er diese vor, er sucht Erdund Brombeeren auf, lieber frift er aber noch Himbeeren und rothe Holunderbeeren. Bon den Kirschen, besonders den suffen, beist er das Fleisch ab und läßt die Kerne am Stiele hängen. Er jagt dann andere besiederte Kirschediebe weg. Auch Weinbeeren fressen sie gern.

Sie bruten nur einmal im Jahre, und nimmt man ihnen die Gier, fo machen fie ein neues Reft, legen aber meniger Gier, als das erstemal. Werden ihm aber die Jungen ge= nommen, fo brutet er in diefem Sahre nicht wieder. Bur Unlage des Reftes mablen fie meift einen schlanken Baum aus. Es ift forb= formig oder einem Fischhamen ahnlich, fehr funftlich und feft an Gabelgweigen befestigt; fo daß, wenn man es losmachen wollte, das Es ift gebaut gange Reft zerftoren mußte. von halbtrockenen Grasblattern, Salmen, Dan= fen von Zaunwinden, Reffelbaft, Berg, Bolle zc., fehr funftlich geflochten, tief napfformig, am Rande eingezogen und inwendig bald blos mit feinen Grasrifpen, bald mit Bolle und vielen Federn ausgepolftert. - Mannden und Beib= den bauen es gemeinschaftlich (G. Naum. und Buble: die Gier der Bogel Deutschl. H. II. Taf. IV. n. 11. p. 14.). Es hat meift 5-6 3. Sohe und 5 Boll Breite. Bon der Erde 12 bis 30 Fuß hoch angelegt. Das Weibchen legt Unfang Juni 4-5 fcone ciformige, bisweis len auch langlichte, fehr glattschalige und glan= gende Gier, die auf hellweißem Grunde mit afchgrauen und rothlich schwarzbraunen fleinen Flecken und Punkten einzeln bezeichnet find. Sie bruten diefelben in 14-15 Tagen aus. Das Mannchen brutet nur in den Mittags= ftunden, wo fich bann das Weibchen Futter Die Jungen futtern beide Gatten mit Infekten, Raupen u. dgl. groß. Die faft im= mer hungrigen Jungen geben ihre Efluß durch ein nicht unangenehm flingendes: Suddi, juddi! zu erkennen. Sie wachsen schnell heran und fliegen, sobald sie flugge sind, aus. Steckt man die Jungen in einen Bauer und hängt sie nicht weit vom Neste auf, so werden sie

von den Alten groß gefüttert.

Falfen und Sabichte fangen fie, gerfforen auch ihre Brut, auch wohnen auf ihnen Schma-Rraben und Elffern, die ihre rozerinfeften. Brut gernichten, verfolgen und beißen fie meg. Ragen und andere Raubthiere verfolgen fie mit flaglichem Gefchrei. Da sie sehr scheu sind, halt es fcmer fie zu fchiefen. Um besten gluckt es noch auf Rirschbaumen, und wenn man im Mai den gartlichen Paarungeruf bio! und ihr gewohnliches Pfeifen gut nachzumachen ver= Auf Rirschbaumen fann man fie auch in Dohnen, Sprenkeln und mit Leimruthen fangen. - Gie nuben durch das Begfangen einer großen Menge Schadlicher Baldinfeften. Ihr Fleifch ift wohlschmedend, besonders das der Jungen und jur Rirschzeit, mo fie mit gelbem Fett gleichsam überzogen find. Rach ihrer Unfunft im Fruhjahre foll fein Rachtfroft mehr erfolgen; auch foll ihr haufiges Pfeifen Regen andeuten. Großen Schaden thun fie den Rirfchen, befonders den fußen, wovon fie fich weder durch Rlapper, noch durch andere Mittel, felbft durch Schiefen nicht leicht abhals ten laffen. In marmern gandern follen fie gleichfalls an Beinbeeren und Feigen großen Schaden thun ").

Leierschwanz. (Maenura. Parkinsonia.)

Der Schnabel an der Burgel breiter als hoch, gerade, an der Spike gebogen, die Spike etwas ausgeschweift; die Nasengrube verlängert und groß, mit einer Haut bedeckt; die Füßeschlanf; der Lauf doppelt so lang, als die mittelere Zehe; die Nägel so lang als die Zehen, breit und oben convey stumps. Flügel kurz,

Dady Cuv. folgt nun das 14. Genus: Gymnops Cuv. Goulin. Die hierher gehörigen Bögel haben einen eben so starfen Schnabet wie die Pierote, runde Naienscher, ohne Schnabet wie die Pierote, runde Naienscher, ohne Schnabet eine hautige Einfassung, und ein großer Theil des Kopfes ist nacht. — Gyon, Dumontii schwarzsgrün, mit surzem Schwanz, die ganzen Scirtentheile des Kopfes um die Augen herum mit eitronengelber, nachter, warziger Haut. Der Hals noch mit weißen Federichuppthen beießt, an den Schwungsedern ein weißer Fleck; Steisesedern und Füße gelb, Schnabel rothgelb. Basterland Neuguinea.

ctwas gebogen. Der Schwanz schon, sehr lang, die Federn von verschiedener Form. — Es ist dies eine Mittelgattung, die man nicht leicht im System anpassen fann, und deshalb bald da, bald dorthin locirt hat. Einige zählten ihn z.B. zu den Hühnern, besonders zu den Großzußhühnern, Megapodius; hierzu fommt noch, daß sich Männchen und Weibchen wie bei den Hühnern sehr von einander unterscheiden. Die Bildung des Schnabels ist mehr den Orosseln, besonders aber dem Wasserschwäher verwandt ze. Die neuern Forscher haben daher ein neues Genus daraus gemacht, das bis jeht nur solgende Artt hat.

Der prachtige Leierschwanz. (Maenura superba. Parkins. mirabilis.)

Die Lange des Mannchens ift 38 3. und 15 vom Schnabel bis zur Schwanzwurzel. Das Beibchen ift etwas fleiner als das Mannchen, und hat nur 12 abgeflufte Schwungfedern von gewöhnlicher Form. Die Farbe ift am ganzen Körper ein schmußiges Braun, der Bauch grau. Die jungen Mannchen befommen erft nach der erften Maufer ihren schönen Schwanz.

Das Mannchen hat die Große eines Fafans, und ift von braungrauer etwas ichmarglicher Farbe. Gein prachtiger Schmang besteht aus 16 Federn, deffen 2 langften die Form einer griechischen Lyra bilden. Im Schwanze sind dreierler Federn; die 12 eigentlichen Echwang= federn find febr lang, mit zerichliffenen, weit aus einander ftebenden Barten; die 2 mittelften allein haben fest anhängende Barte, die beiden außersten find noch langer und Sformig ge= frummt, und die innere Fahne von breiten und anschließenden Barten gebildet, ftellt ein Band vor, meldes abwechselnd mit schwarzbraunen und roffrothen Querbandern geziert ift, von de= nen ein Theil gang durchfichtig icheint; die Spitze ift sammetschwarz, weiß gefrangt, die außere Fahne diefer Feder ift furz und schmal; die übrigen Schwanzfedern sind ichmarz. Die Reble und die Deckfedern der Flugel find roft= farben; die Ropffedern sind lang und bilden einen fleinen Federbufch. - Diefen fonderbar gebildeten Bogel hat man auf den blauen Bergen Neuhollands gefunden, wo er in den Bal= dern hauft. Die Englander von Port Jackson nennen ihn Solgfafan. Er liebt durre und einsame Klippen, und laßt fich nur Morgens und Abende feben, den übrigen Theil des Lages

ift er auf den Baumen. Nach dem Bau feines Schnabels zu urtheilen, lebt er wahrscheinlich von Insetten. Uebrigens soll die Zukunft uns noch seine nahere Geschichte enthüllen.

Bach fielze. (Motacilla. Linn.)

Dieses genus bildet eine außerordentlich zahlereiche Familie, an ihrem dunnen geraden einer Pfrieme ahnlichen Schnabel erfennbar. Wenn er an seiner Basis etwas niedergedrückt ift, so nahert er sich dem der Fliegenfanger; ist er aber von den Seiten zusammengedrückt und seine Spige ein klein wenig gebogen, so gehört er zu den geradschnabeligen Würgern. Es giebt 103 Urten, die Euwier unter verschiedene Ubtheilungen gebracht hat. Wir heben davon Folgende aus:

Bei der erften Abtheilung (Saxicola Bechst.) ift der Schnabel etwas niedergedrückt, und an der Basis breit, mas sie mit der letten fleinen Abtheilung der Fliegenschnapper verbindet. Es sind lebhafte, ziemlich hochbeinige Bogel. Die inlandischen Arten niften auf oder unter der Erde, und fressen blos Insetten. Wir besitzen dabon 3 Arten.

Der schwarzsehlige Biesenschwäher. (Saxic. rubicola. Bechst.)

Alle Schwanzsedern sind schwarzlich und braun; hinten auf dem Flügel freht ein mehr oder weniger sichtbarer weißer Bleck.

Unfer Bogel gleicht fehr dem braunkehligen Biefenschmager, und die Jungen beider Urten find fehr fchmer von einander zu unterscheiden. Jedoch unterscheidet ihn der gangliche Mangel alles Beifen an den Schwangfedern von den übrigen europaischen Urten. Geine Lange beträgt gegen 5-54 Boll; die Blugelbreite 81-85 3., Schwang 13 3. Geine halbe Lange überschrei= ten die ruhenden Flugel nicht. Der Schnabel 5 — 5½ Linien lang, glanzend schwarz; die Bris der etwas großen Augen dunkelbraun, bei Jun= gen etwas lichter. Rach Ulter und Jahreszeit andert ihr Gefieder fehr ab. Beim Fruhlingsfleide des alten Mannchen find folgende Farben: Ropf, Reble bis auf die halbe Gurgel herab, Wangen, hinterhale, Rucken= und Schulter= federn ichwarg; am tiefften an den erften Thei= len. Der Burgel und die obern Schwangdecks federn find weiß, mit einem ichwarzen Langens flect an den Spigen; die weißen Salsfeiten

bilden unter ben ichwarzen Wangen jederfeits einen großen weißen Bleck, der untere Theil der Gurgel und die Rropfgegend find fehr ichon roffroth (fucheroth), nach der Bruft herab lich= ter und an den Geiten derfelben noch bleicher; die Mitte der Unterbruft und der Bauch weiß, mit Rofifarben überlaufen; auf dem Sinter= flugel einen großen ichneeweißen Fleck. Commer haben fich die Federrander mehr ab= gerieben, und das Roffroth ift merflich bleicher geworden. Gein herbsteleid ift wieder von jenem verschieden, denn gleich nach der Mau= fer, wo alle Federn neu und vollständig find, wo, die anders gefarbten Rander fich noch nicht abgerieben haben und die Witterung noch nicht verderblich eingewirft hat, find g. B. die fcmar= gen Federn des Ropfe und der Reble mit licht= oder gelblichbraunen Randern verfehen, melde befonders am Rinn fo breit find, daß die Grundfarbe nur wenig durchfchimmert, deeglei= chen haben die Federn des weißen Salefleckens rofigelbliche Spigen 2c.

Die Beibchen find etwas fleiner als die Mannchen und fehr in der Farbung des Ge= fieders von ihnen unterschieden. Im zweiten Frühlinge feines Lebens: find Scheitel, Sinter= hals, Rucken, Burgel und Schwanz dunkelbraun, mit lichtgelbbraunen Federkanten, die auf dem Burgel etwas ins Roftfarbene fallen und hier die dunfle Grundfarbe faft verdecken; Wangen und Salefeiten hellbraunlich dunkler gemischt; ein Streif uber bem Muge, und das Rinn schmuzig weiß; die Rehle braunlich weiß, ver= mafchen braun geflecft. Die Dberbruft blaß roftfarben, weiter hinab und in den Seiten noch blaffer mit braunen Schaftftrichen, die Mitte der Bruft, Bauch und After schmubig roft= gelblich weiß. Alle Glügelfedern dunkelbraun, lichtgelbbraun gefaumt, nur einige der großen Dectfedern über den hinterften Schwingen weiß, wodurch sich hinten auf den Flügeln nur ein gang fleiner weißer Fleck bildet. Je alter das Beibchen je dunkler seine Farbe. gange Oberkopf der Jungen ift dunkel fcmarg= braun, nur an der Stirn etwas lichter, übris gens alle Federn mit fehr schmalen graugelb= lichweißen Schaftstrichen, Sinterhals und gum Theil die Bangen ebenfo, aber doch mit viel breitern und nicht fo fcharf begrengten Schaft= flecken; Oberrucken und Schultern fcmarzbraun, mit rothlich gelbbrauner Mifchung und jede

Feder mit einem jugespigten fcmuzig gelblich=

weißen Schaftfleck, der an der Spige am lich=

teften ift. Ueber das Auge zieht fich ein gros fer graugelblich weißer Streif.

Diefer Bogel ift weit verbreitet und fommt in Europa, Usien und Ufrifa vor. In unfern Wegenden ift er jedoch felten. Es ift ein Zugvogel, der des Rachts zieht. Er fommt bisweilen ichon im Februar, gleich nach ber weißen Bachftelze, fonft Ende Marg, gicht aber ichon im Ceptember wieder fort. ein ungeselliger Bogel, der ftete allein giebt. Die Mannchen fommen im Fruhjahre immer mehrere Tage fruber an, als die Beibchen. Gie lieben die Gebirgsgegenden, vorzüglich die Bergwiesen und fruchtbaren Thaler. Im Frill= 3m Berbfte jahre fieht man fie oft am Baffer. trifft man sie wie den ihnen fo verwandten braunfehligen - Wiefenfchmager in den einzelnen Feldhecken und Beckenrainen, in Rüben=, Rohl= und Kartoffelstücken, auch in Weinber= Gie fiben gern erhaben, doch nicht auf bo= hen Baumen, fondern mehr auf Stengeln, niederm Buschwerk, Pfahlen 2c.

Bon dammernden Morgen bis zum finken= den Abend fieht man ihn in fteter Bewegung. Ja in der Begattungszeit bort man das Mann= chen felbft des Rache. Er ift leicht und ge= wandt, hupft ichnell und fieht fich oft von einem erhabenen Gegenftande fehr vorsichtig nach allen Begenden um, denn er ift miß= trauisch und scheu. - Geine Stimme ift ein schnalzendes oder schwagendes Tja; die Locf= fimme flingt in der Rabe wie: St=tuck oder Wid — teck, und Wid, wid, wid, teck= teckteck oder Biffteck, wiftteckteck. Man vernimmt dies meiftens blos in der Nahe des Reftes, wo diese Bogel fehr viel schreien. -Das Mannchen singt nicht unangenehm und am Brutorte oft den gangen Tag hindurch, fo= gar oftere des Nachte. Bei ber Gorge ber heranwachsenden Jungen singt er feltener und nachdem diese ausgeflogen, bort er gang auf. 11m ihn an die Gefangenschaft ju gewöhnen, muß man ihm die Flugelfpigen binden, fonft beschädigt er sich durch das Flattern. 3m Ra= fig halt er fich beffer, ale frei im Zimmer.

Seine Nahrung besteht in Raferchen, Flicgen, Bremen u. dergl., mancherlei Insektenlarven und Raupen, besonders Rohlraupen. Er erhascht seine Nahrung theils laufend, theils fliegend. Oft erhebt er sich darnach in die Luft, flattert darüber und eilt dann wieder an sein erhabenes Plagchen, von wo aus er alles überschaut, er nabert fich bierin den Rothlingen,

Bliegenfängern und Bürgern.

Im Rafig geht er nicht gern ans Futter, fo daß man es ihm anfänglich behutsam einsstepfen muß, wozu man die bekannten Umeisfenpuppen (Umeiseneier) wählt; dann mengt man unter Nachtigallfutter außer diesen noch Räferchen, Fliegen und Mehlwurmer, bis er mit diesen jenes koften lernt. Doch sohnt es in der That der Mübe nicht.

Ihr Reft ift schwer zu finden, es fieht ftets an einem Platchen, was fich von den Umgebungen wenig auszeichnet, immer auf dem Erd= boden, an dem mit Gras umgebenen fleinen Geffrauch gang unten, dicht an den Stammen gang fleiner Baumchen oder blos im Grafe, in einer fleinen Bertiefung des Bodens. Es ist ein lockeres Gemebe von Quecken, durren Gras= halmen und feinen trocknen Pflanzenstengeln mit grunen Erdmoos. Die innere Lage befteht aus Wolle, Sagren, besonders einzelnen Pfer= dehaaren. Schon im Mai findet man darin 4-5 Gier, von schmuziger Farbe. Auf blaf= fem blaulichgrunen Grunde, find fie mit einem fehr bleichen rothlichen Gelbbraun besprift und punktirt, oft aber so undeutlich, daß man das Gange für eine Farbe halten fann, bismeilen " find die Punfte fparfamer aber deutlicher vom Grunde abgesondert und sind mehr am flums pfen Ende. - Gie lieben ihre Jungen außer= ordentlich und verrathen fie gar bald durch ihr angstliches Geschrei, wenn man sich ihnen nabert. - Gie werden vom Sperber verfolgt, kleine Naubthiere des Waldes zerstören oft ihre Brut; auch hausen Gingeweidewurmer in ihrem Innern. Sie find übrigens icheu und ichwer ju fchießen. Un ihren Lieblingsplagen fann man fie noch am leichteften, in Sprenkeln, Schlingen oder an Leimruthen fangen. Gic ver= tilgen viele Inseften, haben ein wohlschmecken= des Fleisch und erfreuen durch Gefang und ihr munteres Wefen den Beobachter.

Der braunkehlige Biesenschwätzer, Braunkehlchen, Krautvogel. (Saxcic. rubetra. Bechst.)

Dem vorigen nahe verwandt, unterfcheidet fich aber dadurch, daß alle Schwanzfedern, die beiden mittelften ausgenommen, an der Burzel rein weiß oder gelblichweiß, mit braunen oder schwarzen Schaften; die 6te, 7te, 8te und 9te Schwungseder auf der außern Fahne

dicht an der Wurzel weiß oder blaß gelbroth= lich ift. Er maufert sich zweimal jahrlich, der

porige nur einmal.

Seine Lange beträgt 5-5\frac{1}{4}\), die Flus gelbreite 10\frac{1}{4}\)—10\frac{1}{2}\). Der Schnabel ift auch fürzer, dieser und runder als beim vorigen, 5 Linien lang, an der Wurzel über 3 Linien breit, schwarz; die Trist tief braun, oder roth=

lich schwarzbraun.

Das alte Mannchen in seinem Frühlinge= fleide fieht niedlich aus. Der gange Dberfopf bis an den Nacken schwarz, tiefe Federn find aber mit febr lichten roftbraunen Seitenfanten verfeben, wodurch diefer Theil ein licht roft= braunes mit schwarzen Langeflecken geziertes Unfeben erhalt; die namlichen Zeichnungen und Farben hat der Rucken und die Schultern, wenis ger und bleicher geflecft ift dagegen aber der gange Sinterhals. Bom Nasenloch zieht sich über das Huge bis ans Genicf ein breiter hell= meißer Streif; die Bugel find fcmarg, desgleis chen Wangen und Ohrgegend nußbraun geflecft oder gemifcht; die Salefeiten weißlich und etwas dunkelbraun gefleckt; ein hellweißer Streif fangt an der untern Schnabelmurgel an und trennt die dunkeln Wangen von der schonen rofifars bigen Rehle und Burgel; die Roftfarbe nimmt auch noch die gange Oberbruft ein und verliert fich fanft in den Geiten; die Mitte der Un= terbruft, der Bauch und die untern Schwangs decifedern find weiß, mit schwachem rofigelben Alle Glügeldeckfedern find fcmarz, Unfluge. die fleinen mit weißlichbraunen Ranten, die mittleren und großen blos mit weißen Endfans ten, dabei aber alle junachft am Ellebogenge= lent fiehenden rein weiß, die Schwungfedern braunschwarz mit lichten Gaumchen.

Das alte Beibchen im Fruhlingsfleide ift auch bei diefem von Mannchen verschieden, ob es im Gangen gleich diefelben Zeichnungen hat. Un allen obern Theilen find die lichten Feder= rander breiter und heller gefarbt; der Augens ftreif gelblichweiß; die Wangen lichtbraunlich, wenig mit Dunkelbraun gemischt und gefleckt; das Kinn und der Streif zwischen den Bans gen und der Rehle gelblichweiß; die Rehle bis gur Oberbruft viel bleicher, blafduntel roftrothlichgelb; der weiße Flugelfleck am Ellenbogen= gelenk kaum halb fo groß als beim Mannchen; Schnabel und Sufe auch nicht fo dunkelfdwarz als bei jenem. In der Regel find auch die 3m Com= Weibchen fleiner als die Mannchen. mer wird ihr Gefieder auch dadurch geandert,

daß auf den obern Korpertheilen die schwarzen Flecken mehr hervortreten, indem sich die lich= ten Kanten des Gesieders bei beiden Gatten merklich abstoßen, und die Farben lichter werden.

Im Serbstlleide, wenn sie sich eben gemausert, sehen sie wieder ganz anders aus, als
im Frühlingekleide, 3. B. Nücken und Schultern sind bei alten Mannchen von einem angenehmen, sehr lichten gelblichen Rostbraun,
mit großen ovalen braunschwarzen Schaftstecken
und schmalen weißlichen Spigensaumchen, die
sich sehr schon ausnehmen, versehen. — Der
große breite Streif über dem Auge ist rostgelblichweiß; Zügel braunlich; Oberbruft und Seiten erwas lichter; das Uebrige des Unterleibes
rostgelblich weiß. Die jungen Bogel sehen denen des Borigen täuschend ahnlich, die auf die
weiße Schwanzwurzel und den ganzlichen Mangel eines weißen Flecks hinten auf dem Rügel.

Die Hauptmaufer, bei welcher alle Federn durch neue ersett werden, tritt bei alten Bosgeln im Juli ein und ift vor der Mitte Ausguft beendet; junge Bogel mausern dagegen einen halben Monat später. Im Winter, wähstend ihrer Abwesenheit, mausern sie sämmtlich noch ein Mal, aber dann die großen Flügelsfedern und die des Schwanzes nicht mit.

Diese Urt scheint nicht so weit verbreitet als die erftere, ift indeffen in Deutschland viel befannter als jene; wo sie die fruchtba= ren Berge und Thaler bewohnen, Co trifft man fie in den Boralpen und felbft noch bo= ber hinauf, wo nur uppiges Gras, niedriges Gebuifch und einzelne Baume fteben. Much in unscren Gegenden treffen wir sie auf Biefen und Feldern an. Alls Bugvogel gehort diefe Alrt unter die gartlichen, welche fpat ju uns fommen und fruh wieder wegziehen. . Unfangs Mai fellen sie sich meist erst ein und Mitte Septembers ficht man nur hier und da noch Sie giehen des Rachts im Fruhjahre meift einzeln, im Berbft paar = und familien= weis. Huch bei diesen treffen die Mannchen, wie bei vielen andern fleinen Bogeln, fruber als die Weibchen ein. Feuchte, fruchtbare Wiefen, mit Baffergraben oder Bachen durch= fcnitten, deren Ufer mit niedrigem Geffrauch befett find, lieben fie besonders. Nach der Brutezeit verlaffen fie dicfe Wegenden paar= und familienweis und giehn aufs freie Feld, mo fie fich zwischen Rohl, Kartoffeln und Ruben oder Gemufegarten bei den Dorfern aufhalten; mo= ber man fie auch in vielen Begenden Rraut=

oder Rohlvögelchen nennt. Hier sieht man sie nun oft auf Stengeln und Feldgewächsen stiegend und sich wie die Würger, nach Inselzten umsehend. Ihre Nachtruh halten sie zwisschen Kohls und Kartoffelstauden und suchen ihre Nuhestätte gleich nach Sonnenuntergang. Uebrigens sind sie zu jeder Sahreszeit mit dem schwarzsehligen Wiesenschwähern zus

fammen.

Es ift ein munterer, unruhiger, hurtiger Auf der Erde hupft er in aufrechter Bogel. Stellung, beugt fich schnell vorwarts und schlägt dazu den ausgebreiteten Schwang fo auf und nieder, daß diefer jederzeit die ftartfte Bemes gung unterwarts macht. Er ift eben nicht icheu, ficht er fich aber verfolgt, figt er meift frei um ber drobenden Gefahr bei Zeiten entflieben zu fonnen. Seine gewöhnliche Stimme ift ichwagend, wie: Eza, aber die eigentliche Lock= frimme doppeltonig, namlich ein dumpfer, fanf= ter, angenehmer Pfiff, mit einem Schnalzen oder Schmagen, wie: tjaudef, tjau tjau - tjaudet, tjaudefdefdef. Gefang des Mannchens ift angenehm, es ver= fteht dabei auch die Sone anderer ihm nahes wohnender Bogel bis jum Taufden nachzuahe men, wodurch dann fein Befang verschonert wirt, mas uns wieder an die Burger erin= Er singt fleißig, fangt oft schon vor nert. Tagesanbruch an, bis in die Racht hinein, jumeilen auch noch in der Racht. Dies thut er meift nur an feinem Brutorte, nach Johanni hort man ihn nur noch felten; er fist babei aber ftete erhaben. - Rur mit Muhe fann man diefen weichlichen Bogel gahmen und ftopft man ihm fein Futter ein, fo ftirbt der fleine Erog= fopf, benn nur menige nehmen Infeften u. dgl. Im Rafig mag er fich indeffen freiwillig an. beffer, als im Bimmer erhalten laffen.

Seine Nahrung besteht in fleinen Kafern aus allerlei Gattungen und deren Larven. Im Herbst viel Kohlraupen, der Beißlingarten (Papbrassicae, rapae und napi). — Ihr Nest sins det man meist nur im Grase der Wiesen oder grasreichen Stellen unter einem fleinen Gessträuche, was das Aufsuchen desielben sehr ersschwert. Der Bau des Nestes gleich auch dem vorigen. Man sindet darin 5—6 Gier, die eine furze ovale Gestalt haben, in der Mitte oft bauchig, an einem Ende abgerundet, an dem andern Ende spis zugerundet und haben eine glatte Schale mit merklichem Glanz. Ihre Farbe ist (frisch) ein schones helles Blaugrun

oder eine Grunspanfarbe oft schoner als die Eier des Gartenrothlings. Manche Eier sind am ftumpfen Ende mit feinen Punften von einem bleichen Schmuchiggelbroth oder sehr matten Rofifarbe versehen, die sich bisweilen zu einem tichten Kranze von Punften vereinigen, doch kommt dies selten vor. Binnen 13—14 Tagen werden sie vom Weibchen allein ausgesbrütet, die Jungen aber von beiden Gatten mit Inseften und deren Larven sehr zärtlich liebend ausgesüttert. Sie machen nur eine Brut. Mersten sie einen Menschen, so gehen sie nicht zum Reste, um es nicht zu verrathen, auch gebehrs den sie sich nicht so angstlich, wenn sie Eier

haben, als der Borige.

Gegen Raubvogel miffen fie fich geschickt zu verbergen, defto ofter werden aber fleinen Raubthieren: Ratten, Maufen, Igeln und Spigmaufen ihre Bruten zu Theil, mehrere geben auch beim Seumachen und 216= bringen des Grafes zu Grunde. - Man fann fie, jedoch mit Borficht, fchießen, beffer aber noch auf folgende Urt erhalten, indem man auf Rohl=, Kartoffeln= und Rubenackern 2 Fuß hohe Stocke, die man zwischen jene Pflangen bie und da in die Erde ffecft, und auf jeden einen Sprenkel, Leimruthen oder Schlingen anbringt und fie langfam barauf lostreibt; indem fie nun auf diefe etwas über die Pflanzen hinausreichenden Stocke, um fich umzusehen, fliegen, werden fie leicht gefan= gen. - Gie nugen außerordentlich durch ihre Nahrung, indem sie eine große Menge von Infeften und deren Larven verzehren. Berbft find fie fehr fett und geben ein mohl= ichmeckendes Gericht; auch ergogen fie durch ihren Befang bei nachtlicher Stille, oder wenn in Often der lichte Streif den jungen Sag an= fundigt und die andern Ganger noch fcmeigen.

Graurudiger Steinschwäßer, Steins pider. (Saxic. oenanthe. Bechst.)

Der Rucken, Nacken und Oberkopf hell aschgrau; beim Weibchen rothlich aschgrau; im Herbst und bei den Jungen rothlich braungrau. Die Rehle weißlich; die Gurgel im Frühjahre bleich; im Herbst dunkelrothlich rostgelb; die untern Flügeldecksedern schwarz und weiß geschuppt. Seine Lange beträgt 6—6\frac{1}{4}\, 3., die Flügelbreite aber 12—12\frac{1}{4}\, 3., der Schwanz 2\frac{1}{4}\, 3. lang. Die erste Schwinge ift sehr klein,

schmal und kurz. Der Schnabel 7 Linien lang, an der Wurzel 3 Linien breit und nur etwas über 2 Linien hoch, von Farbe nebst Mundzwinkel und Nachen schwarz. Das große Auge hat eine dunkelbraune Fris.

Das alte Mannchen im Fruhlings= fleide: die Stirn und ein Streif über das Auge hin und bis hinter daffelbe, hellweiß, unter Scharf von Schwarz begrengt, oben in ein sanftes helles Ufchgrau übergehend, welche Farbe den Oberfopf, Genick, Nacken, Sinter= hale, Schultern und den gangen Rucken gleich= formig einnimmt; der Burgel und die obern Schwanzdeckfedern schneeweiß. Die Bugel find fammtichwarz, die gange untere Seite des Bo= gels, roftgelblichweiß, an der Rehle, noch mehr aber auf der Gurgel bis an den Ropf mit einem iconen rothlichen Roftgelb überlaufen; eine angenehme fanfte Farbe. Alle Flügeldecks federn tief schwarz. Die Schwanzfedern find schneeweiß, am Ende etwa 3 3. lang fcmarz. -Im Sommer verschwindet die gelbe Farbe am Unterleibe fast gang, das Ufchgrau wird un= ansehnlicher und das Befieder reibt fich fo ab, daß alle gefärbte Ranten vollende verfchwinden .-Das alte Beibchen fieht im Gangen dem Mann= chen zwar ahnlich, allein da alle Farben un= reiner find, fo fallen die Beichnungen minder in die Augen. Das Afchgrau ift fo ftart rothlich überlaufen, daß man es fast Rothlichasch= grau nennen fann; die Stirn ift nur fchmubig= weiß, und der Strich uber dem Muge, wenig vorffechend, die Bugel mattschwarz, und die Wangen und Ohrengegend rauchschwarz, oder gar nur fahlbraun, menigftens nach vorn ju; die Flügeldecken rauchschwarz. Die untere Seite des Vogels ift schmußiger, als beim Mannchen, da der roftgelbe Unflug ins Braunliche fallt. - Das Berbstfleid ift fast noch fco= ner. Bei dem alten Mannchen: Die Stirn und ein breiter Streif uber dem Muge, bis and Genick reichend, weiß, fark rothlich gelb uberlaufen ; Scheitel, Benicf, Sinterhale, Schultern und der gange Rucken fehr angenehm weinrothlichgrau; Gurgel, Ropfgegend; Rehle bis auf die Bruft herab, schon rothlich roftgelb, mit etwas lichten Federkanten; die übrigen Theile des Unterleibes blaffer. Die Flügeldeck= federn tief schwarz. — Um Weibchen in die= fem Rleide find frete die Farben fchmuziger und weniger lebhaft. Die eigentliche Maufer= zeit ift der August. Sochst mahrscheinlich mau= fern sie zwei Mal im Jahre. In der zweiten

fcheinen fich blos die fleinen Federn gu erneuern, die in den Wintermonaten, da fie fern von und

find, ju geschehen fcheint.

Diefer Bogel ift fehr weit verbreitet, in Europa, den mittlern Ufien 2c. In Deutsch= land in vielen Gegenden gemein. Es ift bei und ein Bugvogel, der Ende Marg fommt und ift im September ichon wieder verichwunden. Er zieht des Nachts, im Fruhling paarweis, felten in fleinen Gefellichaften, im Berbft aber familienweis. Meift fucht er die alten Brut= orte wieder auf. Gebirgige und hügelige Ge= genden liebt er; doch trifft man ihn auch in ebenen, wo nur erhabene Stellen, Damme und hohe Ufer find. Steinhaufen, felbft große Steine, welche auf Feldern oder Wiefen ger= ftreut liegen, sucht er auf. Bor allem liebt er fcroffe, gegen Mittag liegende Felfenwande, Schluchten und Sohlwege, große Steinmaffen und Felfenklumpen an und auf Bergen, auch alte Ruinen und Steinbruche. Im Berbft be= fucht er Brachacker, Rraut=, Ruben = und Rartoffelacter. Er fist gern auf Steinen ober etwas hoch; als, auf Pfahlen, Stocken, Bi= schen 2c., im Herbst auf Kohlstauden und ans dern hohen Pflanzenstengeln, wie der vorige, um fich fo überall umfeben zu fonnen. - Bor feinen Feinden verbirgt er fich unter Steinen, Erdichollen, in tiefen Fahrgeleifen, Erdlochern, Felsenspalten und andern Schlupfwinkeln, wor= in er auch des Nachts zu schlafen pflegt.

In hinficht des Aufenthaltes und zum Theil auch der Lebensart, steht er gewissermaßen zwi= fchen der weißen Bachftelze und dem Saus= rothling. Es ift ein munterer, fehr unru= higer und gewandter Wogel, dabei wild und ungeftum, febr furchtfam und icheu; gegen andere Bogel ift er gankisch und leidet am Brutorte seines Gleichen nicht in der Nahe. Er figt meift aufgerichtet und macht, wenn er etwas Auffallendes bemerft, fcnelle Bucklinge vorwarts und schlagt dabei den ausgebreiteten Schwang auf= und abwarts. Auf der Erde macht er furge und schnelle Sprunge, fo daß er zu laufen Scheint. Er ift in fteter Beme= gung, ja oftere hort man ihn auch des Rachts. Er fliegt dicht über der Erde hin und ruht nur

auf einem Stein oder Erdicholle aus.

Sein Lockton ift ein angenehmes furges: Gim oder Gum, mas in der Ferne wie ein dumpfer Pfiff flingt und dem noch beim Nefte ein angstliches schnalzendes: Tack oder Tock angehangt wird, fo daß es dann wie: Gim=

todtodtod, gim, gim, gimtodtod u.f.m. Bei der Unfunft am Brutort lagt das Mannchen feinen eben nicht angenehmen Befang boren, bald auf feinen Lieblingsplagchen dabei figend, bald auf 10-20 Fuß hoch fich Es ist fchwingend und dann berabfturgend. ein fleißiger Ganger, fo daß er fogar in der Racht bismeilen fingt. Go lange das Beib= den brutet, dauert der Gefang ununterbrochen fort, wird dann feltner und hort auf, wenn die Jungen ausgeflogen find. Gie laffen fich schwer gabmen und dauern nicht lange, weder in der Stube noch im Rafig. — Sie leben von fleinen Rafern oder Larven, auch Rau= pen, Mehlwurmern, Fliegen, Mucken zc. Diefe fuchen fie theils auf, theils fangen fie diefelben in der Luft fliegend, nach Urt der Fliegenfan= ger. Man fieht fie damit ftete beschäftigt. 3m Berbft leben fie meift von den Raupen der

verschiedenen Beiflingsarten.

Un ihren Aufenthaltsorten findet man ihr Neft ftets in einer Sohlung, fast immer in einer horizontalen Lage, zuweilen ganz vorn, zuweilen auch mehrere Fuß tief; in Felfen= fpalten, zwifchen Steinen, Bolgfiofen ac. Das angstliche Benchmen der Bogel, verrath, daß man in der Rabe deffelben ift. Es ift dem= ohngeachtet schwer zu finden. Gie bauen es aus Quecken, feinen Burgelchen, dunnen Grasblattern und Salmen, inwendig ift es mit Bolle und Haaren von Thieren, Pflanzenwolle, Diftelflocken und Bogelfedern ausgefüttert. bildet einen nicht tiefen Rapf und ift weich und warm gepolftert. Gewohnlich findet man darin 5-6 etwas furg geformte und in der Mitte etwas bauchichte Gier. Die garte Schale hat wenig Glanz; die Farbe ift ein fanftes blauliches Grunlichweiß, oder eine fehr bleich und blaß aufgetragene Grunfpanfarbe, die an ausgeblasenen bleicher wird, und wenn fie dem Licht ausgesetzt wird, verschwindet, und sich in ein trubes Weiß verwandelt, fehr felten findet man auch welche mit bleichen gelbrothen Punf= ten fparfam beftreut, meift nur am ftumpfen Ende. Gie werden binnen 14 Tagen von Beib= chen meift allein ausgebrutet, und dann von beiden Gatten mit fleinen Inseften und Raup= den zc. aufgefüttert. Beim Bruten bewacht das Mannchen gleichsam das Beibchen und macht angftlich fcreiend, Bucflinge mit ausgebreiteten Schwanze, den es auf und nieder beweget. Uengfilicher thun beide noch, wenn sie Junge haben. Gie bruten nur Gin Mal im Jahre,

wo man im Mai die Gier und im Juni flugge

Junge findet.

Gelten ermischt ein Raubvogel die vorfich= tigen Alten, defto mehr leidet aber die Brut durch Iltiffe, Biefel ic. - In ihren Gin= geweiden wohnen Burmer, im Gefieder Schma= rozerinfeften. - Gie find fchwer zu fchießen. Um besten fangt man sie mit Sprenkeln, Leim= ruthen und Schlingen, die man an ihre Lieb= lingeplate bringt. In einigen Provingen Eng= lands foll man fie in Schlingen zu Saufenden Im Berbst fangt man fie in Rohl= fructen wie bei ben vorigen angegeben. Bleifch ift dann besonders fett und delifat. In England foll man fie fogar in Fagden einge= macht verfenden. Gie nuben ferner burch ihre Rahrung und beleben ode Wegenden durch ihren Gefang.

Der weißliche, schwarzsehlige, gelbe Steinschwäher. (Saxic. stapazina. Temm.)

Bugel, Augenfreise, Bangen und Reble schwarz; Oberfopf und Oberrucken bleich roftsfarbig, mit durchschimmerndem Beiß, im Sommer mit der ganzen Unterseite weiß; die untern Flügeldecksedern schwarz. — Beibchen: Zügel, Augenfreise, Wangen und Kehle schwarzlich, braun und rothlichgrau gemischt.

Dieser Steinschwäßer wurde sonft als eine Spielart des vorigen angegeben, indessen haben genauere Beobachtungen das Gegentheil bewiesen. Seine Lange beträgt fast 6 3., seine Flus gelbreite 11½ 3.; der Schwanz 23 3.; der Schnabel 7 Linien lang, übrigens wie bei dem

vorigen (Sax. oenanthe) geffaltet.

Das Frühlingsfleid des Mannchens hat nur 2 Sauptfarben. Un ihm find Bugel, die Umgebungen der Augen und Ohren, Wangen und Rehle bis auf die Mitte der Gurgel herab, fammetschwarz; Schultern, Flügel und die un= tern Deckfedern tief schwarz, nur an den Enden der großen Schwingen in Schwarzbraun über= gehend, die untere Geite der Schwingen dun= felgrau; der Schwang, bis auf die beiden Dit= telfedern, die schwarz find, rein weiß, an den Enden schwarz; alles lebrige weiß, auf dem Binterhalfe, Dberrucken und an der Dberbruft mehr oder weniger roftgelb angeflogen; der Bur= gel fchneemeiß. Wegen den Commer nuben fich die Federn fehr ab, und aller gelber Unflug auf ben weißen Federn verschwindet.

Das Weibchen ift nie so weiß als bas Mannchen. Un seinem Frühlingskleide sind die Theile, welche beim Mannchen sammetschwarzsind, matt braunschwarz, die übrigen schwärzelichbraun; Oberkopf und Nacken sind matt und schmuzig gelbrothlich, der Oberrücken noch etwas düßerer; die Oberbruft gelb rothlichweiß, der übrige Unterleib gelblichweiß. Im Commer werden auch die Weibchen viel lichter.

3m herbsteleide gleich nach guruckgeleg= ter Maufer, tragt das Mannchen folgende Far= ben: an der Schnabelmurgel, an den Bugeln, der Augen = und Obergegend, den Wangen und der Reble, bis auf den halben Borderhals ber= ab, fammtichwarg; von der Stirn zieht fich ein weißlich roffgelber Streif uber das Muge bis hinter die Ohrengegend, so daß es das Schwarze oberhalb gang einfaßt, Oberfopf und Racten rothlich roftgelb, mit grauen Tederspiken; der Oberrucken dunket rothlich rofigelb, an den En= den der Federn braungrau überlaufen; Unter= rucken und Burgel ichneeweiß; Rropfgegend, Halsseiten und Oberbruft fehr schon rothlich= roftgelb; die großen Schwingen und Deckfedern fcmary, an den Spigen braunlichweiß ge= faumt. - Das Weibchen ift in Diefer Jah= redgeit dufferer und grauer gefarbt.

Es ift ein sublicher Bogel, der wie seine nachsten Berwandten gebirgige Gegenden, besonders kahle Mittelgebirge liebt. Man findet ihn nur im sublichen Europa in Griechenland wessehr selten versteigt er sich auf deutschen Boden. Auch in jenem mitten Klima ist es ein Zugvosgel, der im Frühling ankommt, und im Herbst wahrscheinlich nach Afrika wandert. Es soll ein scheuer, wilder und unruhiger Bogel seyn. Seine Nahrung ist wahrscheinlich auch die der vorigen. In Stalien wird er verspeist und deshalb auf die Märkte Neapels und anderer Städte ges

bradit. *)

Die zweite Abtheilung nach Cuvier, begreift die Sanger (Sylvia Wolf. et Meyer.)

e) Da wie billig, die Geschichte der einheimischen Bögel uniere vorzüglichste Ausmerksamkeit verbient; so werden wir von den ausländisigen nur die merkwürdigsten mit anführen; dahin gehört denn noch zu dieser Abtheilung Saxie. Innitator. Kehle und Bauch, Stirn und ein Streif über dem Ange weg, weiß; übriger Kopf, hate und Brust schwarz; Nüden und Mantel rothbraun, Schwingen und Schwanz schwarzenun, Bürzel weiß. Beim Beibchen die ganze Unterfeite weiß. — Ahmt täuschend die Stimme aller Rögel, sogar der Gänse nach.

Ihr Schnabel ift blos etwas fchmaler an der Basis wie bei den vorhergehenden. Es sind einfame, gewöhnlich in Löchern niftende, von Insesten, Burmern und Beeren sich nahrende Bögel. — Es giebt davon bei uns 4 Arten.

Der Rothkehlchen = Sanger. (Sylv. rubecula. Lath.)

Schwanz und Flügel von außen olivensbraun; die letzte Reihe Flügeldeckfedern mit roftzgelben Spigenflecken. Alter Bogel: Stirn, Bangen, Kehle und Gurgel gelbroth, mit afchblauer Einfassung. — Junger Bogel: Kehle schmuzig gelbich, mit unordentlichen schwärzlichen Bellen; Oberleib, auf olivenbrauznem Grunde, weißlichgelb getupfelt und schwärzslich gewölft.

Diefer sehr befannte Bogel ift schwerlich mit einem andern zu verwechseln; boch laffen sich die Jungen mit ihren gesteckten Gewändern um desto schwerer von andern jungen San aern unterscheiden. 3. B. von den jungen

gern unterscheiden, z. B. von den jungen Rachtigallen, denen fie taufchend abnlich sind; fie find indeffen fleiner ale diese, haben furzere und dunfler gefarbte Schnabel und Kuße und die Schwanzsedern sind olivenbraun, ftatt

daß fie bei jenen roftig rothbraun ausschen. Die Lange des Wogels ift 55 bis 53 3., die Flugelbreite 9 bis 91 3., der Schwang mißt 243., der einfarbige mattschwarze Schnabel 5 Linien lang. Ueber dem Mundwinkel ftehen drei ftarke ab = und vormarts gerichtete Bartborften und feis nere Sarchen find den Stirn = und Rinnfedern un= termischt. Die großen Augen haben eine dun= kelbraune Bris. - Das Gefieder ift an dies fem Bogelchen groß, locker und fehr weich, be= fonders am Unterructen und der Unterbruft. Die erfte Schwinge ift flein und schmal. Die obern Theile find graulich olivenbraun oder matt grunlichbraun, die untern Theile fcmußig orangeroth, bald mehr ins Rothe, bald mehr ins Gelbe fpielend. Die Grenze zwifchen Diefer und der Farbe der obern Theile bildet ein afch= blauer Unflug, der fich über den halben Bor= bertopf, an den Schlafen und Salefeiten berab, bis auf die Bruft verbreitet; alle übrigen untern Theile find schmuzig weiß. Die großen Flügel= decffedern und Schwanzfedern dunfel grau= braun, mit der Farbe des Ruckens gefaumt.

Das Weibchen urterscheidet vom Mannchen nur das Kennerauge; es ift etwas fleiner, die Kehle blaffer, mehr gelb als roth; die aschblaue Einfaffung derfelben matter. Das herbst= Pleid hat viel frifchere Farben als das Fruh= tingefleid, weil jenes mehr abgebleicht ift.

Das Rothfehichen bewohnt gang Europa und ift bei une ein Bugvogel, der im Marg fommt und im November wieder verschwunden Ginige, von Schnee und Frost überrascht, werden oft gezwungen, bei uns ju übermintern. Sie ziehen meift einzeln des Rachts. -Commer bewohnt Diefer Bogel duftere Bal= dungen, in ebenen, wie in gebirgigen Begen= ben, doch nicht hohe Bergrucken, vielmehr die zwischen liegenden Thaler, und gern mafferreiche Wegenden. Bur Buggeit besuchen fie Feldhol= ger, Gebuich, Biefen, Mecker, Garten, furg überall mo niederes Bufchholz, befonders Bee= renftrauche find, trifft man fie auch. - Es ift ein munteres, fectes und gewandtes Bogelden, mas ein harmlofes, jutrauliches Beneh= men auszeichnet. Es freht immer hoch auf den Beinen, die Bruft erhaben tragend, die Flügel etwas hangend, den Schwang horizontal, fcnellt diefen bei jeder Beranlaffung aufwarts, macht eine fonelle Berbeugung bagu und ruckt dabei meift auch mit den Glugeln; hupft am Bo= den in leichten Sprungen. — Es ift ein muth= williger gantfuchtiger Bogel, der fich mit feines Gleichen jagt und herumbeißt, wobei man hohe tichietichende Sone hort. Ihre Locffimme, womit fie Freude, Bohlgefallen und Unnahes rung eines Feindes ausdruden, ift: fcnid= fonice und fonicenickickick. Man fann diese Cone taufchend nachmachen, wenn man eine halbe Ballnufichale nimmt, darum quer über einen Faden bindet und dazwischen ein Solzchen fpannt, fo daß wenn man mit den Fingern hinten, wo man ein Stuckchen ausfcneidet, darauf druckt, es vorn auf die Schale niederschlägt; geschicht dies rafch hinter einan= der, fo hat man diefen Son. Unfere Rleinen machen fich oft dies Spielwerfchen. Bei Un= naherung eines Naubvogels bort man ein leifes Sih! und die Stimme der nachtlichen Ban= derung ift ein durchdringendes: Efdrietid!-Das Mannejen fingt fehr angenehm, vom Mary bis in den Sommer hinein, dabei gern hoch figend, lagt Flugel und Schwang nach= laffig hangen und blaft die Rehle weit auf. Geht man behutsam ju Berfe, so fann man dem singenden Mannchen ziemlich nabe fom= men, mas dann oft frundenlang fill fist. Es scheint jest ein gang anderes Bogelchen zu feyn, denn ein feierlicher Ernst ist an die Stelle des Frohsinns, eine Urt Stolz und Burde an die

des uppigen Leichtsinns getreten. Dies ift vor= züglich der Fall im Frühling. Es ift übrigens ein beliebter Stubenvogel der uns von den lafti= gen Fliegen und anderm Ungeziefer befreit. Go= bald er nur in die Stube gebracht ift und die Unmöglichkeit durch die Fenfter zu entfliehen bes merft, fügt er fich in fein Gefchick, lernt die hausgenoffen fennen, ift mit aus der Schuffel. nimmt vorgehaltene Leckerbiffen aus der Sand; laft fich jum Mus = und Ginfliegen gewöhnen, ja man hat Beispiele, daß die im Fruhjahr frei gelaffenen im Berbst wieder in die offenen Fenfter bei dem freundlichen Wirthe einkehrten und dafelbst überwinterten, dies auch mehrere Sahre hindurch fortsetten. In hohen Zimmern, die geluftet werden und Conne haben, dauern fie mehrere Jahre, befonders wenn fie fich oft baden fonnen und man fur naturliche Rahrungs= mittel, wie fie die Jahreszeit mit fich bringt, forgt. Auch im Rachtigallenbauer laffen fie fich bei guter Rahrung halten und singen dann laut und gut; denn frei herumfliegend beschmugen fie die Sachen fehr. In den Stuben ganfen und beißen fie fich mit den andern Bogeln berum. Doch scheinen fie auch Gefühl für hulflose Be= fiederte zu haben. Mein werther Freund, ber berühmte Ornitholog Sr. Naumann führt davon Folgendes an: "Ich hatte einst einen jungen Banfling, den ich felbft auffütterte. Da diefer nun immer nach Futter fchrie, fam wie es fchien theilnehmend, das in der Stube frei berum= fliegende Rothfehlchen zum Rafig, wo der fleine Schreihals feinen Schnabel aufsperrte, fogleich flog es wieder jum Tifche, holte fleine Brodfrum= chen und fropfte ihm damit das Maul, dies ge= schah so oft als sich der Bermais'te meldete," wodurch meinem Freunde das Auffuttern fehr Uehnliche Beifpiele find mir erleichtert murde. auch noch von andern Bogeln befannt. - Fangt man fie im Winter und bringt fie gleich in ein geheiztes Bimmer, fo fterben fie, den fchnellen Wechsel nicht vertragend; gewöhnt man sie aber nach und nach daran, fo bleiben fie leben. Jung aus dem Reft genommen und aufgefüttert kann man fie mit ihrem Rafig zu fchlagenden Rachtigallen hangen, von denen fie den Schlag vollkommen, nur fanfter nachahmen lernen. -Ein Parchen, im Berbft eingefangen, begattete fich gegen das Fruhjahr in der Stube, legte in eine zerbrochene Flasche, die deshalb in einen Winkel geftellt, Gier, brutete die Jungen aus, die fie aber nicht aufbrachten. Im großen Bo= gelhaufern foll dies jedoch beffer gelingen und fie

follen fich dafelbft mit Nachtigallen oder der Bedenbraunelle verpaaren.

Mit der Schwarz = und Singdroffel nahrt fich auch das Rothfehlchen im Fruhling und Sommer auf dem Erdboden von Regen= wurmern, fleinen nactten Schnecken, Raferchen, deren Larven und andern Infetten. Sobald es aber im Berbit Beeren giebt, fucht es auch diefe auf, als: Beidelbeeren, Bollunderbeeren, Bee= ren vom Seidelbaft (Daphne Mezereum), bes Spindelbaums (Evonymus europaeus L.), fo= bald die haut davon aufgesprungen ift, das fo= genannte Rothfehldenbrod, Ebrefch = oder Bogelbecren ze. Das Unverdauliche geben fie in Ballen durch den Schnabel wieder von fich. In den Stuben gewöhnen fie fich bald an alle Speifen und fangen dann auch weniger Fliegen. Gie suchen auch Spinnen, Globe und Rafema= den in den Bauernftuben auf. Gie trinfen viel und baden sich oft täglich zweimal; weshalb ih= nen frisches Waffer nie fehlen darf. Im Bauer erhalten fie Nachtigallenfutter, oftere auch Mehl=, Regenwürmer, frifche oder gedorrte und wieder aufgequellte Beeren und andere naturliche Rah= rungsmittel, außerdem dauren fie nicht lange. -In den waldreichen Auen unferer Fluffe niften fie in Menge, wo jedes Parchen ein fleines Re= vierchen einnimmt und keinen andern in der Rabe leidet. Da, wo man das Mannchen haufig fingen bort, fuche man nur nach feinem Refte, dies fieht nahe an oder auf der Erde, in der weiten Sohle eines ausgefaulten alten Strun= fes, zwischen den dicken Burgeln der Stamme, hinter Graebufcheln an den alten Stocken, im Moofe auf der Erde, in Steinrigen ac. Reft muß immer oben eine Decke haben. Meift ift es fehr gut verfteckt und deshalb fchwer gu finden. Seine Grundlage find Baumblatter, dann folgt Erdmoos, trockne Pflanzenftengel 2c. zulett Haare und Wolle, auch Federn. findet darin 5-6 rundlich, etwas fury ge= formte, zartschalige Gier, welche auf gelblich= weißem Grunde mit gelblicher Roftfarbe über und über bespritt und punktirt find, so daß die Punkte haufig mit der Grundfarbe verschmelzen, bisweilen find diefe groß und dunkel, faft roft= farben, die unter den blaffern vorftechen und öfters einen unordentlichen Fleckenkranz am ftum= pfen Ende bilden. In 2 Bochen bruten fie beide Gatten gemeinschaftlich aus, mobei meift das Beibchen in den Mittageftunden abgeloft wird. Durch ein leises Zwitschern beim Futtern verrathen sich zuweilen die Jungen, die das Rest

fcon verlaffen, fo bald fie nur von Zweig zu Bweig flattern fonnen. Gie merben indeffen noch lange gefüttert und bei herannahender Gefahr durch den Ruf: Gih! gewarnt, wor= auf fie fich fogleich ju verbergen fuchen. Bei guter Witterung suchen sich die Jungen schon nach 8-10 Tagen, von der Zeit an, da fie das Reft verlaffen, ihre Nahrung felbft; dann fcbreiten die Alten meift gur 2ten Brut. -Die Brut wird oft von Fuchfen, Mardern, Igeln und Maufen gerftort. - Hebrigens ha= ben auch fie mit außern und innern fleinen Bogelfeinden ju fampfen. Es find feine icheue Bogel, die mit Flinte und Blaferohr erlegt Schr häufig fangt man fie werden fonnen. mit Sollunderbeeren im Berbft in den befann= ten Oprenfeln; im Fruhjahr, mo diefe fehlen, mit Pflaumenmus, Butter oder lebenden Mehl= wurmen. Conft fann man fie auch in Reg= fallen, Meisekaften, Dohnen und Schlingen, auf Rloben, Leimruthen auf Bogelheerden zc. fangen. Im Berbst werden sie fett und man verspeift fie, in Menge gefangen. Gie nugen durch das, mas mir oben schon angeführt, ver= rathen dem Jager oft durch ihr Schickern Guchfe und andere Raubthiere.

Der Blaufehlchen = Sanger. (Sylv. suecica Lath.)

Dberleib graulich olivenbraun; der Schwanz, mit Ausnahme der beiden Mittelfedern, an der Burgelhalfte roffroth, übrigens braunichwarg. -Alter Bogel: Reble und Borderhals bis gur Bruft lafurblau, an der Gurgel ein mei= fes Fledichen. - Jungerer Bogel: Reble und Gurgel weiß, mit ichwarzen Fleckchen ein= Gang junger Bogel: Auf fcmar= zem Grunde roffgelb getupfelt. Lange und Breite hat es fast gang mit dem Rothkehlchen gemein; der wenig abgerundete Schwang mißt aber 2 3. 4 Linien. Die Farbe des 6 Linien langen Schnabels ift glanzend fcmarz; Rachen und Bunge bei Alten faft pomeranzengelb, bei Jungen fleischrothlich; die Augen ziemlich greß, Stern dunfelbraun.

Das alte Mannchen ift ein schoner Bogel. Die Zügel d. ft. ein Strich von der Schnasbelwurzel bis ans Auge, schwarzlich, ein ansderer Strich über demselben, blaß roftgelb; die Bangen braun, verwaschen, licht roftgelblich gestedt. Die Farbe des Oberkörpers graubraun, welcher Farbe sich dem Olivenbraun etwas

nabert, am Scheitel am dunkelften, besonders wo es die gelblichweißen Augenbraunen begren= get. Um fconften pragnt bas glangende Lafur= blau, welches die Rehle und Gurgel bis zuni Ropfe einnimmt, fich hier feitwarts, wie ein Mingfragen ausbreitet, aber am Ende in Schwarz übergeht und hier von einer feinen weißen Linie, in einem Bogen quer über die Oberbruft, begrengt ift, die das ichone blaue Schild von einer lebhaft roftfarbigen ober roft= rothen breiten Binde der Oberbruft fcharf ab= Mitten auf der Gurgel ficht im fchneidet. Blauen ein bellblendend weißer nierenformiger Fleck. Die Unterbruft ift schmuzig weiß. Die Ufter und unteren Schwangdeiffedern von auf= fallender Lange bleich rofifarbig, mit rothlich weißen Enden; die Flugelfedern matt dunfel= Bei alten Mannchen ift das Lafurblau der Rehle ungemein prachtvoll. Bei jungen Mannchen lichter und der weiße Fleck in der= felben fleiner. - Merfwurdig ift der Umftand, daß gegen die Regel die blaue Farbe im Berbft viel bleicher ift, als gegen das Fruhjahr, indem fie dann erft dunfler und glanzender erscheint. Eine abnliche Erscheinung an dem Carminroth mancher Finfenarten, 3. B. des Gartenhanftings.

Gehr alte Beibchen sehen dem ein, = ja zweijahrigen Mannchen gang gleich, junger und bis wenigstens ins dritte Jahr haben sie aber noch feine Spur von Blau, daher man die Beibchen auch von folgender Beichnung erhalt: alle obern Theile find wie am Mannchen, doch bleicher, oder grauer; die Rehle, Geiten des halfes, Gurgel und die Mitte der Bruft (der Lange nach) gelblichweiß; vom untern Schle herab ein auf dem Rropfe fich ring= fragenformig vereinigender Streif, aus dichtfte= henden braunfdmargen Fleckchen beftehend; vom roftrothen Bruftbande ift felten eine Schwache Spur vorhanden; Farbe des Schnabels und der Fuße lichter als am Mannchen. -Berbft trägt auch das Beibchen dunklere Farben ale im Fruhjahr. - Das erfte Ju= gendfleit, das fie etwa 3 Monat lang tragen ift fehr auffallend von dem der Ulten unter= fchieden. Scheitel und Racten find fcmarg mit febr feinen roftgelben Schaftstrichen; Rucken, Flügeldeckfedern und Burgel ebenfalls fcmarz, mit roftgelben großeren Schaftifriden, die an den Schultern und dem Oberrucken Tropfens flecke bilden; Reble, Wangen und Hugenge= gend find gleichfalls auf schwarzem Grunde

roftgelb gestrichelt, doch so, daß ein lichter Augenstreif merklich vortritt. Flugel und Schwanz fast wie bei den Alten. In diesem Alter sind Mannchen und Beibchen nicht zu unterscheiden.

Man findet die Blaufehlchen in der Ban= derzeit faft in gang Deutschland, denn fur Gu= ropa ift es ein Zugvogel. Gie fommen im Marg und Upril an, und ziehen im August und September wieder weg. Die Banderung ge= fchieht des Rachts, meift fommen die Mann= den icon eine Boche früher an. Sier findet man fie nur in foldem Buichwert, mas auf feuchtem Boden machft und an Baffer an Ufern Der Fluffe, Teiche, Gecen, Bache ic. 3m Berbit, findet man das niedliche Bogelchen aber auch in Kartoffel= und Kohlackern, Die Sier hupft nicht weit vom Baffer liegen. es unter den Pflanzen umber und bleibt fo unbemerft, denn felten fliegt es um fich frei umzusehen, verbirgt fich vielmehr im dichten Geffrupp, mo ce denn auch nur vom Renner aufgefunden wird. - Hebrigens ift es ein munteres, fecfes, gewandtes, nicht icheues Bogelchen. Es fteht fehr aufrecht, die Bruft erhaben, hupft absahweise, lauft dazwischen auch schrittmeis. In den 3weigen hupft ce nur wenig, es fliegt bier von Uft ju Uft und fitt dann ftill, wie die Rachtigall. Gie ne= cfen, jagen und beißen fich mit ihres Gleichen, wie die Rothkehlchen und im Zimmer muß meift eins von beiden unterliegen.

Ihre gawohnliche Stimme ift ein schnal= gendes: Zack, tack! wobei es immer den Schwanz aufschnellt, eine andere Stimme flingt fanft pfeifend: fied, fied! Im Born ver= nimmt man wie von mehreren Gangern, fchnarrende Sone. Das Mannchen fingt übri= gens fehr angenehm, am fleißigften die Brut= zeit hindurch, fo bald nur der Morgen grauet, bis zum fpaten Abend. Es fitt dabei frei meift auf der Spige eines emporragenden Bei= Eingefangen halten fie fich am denzweiges. besten in einem Nachtigallen=Rafig, wo man fie auch mit dem Futter berfelben erhalten fann. Doch leben fie meift nur einige Jahre. der Stube geben fie noch zeitiger drauf.

Shre Nahrung befteht in Infelten, meift in folden, die sie sigend oder friechend erhaschen fonnen, selten fangen sie dieselben im Fluge. Raferchen, verschiedene Wasserinsetten, Inseletenlarven und deren Puppen, desgleichen Regens

wurmer sind ihre Hauptnahrung. Im Fruhjahr wenden sie darnach fleißig suchend, das
modernde Laub um; in Moraffen, auf dem
Schlamme und im Moose suchen sie Muckenlarven. Ameisenpuppen und Mehlwurmer frese
sen sie gern. Gegen den Herbst fressen sie
rothe und schwarze Hollunder, auch Faulbaumbeeren. Sie baden sich gern, was meift Nachmittags geschieht. Bringt man sie in die Stube,
sind sie sehr wild, werden aber bald zahm.
Mit Mehl, Regenwurmern und Umeisenpuppen
muß man sie nach und nach an ein Universalfutter
gewöhnen. Sie fressen sehr viel und beschmugen alles in der Stube frei herumsliegend.

In unfern Gegenden niften fie, fich fehr verborgen haltend, in Beidengebufch, an den Ufern der Fluffe und ftebenden Gemaffer. Das Reft fteht fehr verftecft und ift fehr fchwer aufgufinden in den meift naffen dichteften Geftuppe. Es ift oben offen, von außen aus etwas als tein Beidenlaub und grobern Stengeln, durren Salmchen und feinen Stengeln verfertigt, inwendig mit feinen Diepen, Pferdehaaren, et= was Beidenwolle, auch wohl mit andern Thier= haaren guegepolfteit, darin findet man 5-6 febr gartichalige licht blaugrune oder blag grunfpanfarbige, furggeformte Gier, die denen des weißhalfigen Fliegenfangers fo wohl an Form, als Farbe am meiften ahneln. Gie bruten die Gier in 2 Bochen aus. Cobald die Jungen flattern fonnen, verlaffen fie auch das Reft; mas Ende Mais geschieht. scheinlich bruten fie 2 mal jahrlich.

Selten erwischt die so versteckten Blaufchle chen ein Raubvogel, eher noch Füchse und ans dere kleine Raubthiere, die ihrer Brut sehr schaden, wie auch die Banderratte. Schmaroszerinsekten im Gesieder und Eingeweidewürmer plagen auch diese. Im Kasig bekommen sie die Krankheiten der eingesperrten Nachtigallen. Im Frühjahr, da die Baume noch nicht belaubt sind, lassen sie sich am besten schießen, was dagegen im Sommer und herbst um so besichwerlicher ist. Un dem Orte, wo sie sich aufhalten, lassen sie sich, wenn man die Erde wegfratt, leicht mit Netfallen, oder Schlagzgarnchen, mit lebenden Mehlwurmern beközdert, sangen.

Durch ihre Nahrung nugen fie, auch giebt bas Fleisch ein gut Gericht; ihr Gesang, Unsftand, Betragen und die niedlichen Farben ges währen Bergnugen.

Der Garten = Nothling, das Gartenroth ich mangenen. (Sylv. phoenicurus Lath.)

Schwanz lebhaft roftroth mit 2 dunkelbrausnen Mittelfedern; die dunkelbraunen Flügelfesdern mit hell gelblichbraunen Saumen. Die 2te Schwingkeder ist \(\frac{1}{4} \) 3. kurzer als die 3te, und von gleicher Lange mit der sechsten. — Mannchen, die Kehle schwarz; die Brust roststen. — Weibchen, die Kehle schwuzig weiß; die Brust in der Mitte weiß, an den Seiten und oberwärts hellgelblich graubraun; alle obern Theile matt graubraun.

Diefer schlanke nett gestaltete Bogel, ift häusig mit dem Hausrothling, wozu ihre, sich sehr gleichenden Weibchen und Zungen Beranlassung geben, verwechselt. — Seine Länge beträgt 5\frac{3}{2}\text{3}\text{.} die Flügelbreite 9 bis 9\frac{3}{2}\text{3}\text{.} Die Flügelbreite 9 bis 9\frac{3}{2}\text{3}\text{.} Die Flügel bedecken ihn et= was mehr als zur Hälfte. Der pfriemensormi= ger vorn rundliche, hinterwarts breiter, Schnabel ist kurzer und runder als am Hausroth= ling, 4\frac{1}{2}\text{ Linie lang, an der Wurzel 2 Linien breit, er ist hornschwarz; Mundwinkel und Rachen gelb. Itis ist schwarzbraun: Füße und

Rrallen fcmarz.

Das alte Mannchen in feinem Fruh= lin gotleide ift ein ichones Bogelchen: Un= fang der Stirn gleich über den Schnabel; Bugel, Mugen = und Ohrengegend, Bangen, Reble und Burgel bis jur Ropfgegend tief fcmarg; die Stirn gleich über den fcmargen Salftern rein weiß, mas bis auf die Mitte des Scheitels reicht und feitwarts über dem Schmar= gen bis zu den Schlafen fich bingieht; ber Sintertheil des Oberfopfes, Benich, Sinterhale, Rucken, Schultern und die fleinen Flugelbede= federn, dunkel blaulichaschgrau; die Oberbruft fcon gelblich roffroth, melde Farbe fich an den Seiten der Bruft bis zu dem Schenfeln her= abgiebt, nur abwarts etwas bleicher wird, in der weißen Mitte der Unterbruft fanft vertuscht, oben aber vom Schwarzen icharf abichneidet; der Burgel, die obern Schwangfedern und der gange Schwang, die beiden dunkelbraunen, roft= farben gefaumten Mittelfedern ausgenommen, gelblich roffroth oder dunkel fucheroth. großern Flugeldedfedern, wie die Schwingen, find fchwarglichbraun. Die untern Flugeldeck= federn icon roftroth; der Schwang auf feiner untern Geite licht roffroth. - Un jungern Mannchen ift das Beife am Bordertopfe von geringerer Breite, bie schwarzen Federn an der Gurgel haben weißliche Spigenrander, die rostrothe Farbe an der Oberbrust und am Schwanze blaffer, das Weiße an der Unterbrust ausgedehnter; das Alchgrau der obern Theile ist mit gelblichem Braun überlausen, und die Flügelsedern haben breitere lichtbraune Rander.

Bang andere feben diefe Bogel in ihrem Berbsteleide nach der Maufer aus, weil da die meiften Federn andere gefarbte Rander haben, welche die Sauptfarbe verdeden; nur die durch= schimmernde Schwarze Reble und roffrothe Bruft unterscheiden fie dann von den Beibchen ihrer Urt. - Go hat das alte Mannchen im Gept. zwar alle oben beschriebenen Farben, allein die Federn an den obern Theilen haben braungraue, an den untern breite fcmuzig weiße, an Stirn und Wangen aber lichtbraunliche Rander, die jene fconen Farben fo meit verdecken, daß Ober= fopf, Racken, Schultern und Rucken fcmuzig braungrau, die Bugel braunlichweiß und fcmarg= lich gemischt, die Wangen, Rehle und Gurgel grauweiß und fcmarz gewolft, die Dberbruft und Geiten weiß und hellroftroth gewolft er= fcheinen; die roftrothen Schwanzfedern noch lichtere Saumchen. Alle diefe anders gefarbten Ranten reiben fich nach und nach ab, ebe fie fich von neuem maufern.

Das Beibchen sieht gang anders aus als der mannliche Fruhlingevogel; mit dem Mann= chen im Berbfifleide hat es mehr Mehnlichfeit; und vom Beibchen des Sausrothlings un= terfcheidet es fich durch ein weit lichteres, braun= licheres Colorit und durch das viele mit Rofffarbe vermischte Beiß an den untern Theilen. Die Bugel roftgelb, grau gemifct; Stirn, Schei= tel, Bangen, Sinterhale, Rucken, Schultern rothlich braungrau oder matt graubraun; Rehle und Gurgel fcmugig gelblichmeiß, gur Geite graulich; die Ropfgegend und Seiten der Obers bruft roffbraunlich und weiß gewolft, mit graulicher Mifchung; die untern Schwanzfedern dun= fel rofigelb, der Steiß, die obern Schwangs deeffedern wie am Mannchen, nur schmußiger. Rur fehr alte Beibchen befommen eine fchwarg= graue gewolfte Reble, und an der Bruft mehr Ihr Berbftfleid ift nur wenig von roffroth. ihrem Fruhlingofleide unterfchieden. Die juns gen Bogel in ihrem Reftgefieder, Flugel= und Schwangfedern ausgenommen, unterscheiden fich fehr von ihren Eltern. Alle obern Theile find auf braungrauem ind Olivenfarbige fallenden Grunde schwarzlich gewellt und schmupig roftgelb getup=

felt, benn die grunlich braungrauen Federn haben einen halbmondformigen schwarzen Fleck an der Spige und einen schmutig roftgelben rundlichen Fleck in der Mitte auf dem Schafte; Rehle und Gurgel schmutig gelblichweiß, schwarzsgrau punktirt und bespritzt. Sie ahneln den Jungen des Haubrothlings sehr, sind aber lichter, und ihre vorherrschende Farbe fällt mehr ins Gelbe, bei jenen aber ins Aschgrau.

In gang Europa, selbst im nordlichen Ufien trifft man diefen Bogel. Es ift ein Bugvogel, gicht bloß des Rachts, im Fruhjahr einzeln, im Berbit familienweise. Geine Erfcheinung fundet Fruhlingswitterung an, oft erscheint er fcon in den letten Tagen des Marges, der Sauptzug im Upril. Ihr Ructzug erfolgt im Uu= guft. Er liebt das Gebufch in der Rabe menfch= licher Wohnungen, befondere Baumgarten; da= her trifft man ihn in Dorfern und Stadten auf Ungern und Bichweiden. Geine Lieblings= baume find die Kopfweiden, doch findet man ihn auch in Baldern, an Teichen, Fluffen und Baffergraben. Gie übernachten in holen Bau= men oder lochern der Mauern und Felfen.

Unfer Nothschwänzchen ift ein ungemein lebhaftes Bögelchen. Im Supfen und Fliegen gleich gewandt, neckt sich gern mit andern Bögeln, jagt und beißt sich gern mit seines Gleischen; ist listig und scheu und nur die nahe Umgebung macht es zutrausich gegen die Menschen. Selten sist es lange an einem Orte, stets mit erhabner Bruft. Sine eigenthumliche Bewegung der Nöthlinge, ist eine zitternde oder schüttelnde Bewegung des Schwanzes von oben nach unten, aber nicht seitwärts. Dies thun sie sehr oft, heftiger wird es aber, wenn sie etzwas Auffallendes bemerken, wozu sie denn auch noch schnelle Berbeugungen mit dem Kopse und der Bruft machen.

Die Lockstimme ift ein heller Pfiff, es klingt wie: fuid oder hujd! dem meistens ein schaalzendes. Tick! tick! angehängt wird. Das Mannchen singt angenehm und fleißig, gleich so wie es ankommt, bis furz nach Johannis, von der Morgendammerung bis zur Abendammerung, es sist dabei gern erhaben, oft frei. Bei der besten Pflege, die nur die Nachtigallen erhalten, bleiben sie doch nur höchstens 2 Jahr am Leben, so weichlich sind sie. In der Stube als Fliegenfänger dauert er auch nicht lange.

Die Nahrung des Gartenrothlings befieht; in Fliegen, Muden, fleinen Schmetterlingen und allerlerlei fleinen 2 und 4 flugeligen In= feften, die fie theils im Fluge, theils im Gigen ergreifen. Rleine Raupchen, Insettenlarven und Puppen suchen fie auf und fturgen oft von einem Baume darnach fcnell herab. Bei trübem Better fommen fie an die Bande und Saufer die gegen Mittag liegen, um hier die Fliegen in den Nigen verborgen, hervor zu holen. Begen den Herbst begeben sie sich ins niedrige Bebufch nach den Infeften, freffen dann aber auch allerhand Beeren. - Im Rafig giebt man ihnen anfanglich Fliegen, Umeifenpuppen, Mehlwurmer, fleine Diegenwurmer, im Berbft Hollunderbeeren und gewöhnt fie fo nach und nach ans Nachtigallenfutter. Gie merden bald gahm. Brifches Waffer jum Erunf und Baden darf ih= nen nicht fehlen. - In Deutschland niften fie allenthalben, in Garten, Unpflanjungen von Ropfmeiden; in Laubholzwaldungen und in felfigen Gegenden, wo fich hohle Baume, Maueroder Felfenlocher befinden. Das Reft fteht ftets in einer Höhle, mit einem meift engen Eingange. Es gleicht einem Klumpen fchlecht verwebter, durrer, feiner Burgelden, trodfner Salmden, mit Bolle, Saaren und Federn vermengt, meift findet man darin viel Banfefedern, die sie auf den Biehweiden auflesen, auch in der Luft fliegend auffangen, dies thun auch jum Fruhjahr mehrere andere Bogel. Meift icon in der letten Salfte Uprile findet man darin 5-7 fcone eiformige, an einem Ende fpite, von ungemein garter, glatter aber wenig glans zender Schaale, von schonem lichten Blaugrun oder heller Grunfpanfarbe, ungeflectte Gier. Das Mannchen loft beim Bruten fein Beibchen in der Mittagszeit ab, und so werden die Gier in 10-14 Tagen ausgebrütet. lieben ihre Brut fehr, laffen fich bisweilen auf dem Refte ergreifen und verrathen fie oft durch angstliches Schreien, wenn man fich dem Refte nahert und die Jungen in Gefahr zu fommen scheinen. Go bald sich die Jungen fühlen lernen, find fie ziemlich fcheu und verlaffen das Neft, feten fich auf einen horizontalen 3meig nahe beifammen, und wedeln ichon mit den fleinen Schmanzchen, wie die Alten, die nun mit angftlichem Geschrei bin und ber fliegen und sie fo verrathen. Cobald die Jungen felbft Rahrung fuchen lernen, machen die 211s ten Unftalt zu einer neuen Brut, wozu fie ftete ein neues Reft bauen. Runftiges Jahr fuchen fie meift ihren alten Brutort wieder auf.

Schmaroger leben auf und in ihnen, ofe ters fangt auch der Sperber die Alten, die

arme Brut aber wird ofters Ragen, Mardern, Wiefeln, Ratten und Maufen gur Beute. Holzheher und Elftern fangen oftere die noch unbeholfenen Jungen, und da fie nahe an Wohnungen bauen, gerftoren oft auch lofe Bu= ben ihre Brut. Hebrigens fann man sie leicht fchiefen. Im Frubjahr laffen fie fich auch in Netfallen, die auf der Erde mit lebendigen Mehlwurmern aufgeftellt merden, leicht fangen, im Berbft in Sprenkeln oder Dohnen mit vor= gehängten Johannis = oder Hollunderbeeren; auch auf Tranfheerden und an hohen Bohnen, Sagmen= ruben 2c. fangt man fie in hingehangten Spren= feln. - Ihr Fleisch ift wohlschmeckend; fie nuben auch noch durch Begfangen uns fcad= licher Infetten in Stuben und im Freien, und beleben den Fruhling durch ihren Gefang. -Man befchuldigt fie des Wegfangens der Bie= nen, wahrscheinlich find dies doch nur Drohnen.

Der haus, = Stadt = Nothling, Schwarzbruftchen, Buftling. (Silv. tithys. Lath.)

Schwarz gelblichroftroth mit 2 dunkelbrausnen Mittelfedern; die dunkelbraunen Flügelfesdern nut aschgrauen oder weißlichen Saumen. Die 2te Schwungfeder ift \(\frac{1}{2} \) 3. fürzer als die 3te und von gleicher Lange mit der 7ten. — Mannchen: Rehle und Brust schwarz. — Weibchen: Schmuhig aschgrau, an der Brust

etwas lichter.

Beide Nothschwanzarten sind oft mit einsander verwechselt worden, mas vorzüglich bei ihren Weibchen und Jungen, die einander ahnslich sind, von Nichtkennern, verzeihlich war. Die Lange beträgt 6—6\frac{1}{4}, die Breite aber 10\frac{1}{2}\) bis 10\frac{2}{3}\, 3., der Schwanz 2\frac{5}{8}\, 3. Der dunsen, pfriemenformige, spige, schwarze Schnabel ist 5 Linien lang; die Mundwinkel über welchem sich starte Borsten besinden, nebst dem Rachen gelb. Die ziemtlich große Iris dunkelsbraun.

Um alten Mannchen sind im Fruhling die Stirn, Zügel, Wangen, Kehle, Halbseiten, Gurgel und Kopfgegend bis auf die halbe Oberbruft tief schwarz, nach der Unterbruft zu mit aschgrauen Federsaumchen. Unterbruft und Bauch aschgrau; Scheitel, Nacken, Schultern und Rücken tief blaulich aschgrau, am Bordertheil des Oberkopfs, gleich hinter der schwarzen Stirn und am Unterrücken, am lichtesten; die Flügeldecksedern schwarz, die kleinen mit aschgrauen Saumen; die 2te und

3te Ordnung der Schwungfedern braunschwarz mit weißen Kanten, die ein weißes Feld bils den, die großen Schwingen Schwarzbraun, mit fcmalen fleinen Gaumchen. Der Burgel, Die obern Schwanzdeckfedern und der Schwanz felbft lebhaft gelblichroth, die 2 Mittelfedern Caumdhen. dunkelbraun, mit roftfarbigen Wenn ein folches Mannchen bis in den Commer geftogen hat, wird es noch schwarzer, weil die afchgrauen Federrander aldann abgeftoßen find .-Jungere Mannchen find vielmehr aschgrau, weil die schwarzen Federn viel breitere aschgraue Im Berbst nach Federrander haben. Maufer, ficht bas alte Mannchen dem Beib= then fehr ahnlich, weil die breiten aschgrauen Federrander faft alles Schwarz verdecken; das Grau ift dagegen merflich dunfler und blauli= der und das weiße Flügelfchild, ein beftimm= tes Rennzeichen für den aften mannlichen Bo= gel, zeichnet ihn aus. - Das Beibchen hat ein febr einformiges, dufteres Rleid, in eini= ger Entfernung ficht es rauchfahl und ift da= durch felbft von jungen Mannchen im Berbft= fleid leicht ju unterscheiden. Gin dufferes, schmubiges Ufchgrau befleidet die obern Theile, Die untern ein etwas lichteres ins Rothliche fallendes Ufchgrau; der Ufter rothlich weiß. Alle großen Flügeldeckfedern sind matt dunkel= braun mit braunlich weißgrauen oder lichtasch= Steif und Schwang wie grauen Gaumen. am Mannchen, doch viel blaulicher. Im Berbft ift das gange Gefieder etwas dunfler. - Die Jungen im Restgefieder unterscheiden sich von den Jungen des vorigen, durch ihr dufferes fciefergraues oder dunkelaschgraues Gemand, und durch die weniger auffallenden Schaft= flecke; am scheckigsten ift der Ropf und Bor= hald. Ihre Maufer fallt Ende Augufts und Unfange Ceptembere.

Dieser Bogel ist wie der vorige sehr weit verbreitet. In allen Gebirgsgegenden ist er gemein, weniger in ebenen, in sumpfigen aber selten. Es ist ein Zugvogel, er zieht des Nachts, im Fruhjahr einzeln, im Herbst familienweise. Im sudlichen Deutschland kommt er meist schon fruh im Marz, im nordlichen

fpater, im September zieht er weg.

Es ift eigentlich ein Gebirgsvogel, weehalb man ihn auch häufig in felfigen Gegenden anstrifft, daher in der Schweiz hoch bis zur Grenze des ewigen Schnees. Hier bewohnter die hohen Felsen und Klippen, felbst Steinshaufen und Felsenblocke. In Stadten und Dorfern

bie eine hohe Lage haben, bewohnt er Thurs me, Ricchen, Schlöffer und hohe Ruinen. Im Frühling und Sommer sieht man ihn auf den Dachern der Gebäude, auf Giebeln und überhaupt nur auf hohen Gegenständen, selten kömmt er herab und geschieht es, so weilt er nur furze Zeit auf der Erde. Biel häusiger geschieht dies aber im Herbst, wo er die Hostunderbusche in den Garten, frischgegrabene Beete und Rohlacker besucht. Er übernachtet in Löchern, Rigen, Felsen und Mauern, hins

ter Dachfparren 2c.

Hebrigens ift er ein unruhiger, fluchtiger und scheuer Bogel, hupft und fliegt mit Leichtigkeit und Schnelle, neckt und jagt fich immer mit feines Gleichen, verfolgt andere ihm nabe fom= mende Bogel und fucht fie mit Beigen gu ver= treiben. Er tragt wie der vorhergehende Bruft und Oberforper erhaben. Geine Stimme ift: fid teck, teck. Das Fid flingt fast wie wist (woher den wohl der Rame Biffling). Befang hat er Mehnlichkeit mit dem Borigen, boch nicht fo angenehm. Die Unfangeftrophe flingt wie: Bia gifififif fif! Es ift cin fehr fleißiger Ganger, der von Gruh bis Abend fingt. Schon vor der Morgendammerung fist er auf feinem Lieblingsplagden und begruft den kommenden Tag; wenn noch alles schläft, erfreut es den Fruhaufftehenden durch fein Liedden das es von den Dachforften, den Bind= fahnen oder dem Rirchthurme berabgirlt. Die Bahmung gelingt felten, felbft nicht immer bei Jungen, indem fie fich im Rafig oder den Gtu= ben leicht den Ropf einstoßen.

Geine Rahrung befteht meift aus vollfoms menen und fliegenden Infeften, die fich zu jenen Soben erheben, und die der marme Fruhling aus ihren Winkeln hervor gerufen hat. ber Schnee fcmilgt, rucken diefe Bogel aus den Thalern, wo sie zuerft ankommen, in hohere Regionen, fallt aber Schlecht Better ein, fo fommen fie oftere in die Thaler guruck. Erscheinung der Fliegen, von deren mehreren Arten fie leben und die fich an hohen Gebauden und Klippen aufhalten, bestimmt meift ihren Aufenthalt, nebst diesen freffen fie auch Spin= nen und andere Infeften nebft deren Larven, die auf Boden und unter den Dachern leben. In der ersten Salfte des Sommers geben diese ihnen Nahrung. Wenn fie aber Junge haben, fieht man fie oftere in Garten zwischen Ruchen= gemachfen und auf dem Erdboden, um Speife für die hungrigen ju suchen. Cobald diefe ausgeflogen, führen fie auch die kleine Familie bahin, die fie dann mit allerlei Raferchen, Raupchen und verschiedenen Insektenlarven, auch kriechenden Insekten 3. B. Taufendfüße (Julus terrestris) Kellerwürmer, Regenwürmer w. auffüttern. — Im herbst fressen sie Beeren, am liebsten die rothen und schwarzen holunders beeren.

Mit Muhe kann man fie im Kafig halten, wo fie mit Fliegen, Mehlwurmern ze. an das Nachtigallenfutter gewohnt werden muffen. Frei in der Stube herumfliegen zu laffen, gluckt noch weniger, weil fie fich bald den Kopf eins

ftogen.

Sie niften in Lochern, Rigen ic. an ben Bebauden in Rufflochern, Mauerfpalten, auf Balten hinter Dachsparren. Barte Burgelchen, durre Pflangenftengel und Salmden, dicht gewebt, bildet das Reft, mit vielen haaren, auch wohl mit Federn ausgepolftert. Etwa Mitte Uprile, findet man meifene 5-6 niedliche, jartschalige, glanzende, hellweiße, an dem eis nen Ende etwas fpigige Gier. Gie merden bin= nen 14 Tagen ausgebrutet, wobei das Mann= den das Beibeben auf ein Paar Stunden des Mittags abloft. Gie lieben und futtern ihre Jungen febr, und fcbreien gewaltig, wenn fie ausgeflogen find und eine Gefahr fich ihnen nahert. Go bald fie fich felbit ernahren fonnen, wird jur 2ten Brut geschritten, wo man denn etwa in der Mitte des Juni die Gier findet.

Selten erwischt ein Naubvogel einen Alten diefer Bogel, mehr leidet dagegen die Brut von Eulen, Mardern und Ragen. — Man kann sie schießen, doch nur von ihrem hohen Sis, den unten laffen diese sich schwer ankommen. Fangen kann man sie in Netfallen mit lebendiegen Mehlwurmern, damit auch auf Leimrusthen locken, seltener fangt man sie in Sprenkeln.

Ihr Fleisch ift fehr mohlschmeckend, doch thut man Unrecht sie zu fangen, indem sie auf ben Getraideboden den weißen und schwarzen Rornwurm aufsuchen und so eine Wohlthat für ben Landmann werden. Auch freut ihr Liedchen den fleißigen Städter und Landmann, womit sie den jungen Tag von ihrer Sohe herab begrußen.

Grasmücke. (Curruca Bechst.)

Mit geradem, durchaus ichmachtigem, nach vorn etwas zusammengedrücktem Schnabel, defe fen Birfte fich ein klein wenig nach der Spipe hin biegt.

Der Nachtigall = Sanger, gemeine Nachtigall.

(Cur. luscinia. Lath.) Theile dunkelroftgrau, ber obern Schwang roftfarben; die untern Theile fcmu= jig grautichweiß. Die erfte Schwinge furg. Diefes unansehnliche Rleid beweift, daß nicht immer das Rleid den Dlann mache, den wer den Bogel ficht, ihn aber noch nie borte, wird fcmerlich den prachtigen Schlager unter diefem Rleide ahnen. - Unfere Nachtigall ift fchmach= tiger als die folgende, der Sproffer, hat auch eine hellere Ruckenfarbe auch ift der lich= ter gefarbte Schwang viel rother, der Schna= bel fcmachtiger, mithen langer aussehend. Bis= weilen hat man unfern Bogel auch wohl mit dem weiblichen Garten= Roth fcwanzchen verwechfelt, wovon ihn doch sein farbiger roffrother Schmang, die bobern weiß= lichern Fuße und die ansehnlichere Große fehr leicht unterscheiden laft. - Geine Lange be= tragt 63 3., die Flügelbreite aber 101 3. Die Lange des Chmanges 23 3., der fast gerade Schnabel ift 6 Linien lang, oben dunkelbraun; Rachen und Junge gelblich. gen groß, Tebhaft, mit dunfelbrauner Stirne und weißlich befiederten Augenliedern. Fuße find ansehnlich hoch, aber ziemlich dunn. Das Gefieder ift feidenartig weich, die obern Theile find dunkel roftgrau oder graulich roft= braun; Bugel und Augengegend fo wie die Seiten des Salfes lichter, in weißliches Gelb= grau übergehend; die Mitte der Rehle und die der Unterbruft, der Lange nach, find fcmuzig weiß. Mannden und Beibden find ichwer ju unterscheiden, die Farben des Mannchens find lebhafter und eine reinere weiße Rehle, was aber nur auffallt, wenn man beide zu= fammen ficht. Bor der erften Maufer feben die Jungen fehr bunt uus, sie haben zwar die Farben der Alten, doch find diefe dunfler und alle Federn an den obern Theilen haben noch hell roftgelbe Schaftflecke, fie feben dem jungen Rothfehlchen abnlich, find aber größer und hochbeiniger von Farbe aber rother und noch durch den roftrothen Schwang leicht zu unterscheiden.

Die Nachtigall ift über ben größten Theil von Europa verbreitet, auch in Affen und Afrika wird sie angetroffen. In Deutschland ift sie überall bekannt und oft gemein. Alls Bugwogel kommt sie stets im mittlern Deutschstand in der Mitte Aprils an, wenn der Beigdorn

ju grunen anfangt und die Ctachelbeeren belaubt in voller Bluthe fteben. In der Mitte August ziehen sie meift familienweise auch des Rachts fort, im September find fie faft alle verschwunden. Es sind Baldvogel, die das niedere Laubholz, befonders wenn es feuchten Boden hat und von Baffergraben, Bachen, Bluffen durchschnitten wird, lieben. Much trifft man fie in fleinen Feldholzern, Luftgarten und Parfen, felbft in Baumgarten bei Dorfern, wenn fie nur Bufchwert genug haben. Meift suchen fie die alten Brutorter wieder auf, die fie im vorigen Jahre verlaffen haben. Jedes Parchen bewohnt einen Diffrift von einigen bundert Schritten im Umfange, wo man fie dann nie auf hoben Baumen, fondern nur im niedern, dichten Gebuifch nabe an der Erde antrifft.

Im Betragen ber Nachtigall zeigt fich ein bedachtiges, ernftes Befen, in ihrer Stellung eine Urt. Stolz, mas fie über die einheimischen Canger erhebt, dabei ift fie zutraulich gegen die Menschen, wohnt gern in ihrer Rabe, verhalt sich auch fill und ruhig gegen andere Bogel und nur selten fieht man sie sich mit ihres Gleichen ganken. In den Zweigen der Baume figen fie meift ftill oder hupfen nur Die Flügel tragt fie etwas nachlaffig, wenig. fo daß ihre Spigen immer etwas berabbangen, schnellt ben etwas ausgebreiteten Schwang bei jeder Beranlaffung, welche ihre Aufmertsamfeit reigt hoch aufwarts, und wirpt damit nur in ein= zeinen Schlagen; zwifchen 10 bis 12 großen Sprungen macht fie ftets eine Paufe che fie weiter fpringt. - Entblogt man die Erde, fo fommt fie bald dahin, mas auch mehrere andere Bogel, die Burmer und Infeften freffen, thun, also nicht aus Reugierde, wie man falschlich Ihre Lockstimme ift ein hell ge= glaubt. dehntes: Wid oder wiid, dem meift ein ichnar= rendes Rarer angehängt wird.

Benn sie das Bild schnell hintereinander ausrufen, und das Karre nur einzeln anhängen, so zeigen sie dadurch Sorge und Angst an, die etwa ihre Jungen bedroht. Freude und Zufries denheit durch ein tiefes schnalzendes Lack. Im Zorn und Aerger ein rauhes und unangenehmes Kroaf oder Krah. Die Jungen rufen anfang-lich bloß fild, in einem schneidenden Tone, wie st und nachherrer, und dann erst jenes schnazchende Kraf oder Schroaf, woran man sie sogleich erkennen kann. Durch diese Tone spreschen beide Gatten mit einander.

Dem Mannchen ift indeffen der vortreffli= che Gefang eigen, ben man mit den Namen Schlag belegt hat und welcher der Nachtigall den Namen der Konigin aller befiederten Gan= ger zugezogen hat. Man muß selbst mehrere gehört haben um darüber zu faunen und weiß in der That nicht, ob man mehr die Mannig= faltigkeit diefer Zaubertone, oder mehr die Fille und außerordentliche Starte bewundern foll, wie ein foldes Bogelden in Stande fenn kann, fo kräftige Tone hervorzubringen und welche Rraft in folden Rehlmuffeln liegen fann! - Es giebt unter ihnen wie bei meh= rerern Urten der Gingvogel fehr gute, mittel= maßige und schlechte Ganger. Go hat man bei erftern 20-24 verschiedene Strophen im Chlage gezählt. - Man hat ben Schlag durch verschiedene Blechpfeifen oder mit Stud= den mondformig ausgeschnittener Birtenrinde nachgeahmt. Merkwurdig ift es indeffen, daß in einigen Gegenden schlechte, in einer andern vortreffliche Schläger gefunden werden, dies foll j. B. an der Pommerfchen Offfeefufte fenn, mo die schlechtesten, dagegen in der reigenden Gegend von Borlit (im Bergogthum Deffau) die besten. In dem Baldchen meines lieben Freundes des herrn Raumann, den ich um diese Zeit oft besucht habe, sind oft 12-16 Parchen, die wir oft beschlichen und uns an ihren herrlichen Schlagen erfreut haben. Diefe Gegend Scheint damit in manchen Jahren recht gefegnet in fenn, in manchen findet man da= Ja es giebt Gegenden die gegen weniger. fast eben fo vortheilhafte und einladende Plat= den für Rachtigallen haben, und mo fie doch gang fehlen. Man giebt den unangenehmen Muss dunftungen des Bodens die Schuld und daß die luftigen Berftragen die fie des Rachts durchman= bern, fie dahin nicht leiten follen zc. - Je= mehr und langere Strophen ein folder Schlag hat, je mehrere von solchen darunter find, welche im Sone auf= oder abwarteffeigen und je meniger ichirende Sone oder furze Strophen dabei find, defto beffer ift der Schlag. Schlage feiner fleinen Waldbewohner, er mehr als zu mittelmäßigen Schlagern gablt, bemerfte mein Freund etwas Eigenthumliches, nehmlich 2 vielgebrauchte Schlufaccorde ein= gelner Strophen, welche wie: dada hidowitz und watiwatiwati lauteten. Er hat in feinem Buche die Sauptftrophen mit Buchftaben angegeben. Da indeffen wohl wenige unferer Lefer das fo ausgezeichnete aber theure

Werk besitzen mochten, so mag hier daraus etwas folgena), so wie Bater Bechsteins Nachtigallges sang **).

Alte Bogel schlagen in der Regel am regelmäßigsten und ftarfften. Werden sie nun sehr gehegt, so daß die alten Lehrmeister ihre Kunstfertigkeit den jungern mittheilen können, so werden dadurch auch neue Birtuosen ihrer Alt gezogen. Uebrigens darf man auch nicht etwa denken, daß dies hier Mitgetheilte ganz strenge so wieder gegeben wird. Dies ist nicht der Fall, sie wechseln vielmehr und beobachten verschiedene Neihefolgen. — Sie verschönern ohnstreitig die Gegend, wo sie sich singend aus halten, und lassen, geschieht es nur einigers maßen vorsichtig, den Menschen nahe heranskommen; so daß man den fleißigen Sänger auf

Quia quia quia quia quia quia quia quia ti:
Qi qi qi jo jo jo jojojojo qi — I
Lii ly li le lä la lö lo didi jo quia
Higaigaigaigaigaigai giagaigaigai
Quior ziozio pi.

ac) Dad Bedfiein. Tiun tien tinu, Spe tiu squa, Tio tio tio tio tio tio tix: Quito quito quito quito, Zquo zquo zquo zquo, Quorror tiu zqua pipiqui. Zozozozozozozozozozozozo Zirrhading! Tsisisi tsisisisisisisi, Zorre zorre zorre hi; Tzatu tzatu tzatu tzatu tzatu tzatu zi, Dio dio dio dio dio dip dio dio dio: Quoi trrrrrrrr itz Lii lii lii lii ly ly ly ly li lî lî lî. Quio didl li lulyli. Ha giirr giirr quipio! Qui qui qui qui qi qi qi gi gi gi gi; Gollgollgoll gia hadadoi. Quigi horr ha digdiad[llsi! zehoi;

einem freien Zweige oder Affe in ber Rabe feben fann, wie er dabei die Reble ftraubt, er fie nebft dem Schnabel heftig bewegt, den Schwang aber nachläffig herabhangen laft. Kommen fich zufällig zwei Mannchen zu nahe, fo erwacht die Giferfucht, das Gefieder wird ftruppig, der horizontal aufgerichtete Schwanz fehr ausgebreitet und die Rraft ihrer Stimm=

organe icheint fich zu verdoppeln.

Der Rame Nachtigall deutet fcon auf das Schlagen in die Racht hinein, das thun im Fruhjahre vorzuglich die, die noch feine Beib= chen haben, wodurch fie jugleich den fpater ankommenden Beibchen ihr Berlangen angu= deuten icheinen. Manche thun dies die gange Racht hindurch und hausiren nur wenig, man nennt fie ausschließlich: Rachtvogel. Dage= gen fchlagen viele bloß einzelne, oft nur abge= brochene Strophen und paufiren viel, dies find Die fogenannten Repetirvogel. Manche find auch die gange Racht fill, dies find meift alle die, deren Weiber gelegt haben. Bei begin= nender Morgenrothe fangen fie wieder an und feben es eine Stunde lang fort, dann fuchen fie ihr Sutter, mas meift nicht lange dauert, und fie ichlagen dann mit mehrern Unterbre= dungen bis acht Uhr. Gegen Abend fangen fie wieder anhaltend an. Bu Unfange des Maies laffen fich nur noch einzelne horen, denn die befriedigte Liebe bat ihr Ziel errungen und nur die Ruckerinnerung oder die gut Rahrung weckt Diefen Trieb mieder. Dies erflart uns benn auch den Grund, warum die Befangnen im Rafia fruber anfangen und fpater ju fchlagen aufhören; denn im Freien ichlagen fie felten über 2 Monate, nehmlich von der Mitte Uprils bis gegen Ende Des Juni. Unfangs, befonders die Jungen fingen fehr leife, mas man dichten nennt, dann aber wird die Melodie immer ftarfer und ftarfer. - Den eingefangenen 21= ten, muffen oft die Flugel gebunden und Fut= ter behutsam eingestopft werden, wenn fie nicht freffen wollen. Rach und nach gewöhnen fie fich aber; im Rafig fingen fie beffer als in den Bogelhauschen, diese fangen meift um Beih= nachten an und horen zu Oftern wieder auf, doch fangen auch welche schon im November an und fahren damit bis jum Mai fort. Die jung auferzogenen ichlagen ftels langer, nur muß man fie ju guten alten Gangern hangen, ba= mit fie gut ichlagen lernen. Man bat fie bei guter Wartung 8 Jahre lang am Leben er= halten. Bechftein fuhrt gar Beispiele von 15

-25 Jahren an. Gie murden aber nach dem oten Jahre im Chlagen nachläffiger. Sat man mehrere in einem Bimmer, fo verrathen fie ihre Eiferfucht im beftigen Colagen, ja man führt Beispiele an, daß eine die andere fo ju übeifchreien fuchte, daß die Befiegte ju schlagen aufhörte, ja, daß eine fo ftart und beftig fchlug, daß fie fich Gefaße zersprengte

und ploglich farb.

Ihre Nahrung beffeht mehr aus Erdgemur= men und Infeftenlarven, als wirfichen voll= fommenen Infeften. Gie hupfen deshalb auch immer auf der Erde darnach herum, und bil= pfen gern auf rund gemachten Stellen berum. Die Larnen der Schattenfafer und Umeifen= puppen nebft den Umeifen freffen fie fehr gern. Rleine Regenwurmer, Fliegen, fleine Motten und Raupchen verzehren fie auch, doch fuchen fie diefelben nach Urt der Droffeln am liebs ften im Moofe und alten abgefallenen Laube auf.

Cobald die Beeren reifen, suchen fie diefel= ben but, vorzüglich Johannisbeeren, die Beeren des Traubenholunders (Sambucus racemosa) auch die Beeren des fcmargen Solunders zc. Gie baden fich gern, befonders des Ubende, mes= wegen man ihnen auch im Rafig Boffer jum Erinfen und Baden taglich reichen muß. (Die Maffe an Futterung betr. fiebe den Eproffer).

Im dichten Laubgebufch findet man ihre Reffer, meift nahe an oder auf der Erde, auf einem alten Ctamme zwifden den aufgefchof= fenen jungen 3weigen deffelben, im dichten Be= ftruppe nahe an der Erde. Gie miffen es übri= gens fehr gut ju verbergen, mas noch durch die unansehnlichen Materialien, woraus es ge= baut ift, unterftugt mird. Die Grundlage bil= det oft durres laub, oft von Gichen, die Run= dung geben ihnen aber trodfne Balme und Stengel, juweilen Schilf= oder Rohrblatter, und das Innere ift mit garton Grashalmchen und Difpen, oft auch mit, feinen Burgelchen ausgefüttert, dann zuweilen Pferdehaore oder etwas Pflangenwolle. Wo Pforde felten bin= fommen, nehmen fie wie mehrere fleine Bald= vogel, die Pferdehaare aus den alten Dohnen und Schlingen. - Das Reft bildet inmendig einen niedlichen, etwas tiefen Rapf, übrigens bildet es einen großen Klump. Man findet darin 4-6 Gier von fehr verschiedener Geffalt, bald von fchlanker, bald mehr von runder Se= ftalt. Gie haben eine garte, glatte, aber me= nig glanzende Schale von grunlich braungrauer Farbe. Genauer betrachtet, erfcheinen fie auf

blaffem meergrunen Grunde, mit braungrauer Farbe getupfelt, fo daß die Flecken in der Grundfarbe fich verlieren und mit ihr verfchmel= gen, daber fie meift einfarbig erfcheinen und wegen dem lichten Grunde durch die Flecken Punfte und Striche durchschauen laffen. 2 Bochen bruten fie Mannchen und Beibchen nach Urt der übrigen Ganger aus. Das brutende Beibchen fitt oft fo feft, daß man es leicht mit der hand ergreifen fann. Die Jun= gen ziehen fie gemeinschaftlich mit fleinen Bewurmen und Infetten auf. Diefe verlaffen das Reft bald, figen einzeln im Gebufche und laffen fich noch lange von den Alten futtern. Sperrt man die Jungen in einen Bauer, und ftellt ihn in die Nahe des Reftes, fo futtern fie die Ulten auf, ja man will Beispiele haben, daß die mit eingefangenen Ulten es im Bauer auch gethan hatten. - Die jungen Mannchen fangen schon leife an zu-zwitschern und zu dich= ten, wodurch man fie leicht an den Beib= den unterscheiden fann, weshalb man auch nur diefe aufzufüttern braucht. - Saben die Ulten Junge, fo thun fie dabei febr angfilich, verfolgen ihren Feind mit unaufhörlichem Unaft= geschrei und dem Ruf: Wid, wid!

Auch sie werden von Schmaroherinsekten im Gesieder und Eingeweidewurmen geplagt. Da sie meist im dichten Gebusche leben, er= wischt sie nur selten ein Naubvogel. Dagegen stellen ihrer Brut häusig Füchse, Raben, Mar= berarten, Natten, Mause, ja Schlangen und

Igel nach.

In vielen Landern ift das Fangen diefes niedlichen Bogels verboten, und nur die Lieb= haber konnen es vom Forfter wie anderes Wild erfaufen. In Solland foll das Fangen einer Nachtigall ober das Berfibren ihrer Brut mit 100 Gulden beftraft werden. Es ift ein leicht zu fangender Bogel. Im Fruhjahr 3. B. darf man nur da, wo man fie boit, fich be= hutsam anschleichen und in ihrem Ungesicht den rafigen Boden aufreisen, ftellt darüber ein Schlaggan oder eine fogenannte Rachtigallen= falle, an deren Stellzuge ein lebendiger Mehl= wurm befeftigt ift, und zieht fich behutfam guruck. Go fommt fie oft febr fchnoll bin und ehe man sichs versieht, hat sie sich gefangen. Co fann turch einen gefdicften Bogelfanger in furger Beit eine Gegend entvolfert merden. - Gefdieht der Fang in den erfren Sagen, fo fann durch die noch nachfommenden Bogel, der Schade einigermaßen erfeht werden; mas

aber nach der Zugzeit richt mehr geschehen kann. Im Spatsommer fangt man sie mit Johannis auch Hollunderbecren in Sprenkeln. Gern setzen sie sich in die Dohnen, daher man vor ihrer Ankunft die Dohnen im Droffelfange zuziehen muß, sonft findet man viele dieser Thierchen erdrosselt.

Sie nugen durch ihre Nahrung, beleben eine Gegend durch ihren Gefang, und erfreuen durch ihren herrlichen Schlag gefühlvolle Mensichen, deren Herzen bei der neu belebten Nastur um so mehr zu dem Bater ber ewigen liebe, der sich in der Bildung dieses niedlichen Thierchens so verherplichte, hingelenkt wird. — Ihr Fleisch ift, wie das der übrigen kleinen Sanger, wohlschmeckend. Doch wird sie wohl kein gebildeter und gefühlvoller Mensch deshalb morden. Dies konnte nur laut der römischen Geschichte der berühmte Schwelger Heliogas bal, der sich ein Gericht aus Pfauens und Nachtigallenzungen bereiten ließ. —

Der Sproffer = Canger, Nachtphilo=

(Cur. sylv. philomela Bech.)

Der Rucken dunket rothlichgraubraun; ber Schwanz schmuchig roftbraun; Rebte weiß, uns beutlich grau eingefaßt; Oberbruft dunkelgrau gewölft. Die erfte Schwungfeder außerorsdentlich flein.

Sonst hielt man diese nebst der vorherges henden Art für ein und dieselbe, doch hat man jest beides mit Recht getrennt. Beim Bersgleich erscheint der Sproffer stets etwas größer, er ist fraker gebaut, daher weniger schlank, der Schnabel fraker, der Schwanz mehr braun als rostroth, die Kehle hellweiß, Nücken und Blügel dunkler, auch weniger rothlich und die Oberbrust stets dunkel gewölft. Die Lange beträgt 7—7½ 3., die Breite 11—114 3. und der Schwanz 23—3 3.; der Schnabel etwas über 7 Linien lang. Die Fris der ziems lich großen Augen dunkelbraun.

-Auch hier ift Mannchen und Weibchen fich fehr ahnlich. Im Zimmer wird die Farbe dies fer beiden Arten ficts viel dunkler. — Die noch unvermauseten Jungen sind eben so gestleckt, wie die der vorigen Art, im Ganzen aber doch viel dunkler und von einer gezogenen Gestalt. Die Wellenlinien der untern Theile stehen besonders an der Brust fehr gedrangt.

Diefer Bogel Scheint mehr bem ofttichen

Europa anzugehören und nicht weit nach Norden hinaufzugeben. In Ungarn, Do= Ien und Defferreich find fie zahlreicher als die gewöhnliche Neachtigall; im übrigen Deutsch= land aber felten. Alls Bugvogel fommen fie fpater als die Rachtigall, namentlich erft Un= fange Mai, und im August pilgern sie schon wieder weg. Ihre Reifen machen fie einzeln und bes Rachts. Ihren Commeraufenthalt nehmen fie in tiefliegenden Laubholzwaldern, welche dichtes Unterholz und Gebuich mit vie= len Baffer haben, besonders an ben Ufern der Bluffe. In dem nordlichen und mittleren Deutschland trifft man fie befonders in den maldigen Muen der Fluffe, deshalb der Rame: Quennachtigall. Gie bewohnen daher auch Die Ufer der Donau, Dder, Mulde, Elbe und Saale, aber nur einzeln, da mo die Bufche wieder uppig machfend, oft undurch= dringliches Gebufch bilden. Das Betragen des Sproffere ift dem der Rachtigall gleich, auch einen gemiffen Stolz verrathend; feine Beme= gungen find fraftig und icheinen abgemeffen und mohl überlegt. Er hupft auf 3meigen und auf der Erde bin, Doch nur in fuigen Beit= raumen und nie anhaltend. Der Cchwang er= bebt sich über die Flügel und wird oft in die Bobe gefdnellt, mas ftets gefdieht, wenn im Bupfen eine Paufe gemacht mird. Bierin und in feiner Butraulichfeit gleicht er auch der Radtigall. Geine Lockftimme ift aber andere: glocf-rrrr oder wie man auch fagt: Da= vid und Jafob! Gehr unterscheiden fich auch Der Jon des beide Bogel im Schlage. Sproffere ift tiefer, hohler aber dabei farter und ichmetternder, die Mannichfaltigfeit in den Strophen etwas geringer, furjer und abgebro= chener, das Tempo aber im Bangen langfas und langer die Paufen gibifchen den mer, Strophen; auch fehlen unter lettern die gie= benden, fanft lallenden und verschmelzenden Melodien, die den Rachtigallfchlag fo verfcho= nern. Die außerordentliche Gewalt der Stimms organe eines Sproffere find fo ftart, daß fie im Zimmer unangenehm werden, weshalb man fie vore Fenfter hangen muß.

3m Balde bort man fie fehr weit und ihre Stimme bezaubert den Buborer. Much unter ihnen giebt es gute und ichlechte Ganger, fogar welche, die Gefangftropten aus denen

der Rachtigall entnehmen. ")

Der Sproffer vorzüglichsten Schlag hort man nur vom Mai bis Ende Juni, nach Jo= hanni nur noch felten. Um fconften fchlagen fie in Fruh = und Abendftunden, auch mohl im Mai die Racht hindurch und benehmen fich beim Gefange wie die Rachtigall. Gie find indeffen robufter als diefe, und auch dauerhafter. Un= fanglich bindet man ihnen die Flugel und thut fie in einen fleinen Bauer, um fie erft ans Butter zu gewöhnen, ftopft ihnen auch wohl Umeifenpuppen ein, wenn fie nicht freffen wol= Rachber fommen fie erft in einen ge= raumigern Bauer, den man anfanglich mit grunen Tuche behangt und mahrend der Schlag= geit darüber laft. Alte Bogel die man ichon im Bauer gehabt, fangen oft ichon im Januar an und horen erft Ende Juni auf. Die mei= ften find Rachtvogel, doch gibt es auch un= ter ihnen Repetirvogel und Die, die Rachtie gall=Strophen mit einmifchen, heißen in De= fterreich 3meischaller.

Allerlei Erdmaden, Infeftenlarven, Diegen= murmer 2c. die fie unter und neben den Gebuifch im Moofe, an alten Ctammen, halbverfaul= tem Laube auffuchen, machen ihre Rahrung aus. Umeifenpuppen und Mehlmurmer gebo= ren auch unter ihre Lieblingsfoft. Im Berbft freffen fie auch Beeren. - Im Bimmer ver= langen fie eine forgfaltige Abwartung; ein ge= raumiges Behaltniß und große Reinlichkeit nebft immer frifchem Butter, fonft leben fie nicht lange. Mit Umeifenpuppen und Mehlmur= mern gewohnt man fie am beften an folgens

des Futter").

[&]quot;) Bediftein fagt , ein guter Ganger hat folgende Etrophen: Gia - gu gu gu! - Hagoi,

həgoi, zü zü zü, — — Gergegegegeh, — — Zicka Zerrrrrrrr — Hoa, goigoigoi gi, — — Zicka zicka zicka, — — Davitt davitt davitt! Ova wa wa wa wa wa wat ---— Gockörk gockörk; — — Geden geden geden geden geei, — — Goi goi goi goi girrr — Philip Philip Philip! — — Golka golka golka golka, — — Hia giagiagiagia; — Gleck glock glock glock glock glock.

— Geä geä geä gi! — Scherk, scherk, scherketz. — Goi gagagaga gägi, — — Heid heid heid hi; -- Woi da da! woi da da! - Gei gei gei gei girr girr; - Hoi gegegege - Hoigoi! Zerrrrr

^{*)} Man reibe eine gute gelbe Rube auf dem Reib= eifen, eben fo ben dritten Theil fo viel von gefottenem Mindshert, eben jo viel flar geriebene harte Semmel, und mijde es mohl burdeinander; hierzu fommen noch für jede Reget täglich 6, in Der Singezeit nur 4 Dehlwurmer, mahrend der Maufer friiche oder gedorrte Ameifens

Ihr Neft findet man nur in mafferreichen Gegenden, besonders an Fluffufern, im Bei= dengebuich, mo dies große Strecken bedecft, mehr im sudlichen ale nordlichen Deutschland, 3. B. in Defferreich, Ungarn ze. Das Reft felbft ftebt auf einem alten Stumpfen, auf den nahe über der Erde abgehauenen und wieder mit neuen Zweigen umgebenen Stammen der Reilweiden, Erlen und Ulmen, nabe am Boden oder unmittelbar auf der Erde felbft und gut verfrecft, von dunnem Laube gebauet und mit Balmchen und andern garten Pflanzentheilen ausgefüttert. In daffelbe legen fie gewohnlich 5 auf matt olivenbraunem Grunde, mit etwas dunflerem Braun gewolfte oder befpripte Gier, der Nachtigall ahnlich, doch größer, runder und Brutzeit und Erziehung ber wenig långlich. Jungen wie bei der Nachtigall. - Die Alten. Die ftete in dichtem Gebufche weilen, fangt fel= ten ein Raubvogel, dagegen leidet ihre Brut an den bei der Rachtigall angegebenen Feinden fehr.

Die armen Gefangenen sind manchen Krankheiten unterworfen. Bei einem verdorbenen Magen soll Safran ins Trinken gethan, nebft frischen Ameisenpuppen, Spinnen und andere Insekten gute Dienste leisten. Bei Bereftopfung der Fettdruse, die aus Mangel des Badens entstehen soll, hülft oft eine sanste Operation mit einer Nadel und Ausdrücken der Druse. — Bei der fallenden Sucht taucht man sie mahrend des Anfalls einigemat in kattes Waster, oder man schneidet an einer der Hinzterzehen den Nagel so weit ab, daß ein Tropfen Blut herausstließt ic.

Leicht find fie zu schießen. Gefangen mer= ben fie mie die Nachtigallen, mit denen fie auch gleichen Rugen haben.

> eier, und im Berbfte guiveilen Sollunderbeeren. Man kann Dieselben auch trodinen und im Binter fie in Baffer aufquelleu und ihnen reichen, weil fie ihnen febr mohl befommen. Das gange Jahr Ameifenpuppen unter ihr Futter gu mengen; ift nicht nothig. Daffelbe verrichten auch hartgefottene und flargeriebene Gier, die beim maufern und frankein ihnen febr eripricklich find. Das Rübenfutter muß täglich neu gemacht mer= den, denn fauert es, fo ichadet es, meshlb man bei beißen Sommertagen es täglich lieber 2 Mal maden muß. Der Boden des Kafigs muß mit frischem Sand bestreut und reinlich gehalten mer= ben; auch darf täglich frijdes Waffer jum trinfen und baden nicht vergeffen merden. - Dies Futter paßt für alle Gangergattungen.

Der Droffel-Rohrfanger, Rohrschirf. (Sylvia Cur. turdoides Mey.)

Oberleib gelblich roftgrau, ein deutlicher gelblichweißer Strich über dem Auge; Untersleib roftgelblichweiß; Mundwinkel orangeroth; 8 3. lang. — Mannchen an der Gurgel aschggrau überlaufen.

Diefer Bogel wurde fonst zur Drosselgattung gerechnet, wozu wohl seine Größe mit
beitragen mochte. Sie beträgt 8 3.; die Breite
113 bis 12-3. Lange des Schwanzes 3\frac{1}{4}\frac{3}{2}.
Der Schnurrborsten über dem Mundwinstel sind ansehnlich groß und schwarz; die Iris braun. —
Mannchen und Beibchen sind schwer von einander zu unterscheiden. Ze jünger diese Bogel,
desto gelber ist ihr Gesteder. — Im Herbst
sind alle Farben dunster, frischer und an den
obern Theiten brauner mit startem olivengelben
Uebersluge, daher fast schmußig olivensarbig zu
nennen.

Diefen Bogel trifft man bloß in gemaßig= ten und marmeren Erdftrichen, eben fo im fud= lichen Polen und Rugland ift er baufig. In Unhalt, wie in dem angrenzenden Gach= fen und Brandenburg kommt er nicht fel= ten vor. - 218 Bugvogel macht er einzeln feine nachtlichen Wanderungen. Im Berbft fchleichen fie fich familienweis aus unfern Ge= Erft ju Ende Uprile laffen fie fich schen und im September geben fie wieder ab. Ihren Aufenthalt suchen fie freis am Baffer. Um liebsten auf Teichen, Landfeen, großen tie= fen Baffergraben und an folden Gemaffern, in welchen das gemeine Robe (Arundo Phragmitis) recht hoch und uppig machit, und wo es große Strecken, gleich einem Balde bildet, da= bei auch noch viel Beibengebusch. Sier figen fie frete niedrig über der Erde und über dem Baffer. Rur felten ficht man fie auf dem Freien, noch feltener auf dem Erdboden; man wurde fie daber menig oder gar nicht bemerken, wenn nicht ihre Stimme und der Gefang des Mannchens, das jur Begartungezeit fehr un= rubig ift, fie nicht verriethe. Gie flettern be= fonders geschicft an fenfrechten 3meigen und Pflanzenfrengeln auf und ab, nicht aufwarts als ein Specht, fondern fchief, mit beiden Gu-Ben den Stengel oder das Reis umflammernd, wobei fie einen Jug nach dem andern fortfeten. Sie find fehr icheu; im Herausfliegen laft diefer Bogel den facherformig ausgebreiteten

Chwang etwas hangen, die furgen Glugel machen dabei eine fdnurrende Bewegung und fo fchieft der Bogel rudweis oder hapfend fort. Ihre Bantfucht mit ihres Gleichen ift fehr groß, befonders der Mannchen jur Begottungezeit. Unf dem Erdboden ift die Bewegung Diefes Bogels mehr fdrittmeis als hupfend. - Ceine Locfftimme ift ein fchnalgendes tiefes Back oder Batid und ein tief ichnardendes Korr ober Schorr, letteres bort man befonders, menn er etmas Auffallendes in feiner Rabe bemerft. Beim Unfommen im Fruhjahr lagt das Mann= chen feinen nicht unangenehmen Gefang boren, befonders an dem Orte, wo es brutet, vom Mai bis Juli. Man hort ihn in der Mor= gendammerung, bisweilen auch noch in der Racht. Die Sollander nennen ihn von feiner Stimme entlelint: Rarrafiet, weil Sone mit vorfommen, die man mit dem Quafen der Laubfrofde vergleicht, g. B. Rarr farr farr. - Dorrdorrdorr, - Rarre farre farre - Rri, fri frifi, - farra farrafied &.

Alls Gefangne find fie fehr wild, verlangen einen geräumigen Rafig und forgfaltige Be= handlung, da fie noch gartlicher als Rachti= gallen find. Ihre Rahrung befteht in der Frei= beit aus folden Infeiten, welche fich über dem Waffer im Rohr und Weidengebufch aufhalten, und welche fie meift im Gigen oder barnach fpringend, aber felten im Fluge fongen. Sier= ber geboren Libellen, Safte, Frublingefliegen, Schnafen, Muden, Fliegen, Blattlaufe, Spinnen, auch fleine Rafer, ale Dobrfafer und die Larven derfelben, fobald fie das Baffer ver= laffen. Bei ihrer Unfunft, wenn das Robr abgeschnitten und noch nicht groß ift, befuchen fie niedrige Gebuiche an den Gemaffern. Berbfte freffen fie auch fdwarze Solunderbee= ren und begeben fich darnach auf die am Baf= fer flehenden Bebuiche. Gie baden fich fehr gern. Im Rafig muß man ihnen anfänglich Umeifen= puppen, Fliegen, Meblwurmer und andere In= feften in Menge vorlegen und damit nach und nad) fie an das Rachtigallfutter gewöhnen. Dies muß besonders in der Maufer fortgefest werden, und noch hartgefochtes, auf einem Reibeifen flar geriebenes Suhnerei jugefest werden. In der Regel halten fie fich nicht lange. Gie niften in Deutschland, frete über dem Baffer, auf Landfecen, großen Teichen, breiten und langen Baffergraben, mo nur bo= hes Rohr uppig machft und große Dickichte bil= det. Es wohnen oft mehrere Parchen auf ei=

nem Teiche, boch hat jedes feinen fleinen Be= girf aus denen es das andere fogleich vertreibt. - 3hr Reft gehört gewiffermoßen ju den funft= lichen; es fdwebt gleichfam über bem Baffer an 4, 5 bis 6 farten und nabe beifammenfte= benden, fenfrechten Robrftengeln, die es an feinen Banden durchbobren, und an welchen es mit dem Material feffgewickelt ift. Es ift indeffen fo befeftigt, daß es nicht berabgleiten fann, etwas über 3 Tug über dem Bafferfpie= get, meift fo angebracht, daß man es in dem Dicficht nicht bemerfen fann. Auf abnliche Urt bauet die gange Familie der Robrfangerer= Das Reft bildet einen tiefen Rorb, fo daß bei Sturmen weder Gier noch Junge her= ausfilirgen fonnen .- Die Materialien find meift durre Grasblatter und Salme, mit untermifch= ten Bafifafern von Reffeln, Beibrich und an= dere am Baffer machfenden Pflanzen; diefen ift bisweilen Camenwolle von Beiden, Riobr 20. Infeftengefpinnft, grunes Dioos, und dergt. beigemifcht. Das Innere ift mit feinen Salm= chen, trodfnen Grasrispen und Robriamenfro= nen beigemifcht, ausgefüttert. Erft menn das junge Robr anfangt ju ichießen, beginnen fie den Refibau, daher man denn nur im Juni Gier darin findet. Die Bahl der Gier belauft fich meift auf 4-5; fie haben die Broge der des Saussperlings, von schoner regelmifig ei= formiger Gestalt und einer glatten nicht glan= genden Schale. Gie find auf blaugrunlichwei= Ben oder febr bleich grunfpanfarbigem Grunde mit fehr dunkel = oder femarglich olivenbraunen und dunkel afchgrauen Flecken und Punkten überfaet, die meift über die ganze Fliche ver= Gie variren nur in der Große breitet find. und Ungahl der Flecken, und die Grundfarbe vermandelt fich beim ausgeblasenen nach und nach in blauliches Beig. Das Mannden loft fein Beibchen des Tages mehreremal ab, und in 14 - 15 Lagen fommen die Jungen heraus, Die mit fleinen Infeften groß gefüttert werden. Gie folgen ihren Gitern bato: indem fie febr gut an den Ctengeln herumflettern fonnen und Das Berlangen nach Futter durch ben Son Jud ausdrucken. Die Alten find fehr beforgt um fie, mas ibre angfflichen Tone befagen, wenn fich eine Gefahr ihrer Brut nabert. Gie machen jahrlich nur eine Brut. Gie merden auch von Comarozerinfeften im Gefieder und von einigen Urten von Gingeweidmiffmern ge= plagt. Gelten fangt ein Falfe oder Sabicht einen alten Bogel, da fie fich frets im Gebuich aufhalten. Aber die Rohrwiche fangt ofters

ausgeflogene Junge.

Wegen ihrer Cheu find fie fcmer gu fchie= Man nimmt ju ihrem Fange 3 - 5 Fuß lange Stocke, in die man fleine Reischen mit Schlingen frectt, fo, daß ein folder Stock eine gange Reihe Dohnen bildet. Dergleichen macht man mehrere und ftellt sie horizontal auf ein paar Pfahlchen ins Rohr, fo daß fie etwa 2 -3 Fuß über dem Bafferspiegel oder am Ufer über dem fumpfigen Boden fiehen. Gie benu= Ben im Durchichlupfen des Geffruppes gern diese Stocke zu bequemen Gigen und werden fo leicht gefangen. - Ihr Fleisch schmeckt an= Gie vertilgen eine große Menge uns laftiger Infeften, und beleben diejenigen Wegen= den, die ohne fie nur wenig Reize haben, und da fie oft des Rachts auch fingen, hat man ihm den Ramen Baffernachtigall gegeben.

Die Mond = Grasmucke, Plattmond. (Mot. Silv. Curuc. atricapilla Lath.)

Rehle meifigrau; Zügel, Bangen und Seizten des Salfes lichtaschgrau; die oberen Korpertheile grunlich braungrau. Mannchen: Obergfepf schwarz; Beibchen und junger Bogel: Oberfopf rothbraun.

Thre Lange ift 6-61 3.; die Breite 91 - 10 3. Die Lange des Schwanzes 21 3. Schnabellange 5 Linien. Die Bris ein frifches bunkelblau. Ihr Gefieder, besonders das kleine,

ift feidenartig.

Diefer Bogel bewohnt das mittlere Europa, und ift in unfern Gegenden ziemlich gemein. Er gehort unter die Jugvogel, Die blos des Rachts und zwar einzeln ziehen. Gie fommen in der Mitte des Uprile und giehen im Cep= tember und October wieder fort. Beilen alfo langer hier als ihre Familienverwandten. Bals der die aus Laubholz bestehen und viel dichtes Unterholz haben, sie mogen in bergigen oder ebenen, felbft lichten Begenden fich befinden, in Baumgarten der Dorfer und Statte, vois züglich wenn fie von Bald begrenzt werden, in englischen Garten 20. Gie halten fich im= mer in den Kronen der Baume von mittler Sobe, und im niedrigen dichten Gebufch auf. Ihre Locfftimme gleicht der der übrigen Grass muchenarten, flingt aber ein wenig tiefer und ift ein schmagendes oder schnalzendes Sack oder Tack, tack, welches fie im Uffect schnell bin= tereinander ausftogen, ihr Barnungoruf ein ges

dampftes, ichnardendes Raahr oder Chaar, und ihr Ungfigeschrei- ein quafender Jon. Thre Bartlichfeit und ihr Wohlbehagen fuchen beide Gatten gegenseitig durch ein fanftes Pi= bu, pibububu (fdnell ausgesprochen) auszu= drucken, und man hort dies hauptfachlich in der Zeit, wenn die Jungen jur Gelbfternah= rung reif und bie Ulten gur Eten Brut fic anschiefen. Der Diuf der Jungen nach Futter ift: fchard und fchadtadad. Der Befang des Mannchens ift einer der vorzüglichsten und manche ziehen ihn den der Nachtigall vor. Er beffeht aus einem fehr abmechfelnden, angeneh= men Piano, dem ein rein flotendes, lautes Forte folgt, mas wie ein furger Marich oder wie eine Fanfare klingt. Es giebt auch unter ihnen gute und schlechte Ganger. Gie fingen fleißig bis jum August, wo die Maufer eintritt und sie ganglich schweigen.

Gern halt man diesen anmuthigen Sanger, der bei weitem nicht so zartlich als die Rachetigall iff. Gefangen bindet man ihn die Flugelspigen und thut ihn in einen fleinen Bauer, um ihn ans Stubenfutter zu gewöhnen, dann aber in einen größern oder in das Bogelfammerchen. Den Bauer überhangt man anfanglich mit grauem Tuche, um sie so nach und nach an Menschen zu gewöhnen. Jung aufgezogen werden sie sehr zahm und lernen fremde Melodien nachpfeisen.

Thre Nahrung beffeht, befonders im Frichlinge, in kleinen glatten Raupen, besonders von Bicklern und Spannen, die fie aus den Bluthen und Knofpen der Baume von Blat= tern und Zweigen ablefen; dabei fuchen fie aber auch andere Knofpeninseften und folche, die sich auf Baumen und im Gebuich aufhalten, als: Blatt =, Conn =, Diuffelfafer (Curcul. pyri) 30., Die Larven derfelben, fleine Nachtfalter, Flies gen, Mucken ac. Alle diefe erhaften fie im 2118 fehr lebhafte Bogel haben sie stets Gigen. Uppetit und find deshalb auch immer mit Hufs suchen ihrer Nahrung beschäftigt. — Cobald es aber reife Beeren und Rirfchen giebt, merden diefe ihre Sauptnahrung. Gie freffen auch Traubenfirschen (Prenus padus) wovon fie, wie von den übrigen auch Schalen als unverdaulich durch den Schnabel wieder von fich geben. Außerdem noch viele Urten von Beeren, als: Johannis =, Holunder =, Himbeeren; Epheus, Ceidelbaft=, Tagbeeren zc. Beim Nachtigalls futter, dem man noch etwas zerquetschten Sanfoder Mohnfamen beimifchen fann, halten fie fich fehr gut. Die Jungen fann man aus bem Refte nehmen, in einem Bauer neben dem Baume hangen und von den Alten auffüttern laffen; fie auch mit fangen, und fie thun es auch; sonst lassen sie sich auch mit frischen Umeifenpuppen groß futtern und an ein Uni= verfalfutter gewöhnen. — Täglich verlangen fie frifches Waffer zum Baden und Erinfen.

In Deutschland niften fie überall, mo es nur Balder und Gebuiche von Laubholz giebt, in großen Baumgarten, englischen Garten zc. Das Reft feht meiftens in den Gabelgweigen eines mannehohen , durchaus von Safeln, Beigbu= den, in Simbeer = und Brombeerbufchen zc. in lebendigen Becfen und Lauben. G:lten ffeht es fehr verborgen, meift ift es leicht ju erblicken. Es ift nachläffig gebauet, aus trock= nen feinen Stengeln und Salmchen von Galium aparine und andern Laubfrautarten, von Beide und Gras mit feinen Baftfafern von Reffeln und dergl., und mit Gewebe von Rau= pen oder Spinnen lofe verbunden, das Innere ift mit fehr feinen Salmden und zuweilen auch mit einzelnen Pferdehaaren ausgelegt. Ende Upril findet man meift ichon 5 - 6 Gier im Nefte, welche von Geftalt fast immer schon eiformig find und in der Farbe gang außeror= dentlich variiren. Gewöhnlich haben fie auf schwach rothlichmeißen Grunde matt olivenbraune und aschgraue Zeichnungen, die dichter oder einzelner fteben und in Punkten, Sprigen, Gefriget oder marmorirten Flecken bestehen, über welche einzelne schwarzbraune Punfte gerftreut find, die meiftens einen roth= lichtbraunen Rand wie Brandflecken haben und nie gang fehlen. Gie bruten fie abmechfelnd in 2 Bochen aus und laffen fich mahrend des Brutens febr nabe fommen. Gie lieben die Jungen febr, die fo batd fie nur fonnen, das Reft verlaffen. Rabert man fich den Jungen, fo malgen fich die Alten oft im Grafe, um dadurch die Aufmerkfamkeit von den Jungen abzugiehen. Rach etwa 8 Tagen, mo die Jun= gen aus dem Mefte fliegen und nun felbft Fut= ter suchen, machen die Alten Unffalt zur neuen Brut. Geht alles gut ab, fo fliegen die erften Jungen Ende Maich aus, und dann haben Die Alten Unfange Juni wieder Gier. Gine breimalige Becke machen sie nur dann, wenn eine der erften verunglückt. Nachdem aber die Jungen der letten Bocke aufgewachsen, verstummt auch des Mannchens Gefang. — Richt felten bestimmt fie auch ein Rufuf zur Erzic=

hung feiner Brut.

Gin fleines Schmarozerinseft im Gefieder, und Eingeweidwürmer plagt auch diefe Bo= gel. Die Raubvogel fonnen den Ulten wenig anhaben, defto mehr leiden die Jungen burch Ragen, Guchfe und Marderarten; jelbft auch uble Witterung ruinirt viele Junge. Gie ba= ben als Gefangene die Krankheiten der Rach= Gie laffen fich leicht schießen, und tigallen. am beffen fangt man fie im Fruhlinge durch Netfallen, worin man Mehlwurmer zur Locks speife braucht und fie dann im Gebuich auf= ftellt. Much fangt man fie in Sprenkeln und Dohnen, wo Johanniebeeren, rothe oder schwarze Holunderbeeren vorgehangt werden. Die Berminderung der Blutheninfeften, ihr herrlicher Gefang und felbft ihr mohlschmeckendes Fleisch beftimmen ihren Rugen. Schaden thun fie nur an den Guffirschbaumen, deren Fruchte fie febr gufprechen.

Die Ganger : Grasmucke, Meifter = , Orpheusfanger. (Sylv. Curuc. orphea Temm.)

Oberleib afchgrau, am Rucken blaulichgrau, Unterleib weiß, Geiten und Ufter mit schwa= dem roftfarbigen Unftrich. Die ichmale Fahne der außersten Schwanzfedern ift weiß, die breite mit großem, weißem Reitfled von der Spibe am fcmarglichen Schaft berauf, Die 2te mit weißem Spigenfled. Lange 61 3., Breite 9 - 9 1/2 3., Schwang 23/3. lang. Beim Mann= chen haben die 3 außerften Cchmangfedern eis nen weißen Spitzenfleck. Im Frühlinge ift der gange Oberfopf bis unter das Auge und im Nacken schwarz, im Herbst dunkelgrau; an jungen Mannchen afchgrau, und die Zügel und Ohrengegend dunkelgrau. - Beim Beibchen haben nur 2 der außerften Schwangfedern ei= nen Spifflect; der Oberfopf braungrau, Bugel und Ohrengegend dunfefgrau, und über den Bugeln ein undeutlicher lichter Streif.

Der droffelartige Echnabel ift ffart, ge= rundet, von der Spige bis jur Stirn 6 Linien. Im Berbit feben fich Mannchen und Meibchen im Meußern am ahnlichsten. Beim Mannchen nabert fich jedoch die Farbe an den obern Thei= len mehr bem reinen Ufchgrau, beim Beibchen

dagegen dem Maufegrau.

Diese Urt gehort eigentlich dem Guden von Europa an, fommt auch im marmern Italien und auf ben Infeln Griechenlands vor. Gie ift ein Bugvogel, der gegen den Binter in warmere Gegenden mandert. Gebirgige Ge= genden icheint fie vorzüglich zu lieben. Es ist ein unruhiger und lebhafter Bogel, der immer durch die dicht belaubten Zweige hupft. Un Gefang foll fie alle andere Grasmuckenarten

übertreffen.

Ihre Nahrung ift die der vorigen Urt. — Sie niftet in dem Gebuich der Laubmaldungen und Garten in den oben angegebenen Orten. Das Reft ift wie bei der Sperber= und Gartengrasmucke. Zuweilen follen fie es in Felfenlocher, Mauerspalten und felbft unter Die Dader der Gennenhutten bauen. Gie le= gen 4 Gier, deren Farbe weiß, mit gelblichen unregelmäßigen Flecken und fleinen braunen Punften bezeichnet, find aber größer als der ber Gartengrasmucke. - Gie laffen fich leicht ichießen und in Regfallen, mit Leimru= then und in Sprenkeln fangen. Rugen ber Borigen.

Die Sperber= Grasmude, großer Dorn= wich, großer Gliegenfreffer. (Sylv. Curuc. nisoria. Bechst.)

Die außerfte Schwungfeder hat ein trub= weißes Caumden an der außern Fahne, ihrer gangen Lange nach auf ber innern nur am Ende einen hollweißen Fleck. Die Beibchen find mit dunkelgrauen Wellenlinien oder Mondflecken bezeichnet; die untern Schwanzdecffedern grau, mit einem dunfleren Langetfleck und breitem

weißem Caum,

Es ift die größte unter den einheimischen Urten diefer Familie, die, fobald fie das erfte Sahr zurückgelegt hat, durch ihre Farbenzeich= nung fich fenntlich macht. Die brennenden gelben Augenfterne und das blaugraue mit Wellenlinien bezeichnete Befieder geben ihm un= ter den Grasmucken ein eigenes, einem Gper= ber nicht unansehnliches Unsehen, daher auch obiger Rame. Dagegen find bei den Jungen Die Seiten nur etwas mellenformig gezeichnet, auch haben fie feinen gelben Mugenffern. Die gewöhnliche Lange diefer Graemucke ift 63 3., Die Flügelbreite aber 11 - 11! 3. und die Lange bes Schwanzes 3 3. Der Schnabel ift vollig wie an der Droffel geftaltet, ftark, oben ein wenig abwarts gebogen \(\frac{1}{2} \) 3oll lang. Die Tris der Jungen ift broun, dann fcon gelb, im hohen Alter prachtig hochgelb. Das Beibchen

ift eben fo gezeichnet wie bas Mannchen, aber mit weniger deutlichen Wellen oder Mondflecken gegiert, indeffen fallt die weiße Grundfarbe der untern Theile beim Mannden ftete mehr ins blauliche, beim Beibchen dagegen mehr ins Ihre Maufer fallt im August, bei gelbliche.

den Alten etwas früher.

Diefer Bogel findet fich in mehreren Lan= dern Europas, ift aber als besondere Urt noch nicht fehr lange befannt. In Deutschland fommt er haufig vor; indeffen feine Wehnlichkeit im Aufenthalte, Lebensart, Stimme und Befang mit der Garten= und Dorngrasmude find ichuld, daß man ihn nicht beffer fennt. unfern Begenden ift er nicht felten, ja in den Baidern an dem Elbufern haufig. Es ift ein Bugvogel, der des Rachts feine Reifen macht. Gie fommen Ende Uprile, und verlaffen uns im August schon wieder. — Als Baldvogel findet man fie in ebenen Begenden im Laub= bolge. Gie lieben vorzüglich die etwas tief lie= genden Laubwalder in den Muen der Fluffe und dafelbit maldreiche Infeln. Um liebsten fuchen fie folde Schlage, in welchen viel Dor= nenbufche madfen, daher lieben fie befonders den Beiß= und Schwarzdorn (Crataegus Oxyácantha u. Prunus spinosa Lin.). 3m Fruh= jahr auf ihren Bugen findet man fie meift nur im Balde auf hohen Baumen, mas bas Mannchen auch in der Brutzeit thut; dagegen befuchen fie im Gpatfommer jedes fleine Ge= bufch, vorzüglich Felobecken, worin Dornen machfen, fo bleiben fie verborgener und ziehen fo faft unbemerft von uns meg.

Die Sperbergrasmucke ift ein unfiater, ei= ferfüchtiger und ganfischer Bogel, gegen andere fo mie gegen ihres Gleichen. Bahrend das Beibden bas niedere Gebuich durchfriecht, am Refte baut, oder auf demfelben figt, treibt fich das Mannchen unruhig in den bobern Bau= men umber, fingt, fcbreit und pagt auf, bag fein Nebenbuhler fomme, den es fogleich an= fällt und verfolgt. Gie find übrigens fo icheu und furchtfam, daß fie bochft ungern übers Freie fliegen, dann aber fehr eilen. - Ihre Locfftimme ift ein ichnalzendes Eichach, bei befondern Beranlaffungen auch ein fcnarchen= des Schaar, wie die andern Grasmucken, ei= gen ift ihm aber ein lautes Errrer, abrlich dent des rothröckigen Burgers und des Baussperlinge. - Der Befang des Manns dens ift icon, fart und melodifch, doch nicht fo icon, ale der der Bartengrasmude, mit

der er noch die größte Achnlichkeit hat, bann auch mit der Dorngrasmucke, fo daß die= fer Befang aus beiden Befangen gufammenge= fett ju fenn fcheint. Das Finale ift gewohn= ·lich ein etlichemal wiederholtes ichnalzendes Sach, tack, worauf dann mehrentheils noch das froblockende Errerr folgt. Um Brutorte angefommen, fingt das frohe Mannchen bis gegen Johanni, haben fie aber erft Junge, fo fingt es nur in den Morgenftunden. Gefan= gen betragen fie fich anfanglich wild und un= geffum, fo daß man ihnen die Flugel binden und ihren Rafig aufhangen muß, fonft fiogen. fie fich, befonders Abende beim Lichte, den Ropf ein; fie muffen forgfaltig wie Nachtigal= len behandelt merden, halten fich aber in Bo=

gelhäufern am beften.

Thre vorzügliche Nahrung find Raupchen und andere Infeftenlarven, nebft Blatterin= fetten, welche fie vom grunen Laube der Bau= me und Bufche ablesen, wonach fie befrandig in den dichten Aefren herumhupfen und die diefften Gebuiche durchfriechen, fetten hafchen fte indeffen nach fliegenden Infeften, felten fommen fie darnach auf die Erde, wo fie et= wa einen Regenwurm und ein friedendes In= feft aufnehmen, einige Suß darnach hupfen und dann fogleich wieder ins Gebufch eilen. Im Berbft leben auch diefe mehr von Beeren, be= fonders icheinen fie die Beeren vom Faulbaum ju lieben. Mit Beeren gewohnt man fie am leichtiffen zu Universalfutter, doch befommt ihnen das Nachtigallenfutter im Rafig am be= ften. Muf ihren Lieblingsplatichen niften fie auch und finden fich dafelbft oft am Morgen ein; nur darf es nicht an Dornbufchen fehlen. Bort man fie bier in- der letten Balfte des Maics ofters, fo fann man auch auf die Be= genwart ihres Reftes Schließen. Das Reft freht meift in dicht verworrenen Zweigen, gut verftedt, 2-4 Fuß vom Boden entfernt. ift leicht gebauet, befreht aus trocknen Pflans genftengeln und garten Salmchen, größtentheils von Winde, Labfraut (Galium aparine u. G. sylvaticum) und von Schmielen, haufig mit Raupengespinnft und weißen Spinnweben durch= webt und inwendig fast immer mit einzelnen Pferdehaaren ausgelegt. Gie legen 4-5 Gier, welche eine garte, wenig glanzende Schale und meift die Grofe der Gier des Saussperlings haben. Man findet fie oftere von einer mehr langlichten als furzen oder rundlichen Gierform. Sie variiren in Farbe und Zeichnung, meiffens aber auf einem grauweißen Grunde mit hellem Micharau und blaffem Olivenbraun befpritt, erftere Farbe aber gewöhnlich haufiger und am ftumpfen Ende in einen Fleckenfrang jufam= mengefloffen. Colde, an welchen das Belb= braun haufiger ift, find feltener, und bei die= fen fallt dann auch die Grundfarbe etwas ins Gelbe. Die aschgraue Farbe ift von weniger Dauer, fie bleicht baber in den Sammlungen fo aus, daß fie gang grauweiß merden, und faum merflich vom Grunde abstechen, fo daß fie faum bleichgrau gewolft zu fenn scheinen. Rur die mehr gelbbraun gefleckten haben einige Mehnlichkeit mit den Giern des rothrockigen

Whirgers.

Beim Reftbaue fowohl, wie beim Bruten find fie fehr furchtfam, indem fie fogleich, wenn man fich nabert im Gebufch entwifden. brutende Beibchen mird vom Mannchen in den Mittagestunden abgeloßt. Nur wenn das Weibchen über den garten Jungen sist, wartet es die Rabe eines Menschen ab, und flattert dann, um- diefen zu taufchen, sich gang matt und lahm ftellend, gur Erde und auf diefer eine Strecke fort, wie es auch die andern diefer Familie zu thun pflegen. Dadurch suchen fie nehmlich die Aufmerksamkeit vom Refte ab und auf fich zu lenken, entflieben dann aber schnell, wenn man sie verfolgt. Ueberrascht man fie beim Bau des Reftes, fo laffen fie es oft unvollendet und mablen einen andern Ort, das thun fie auch, wenn man ihm eins der Gier megnimmt. In 14 Tagen merden die Jungen ausgebrutet, die meift mit grunen Raupchen aufgefüttert werden. Rabert fich Je= mand dem mit Jungen befegten Rofte, fo ruft das Beiben angfilich oft wiederholend: tich af tichaf tichaf tichaf u. f. m., gerade wie der rothrockige Burger, dem fie auch hierin abneln. Die Jungen verlaffen das Reft febr bald und halten fich im Gebufch verftecft. Ra= bert man fich einem folden Orte, fo, fommen gleich beide Alten, fich flaglich gebehrdend, ber= bei, flattern an der Erde hin und laffen außer dem Efchack noch ihr ichnarrendes Errere horen, die Jungen verhalten fich dabei gang In der Regel bruten fie nur einmal rubig. im Jahre. Gelten ermischt ein Raubvogel diefe fo verfteckt lebenden Bogel; das Reft felbft wird meift auch von den dichten Dornen gefchutt, doch werden die noch ungeschieften Jungen oft die Beute der Fuchfe, Marder und Ragen. Bang fleine Schmarogerinfeften bewohnen ihr Gefieder und einige Arten der Eingeweidemursmer ihr Inneres. — Als sehr scheue Bogel sind sie nur schwer zu schießen. In den Helsen sie fen fangt man sie in Nethsallen mit Mehls oder Regenwurmern, vornehmlich an kalten Tagen des Frühlings. Im herbst in Sprenkeln mit rothen Holunders oder Johannisbeeren in einzelnen Feldbecken. Ihr Nuten liegt in ihrer Nahrung; ihr Gesang belebt den Bald; ihr Fleisch das im herbst ziemlich fett ift, hat einen vortrefflichen Geschmack.

Die Baun = Grasmude, fleines Beiß= fehlden. (Motac. curruca. Lin.)

Oberfopf afchgrau; Zügel und Wangen bunkelgrau; der Unsterleib weiß. Die außerste Schwanzseder an der Außenjahne weiß, auf der Innenfahne mit großem weißen Keilfleck, von der Spige am schwarzen Schaft herauf; die 2te mit einem ahnlichen, aber nur ganz kleinen und undeutslichen.

Diefer Bogel ift in der Familie der Gras= mucken der fleinfte. Lange 54 3 , Flugelbreite 8 - 81 3., Lange des Comanges 24 3. Der Conabel ift verhaltnifmäßig furz, abgerundet, an der Burgel ziemlich breit, faum 5 &. lang. Die Farbe der Gris ift bei Alten hellbraun, bei Jungen hellgrau. Die Farbe der Fuße hell bleifarben oder schmußig lichtblau. - Die Stirn ift lichtgrau, der ganze Oberkopf hell aschgrau, Macken, Rucken und die obern Flugel= und Schwangdecffedern braunlich = afchgrau. Bügel bis Ohrgegend schwarzgrau. Bon unten ift der gange Bogel weiß; an der Reble ift das Weiße am meiften und fehr bervorleuchtend. Mannchen und Weibchen sind fcmer von ein= ander zu unterscheiden.

Dieser Bogel ift über ganz Europa verbreistet, doch nirgends fehr häusig. Es ift ein Zugvogel, der auch des Nachts zieht. Ihre Ankanft nimmt man als zuverlässige Berkunz digerin beständiger Frühlingswitterung an. Diese Grasmucke fommt im April an, wenn sich die Stachelbeerbüsche mit jungem Grun schmucken, wo man dann keine starken Nachtsrösste mehr zu fürchten hat. Die Mannchen treffen meist einige Tage früher ein als die Weibchen. Ihzen Nückzug treten sie schoon im August an. Es ist eigentlich ein Waldvogel, der indessen dech die Umgebungen der Städte und Dörfer, die

Garten und Gebusche besselben liebt, doch mehr das zusammenhangende Buschwerk, wo Dornen wachsen, wo es lebendige und todte Zaune und vor allen Stachelbeerbusche giebt, die ihm vor allen Holzarten die liebsten sind. Zaune und kunftliche Hecken lieben sie mehr als die übrisgen Orte, daher auch obiger Name Zauns grasmucke für sie sehr passend gewählt ist. Man sieht sie meist nur auf niedrigen Bausmen und im Gebusch, nahe an der Erde, in den dicht belaubten Zweigen, besonders in den Kronen der Obstbaume, in den Dornens und Stachelbeerbuschen. Auf dem Freien sieht man sie nie.

Es ift übrigens ein außerordentlich lebhaf= ter, munterer und unruhiger Bogel, welcher felten lange an einer Stelle verweilt, fich mit andern Bogeln neckt und mit feines Gleichen herumjagt, dabei aber die Begenwart des Men= fchen nicht scheut, befonders wenn er in der Rabe menschlicher Wohnungen niffet. Gelten fieht man fie auf der Erde. Gewöhnlich flat= tert und ichieft er von Buich ju Buich, und hupft beim Miedersetzen fogleich schnell wieder durch die Zweige fort. - Geine Locffimme abnelt der der andern Grasmucken, es ift ein fcnalzender Son. Das Mannchen ift ein fehr fleißiger Ganger und laßt feinen ausgezeichneten Gefang vom fruhen Morgen bis gegen Abend boren, besonders im Frühlinge. Gein Beib= den loft er ju Mittag beim Bruten ab, wo er nicht fingt, gegen Johanni schweigt er gang. - In der Gefangenschaft wird er bald gahm und laßt man ihn frei in der Stube herum= fliegen, so ternt er seinen Warter kennen und nimmt ihm das Futter aus den Sanden. Er dauert indeffen nicht lange; langer noch im Rafig, wo er die Wartung der ihm ahnlichen Bogel verlangt.

Im Freien besteht ihre Nahrung in fleinen glatten Naupen, die sie wie die Vorigen aus den Anospen und Blüthen der Baume und unzter den Blättern hervorholen; fressen auch alelerlei Insesten, kleine Puppen und mancherlei fleine zweiz und vierstügliche Insesten, verschies dene Arten grüner Blattläuse (Aphis. Linn.), kleine Schmetterlinge u. dgl., die sie nicht slies gend, vielmehr forthüpsend von den Blättern und Zweigen ablesen. Im Nothsall fressen sie auch Negenwürmer, die sie zuweilen von der Erde aufnehmen. Ihre Lebendigkeit fordert ihren gusten Appetit. Die frühen Sorten der Süßkirssschen mit weichem Fleische suchen sie sehr heim.

Huch freffen fie wie die vorhergehenden Urten allerlei Larvenarten. In den Stuben fangen fie die Fliegen und sind diese alle; so giebt man ihnen Beeren und gewohnt sie an ein Univer= In einem geräumigen Bogelbauer bei Rachtigallfutter halten fie fich am beften, doch darf, wie bei Borigen, frifches Baffer jum faufen und baden nicht fehlen. Defters findet man in Schmarg= und Weißdorn ihr eben nicht fehr verftecttes Reft. In Garten findet man es in Stachelbeerbufchen, Sagus= baumen ic., felbft in todten Baunen, etwa 2 - 3 Fuß hoch von der Erde. Ihr Reft ift wie bei den andern Urten leicht gebauet und meift am Boden fo durchsichtig, daß man fich mundern muß, wie darin die nothige Brutmarme gufam= mengehalten werden fann. — Das Material ber meiften diefer Reffer befteht größtentheils aus vorjährigen, dunnen, trochnen Stengeln vom Rlebfraut (Galium aparine Lin.), die frar= feren zur außeren Untag, die feinen nebst fehr garten durren Grashalmchen gum innern Huss bou. Das eingeflochtene Gefpinnft von Rau= pen und Spinnen giebt ihm noch den nothigen Gehalt. Das Innere ift, mo es nur irgend fenn fann, mit einzelnen Schweineborften und Pferdehaaren ausgefüttert, fonft vertreten auch garte Salmchen deren Stelle. Unfangs Mai findet man darin Gier und Ende diefes Monats flugge Junge. Gie follen nur einmal bruten. Bart, wie das Bogelchen, find auch die Gier 5-6 an der Zahl; sie sind gartschalig, von iconer Giform. Ihre Grundfarbe ift rein weiß, bisweilen ins Blaulichgraue ziehend, dabei mit afchgrauen oder violetgrauen Punften einzeln, haufiger aber, doch nicht fehr dicht, mit gelbbrau= nen Punften und fleinen Flecken bestreut, nach dem flumpfen Ende ju großer, dichter ftebend und einen Fleckenkrang bildend; zwischen diefen sieht man auch noch einzeln fehr feine schwarze Punftchen, auch wohl furge Saarzuge. 13 Tagen bruten fie beide Gatten aus. Die von den Alten febr fleißig gefütterten Jungen machfen schnell auf und verlaffen, fonnen fie nur von Zweig ju Zweig flattern, ihr Reft. -Bu ihren Eigenheiten gehort, daß wenn fie ei= nen Menschen in der Rabe, wo sie das Rest bauen, feben, fie daffelbe (welches fonft in 2 Sagen vollendet ift) verlaffen und oft weit von Diefem ein zweites anfangen. Benn fie Gier haben und man berührt dieselben oder greift die Jungen an, so verlaffen sie diese nicht fel= ten. Gie lieben ihre Brut fehr, fturgen fich auch darauf figend, ichnell herab und fuchen wie die Borigen, den Feind auf fich zu lenken und fo die Gefahr von den Jungen abzumen= Sieht man die noch im Refte figenden Jungen fcharf an, und fie tonnen es nur ei= nigermaßen, fo fturgen fie fich aus demfelben und fuchen im Gebufch zu entschlupfen. -Nicht felten legt der Rufut fein Gi in das Neft diefer Grasmucke. Diefer große Freffer macht den Eltern viel Roth, denn faum fonnen fie diefem immer Sunger flagenden Pflegefinde ge= nug Futter juschleppen. Geine Große und fein Bewicht debnt nicht felten das Reft fo aus, daß er durchfällt und im Geffruppe am Boden liegend, umfommt. Dies Treiben dabei ju be= obachten, ift fehr intereffant. -

Außer den gewöhnlichen Bogelfeinden, leis det ihre Brut sehr durch Ragen, Marder, Biesseln zc. ja selbst durch üble Witterung. In der Negfalle läßt dieses harmlose Bögelchen sich leicht mit lebendigen Mehlwurmern, im Sommer mit Johannisbeeren oder Kirschen sangen, auch durch Leimruthen, Sprenkel und Meisesfasten fann man sie berücken. In den Obstsgarten sind sie ihrer Nahrung wegen sehr nüßeliche Bögel. — Ihr Gesang ist angenehm, ihr Fleisch wohlschmeckend und verdienen ihres Nubens wegen Schonung.

Die Dorn= gemeine Grasmude, Spott=

(Sylv. Curuc. cinerea Lath.)

Bon oben braungrau; von unten gelblichund rothlichmeiß; die Flügelfedern mit breiten hellroftfarbenen Kanten; die außerste Schmanzfeder weißlich, mit hellweißer Außenfahne, die folgende mit undeutlicher weißer Spige, wovon oft auch noch die dritte eine Spur zeigt.

Dieser so bekannte, doch oft mit andern verwechselte Bogel, zeichnet sich besonders durch seine roftsarben gekanteten Flügelsedern vor den übrigen einheimischen Grasmuckenarten aus. Die Länge beträgt meist 6—64 3., wovon 2½ 3. auf die Länge des Schwanzes kommt, Flügelbreite 9—9½ 3. Der kurze, rundliche und starke Schnabel ist 5 Linien lang, von oben ist er braun, gegen die Spize schwarzlich. Der Augenstern ist bei jungen Bogeln graubraun, bei den alten aber hell gelbbraun.

Der gange Oberfopf, Bangen, hinterhals, die fleinen Flügeldeckfedern, der Rucken bis an den Schwang, find braungrau, etwas ins

Nothliche zichend, am Kopfe aber, befonders an den Wangen, mit hervorschimmerndem Usch= grau. Die Roble, die Mitte der Bruft der Lange nach und die Enden der untern Schwang= deckfedern, find reinweiß; die Ropfgegend, die Seiten der Bruft und die Gegend am Ufter weiß, mit gelbrothlichem Unfluge, welche am Ropfe am reinften oft von einer bleichen Fleisch= farbe ift. Alle große Flugelfedern find matt= dunkelbraun, mit gelblich roftfarbenen Caumen, die an den hintersten Schwingen und den gro= Ben Deckfedern in breite Ranton ausarten, Die auch von einer lebhafteren Roftfarbe find. -Mannchen und Beibchen find im Meußern ein= ander febr abnlich. Das Mannchen hat fets mehr Ufchgrau am Ropfe und das Weibchen sieht im Ganzen schmuziger und und unan= sehnlicher aus, auch ist es stets etwas kleiner als das Mannchen.

Diese Grasmucke ift fast über ganz Europa verbreitet. In Deutschland ein überall vorskommender, oft aber ein mit andern verwechsselter Bogel. Bei uns ift sie sehr häusig und gehört wie die andern Arten, zu den Zug vösgeln, welche des Nachts ziehen. Man bemerkt sie schen in der Mitte des Aprils, wenn die Weiden zu grünen anfangen und zu Ende des August berlassen sie unsere Fluren.

Sie lieben das niedere Gebusch und Dornen, vorzüglich Schwarzdorn und Kreutbeere
(Rubus fructicosus), weshalb auch der obige
Mame. Die Berggegenden in der Nähe der
Flüsse sind ihnen vorzüglich angenehm. Bon
menschlichen Wohnungen leben sie gern entfernt.
Hierdurch unterscheiden sie sich sehr auffallend
von der Garten, = Zaun = und Monch sie
grasmücke und sind hierin mehr der Spers
bergrasmücke ähnlich. Ihr Wesen treiben
sie fast immer in niederem Gebusch, lassen sich
jedoch öfter sehen als manche andere Art.
Da wo sich der rothröckige Würger aufhält,
sindet man auch die Dorngrasmücke.

Sie ift übrigens die unruhigste und lebhaftefte unter allen Grasmucken. Sie durchhupft
mit unglaublicher Schnelle das dichtefte Geftrupp
von Dornen, Brombeeren, Resseln u. dgl. und
laßt sich dabei immer einmal außerhalb sehen.
In dem Bezirke, in dem sie lebt und der nie
sehr groß ift, treibt sie sich immer umber. Es
ift ein froblicher Bogel, immer heiterer Laune.
Un den ihr nahe wohnenden Bogeln laßt sie stets
ihren Muthwillen aus durch Necken und Jagen.

Ihre Locfftimme gleicht denen der andern

Grasmucken. Ihr Warnungeruf klingt rauh und gedämpft wie Schaar. Ein anderer Son der nur Wohlgefallen und Freude zu verkündisgen scheint und meift gleich auf den Gefang des Männchens folgt, klingt wie: Hoad hoed wäd wäd wäd wäd wäd (die ersten Sylben gedehnt, die lesten schnell nacheinander); dies ist ihr allein eigen. Sie singen im Sigen und auch im aufsteigenden Fluge. Es ist ein fleißiger Sänger, so daß das Männchen von seiner Unfunft bis in den Sommer hinein singt.

Als Gefangene find fie zartlicher als bie Nachtigall und muffen gut abgewartet werden, wenn fie einige Sahre erhalten werden follen. Sie verlangen einen geräumigen Bauer, halten sich auch in der Stube und werden fehr zahm.

Jung aufgezogen gluckt es noch beffer.

Much sie leben im Freien von allerlei Knoë= peninfeften, deren Giern und Larven, eben fo wie die vorigen Urten. Sie geben auch in die dem Gebusche nabe liegenden- Raps =, Rub= faat =, Baigen = und Erbfenacker, den Infeften nach. Gegen den Berbit befuchen fie auch ein= zeln die nahen Kartoffel= und Kohlacker, doch durfen fie nicht weit vom Gebufch liegen. Co wie die Uebrigen lieben sie auch viele Urten von Beeren, Guffirfchen, im Rothfall freffen fie auch Regenwurmer. Gie baden fich gern. -Im Rafig gehalten, verlangen fie Nachtigallen= futter mit Umeisenpuppen, zuweilen auch einen Mehlmurm; im Berbft frifche Beeren, im Bin= ter gedorrte Holunderbeeren, die ihnen fehr wohl befommen. Jung aufgezogen, werden fie febr gabm, man futtert fie mit Umeisenpuppen auf, und gewohnt sie nach und nach an das Nachtigallenfutter.

Sie niften haufig in unfern Gegenden, doch am zahlreichften find fie in den ichonen Quenmaldern der Elbe, Mulde ic. Ihr Neft befindet fich ftets im dichteften Beftruppe in einem Dornbu= fche, am liebsten in Schwarg = oder Rratbee= renbufden; auch felbft in hohen farfen Pflan= gen; felten ficht es uber 2 Fuß boch, und ge= wohnlich fehr aut verborgen. Das Reft ift eben fo gebaut, wie das der übrigen Grasmucken, doch ftete dichter und die nopfformige Aushohlung tiefer. Meift ichon in der 2ten Balfte des Uprile findet man die Gier diefer Bogel 4-6 Stuck an der Bahl. Gie find etwas flein, fiets furz oval, zuweilen fast rundlich. Muf einem grunlich = oder blaulichweißen Grunde find fie mit einem bleichen Olivenbraun über und über besprift und punktirt, zuweilen nur einzeln, zuweilen auch fo dicht, bag die Grund= farbe faum durchscheint; unter biefen zeichnen fich etwas großere Puntte und runde Fleckchen von eine, braungrauen oder dunkelgrauen Farbe aus, die aber nicht häufig find und febr oft am frumpfen Ende einen Fleckenkrang bilden. Durch das Bebruten werden fie gruner, und die in Faulniß übergebenden werden dunkels grun; Mannchen und Beibchen bruten fie wechfeleweife in 2 Bochen aus. Die Jungen verlaffen das Reft fcon ehe fie noch recht flie= gen fonnen und noch gang furge Schwangfe= dern haben. Gie haben anfanglich diefe fleische oder rosenfarbene Mundminkel und find unge= mein behende im Berfriechen und Entschlupfen durch das Dickicht. - Glauben fich diefe Bo= gel beim Reftbau geffort, fo laffen fie ibn liegen; meniger thun fie dies aber, menn fie ichon Gier oder gar Junge haben. Wo man das Mannchen oft singen bort, da ift meift auch das Reft zu fuchen. Gie haben zweimal Junge in einem Jahre. Defters muffen auch fie einen jungen Rufuf mit ausbruten. -Schmarozerinseften und Gingemeidmurmer beherbergen sie so gut wie die vorhergehenden Urten. Ihr Aufenthalt fcutt fie gegen Raub= vogel; indeffen leidet die Brut viel Schaden durch Fuchse, Marderarten, Raten und Ratten, Der rothröckige Burger, der oft in ihrer Nahe wohnt, vergehrt auch oftere, wenn Regenwet= ter einfallt und Inseftenmangel dadurch herbei= geführt wird, beren Brut. - Begen ihrer fteten Unruhe find fie schwer zu schiefen. Leich= ter erhalt man fie mit einer an ihrem Aufent= haltkorte aufgefiellten Refifalle mit lebenden Mehlwurmern. Im Berbfte in Sprenkeln mit vorgehangten Johannis = oder Holunderbeeren. - In den Forften und Acceern nunt das Thier durch Wegfangen der schädlichen Inseften sehr Ihr frohlicher Gefang erfreut daher den Land = und Forstmann, so wie den Liebhaber der Ctubenvogel; auch ichmeeft ihr Fleisch, vor= züglich im Berbft, angenehm.

Die Garten = Grasmude, große oder grungraue Beißfehte. (Sylv. Curuc. hortensis. Bechst.)

Bon oben olivengrau; von unten schmuzig gelblichweiß; die untern Flügeldeckfedern weiß= lich rofigelb; die Schäfte der Schwing= und Schwanzsedern von der untern Seite weiß; die kurzen Füße schwunzig lichtblau; das Schwanzende gerade.

Weder Farbe noch Geffalt zeichnen biefen Bogel aus, baber er auch oft mit andern, 3. 33. bem Beibehen der Dionchsgrasmuche, dem Gumpf = oder Tlugrohrfanger ver= wechselt worden ift. Seine Lange beträgt 6 3., die Flügelbreite 9½ — 93 3. und die Lange des Schwanzes 24 3. Der Schnabel fieht bem Droffelschnabel abnlich, er ift furg, frart und rund, 5 Linien lang, über den Mundminfel fteben ftarre schwarze Borfthaare, von welchen fich drei durch ihre Große auszeichnen. Bris ift dunkelbraun, bei Jungen lichter oder graubraun. Das Gefieder ift nicht fehr groß, etwas locker und feidenartig weich. Die obern Theile des Bogels find olivengrau; ein etwas lichterer doch wenig auffallender Streif zieht fich über das Auge bin, und gur Geite des Rackens schimmert durch die hauptfarbe des Oberteibes ein lichtes Afchgrau bervor. Rehle und Mitte der Bruft, der Bauch und großen Enden der graulichen untern die . Schwanzfedern find trubmeiß, die Geiten der Reble, Gurgel, die Gegend des Kropfes blaß oder weißlich roffgelb. Alle große Flugel= und Schwanzfedern dunkel braungrau. Beide Gat= ten find einander fehr ahnlich. - Das Fruhlinge und herbstfleid ift ziemlich verschies den, denn das lettere ift viel dunkler, an den obern Theilen grunlicher, an den untern gels ber. Das Frühlingefleid ift dagegen viel blaffer und grauer. Jungere Bogel find allemal dunffer, von oben graulicher, von unten gel= ber ale die Alten.

Diefer Bogel ift im marmeren und ge= maßigten Europa zu Sause. In Deutschland trifft man ihn überall. Es ift ein Bugvo= gel, der auch des Rachts reift, im Berbft, einzeln bisweilen auch familienweis. Im Frühjahr kommt er erst jur Zeit der Kirsch= bluthe, der Beggug dauert den Geptember hindurch. Es ift ein Bewohner des Waldes vorzüglich der Laubholzwalder, die viel Unter= holz haben und an Bergen, in Thalern oder in ebenen, felbst feuchten Gegenden liegen. Dafelbft mohnen fie, befondere menn nur ein= gelne Dornen =, Simbcer = oder Brombeerbufche barunter nicht fehlen-; besgleichen lieben fie auch die Buschmeidengehege der Glugufer, fleine Feldhölger, englische Garten und Bosquette, felbft Baumgarten bei Dorfern und Stadten, wenn es bafelbft nur nicht gang an niedrigem Gesträuche fehlt; denn sie liebt eben so gern Die Rabe menfchlicher Wohnungen, wie den einfamen Bald, deshalb treffen wir fie auch bei une oft an, doch ofter noch die Dorn= und Mond egrasmucke. Mit der Borigen hat fie Aufenthalt, Gitten und Lebensart ge= mein.

Es ift übrigens ein einsamer, harmlofer Bogel, welcher fich durch ein filles aber thatiges Leben auszeichnet, mit den um ihn moh= nenden Bogeln im Frieden lebt, und gegen den Menfchen einiges Butrauen verrath; ift vor= fichtig, doch nicht icheu und treibt fein Wefen unbefammert in den Obftbaumen, indem fich Darunter Menschen befinden. Er fchlupft, wie die andere Grasmucke in fehr gebuckter Ctel= lung leicht und ichnell durch die lefte bin, aber eben fo schwerfällig, schief und felten auf der Erde, wie jene. - Die Locfftimme hat fie mit der Monchegrasmucke gemein; froft fie auf et= mas Unerwartetes, fo laft fie ein gedampftes und ichnarchendes rrahr horen. Gin befonde= res Wohlbehagen Scheint fie burch ein fanftes, nur in der Rabe vernehmbares: Bimamama auszudrucken. - Das Mannchen ift ein vor= trefflicher Ganger, bas, wenn es den Fruhling ankommt bis nach Johannistag, feinen vor= trefflichen aus lauter flotenartigen Sonen gu= fammengefetten Gefang, vom fruhen Morgen an bis nach Connenuntergang erschallen laßt, die Stunden wo es fein brutendes Weibchen abloft, ausgenommen. - Es lagt fich bald und gut gahmen mit der Borficht, die wir bei den übrigen ichon angegeben. Man fann fie auch in ber Stube herumfliegen laffen, doch halten fie fich beffer in Bauer. nimmt man fie jung aus dem Reffe und hangt fie neben dem Brut= orte auf, fo futtern fie die Alten groß, ja man fann diefe auch durch Schlagnege fangen und fie von ihnen in der Gefangenschaft auffuttern lassen. Neben Nachtigallen gehängt, lernen die Jungen den Schlag, den fie mit dem ih= rigen oft fehr gut zu verfchmelgen miffen.

Die Rahrung haben sie mit den vorigen Urten gemein. Gie freffen febr gern Rirfchen, befonders die mit weichem Fleifch, die fie bis auf die Rerne abnagen. Im Berbft befteht ihre Nahrung faft einzig und allein aus den Beeren, die wir bei vorigen Urten schon ange= führt haben. Es find ftarte Freffer, die faft immer nur Rahrung auffuchen. Gie baden fich gern und geben ziemlich regelmäßig Mor= gens und Abende jur Tranke. In der Gefan= genschaft verlangen fie Futter und Wartung der Nachtigall; dann und wann einen Mehl= wurm, frifche oder gedorrte (lettere wieder auf=

gequellt) Solunderbeeren.

In den oben angegebenen Aufenthaltsortern Gie legen ihr Reft fehr wenig niften sie auch. verftecft an; oftere mablen fie dagu Simbeer= ftrauche, Kragbecrenbufche, Brombeeren= und Sopfenranten, Frang = Spalierbaume ec., es ift fehr leicht gebauet, fo daß man durch den Bo= den deffelben immer durchsehen fann. Da es wenig befestigt ift, lagt es fich leicht wegneh= Sie fangen oft mehrere Refter an, ehe fie eins vollenden. Gegen Ende des Maics findet man meift erft 5 - 6 Gier in ihrem Reffe. Sie haben eine regelmäßige Giform, variiren aber in Farbe und Zeichnung außerordentlich. Gie find auf einem truben rothlichweißen Grunde matibraun und aschgrau verloschen fein geflectt und marmorirt und mit einzelnen buns kelblauen Punkten bestreut, welche haufig einen lichten Rand haben; zuweilen ift auch die mar= morartige Zeichnung grober und deutlicher, der Grund zwischen den Punften reiner, diefe auch zuweilen am flumpfen Ende franzartig gufam= mengefloffen, manchmal auch in den olivens braunen großen Flecken noch Zeichnungen von einer dunfleren Farbe, furg, die Beichnung mit Grau und Braun ift unendlich mannichfaltig. Man findet immer in einem Reffe, wo nicht gang gleich, boch fehr ahnlich gezeichnete Gier. Das Mannchen loft das Weibden nur in den Mittagffunden ab; in 2 Wochen entschlus pfen die Jungen den Giern. Die Gier fo menig als die Jungen darf man berufren, denn nicht felten verlaffen fie diefelben. Saben fie Junge und man nabert fich dem Reffe, fo benehmen fie fich gerade fo, wie die übrigen Urten. Ba= gen die Jungen aber ichon das Reff zu verlaf= fen, fo folupfen fie beim Unnahern beraus, die Alten eilen fogleich berbei, gebehrden fich flaglich, ichreien und flattern wie gelahmt in der Rabe umber, um dadurch die Aufmertfamkeit von den Jungen auf fich zu lenken. Die Jun= gen haben dicke, bleichgelbe Rander an den Mundwinkeln. — Gie follen nur eine Brut maden.

Sie leiben von fleinen Comarozerinseften, auch der Rufuf legt zuweilen ein Gi in ihr Reft. Der Sperber ermifcht hier und da auch einen. Ihre Brut leidet viel durch großere und fleinere Raubthiere, auch Raffe und Ralte bringt manche um.

Mit der Flinte und dem Blaferohr fann man fie erlegen. Der Fang ift übrigens wie

bei den vorhergehenden Urten, mit denen fie auch gleichen Rugen in Bertilgung der Bluthen= feinde und anderer uns schadlichen Infeften ha= 3br Gefang erfreut im Bald, Gebufch und Garten, Im Berbft ift auch ihr Tleifch fett und mobischmeckend. - Ihre Begierde nach Rirfden mit weichem Fleifche ift fehr groß, und nicht leicht laffen fie fich von einem folden Baume vertreiben.

Braunelle. (Accentor.)

Schnabel: ziemlich gerade oder ein wenig aufwarts gebogen, etwas fart, hart, an der Burgel fehr dick. Die Bunge hat eine getheilte Spige, icharfe Geitenwande. Fuße: mittel= maßig farf; die erfte Schwingfeder fehr flein, schwach und spigig. Gie unterscheiden fich von ben Gangern und Grasmuden durch ihren viel harteren, mit icharferen Schneiden verfebe= nen Schnabel, fo daß fie damit ziemlich hart= fchalige Gamereien mit Leichtigfeit hulfen fon= nen. Gie leben daher nicht allein von Infeften, fondern nebenbei auch von Camereien, weshalb fie auch ichon in dem mittleren Europa über= mintern. Gie lieben gebirgige Begenden. Gin roftiges Braun ift meiftens Sauptfarbe des Ruckens. Bir führen davon an:

Die Beden=Braunelle, Bleifehlchen, Spanier ..

(Accent. modularis. Koch.)

Der Vorderhals bis auf die Bruft dunkel= blaulich aschgrau; bei den Jungen dunkelroft= gelb, mit fchwarzlichen Langeflecken; der Ruffen roffbraun, fcmarg geflecft; Der Schwang faft einfarbig graubraun.

Die Lange beträgt 6-61 3., die Breite 9-94 3., der Schwanz ift 24-23 3. lang, menig ausgeschnitten. Die erfre Schwinge ift fehr flein, schmal, furz und spigig. Der harte, ctwas in die Hohe gezogene Schnabel ift ziem= lich 5 Linien lang, bei Alten gang schwarz, bei jungen Bogeln braunschwarz, Rachen und Bunge gelb. Ropf, Sals und ein Theil der Dberbruft find dunkel blaulichafchgrau oder hell= Schieferfarbig, auf den Bangen braun überlau= fen und hier mit weißlichen Schaftstrichen, am Scheitel und auf dem hinterhalfe verwaschen mit Braun geflecft; die Oberrucken= und Schul= terfedern in der Mitte dunfel fcmarzbraun, mit

breiten hellroftbraunen Seitenkanten, Unterruffen = und Oberschwanzdeckfedern gelblich grau= Die Reble ift immer lichter, als die Ropfgegend; Bruft und Bauch in der Mitte trube weiß, an den Geiten auf graugelblichem Grunde braun geflecft; die untern Schwangfe= dern gelblichweiß, in der Mitte mit einem braun= grauen Langetfleck. Die Flügel haben faft die Farbe des Ruckens; die großen Decffedern ha= ben an den Spigen bellmeiße Fleckchen, die eine Fleckenbinde quer über den Flügel bilden; die jungen Bogel haben deren zwei roftgelbe; die Schwanzfedern find dunkel graubraun, mit lich= ten oder gelblich braungrauen Gaumen.

Mannchen und Weibchen unterscheiden fich Im Berbft find alle Farin der Farbe wenig. ben frifder, im Frühjahr aber matter.

Die Farbe der flüggen Jungen: über dem Muge ein lichter graugelblicher, obermarts dun= kelbegranzter Streif; die Mitte des Oberkopfs dunkel gelbbraun; der hinterhals ichmugig braungelb und ichmarglich geflecht; Ruchen= und Schulterfedern gelblich roftbraun mit schwarzen Langoflecken; der Burgel gelbgrau. Die Reble graugelblichweiß; Ropfgegend, Oberbruft und Seiten des Unterforpere dunkel roffgelb, mit fcmarglichen Langeflecken; die Mitte der Bruft und der Bauch ichmugigmeiß, jede Feder am Schafte graugelblich. Gie maufern jahrlich 2 mal, und zwar im Juli und Auguft.

Diefer Bogel ift in gang Europa verbreitet, am haufigften in bergigen Begenden. Deutschland ift er ein Zugvogel; fein Bug ge= Schieht des Rachte, meift eingeln. Er fommt gewöhnlich im Marg und verläßt und mieder Rur einzelne bleiben mit Ablauf Octobere. auch den Winter bei uns in Garten.

Als Waldbewohner lieben sie das niedrige dichte Unterholz, gleich viel auf Ebenen oder Bergen, vorzüglich Gebirgsmalder, aus laub= oder Radelholz beftehend; auch lieben fie todte Baune, wie die Baunenschlüpfer, und fuchen fie auf. Im Berbft und Fribjahr fieht man fie fast immer auf der Erde herumlaufen und nur fetten laffen fie fich im Freien feben.

Es ift übrigens ein filler, harmlofer und ungefelliger Boget, den fein Aufenthalt, fo wie feine Farbe nicht leicht bemerkbar macht. Geine Locffrimme tont ziemlich weit, boch und hell, Dabei oft etwas ichnarrend: ti, tui, tie oder faft fri, frii oder firri! Gin leiferes Ei, ti, scheint Wohlbehagen anzudeuten, fo wie dagegen ein helles Titu, titu Angst anzus

deuten scheint. der Gefang des Mannchens ift eben nicht unangenehm, und ahnelt dem des Zaunenschlüpfers. Da wo es niftet, singt es sehr fleißig vom Marz bis Ende Juni. — Gefangen, werden sie leicht zahm, in großen Wogelkammern halten sie sich am langsten, ja hier paaren sie sich mit Rothkehlchen, ja selbst mit Buchfinken.

Thre Nahrung besteht in kleinen Insekten und Camereien. Die Jungen werden aber nur mit Insekten aufgefüttert; sehr gern fressen sie Mohn=, Tabak=, Nachtschaftensamen ze. webhalb sie auch gern nach den kleinen Camereien in die Garten kommen. Holunderbeeren sollen

fie aber nicht freffen. In der Gefangenschaft fann man fie mit Mohnsamen recht gut er= halten; sonft freffen fie auch wie die Noth=fehlchen alles, doch halten fie fich am besten, wenn man das Futter der Grasmucke zur Halfte mit Mohnsamen vermengt, ihnen reicht.

Ihr Reft fieht verftecht, und an abnlichen Orten, wie das der Grasmucke, meift nicht unter, und nicht über 4 Tug vom Boden, in einem Fichtenbufchel, Dornbufche, Brombecren= ranfen oder andern durchflochtenen Geffrauch oder Secfe. Es ift außerordentlich fcon, in= wendig tief napfformig- oft einzig und allein von grunem Erdmood gebauet. Die Unterlage befieht meift aus durren Reischen und Pflan= genffengeln, worauf dann erft das Moos folgt. Das Innere ift mit feinen durren Grashalmen, mit Bolle; Saare und einzelnen Federn aues gelegt. Man findet darin 4-6 Gier. gleichen den Giern des Gartenrothling, find aber etwas größer und von einer fehr ange= nehmen blaugrunen oder Grunfpanfarbe." Et= mas furgoval, bald ichon eiformig mehr oder weniger bauchig, gart und glatischalig, etwas glangend. Gie lieben fie fehr und laffen fich ziemlich nahe fommen, machen ce dann aber wie die Grasmucken. - In 13-14 Tagen bruten fie die Gier aus, fo daß die Jungen da nur noch 10 bis 12 Tage im Refte weilen. Die Alten füttern die Jungen mit kleinen Raup= chen und andern Infeften fehr fleißig. Gie follen 2 Bruten jahrlich machen und auch ofters junge Rufufe mit aufziehen helfen.

Selten erwischt die Alten ein Naubvogel, dagegen leiden die Bruten durch Fuchse, Marsder, Stiffe, Biefel, Hoher, Elftern, Burger ze. In ihrem Gefieder finden sich auch Schmaroszerinsekten, auch sollen sie von Pocken befallen werden. — Leicht laffen sie fich schießen und

in Negfallen, wo man fie mit Mohnsamen oder Mehlwurmern anlockt, fangen. Ihr Ge= fang belebt die Balder; ihr Fleisch ift wohl= schmeckend und fett*).

Soldhåhnden. (Regulus, Koch.)

Schnabel: gerade, pfriemenformig, fpit, nach vorn an den Geiten zufammengedrückt, mit fantigem Rucken. Die Rafentocher eirund, oben mit einer Saut umgeben, darüber ein Bederchen, das auf beiden Geiten fammartig ift. Die ziemlich ftumpfen mittellangen Glugel beffeben aus 19 fdmachen Schwungfedern, von benen die erfte flein, die dritte und vierte die langfte ift. Der mittellange Comany ift fcmach ausgeschnitten, aus 12 Steuerfedern beffehend. Das gange Gefieder ift wie bei den Meifen, lang, loder, weitstrichlich, auf dem Ropfe, wo es geffraubt eine Saule durch die verlan= gerten Federn bilbend. Die Farbe an den obern Theilen des Korpers bet allen befannten Urten grun, olivengrun oder braungrun, Die Weibchen haben frets eine weniger ichon ge= farbte Saube, den noch jungen und unvermau= ferten icheint fie bei allen Urten zu fehlen.

Unter den europäischen Bögeln find die Goldshähnchen die kleinsten. Sie leben meist in Nasdelwäsdern und find Zug= und Strichvögel, liesben die Gesellschaft der Meisen, denen sie in Sitten und Lebensart ähnlich sind. Sie leben auch wie diese von Insekten, deren Larven-Puppen und Siern, mitunter auch von Samereien, haben einen hüpfenden Gang, sind sehr gesellig, bauen aber an die Enden der Ueste ihr kunstlisches, ballformiges, oben offenes, warmes Nest, legen 6—12 Gier und bruten meist zwei Mal im Jahre. Mauser jährlich nur einmal.

Alle haben einen prachtigen rothen oder gel= ben Ropfflect, welcher mehr oder weniger durch

^{*)} Bu ben europäischen gebort noch die Bergs Braunelle (Acc. montanellus Fem.) mit schwarzsbraunem Scheitel, Sügel und Wangen; einem breiten, vom Schnabel über das Auge bis ins Genich hinziehenden, gelblichweißen Streifen und schwärzlich gefärbier Bruft; ift 6½ 3. lang und 9½ 3. breit. Wohnt im südlichen Europa und Affen. — Die Alpens Braunelle (Acc. Alpinus Bechst.) Alle Schwanzfedern haben an der Spige einen weißen oder lichtrofigelben Fleck. Kehle des aften Bogels weiß mit ichwärzlichen Muschelfleden, beim jungen weißgrau, ungefledt. Länge 7 3., Breite 13 3.

duntle Seidenfedern bedeeft wird und fich nur bei geftraubten haubenfedern in ganger Schon=

heit zeigt.

Die Zunge ift hart, flach, dunn, faft gleich breit, mit abgestuckter in kurze Borsten zerkerbzter Spige, hinten erweitert, mit starkem, schwach gezähneltem Eckzahn. Die Speiseröhre ift ohne Kropf, der Magen schwachmuskulos. Die Gestarme mittellang mit 2 ganz kleinen, warzenzartigen Blinddarmen. Minimum der Knochenzpneumacität.

Fr. Brehm der so ersinderisch in neuen Arsten zu machen ist, gibt statt der sonst in Deutschsland bekannten 2 Arten, 6 an. Er theilt sie zuerst a) in ungestreifte, dahin gehören: 1) Regul. septentrionalis, 2) R. crococephalus, 3) R. chrysocephalus, und b) in gestreifte, dahin gehören: 1) R. Nilssonii, 2) R. pyro-

cephalus 3) R. brachyrhynchos.

Das feuerfopfige Goldhahnden. (Reg. ignicapillus N. R. pyrocephalus Breh.)

Heber den Augen ein weißer, durch fie ein fdmarger Streif. Die erfte und genaue Be= schreibung als eigne Urt haben wir der Bemui= hung des Brn. Brehm zu verdanken. niedlichfte und fleinfte Urt unter den Bogeln Deutschlande, unterscheidet fich von den übrigen Arten deutlich durch eine andere Farbe des Mittelscheitels, durch die hellere, grunere Diuf= fenfarbe, durch feinen fleinen, fcblanten Ror= per und durch den etmas größern Schnabel. -Es ift nur 34 - 33 3. lang, die Flugelbreite 6-61 3., Lange des Schwanzes 14 3. bis 1 3. 51 Linien. Gein Bewicht beträgt felten über 14 Quentchen. Rach allen diefen unfer deutscher Colibri. - Der Schnabel ift bei 211= ten 3 Linie, bei jungeren nur 3 Linien lang. Rachen und Bunge orangengelb, das Rafenloch flein, oval, die fanimartige Feder, die es bedecft, gelblich oder rothlich hellbraun. Der Uu= genftern dunkel rugbraun. - Das alte Mann= chen ift ein fehr niedlicher Bogel. Gine Urt Federbusch bilden die fich erhebenden Federn des Dberfopfes von brennend orangefarbe, oder hoch feuergelb fast einen feuerrothen Streifen bildend, fchmal an beiden Geiten hochgelb begrangt, dann aber wieder von einem fammetschwarzen Streifen begrangt, sowohl quer über die Stirn, als zu beiden Geiten, bier nur viel breiter als dort eingefaßt; die Bugel und ein Strich durch das Auge fcmarz, auch noch ein Fleckchen hin=

ter dem' Ohr; die Wangen aschgrau; ber gange übrige Oberforper fcon olivengrun oder fcmu= gig zeifiggrun. Alle untern Theile gelbbraun= lichweiß, auf der Mitte der Unterbruft und am Bauche am blaffeften. Die Flugelfedern fammtlich braunlich fcmarggrau; auf den Flus geln 2 weiße Querbinden, von den Federfaum= chen gebildet. Die Schwanzfedern matt braun= Un alten Weibchen ift die schwärzlich. — Feuerfarbe des Scheitels um vieles matter, ei= gentlich bloß ein rothliches Sochgelb, die es begrangenden fdmargen Streifen find merklich fcmaler und matter fcmarg; am Unterleibe mehr graulich als gelblich, am Oberforper we= niger grun und an den Salsseiten meniger gelb. - Jungere Mannchen feben ben alten Im Frühlinge sind Weibchen fehr abnlich. alle Farben etwas matter als am frifden Berbft= fleide. 3m August ift die Hauptmaufer.

Man findet diefes Goldhahnchen in Deutsch= land und in der Schweig nur einzeln; in Bel= gien und Franfreich aber gahlreicher. Bei uns ift es ein Bugvogel. Gein Beggang erfolgt im September und October, feine Ruckfehr im Marz und April. Rie zieht es in Heerden, wie das gelbfopfige Goldh. ofters aber in Be= fellschaft deffelben oder der Meifen und Baum= Gie mandern des Rachts und ffreifen am Tage gewohnlich in einem weit fleineren Umfreise umber, als das bei uns gemeine gelb= fopfige Goldhahnden. — Auf ihrem Buge fin= det man fie in Radelmaldungen, auch in ge= mifdten Bolgarten, in Garten und Gebuichen. In den Commermonaten fieht man fie, wie jene, mehr in den Kronen hoher Baume, als im niedrigen Gebufch. - Hebrigens ift es ein unruhiger, gemandter und hurtiger Bogel, in fieter Bewegung. Gie ziehen einzeln oder paar= weise; im legten Falle scheinen fie Jahr aus Sahr ein ungertrennlich zu fenn, Denn ichieft man eins davon, fo gebehrdet fich das andere fehr angfilich und fucht lange Beit den gelieb= ten Gegenstand unter heftigem Locken, ehe co die Gegend verlaft. Es ift indeffen auch fcuch= terner als das gelbkopfige Goldhahnchen. Geine Locfftimme ift ein feines, fcnarrendes Si fi fi oder Gri fri fri! 3m Forthapfen laft es beständig ein leifes, feines Bit oder Sit horen. Gelbft fingend ift es in ffeter Bewegung, ftraubt dabei feine fcone Saube auf, und hupft flatternd von Zweig zu Sweig. Will man fie halten; fo muß man mehrere zu gleicher Zeit fangen, wo fie fich dann beffer gewöhnen. Unfänglich gibt man ihnen Umeisfenpuppen mit untermengten halblebendigen Fliegen, dann etwas vom Nachtigallfutter, wosran sie sich denn nach und nach gewöhnen; gequetschter Hanfs und Mohnsamen befommt ihnen auch wohl, doch nicht Nübsamen unde Leindotter, der sie tödten soll. Im Freien fresfen sie sleine Räferchen, Mücken, Blattläuse und andere ähnliche Insesten nebst ihren Larzven, die sie hüpfend und flatternd aufsuchen.

Gie niften bin und wieder in Deutschland in Nadolmaldern, die meift aus Sannen und Fichten bestehen. Das Refichen ift fehr funft= lich an die dichtstehenden, dunnen, herabhan= genden Nadelzweige befestigt, fo daß es bei= nahe in der Schwebe hangt, indem mehrere der hangenden Zweige in feinen Banden mit dem Reftmaterial febr feft umwiefelt find. Es ift zwar ballformig, doch ftets langlichter und am Boden fpitiger ale bas des gelbfopfi= gen*), von außen meiftens von grunen laub= moofen, mit einzelnen Baumflechten und trocf= nen Salmchen untermenat, und mit Infeften= gefpinnft fo verwebt, daß das Gange ein recht haltbares Gemebe bildet. Im Innern fehr weich mit Reh=, Safen= und andern Saaren der Waldthiere, fo mie mit Federn von Daben, Bebern, Droffeln zc. ansgepolftert. 21m Rande ift es fo nett noch mit Federn ausgelegt, daß diefe fich alle nach dem Mittelpunfte der Deff= nung, die ftete oben ift, neigen und diefe da= durch fehr verengen. Diefen fo kunftlichen Bou fuhrt allein das Beibeben aus, das Mannden thut dabei weiter nichte, als daß es beim Busammenholen der Materialien, wie bei ihrer Berarbeitung, fein ungertrennlicher Begleiter ift, und es mit feinem Befang un= terhalt. - Die niedlichen Gierchen find von der Große einer Erbfe, von einer etwas fpigi= gen Form, über der Mitte etwas bauchig, bald langlicher, bald furger, ungemein garticha= lig, fehr zerbrechlich, glatt, doch wenig glan= gend. Ihre Grundfarbe rothlichmeiß oder blag= fleischfarbig; meift nur am flumpfen Ende mit

einem matten Gelbgrau und Graugelb fehr fein befprift und bepunftet, selten schwach gewolft, 6-8 in einem Refte. Gewöhnlich machen fie jahrlich zwei Bruten, wovon man im Mai und Unfangs Juli die Gier findet. Gie lieben ihre Jungen fehr und die fleine Familie bleibt lange beifammen. -Schmarozerinfeften auch in ihrem Gefieder. Die Ulten merden öfters eine Boute des Sperbers und ahnlicher Rauber. Die Brut leidet von Rraben, El= ftern, Hehern und Burgern. Bei ihrer Un= rube find fie ichmer ju fchiegen. Um beffen fangt man fie auf Bogel = und Tranfbeerden im Balde, auf Biefen, Suten, in Rloben und Sprenfeln zc. auch wenn man felbft ein gelb= fopfiges Goldhahnchen in einem Bauer als, Lock= vogel braucht und auf diefe Leimrüthen legt. -Sie vertilgen eine große Menge schadlicher Blue then = und Knoepeninseften; erfreuen durch ibr Betragen und Gefang in der Gefangenichaft und geben auch ein mohlschmeckendes Gleifch.

Bu diefem Geschlecht gehören nach Cuvier noch mehrere Urten, wovon auch noch 4 Urten ju Deutschlands Bogeln gehoren und die Fa= milie der Laubvoget (Phyllopseustae) bilden. Schmadlich fleine Fuße, dunne, pfriemenfor= mige, lichtgefarbte Schnabel, gerade oder doch menig ausgeferbte Schmange haben. hauptfarbe ift grunlich. Ueber das Huge gieht fich ein lichter Streif. Gie halten fich in be= laubten Baumen, wie im Gebufche auf. Ihre Rahrung befreht aus fleinen Blatterinfeften und deren Carven. Beeren freffen fie nur felten. - Gie niften im Gebufch, meift auf der Erde, bauen febr funfiliche oben überwolbte Mofter, mit einem engen Gingange gur Geite, und legen weiße, rothlich punftirte Gier; nur eine Urt meicht davon ab, bauet ein tiefes napf= formiges Reft auf Bufche oder Baumchen und legt rothliche, fcmarglich punftirte Gier.

Der Garten = Laufvogel, gelbbauchiger Sanger. ([M. R.] Sylvia hypolais. Path.)

Bon oben grüngrau, von unten blaßschwesfelgelb; die hintern Schwungsedern mit weißsgrauen Kanten; die Füße lichtblau. Die größte unter den einheimischen Arten, $5\frac{1}{2}-5\frac{3}{4}$ 3. lang, Flügelbreite $9\frac{1}{2}$ 3., Schwanz 23. lang, der Schnabel 6 L. lang. Die Iris der etwas großen Augen iff dunkelbraun. Die obere Seite der Stirne, des Scheitels, Rückens 20., grüns

^{*)} Das gelbköpfige Goldh., (Reg. flavicapillus N.) Die Stelle um das Auge ift graumeis. Es ist größer und hat auch einen kleinern Schnabel als voriges. Es gibt welche von 3 3. 6 L. Länge bis ju 4 3., und von $6\frac{1}{4}-6\frac{7}{8}$ 3. Breite. Die Scheitelsedern des Mannchens has ben eine ichöne Drangenfarbe. Es ist bei uns die gewöhnliche Art, und hat mit dem Vorigen vieles gemein.

grau oder bleich olivengrun, vom Rafenloche gieht fich ein licht fchmefelgelber Streif uber bas Huge bin; Bugel und Ohrengegend grau; die untern Theile des Korpers blaß fcmefelgelb. Mannchen und Weibchen find wenig von einander verschieden. Das erfte Rleid der Jungen ficht faft eben fo aus, wie das der alten. Man trifft Diefen Bogel in gang Europa, bei und ift er gemein. Gie fommen meift erft gu Ende des Uprile und ziehen im Muguft wieder weg. Laubholzwaldungen mit dichtem Unter= bolg liebt er vorzüglich; findet fich auch gern in Garten, die viele Baume und niederes Be= buifch haben ein, liebt daher auch englische Gar= ten, und Bosquets; auch ift er gern in der Nabe menfchlicher Wohnungen. Es ift ein au= Berft lebhafter, gewandter, liftiger und icheuer Bogel, dabei fo gartlich und meichlich, als faft fein anderer. Er ift fast immer in den belaub= ten Baumen, felten befucht er die Erde. -Seine Lockftimme ift ein ichnalgendes dach, dach. dack derahd, dackerahd oder dackderaed! daber der Rame Chacfruthchen. Das Mann= chen fingt febr fcon und fleißig. Es blagt da= bei die Rehle auf und' erhebt dabei die Ropffe= dern zu einer Solle. Es ahmt auch bisweilen die Tone anderer Bogel mit nach, die es in fei= nen Gefang mit einmischt. Ihre Futterung und Saltung foffet viel Muhe, denn wenige nur ertragen das Joch der Gefangenschaft.

Sie leben von fleinen flegenden Insesten, die sie in dem belaubten Baumen aufsuchen; als: Fliegen, Mucken, fleine Nachtfalter, fleine Rassferchen, Spinnen ze. Reife Rirschen, besonders die frühen Sorten sucht er auf, auch Ichansnisbeeren, Holunderbeeren u. dergl. besucht er, besonders bei seinem Wegguge. Will man die Gefangnen am Leben erhalten, so muß man ihnen anfänglich Fliegen und Ameisenpuppen einstopfen und damit so lange fortsahren, bis sie selbst and Futter geben, was mit Fliegen und lebendigen Mehlwurmern gemengt senn muß; auch nuß dieser Bogel täglich frisches Wasser zum Trinken und Baden haben.

Ihr Neft legen sie 6—8 Fuß hoch von der Erde an, selten bis 15 Fuß. Es steht ziemlich frei, oft nur durch das Laub versteckt. Uebrisgens ist es recht nett, dicht und dauerhaft gesbauet und gut an den Gabelzweigen oder fleienen Uesten der Baumchen befestigt. Die Masterialien sind sehr zarte, treckene Halmchen und abgestorbene Grasblatter mit Puppenhulsen, Raupengespinnst und Spinngewebe sehr dicht

und fest durchfilgt. Deftere Camenwolle von Weiden und Pappeln, auch Thierhaare, Berg; find Birfen in der Robe, fo mird die außere, garte, weiße Chale derfetben fo eingewebt, fo daß ce von Papierfchnigeln verfertigt zu fenn scheint. Das Inwendige ift größtentheils blos mit feinen Salmden und garten Grasrispen ausgepolftert. Ende Maies findet man meift erft das Reft mit 4-5 Giern, fie find gart= fchalig, wenig glangend und es fteben auf ro= fenrothem Grunde feine und grobere rothlich= fcmarge Puntte. Fleischfarben wird indeffen die Grundfaibe nur dann, wenn fie fart bes brutet find. Das Parchen brutet fie mechfeles weise in 14 Tagen aus. Das Mannchen brutet meift von Mittag bis gegen Abend, die übrige Beit das Beibchen. Die Jungen werden mit fleinen Infeften und deren Larven groß gefut= tert. Es find fleine Refthocker, die das Reft nur verlaffen, wenn fie fast gang groß und fo ftarf wie die Alten befiedert find. Gie bruten nur einmal im Jahre. - Gelten ermischt ein Raubvogel die immer im Laube der Baume fich aufhaltenden Alten. Mehr leiden die Jungen von Mardern, Ragen, Baldmaufen, Elftern, Behern und Burgern. Man erlegt fie mit Flin= ten und Blaferobren und fangt fie bisweilen in Sprenkeln und auf dem Tranfheerde. Nuben besteht in ihrer Nahrung, indem sie viel Bluthen = und Rnofpenfeinde unter den Infef= ten freffen. Ihr Gefang ift fehr angenehm.

Unmerf. Rurz gedenfen wir noch der 3 ubrigen, die bei uns wohnen:

1) Der Baldlaubvogel (Sylvia sibilatrios Bechst.) Der Oberleib gelblich graugrun, Borderhals und Geiten der Dberbruft lichtgelb, der übrige Unterleib rein weiß; die Bugel und ein Strich durch das Muge fcmarglich; die untern Flügeldeckfedern am Flügelrande hellgelb, grau gefleckt; Fuße ichmutig rothlichgelb. Die erfte Schwungfeder fehr flein und furg. Die ruben= den Flügel decken den Schwang bis auf 1 3. Das Gefieder ift feidenartig weich, febr fein, und die Schmangdedfedern oben wie unten find fo lang, daß fie 3 von der Lange der Schwang= federn bedecken. Die Lange ift 5 3., die Glus gelbreite 9 3. Er liebt die Nadelmalder und ift ein Zugvogel. Sat die Nahrung des vorigen. Sie bauen niedrig und fehr verfiecft. Man fin det im Nefte 5-7 Cier, die furz oval, faft rund find. Gie haben eine fehr garte, glatte aber nicht glanzende Schale; auf einem weißen Grunde mit Punkten und kleinen Flecken von einer ichwarzlich violetten Purpurfarbe überfaet, am frumpfen Ende oftere einen Kranz bildend. Wenn im Fruhjahr ihr fonderbarer Gefang erstont, ift fortdauernd gut Wetter zu erwarten.

2) Der Fitis=Laubvogel (Sylvia trochilus Lath.) Oben grunlichgrau, unten gelblich= weiß; die untern Flugeldeckfedern am Blugel= rande-fcon fcmefelgelb; die Bangen gelblich; Buge gelblich fleischfarben. Die erfte Comung= feder ift fehr flein, furz und fcmal. Die ru= henden Flugel decken den Schwang bis auf einen Boll. Das Gefieder ift weich wie Geide. Lange 45 - 47 3., Flugelbreite 73-8 3. Er ift fehr gemein, gieht des Nachts, fommt im Marg und gieht im August wieder fort. Es ift ein achter Waldvoget, der am liebsten in den Laub= malbern lebt. In Stuben fangen fie die Flie= gen weg. Ihre Nahrung haben fie mit der vorigen gemein, doch freffen fie im Berbft auch Beeren. Gie trinfen viel und baden fich gern. Ihr tief febendes Reft auf der Erde ift febr gut versteckt, es ift oben überwolbt. Gehr haufig findet man in ihren Reftern Rebhahnerfedern. Ende Aprils findet man darin 5 - 7 Gierchen, die an einem Ente fart abgerundet, am an= dern dagegen merklich fpibig find. Gie haben eine zarte Schale, glangen etwas und find auf gelblichweißem Grunde mit heller Roftfarbe befpritt und punktirt. Bisweilen find auch Punfte und Strichelchen über die gange Glache verbreitet. Gie find in Sprenkeln, Schlingen und mit Leimruthen leicht ju fangen. fang ift fehr angenehm.

3) Der Beiden-Laubvogel (Sylv. rufa. Lath.) Oben ziemlich braungrau, unten schmu= big weiß, an den Seiten gelblich; die Bangen braunlich; der Flügelrand blafgelb; die Fufe braunschwarz mit gelben Coblen. Die erfte Schwungfeder fehr flein und fcmal. Die ru= henden Blugel deifen den Schwang bis auf eis nen Boll. Ift nicht viel größer als ein Gold= bahnchen. Lange 41 - 43 3., Elligelbreite 7 Alls Bugvogel fommt er ichon im --8 3. Marg bei und an, und zieht im October wieder fort. Man findet fie in Laub= und Radelmal= dern bei uns an. Das Mannchen fingt fleißig, doch ift fein Befang nicht fcon. Gie geben oft gur Trante und baden fich gern. Gie lieben Die Beiden und durchflattern fie gern. Rahrung ift die der vorigen Laubvogel. Ihr Reft ift bacfofenformig, oder oben übermolbt, fo daß der Gingang auf der Seite ift. Sie ha=

ben 5—6 Eier, von etwas kurger Gestalt, an einem Ende merklich spiger, sie haben eine zarte, wenig glanzende Schale und auf einem hellweisen oder gelblichweißen Grunde sehr kleine Fleckschen und Punkte von einer schwarzlich rothe braunen oder purpurbraunen Farbe, welche am dicken Ende dichter stehen, sich auch wohl kranzartig häusen. Sie brüten beide Gatten wie die vorigen in 13 Tagen aus. Sie machen jahrelich 2 Bruten.

Schlüpfer. (Troglodytes. Koch.)

Schnabel: langlich, doch furger ale der Ropf, etwas gebogen; dunn, pfriemenformig, an den Seiten etwas jufammengedruckt, ber Rucken fantig. Flugel: furg abgerundet, febr gewolbt, mit fabelformig gebogenen vorderen Schwungfedern. Schwang: feilformig oder febr zugerundet und furg. Rorper: furz, rundlich, mit weichen, langen, etwas lockern oder weitstachlichten Federn befleidet. Es find fammtlich fehr fleine Bogel, welche an Geffalt und Farbe fich ungemein abnlich find. Bei al= len ift ein rothliches oder roftiges Braun die Hauptfarbe; alle haben einen rothlichbraunen, dunkelgemafferten Diucken; alle einen jugerun= deten rothlich rofibraunen, mit schwärzlichen Wellenlinien burchzogenen Schwang, alle gang gleichgezeichnete Schwungfedern; fo daß unter den Urten diefer Gattung eine große Ueber= einstimmung herrscht. Den aufgerichteten Schwang tragen fie immer aufrecht. In Deutsch= land haben wir nur folgende Urt.

Der Zaun=Schlupfer, Zaun=, Winter=

(Troglody. parvulus. Koch.)

Die mittlern Flügeldeckfedern haben an der Spige einen großen weißen Punkt; eben so die untern Schwanzdeckfedern, oder doch weiße Epigen. Dieses kleine niedliche, kecke Bögelten ift, da es fast überall vorkommt, sehr bestant. Seine Lange beträgt 3\frac{3}{4} - 4\frac{1}{4} 3., die Flügelbreite 6 - 6\frac{1}{4} 3. Die ruhenden Flügel becken den weichsedrigen, sehr zugerundeten 1\frac{1}{4} - 1\frac{1}{3} 3. langen Schwanz, dessen Federn an der Seite um ein Merkliches kurzer sind als in der Mitte. Der 5 Linien lange Schnabel ift langlich, schwach, aber hart, etwas gebogen, von den Seiten merklich zusammengedrückt,

vorn pfriemenfornig spiß, oben und an ber Spige braunschwärzlich, der Raden fleischfarsben. Das Rasenloch sehr schmal; die Fris dunkel nußbraun. — Das Gesteder ist im Ganzen an den obern Theilen rostbraun, mit etzwas dunkleren Querfreischen gewässert. Sin brauner Strich zieht sich durch das Auge, bis zur rostbraunen Ohrengegend. Die Oberbrust ist rostbraunen Ohrengegend. Die Oberbrust ist rostbraunlich weiß; die Unterbrust, Seiten und Bauch blaß rostbraun, mit dunkelbraunen Wellen durchzogen. Männchen und Weibchen unterscheiden sich nur sehr wenig. Im Juli und August mausern sie sich und sind daher in den beiden folgenden Monaten am schönsten.

Dieses Bogelchen fommt in gang Europa vor, doch häufiger im nordlichen, als im fudli= chen Theile. In Deutschland ift es ein Stand= und Strichvogel. Gegen frenge Ralte ift er gang gleichgultig und immer bei guter Laune. Seine Strichzeit ift im Berbft der October, im Fruhjahr der Marg; dann sieht man ihn an folden Orten, wo er im Commer nicht an= getroffen wird. Geine Reifen verrichtet er bes Rachts. Ulte Parchen bleiben meift das gange Sahr hindurch an demfelben Orte, und entfer= nen fich kaum 1 Stunde weit von ihrem Brut= orte. Ueberall mo dichtes Buichwerf machft, dichted Gestrupp, Bache. Quellen und Aluffe fich befinden, da ift fein liebster Aufenthalt. Gern halt er fich bei Dorfern und Stadten auf, wenn nur in den Garten wildes Bufch= werk nicht fehlt. Sodte Baune liebt er fehr, baber die Ramene Baunenkonig, Baunen= fcnurg ic. Gern durchfriecht er, immer nied= rig fich haltend, Decishoffhaufen, Bolgftofe, Butten in ben Baldern, Rahrung fucbend. Sein Bang ift hupfend, und bei ftrenger Ralte, wenn unfere Sperlinge traurig aussehen und ihr Gefieder frauben, durchfriecht er behaglich im Biederschein der Gonne fein Liedchen pfei= fend, Baune und Holiftoffe. Er hupft so fchnell, daß man eine Maus laufen gu feben malnt, dabei die Bruft tief gebeugt tragend. Stoft ihm aber ploglich etwas auf, fo macht er ichnell Bucklinge und wirft den Schwanz hoher als gewohnlich; er hat ein fehr munte= res, fectes Unfebn, ob er gleich den Sals im= mer fehr eingezogen tragt und fein Rumpf eine fugelformige Geftalt dazu annimmt. Er befist auch einen Grad von Reugier, die ihn alles in der Rahe zu besehen verleitet, mas man oft auf Bogelheerden und auf dem Meisenfang zu beobachten Gelegenheit hat. Er ift firre und zutraulich, fo lange er fich nicht verfolgt fieht. Gein Flug ift schwerfallig und auf freien Fla= chen verfolgt, verbirgt er fich in Mauers, Baum= und Maufelocher. Geine Stimme, die er oft horen lagt, ift ein verschieden mo= dulirtes: Brg, grg! der eigentliche Lockton flingt: Berrrrrrr; man bort ihn besonders des Abends in der Strichzeit, beim Untritt der nächtlichen Wanderung; oder auch wenn man sich den Jungen nabert. Der Gesang des Mannchens ift febr angenehm, und fo ftart, daß der, der es noch nicht weiß, einem fo fleis nen Bogel schwerlich eine folche Starfe, des Sons gutrauen mochte. Er fingt ichon im Januar und Februar fleißig; am meiften und lauteften aber im Marg und Mai, vorzüglich in den Frühstunden, wobei er gewöhnlich et= was boch auf einem burren 3weigelchen fitt. Den Berluft der Freiheit ertragen diefe Bogel nicht lange. In den Stuben verfriechen fie fich bald, flemmen fich hinter Schrante und dergl. und fommen fo bald um. In einem engen Bogelbauer laffen fie fich noch am befren erhalten, darin muß man aber noch ein Saus= chen mit 2 Löchern anbringen, worin fie fich bei Gefahren, die fie fürchten, flüchten konnen, fonft fterben fie noch ichneller.

Die Ratur scheint ihnen vorzüglich Spinnen, kleine Insektenlarven, Puppen und Infekteneier zur Nahrung angewiesen zu haben.
Im Sommer hat er daran lleberfluß, im Winter aber nähert er sich den Wohnungen und
sucht auf Boden, Strohdächern, Ställen, Rellern und Gartenhäusern, die hier im Winterschlafe liegenden Infekten auf. Gegen den

Berbft frift er auch Beeren.

Das Neft legt er bald hoch, bald tief an, in Strohdachern, unter Dachsparren, in Mauersspatten, Beisighaufen, Holzstoßen ic. stets an duftern Orfen. Ihr Nest gehört unter die Kunstlichsten, es wird von einer so großen Menge Materialien erbaut, daß die Bogelchen, ist die Witterung nicht ganz gunftig, über 2 Wochen baran bauen. Grunes Moos enthalsten alle, die übrigen Materialien sind aber sehr verschieden. Die außere Lage besieht meist aus durrem Laube mit untermengten groben, trocksnen Pflanzenstengeln und seineren Halmen, dann eine dichtgesilzte Lage von grunem Moos, dann als Ausfütterung eine Menge meist großer Federn von Gansen, Hühnern, Lauben und andern Bögeln. Für das Bögelchen ist es sehr groß, über 7 3. hoch und 5½ 3. breit; es ist

vollig eiformig gerundet, nur an der Geite, wo fich das Gingangsloch befindet, etwas platt, unten fdmal zugerundet, oben abgeplattet und merflich breiter, der ziemlich weite runde Gin= gang an einer Geite gang oben, das Gemolbe über demfelben besonders dicht und schon gefist. Die Gier findet man in der 2ten Salfte des Uprile, nach der Mitte des Maies aber flugge Junge. Die 6-8 Gier find furg oval, in der Mitte fehr bauchig, an einem Ende merk= lich abgestumpft, am andern etwas fpig, die Schale wenig glangend, febr gart, fo daß der Dotter etwas durchscheint. Gie find meift rein weiß, felten gelblichmeiß und haben mehren= theils nur gegen das frumpfe Ende feine Dunft= den von rothbrauner oder blutrother Farbe, die oftere auch eine Urt von lofem Rran; bil= den, zuweilen aber auch gang fehlen. Gie ha= ben einige Uchnlichkeit mit den Giern der Mei= fen und Baumlaufer, und variiren fehr. 13 Tagen bruten fie beide Gatien aus. halten das Reft ungemein rein, indem fie den Unrath der Jungen forgfaltig wegschäffen. Es find febr forgfame Eltern, welche die fleinen Refthocker mit Infetten und Infettenlarven auffüttern. Ausgeflogen halten fich die Jungen auch noch gern zusammen und sigen oft auf einem Durren Reischen alle neben einander. Stort man fie hier, fo verfriechen fie fich fo fonell wie die Maufe, im Zaune oder im alten Moofe zwischen den Stammen. Gie follen nur eine Brut machen, mas durch die Beit, die fie auf den Reftbau, fo wie auf die lange Fütterung der Jungen verwenden, mahrichein= lich wird. Buweiten legt auch der Rufuf ein Ei in ihr Reft. - Comaroberinfeften moh= nen auch in ihrem Gefieder, fo wie Gingeweid= wurmer in ihrem Innern. Gelten erwijcht ein Raubvogel diefe fleinen, lebhaften immer im Dieficht und Geffrauch lebenden Bogel; defto mehr leidet ihre Brut durch Roben, Marder, Biefel, Ratten und Maufe, felbft durch Rras ben, Elftern und Beber großen Berluft. Leicht erlegt man fie mit der Flinte und dem Blafe= robr. Fangt fie auch leicht auf Meifenfloben, indem man den Bram einer Pelimuge oder dergleichen aus der Meifenhutte ichiebt, mo fie bann um es naber ju feben, fich auf den Ric= ben fegen und gefangen merden; auch fangen fie fich in Sprenkeln mit vorgehängten Holun= Im Binter in Umeifenfaffen mit derbeeren. Mehlmurmern. Gie vertilgen eine große Menge beschwerlicher und schadlicher Infeften, auf Boden die so schädlichen Kornwurmer, und suchen die Spinnen auf, selbst die beschwerlichen Hosnigs und Wachemotten und deren Larven. Dieser Bogel ist immer in Bewegung und verstigt bei seinem guten Appetit und bei seinem geringen Gewicht von 3 Drachmen, viele der genannten Insesten. Seinen angenehmen Gestang, der, wenn er recht laut ertont, auf Wetterveranderung deuten soll, liebt der Landsmann sehr. — Daß er ein Bienenrauber sey, wird von vielen wohl mit Necht geleugnet.

Nach Euwier folgt nun das Geschlecht der eisgentlichen Bachftelzen (Motacilla Bechst.) Sie verbinden mit einem noch dunnern Schnabel, als der der Sanger ift, einen langen Schwanz, den sie unaufhörlich auf und nieder bewegen, haben hohe Fuße und ziemlich lange Schulterfedern, welche die Enden der zusammengeschlagenen Flügel bedecken. Auch hier sind einige Unterabtheilungen gemacht.

a) Eigentliche; (Motacilla Cuv.)

Die Rrallen ihres Daumens ift noch gebos gener wie bei den andern Cangern. Gie les ben an Ufern der Gemaffer.

Die weiße Bachftelge, Wippfforg, Etiftefraulein. (Motac. alba. Linn.)

Die 2 außerften Schwanzfedern find großtentheils weiß; die untern Comangfedern und der Bauch weiß; ber Diucken afchgrau und der Burgel fcmarggrau. - Ihre Lange beträgt 71 - 73 3oll, wovon der am Ende gerade Schwang 32 3. wegnimmt, die Flügelbreite bes tragt 113 - 121 3. Der ziemlich geftrectte Schnabel ift 1 3 lang; an der Wurzel 21 2. breit, aus und inwendig fcwarz; der Augen= ftern dunfelbraun. Um alten Dannchen, in feinem Sochzeits = oder Commerfleide fieht man nur 3 Sauptfarben: Beif, Ufchs grau und Comary fehr fcon vertheilt. Bir übergehn ihre Bertheilung gen euer anzugeben, da dies Bogelchen allenthalben befannt ift. Die alten Beibehen feben ihren Mannchen ziemlich abnlich. Dur das fleine Befieder ift in einem Sahre einer doppelten Maufer unterworfen. Das Herbst= oder Winterfleid ift bei ihnen ziemlich vom Sommerfleide unterschieden.

Un febr alten Mannchen find bann Stirn, Borderfopf, die Mugen's und Ohrengegend, Bangen, Salsseiten, Reble und Gurgel fchnec= weiß, am Ropfe mit einem iconen, hufeifen= formigen, fammetichmargen Bleck wie mit ci= nem Ringfragen geziert. Alle übrigen Farben find wie am Commerfleide. Im Win= terkleide ift bei den Jungen der ganze Ober= fopf gelblich afchgrau und die Bugel weißtich gelbgrau. Die Sauptmauser ift im Muguft und September, mo felbft Schwung= und Schwang= federn mechfeln. Wenn fie zu uns fommen, ift das Winterfleid meift gang abgelegt. man dies alles mußte, hat man eine neue Urt ous den Jungen gemacht, unter dem Ramen Motac. cinerea. Indeffen giebt es unter ihnen manderlei Barietaten, als: gang weiße, blaffe 2c.

Hebrigens findet man diefen Bogel in al= Ien Theilen Europas. In Ufrifa follen fie jum Theil überwintern. 218 Bugvogel gehort fie ju benen, welche nur wenig Monate abwefend find. Gie fommen ichon im Marg und gichen im Geptember wieder ab. Gie find halb Feld= und halb Strandvogel. Gie lieben die Rabe der Menschen, daber trifft man fie haufig bei Dorfern und den Umgebungen der Stadte, bes fonders wo Baffer und wo Solz aufgeschich= tet ift. Besucht auch gern Biebtriften, folgt auch dem Pfluge nach. Im Fruhjahr besucht fie befonders die lifer, im Berbft dagegen die Thre Nachtruhe halten fie gern auf Felder. Baumzweigen, als auf Ropfweiden, Erlenzweis gen zc. Gern mablen fie dazu auch die Schilf= teiche, worin fie des Rachts ruben. Gie gie= hen, wie die Schwalben in herden meg, wozu fie fich ordentlich versammeln.

Die Bachftelze ift ein fehr lebhafter Bogel, immer in Bewegung, theils fucht fie Nahrung auf, theils neckt fie andere Bogel, jagt fich mit ihres Gleichen herum, verfolgt vorüberflie= gende Raubvoget, badet fich ze. Gie lauft im= mer Schrittweis und ungemein fcnell. Da, mo fie nabe um Menschen wohnt, wird fie fehr gutraulich und firre. Ihr Lockton ift ein ge= jogenes helles zinit-jujit, - binif. Das Mannchen fingt auch febr fleißig figend, lau= fend und fliegend, flingt aber eben nicht ichon. Um meiften tarmen fie an den Platen, mo fie zur Rube geben. Gie find leicht zu gahmen, halten fich doch beffer in der Ctube, als im Bald geht fie dann an den Rapf mit Baffer und nimimt das hingelegte Futter an. Mit bem Baumpiper follen fie fich in ber Ctube gut vertragen, ja fich fogar begatten.

Ihre Rahrung beffeht in fehr verschieden= artigen Infeften, deren Larven und Puppen, die fie bald auf dem Schlamme, Riefe und zwischen den Steinen an Baffern und Teichen, Graben ze. bald auf den Miftfratten bei Bieh= beerden und auf den Triften, bald auf frifch gepflügten Mectern fuchen. Die Befangenen muß man baber anfanglich mit Dehlmurmern, Fliegen und Umeisenpuppen, an ein Universals futter gewöhnen. Gern fangen sie die in den Stuben befindlichen Fliegen mit vieler Gefchicf= Gie baden fich gern. 3hr Reft brin= lichfeit. gen fie gern nicht weit vom Baffer an, meift immer in einer Sohle, in Ctein= und Solz= haufen, bohlen Baumen, an Muhlgebauden zc. Das Reft bauen beide Batten, doch ift das Beiben dabei thatiger, es beffeht aus schlecht verflochtenen Materialien: aus durren Reischen, Grashalmen, Etroh, Moos 20.; das Innere aus Bolle, Rubhaaren, Schweinsborften, Pferdehaaren und dergl. Die Gier, 6-7 an der Bahl, find mehr rund als oval, meift fehr bau= dig, haben eine garte, glatte aber nicht glan= jende Chale. Der Grund ift ein blauliches Beiß, bald rein, bald schmußig, letteres ent= fteht mehrentheils durch eine Menge fein licht= grauer Punfte, die feinem diefer Gier gang feb= len und felbft bei den weißeften fich menigftens am frumpfen Ende finden; oft find auch noch fleine Fleckchen, fleine und febr feine Punfte und Strichelchen von einem rothlichen Grau= braun, in geringer ober großerer Menge über die gange Flache verbreitet, am frumpfen Ende am baufigsten. Co variiren fie auch in Form und Farbe, doch bleiben fie der Sauptform fo treu, daß man fie nicht leicht verfennen fann. Binnen 2 Bochen werden die Gier ausgebril-Das Reft verlaffen fie nicht eher, als bis fie fliegen fonnen, wo fie dann die Eltern begleitend, noch gefüttert werden. Gie bruten jahrlich 2 mal, und besuchen gern den Ort wieder, mo fie das vorige Jahr maten, doch mabten fie nicht diefelbe Sohte wieder. Kon= nen die Jungen fich felbft ernahren, fo befu= den fie bie Bichtriften, mo man fie dann in Menge mit den getben Bachfielgen und Staa= ren in Gefellschaft antrifft Oft muffen fie die Pflegealtern eines jungen Rufufs merden*).

⁹⁾ Bwei Jager, die auf die Jagd gingen, trafen fpat im November bei Froft und rauher Wittestung, eine einfame Bachftelge am Ufer eines

Gie lieben ihre Jungen fehr, marnen fie bei jeder Gefahr, laffen fie nicht aus den Mugen und be= : schützen fie. Rur felten ermischt ein Raubvogel einen alten Bogel. Indeffen leidet die Brut durch Raben, Marter, Iltiffe, Biefel und Ratten, Die oft auch einen Alten auf dem Refte mit fangen. - Much sie plagen Schmarogerinseften und Eingeweidwurmer. Im Fruhjahr und Com= mer fann man' fie leicht mit Blaferobren erles . gen, im Berbfte find fie icheuer. In einigen . Wegenden fangt man fie auf einem eigende bagu eingerichteten Bogelheerde in ziemlicher Menge, fonft auch am Baffer oder auf Difffiatten, wenn im Fruhjahr noch Schnee gefallen, und man diefe Stellen davon reinigt und Leimru= then oder fleine Repfallen mit Mehlmurmern verfeben, binfiellt, fo wie auch in Laufichlin= gen. — Der Landmann liebt fie befonders, indem fie zuerft als Berkundiger des Frublings erscheinen und auch deren Bieh von läffigen Infeften befreien. Unter den Dachern ftellen fie auch den fo laftigen Kornmotten nach und lefen binter dem Pfluge bie schadlichen Infel= tenlarven auf. - Ihr Gleisch schmeckt im Berbst angenehm. Ihren befiederten Mitge= Schopfen nuben fie dadurch, daß fie bei Erblif= fung eines Raubvogels ein heftiges Gefchrei erheben, worauf fich alle daselbit befindliche Bachftelgen erheben, den Rauber verfolgend. Die andern Bogel, welche diese Stimme mohl verfteben, verftecken fich oder ergreifen eiligst Die Flucht. Ja selbst der Jager, der Diese Stimmen wohl fennt, wird dadurch aufmertfam gemacht.

b) Ruhstelzen. (Badytes. Cuv.)

Die Charafter ber vorigen, aber die Sin= terfralle lang und frummgebogen, wodurch fie

> Waffere, fich emfig Futter fuchend und bann bas. mit nach einer Gide binfliegenb. Gie unterfuch= ten die ungewöhnliche Ericheinung und fanden einen jungen Rufut in der Gide eingeichloffen, ba das Loch, wo er hatte herausfommen fonnen, für feinen Korper jum Durchgange gu flein mar. Die befagte Pflegemutier hatte felbft Die Suggeit verfireichen laffen. Unfänglich batte fie wohl noch ihr Mannchen unterfrigt und fo hatte fie gegen 4 Monate Diefes große Rind gefüttert. Die menschenfreundlichen Jager erweiterten Dies Gefängnis unter angftlichen Gefchrei ber Mutter, fo dag der Gefangene nun gemächlich heraus konnte. Den andern Sag faben fie weder Stiefs mutter noch Stieffind. Bielleicht, bag beide burch fcnelle Gile in ein wirthbares Klima, bem Sungertodte noch entgangen find.

sich den Pipern und Lerchen nahern. Gie hals ten sich auf Biehweiden auf, und fangen die Insetten zwischen den Heerden.

Die graue Bachftelze, gelbe Bachftelze mit ichwarzer Kehle, (Mot. sulphurea Bechst. boarula Linn.)

Die 3 außersten Schwungfedern find groß= tentheils weiß; die Schwungfedern zweiter Ord= nung an der Wurzel auf beiden Fahnen auch weiß; der Rucken afchgrau und der Burgel gelb= grun. -- Es ift ein schon, schlank und ange= nehm gebildetes Bogelchen. Man hat fie of= ters mit ber gelben Bachfielze verwechselt, ins deffen unterscheidet fie fich hinlanglich von je= ner durch geringere Sohe und lichter Farbe der Fußwurzeln und durch den viel kurzern und frummern Ragel der Hinterzehe und durch ei= nen viel langern Schwang. Die Lange beträgt 73 - 84 3., movon 44 3. auf den Edmang fommt, der aus fehr schmalen, weichen, juge= rundeten gleichlangen Federn befreht. Die Glus gelbreite ift 11-11 3.; der geftreckte Schna= bel & 3. lang. Das alte Mannchen in feinem Sochzeitfleide fieht fehr niedlich aus. Un ihm find die Bugel schwarzgrau; ein schmaler weißer Streif zieht, fich vom Nasenloch über das Auge bis an das Genick; Stirn, Ober= fopf, Racken, hinterhale, die Schultern und der gange Rucken afchgrau, an lettern etwas olivenfarbig, überflogen; Burgel und Schwangdeeffedern gelbgrun, an den Geiten in reines Blumengelb übergehend. Reble, Gur= gel und Kropf tief fcmarz; die afchgrauen Wangen und die schwarze Rehle trennt jeder= feits ein breiter meißer Streif ber lange nach, alle übrigen Theile des Unterforpers find run= felgelb, am iconften an der Oberbruft gleich unter dem Schwanze und an den langen un= tern Schwangdecffedern. Im Fruhjahr haben die schwarzen Rehlfedern meiftens noch weiße Caumchen. Gehr alte Beibchen haben eben= falls eine schwarze Rehle doch von etwas ge= ringerm Umfange; meift erfcheinen diefe Theile weiß und fdwarz gefleckt. Die obern Theile beim Beibehen erscheinen fast braunlich afch= grau, die untern Theile auch nur bleichgelb; das Beibchen ift auch ftets fleiner und fcmach= tiger a's das Mannchen. - Gegen den Berbft legen fie diefe Rleider ab und dann hat das alte Mannchen eine gelblichweiße, ganglich uns geflectte Reble und Gurgel; die feitwarts und

am Kropfe in blasses Ochergelb oder Rosigelb übergeht. Die Weibchen sind im Herbsteleide ihren Mannchen ahnlich, nur blasser gelb am Unterforper, auf der Mitte der Brust noch weißer. Im August ist die Hauptmauser, wo sich bei alten Bögeln auch Flügel= und Schwanzsfedern erneuen. Die kleine Mauser, die sich nur über das kleine Gesieder erstreckt, erfolgt im Februar und März; sie erscheinen dann, meist fertig vermausert, in ihrem Frühlingskleide, mit schwarzer oder schwarzgesteckter Kehle. Beim ausgestopften Bogel verlieren die schwen Farzben sehr.

Im nordlichen Deutschland ift dieser Bogel felten, meniger ift er's in der Schweiz und Frankreich. Er liebt die Gebirgegegenden, da= her trifft man ihn wohl auf dem Harg, im Mannefeldischen, Thuringischen zc. 2118 Bug= vogel fommt diefe, bei une nur felten vorfom= mende Bachftelze im Marg an, und verlagt uns dann wieder im September und October. Ginige bleiben auch an Bachen, Teichen und an folden Gemaffern, die im Binter nicht gufrieren. Gie find ftets am Baffer, doch mehr an fliegenden als ftehenden, lieben die, welche flache und ffeinige Betten haben, halten fich auch gern in der Rabe der Menfchen auf, befonders bei Muhlen, Muhlenmehren, Sam= mer = und anderen Werfen, befondere an folchen Stellen, mo hohe Erlen und andere Baume Ihre Nachtruhe halten die Ufer beschatten. fie nicht wie die andern Urten im Rohr, son= dern fuchen fich einen schlanken über das Baf= fer bangenden 3meig aus.

Diefes artige Bogelchen ift zutraulich doch auch vorsichtig, fo bald es fich beobachtet oder verfolgt glaubt. Behende im Laufe und im Fluge, geht immer Schrittmeis, bei jedem Schritte mit dem Ropfe nickend. Ins feichte Waffer geht es häufig bis an die Fersen. Ihre Locfftimme ift faft wie die der übrigen bei und wohnenden Bachftelgen, flingt icharf und furg: Bigi, gi, gif, giffiß oder flip, ftip ftip. Das Mannchen fingt nicht unangenehm doch felten. Die Gefangenschaft ertragen fie nicht lange. - Ihre Rahrung besteht meift aus Bafferinfeften und deren Larven, wonach man fie immer herumlaufen fieht. Eleine Libellen, Frühlingofliegen, Waffermotten, Schnafen, Muchen u. dergl. findet man fets in ihren Magen. Biehtriften befuchen fie nicht. Im Zimmer muß man fie mit untermengten Infetten an das Rachtigallenfutter gewöhnen.

Einzelne Parchen trifft man von Leipzig einige Stunden entfernt an der Elfter und Pleife niftend, haufiger im Mannefeldifchen, auf dem Barg und in Thuringen. Das Reft ift nahe am Baffer, haufig im Ufer felbft an= gebracht, auch in locher der Mauern und Fel= fenmande, in Teichufern 2c. Die erfte Grund= lage des eben nicht funftlichen Refres befreht aus Dieischen und Burgelchen mit grunem Erd= moos vermischt; im Innern findet man Saare, Borften, Bolle und Pferdehaare, woraus ein halblugelformiger Rapf gebildet ift. Darin lie= gen 5-6 fehr dunn und glattschalige, meift furzoval, oft an einem Ende ziemlich fpig, an dem andern frart abgerundete Gier, denen der weißen Bachftelze abnlich, doch fiets fleiner. Auf einem fcmugig gelblichweißen ober grau= gelblichweißen Grunde find fie überall mit gelbbrauner Farbe und mit einem bleichen Gelb= braun besprift und bepunktet, zuweilen auch mit diefen Farben einzeln und grober geflecft. Manchmal verfließen die Zeichnungen mit der Grundfarbe fehr, bei andern blieft diefe wieder reiner durch, noch andere erscheinen nur blag= braun gewolft. Dadurch entstehen denn viele Barictaten. In der Farbe ahneln fie denen der gelben Bachftelge fehr, boch im Gangen viel lichter und gelblicher und viel großer. Das Weibchen brutet fie faft allein aus. Ihre Brut lieben fie febr. Im Upril findet man meift fcon ihre Gier und Unfangs Mai flugge Im Juni findet man bann ichen Tunge. wieder ein neuch Reft mit Giern, da fie ge= mobnlich 2 Bruten machen. Im folgenden Jahre fuchen fie ihr altes Deft, wenn fie nicht geftort werden, wieber auf. - Bern legt der Rufuf feine Gier in die Refter Diefer Bachftelgen. — Alte Bogel erwischt nicht leicht ein Raubvogel, dagegen leidet die Brut durch Raben, Marder und Ratten, die oft die Ulten mit fangen; auch fangen Rrahen und Elffern die eben ausgeflogenen Jungen weg. Gelbst das plogliche Unschwellen des Waffers thut ih= nen viel Schaden. Leicht laffen fie fich fcbie= Ben an den Brutortern, defto fcmerer aber auf Im Winter fangt man fie mit dem Buge. Leimruthen, in einem Schlaggarnchen am Baf= fer oder auf Miffftatten mit lebenden Mehl= wurmern. Gie nugen übrigens durch ihre Rah= rung, auch ift ihr Gleisch wohlschmeckend, und foll auch gefund fenn.

Unmerf. Bu der bei uns noch ofters vorfommenden Bachftelze gehort die gelbe Bach= ftelze (Motacil. flava Linn.) Bippfterg, Rubbachftelze. Die 2 auferffen Cchmang= federn find großtentheils weiß; der gange Ruf= fen olivengrun; der Oberfopf grau. - Jun= ger Bogel: von oben dunkel erdgrau, von unten blag lehmgelb, an der Gurgel ichwarz geffecft. In hinficht ihrer Geffalt und Lebens= art fieht fie zwischen Bachfielzen und einem Di= per als Bindeglied mitten inne. Unter den bie= figen ift fie die fleinfte und hat nach Berhalt= niß den fürzesten Schwanz. Ihre Lange beträgt 6½ — 7 3., Flügelbreite 10½ — 11 3. Der Schwanz mißt 3 3. Der Schnabel 51 2. lang. Das Mannchen im Fruhjahr: Stirn, Scheitel und das hinterhaupt bis an den Nacken schon blaulichaschgrau; ein weißer Streif fangt hinter dem Nasenloche an und zieht sich über das Auge meg; die Bugel find grauschwarz; weißlich ge= ftrichelte Wangen und das Rinn grun weiß; Sinterhale, Schultern und der Rucken bis an den Schwang olivengrun. Bon der Reble an bis an den Schwang find alle untern Theile prachtig bochgelb, alle Blugelfedern matt braun= fcmarg. Im Berbft find die Farben meniger schon. Gie ift die häufigste von allen den an= geführten Urten und bewohnt gang Europa, be= fonders in ebenen Begenden und vorzüglich in ben Marfdlandern. Gie fommen Unfangs Upril und ziehen Unfangs October wieder fort. Cie ift gang Feld = und Sumpfvogel, icheuet die Rabe des Monichen, liebt dagegen fette, feuchte und sumpfige Biefen mit einzelnen, niedrigen Reilweidengebufch, mo dazwischen auch Bieh weider. Nachts fchlafen fie wie die Ctaare, Stachelschwalben und weißen Bachftelgen im Schilfe. Die Lociftimme ift ein angenehmer, pfeifender, gezogener Eon, der bald mie pfuip, pfujip, bugip und pilip, auch blie flingt. Der Gefang ift fcblecht. Gie ganten fich gern mit andern Bogeln. Gie halten fich übrigens fehr gut als Stubenvogel. Leben im Freien nur von Infeften und deren Larven, die fie bei den Bichheerden, auf Triften, in Stoppeln, auf frischgepflügten Medfern, am Waffer 2c. begierig aufsuchen. In Schoten, Wicken, Feld= bohnen, Raps und Rlee, vertilgen fie eine Menge Schadlicher Infekten. Ja fie find den Heerden, eine Wohlthat, indem fie in Gefell= Schaft der Ctaare, Schwalben und weißen Bach= ftelgen, Stechfliegen und andere laffige Infetten fleifig megfangen. In der Stube fan= gen sie geschickt Fliegen und laffen fich durch untermengte Inseften leicht, an ein funftliches

Futter gewöhnen. Sie baden sich auch gern. - Fette ober feuchte Biefen und Getreidefel= ber dienen ihnen gum Niften. Das Reft fteht auf dem Erdboden meift in einer Bertiefung. Man findet darin 5-6 Gier, die das Beib= chen binnen 13 Tagen allein ausbrutet. Gie haben die fleinsten Gier unter den schon be= fdriebenen Bachftelgen; meift fehr furg rund= lich, find fehr zattschalig, glatt, faft ohne Glanz. Die Grundfarbe ift ein fcmugiges Beif, das bald ins Gelbliche, Rothliche, Grauliche, bald ind Blauliche fpielt, mit untermischtem, blaf= fem Bioletgrau, und in Punfte, Strichelchen und wolfichten Zeichnungen über die gange Flache fich verbreitet. Gern legt auch ber Ru= fuf in ihr Reft seine Gier. - 3hr Fleisch ift wohlschmeckend.

Pieper. (Anthus. Bechst.)

Nach Cuvier die zehnte Gattung. Der Schnabel: geftrecft, gerade, pfriemenformig; der Rucken rund; die Spipe des Oberfiefers fehr wenig abwarts gesenkt. Die Spite der untern gerade. - Bunge: lang, fcmal, mit getheilter, borftig gerriffener Spige und ftart ausgeschnittenem, fammartig gegahneltem Sin= terrande. - Fuße: ichlank, die außere Bebe mit der mittelften bis faft jum erften Belenfe zusammengewachsen; die Rrallen fcmach und menig frumm; die hinterzehe mit einem lan= gen, mehr oder weniger bogenformigen, dunn= fpigigen Cporen. Flugel: mittelmaßig, megen der fehr langen hintern Schwingfedern mit 2 Spiten. Der Ropf ift fehr flachstirnig, fpis und lang; der Sals dunn; der Rumpf fclanf; der Schwang etwas lang und breit; der Sa= bitus bachftelgen = und lerchenartig; die Farbe des Gefieders meift von lettern; über die Flus gel gehen 2 lichte Querftreifen und über das Muge ein lichter Strich. Mannchen und Weib= den unterscheiden sich wenig in der Farbe. Gie machen einen Hebergang von den Bachftelgen gu den Lerchen. Diese Gattung, nicht zahlreich an Urten (11 nach Cuy.) ift über alle Bonen verbreitet. In Deutschland find 4 Urten be= fannt.

Der Brad = Pieper, Suffer, Rraut=

(Anth. campestris Bechst.)

Die obern Theile licht gelblichgrau, mit me-

nigen undeutlichen, dunkeln Flecken; die untern Theile trube gelblichweiß, an ten Geiten der Oberbruft nur mit einzelnen dunkelgrauen Fleck= Die außerfte Schwangfeder hat einen weißen Schaft und Außenfahne, desgleichen von ber Epite berauf einen fehr großen gelbweißen Reilflect; die zweite einen abnlichen, aber viel fleinern und einen dunkelbraunen Schaft. Der Nagel der hinterzehe groß und nur flach. Diefer Pieper ift 63 - 74 3. lang und 11 - 123. breit; Der etwas ausgeschnittene Schwang ziem= lich 3 3. lang. Der Schnabel 7 2. lang. Bris der giemlich großen Mugen dunfel nufbraun. Die Wangen find grau und gelb gemifcht; Bugel und Ohrengegend dunkelgrau, auch die Bangen vorn herab fo geflecft; Reble, Gurgel und alle untern Theile trube gelblichweiß, mit einem angenehmen Roftfleck ftart angeflogen, bei einigen rothlich, bei andern fich mehr zum Schwefelgelben neigend. Die fleinen Flugel= deckfedern find wie der Rucken, alle übrigen Blugelfedern matt dunkelbraun, mit grunlich

roftgelben Ranten.

Man findet diefen Bogel in verschiedenen Landern unferes Erdtheils; in Deutschland in hügeligen, auch ebenen, freien, trocknen und unfruchtbaren Landerstrecken. Ule Bugvogel fommt er bei und Mitte Uprile an, gieht bis in den Mai und verlaßt uns ichon im Geptem= Im Berbft trifft man fie auf ber wieder. Brachfeldern, bei Roblackern, auf Grafeplagen, an den Wegen, auf durren Biehweiden und an fteinigen Unhohen. Gie lieben überhaupt ei= nen ichlechten unfruchtbaren Boden. - Es ift ein unruhiger, icheuer und fluchtiger Bogel, der mit großer Bewandheit und Schnelle am Boden entlang lauft. Bum Guchen mablt er, wenn er eine Strecke gelaufen, erhabene Stellen, eine Erdscholle, ein fleines Sugelchen ac. - Ge= fangen gewöhnen fie fich leicht an das Univer= falfutter, da sie aber eigentlich feinen Gefang haben, auch nicht schon aussehen, unterlagt man es. — Ihre Rahrung befteht aus fleinen Raferarten und fleinen Beufchrecken nebft deren Larven, auch Motten, Fliegen und ahnliche Infeften, die auf den durren Sandlehden zwi= Schen kimmerlichem Grafe, Beidefraut und auf den Brachackern haufen. Gie baden fich auch, nicht wie die Lerchen im Sande, fondern im Wasser. — Sie niften gern in der Rahe der Riefernwaldungen. Das Reft feht auf ber Erde und ift schwer aufzufinden, meift in einer Bertiefung. Es bilbet einen ziemlichen Rlum=

pen aus trocenen Quecken, Grasmurgeln mit etwas grunem Erdmoos, auch durrem Laub ver= mifcht, inwendig liegen feine Burgelchen und Balmchen. Man findet darin 4-5 Gier, von einer furzovalen Form, gartichalig und glatt, Ihre Grundfarbe ift ein tru= wenig glangend. Shre Grundfarbe ift ein fru-bes Beif, mas über und über, aber nie fehr wenig glanzend. dicht, mit matt rothlichbraunen Punften, Strie delden und fleinen Fleckchen bestreut ift, zwi= fchen welchen fich häufig auch noch dergleichen von einem blaffen Ufchgrau zeigen, die ofter, mit den rothlichbraunen, gegen das frumpfe Ende hin etwas häufiger ftehen oder größer find, ohne einen Fleckenfrang zu bilden. Gie variiren in der Große und Zeichnung. - Bie die übrigen fleinen Bogel bruten auch fie die Gier im 13-14 Tagen aus, bei diefer aber nur das Beibden. Das Mannchen fcheint un= terdeffen das brutende Beibchen durch fein Sin= und Berfliegen und feinen Son: Gridliche und Biurrer die Beit zu verfurgen. Raht man fich dem Nefte, fo lauft das brutende Beibchen ein weit Stuck meg, ehe es fortfliegt, mas das Auffuchen des Reftes noch mehr erschwert. Sie niften nur einmal im Jahre. Much fie muffen oftere Pflegeeltern eines Rufufe merden. Gie und ihre Jungen leiden viel durch die Raub= vogel, auch durch Raben und Burger. Gie find icheu und nicht leicht zu ichießen. Un den Brutortern, wo fie ihre Lieblingsplagchen ha= ben, laffen fie fich mit Leimruthen und Schlin= gen fangen. - Gie beleben manche ode Be= gend, vertilgen viele Infeften und haben ein wohlschmeckendes Fleisch. In Italien foll man fie deshalb haufig fangen.

Der Baum = Pieper, Baumlerche (Anth. arboreus. Bechst.) Dben grunlich braun, dunfelbraun geflecft; an der Bruft licht= ochergelb, mit schwarzbraunen Flecken. Der Nagel der Hinterzehe kurzer als diese, halb= mondformig oder in den vierten Theil eines Birkels gebogen. Oft ift er mit dem Biefen= pieper vermechfelt worden, doch ift er flets gro= fer. Ceine Lange beträgt 61 - 63 3.; die Breite 11 - 11 3 3.; Schwang 23 3. lang; Schnabel 51 Linien lang, pfriemenformig, et= mas ftart und lerchenartig. Der Ragel ber Sinterzehe bei alten Bogeln, mo er viel langer wird, bildet den 5ten Theil eines Birfels. -Das Beiben ift dem Mannchen abnlich, nur etwas fleiner. Das Berbfifleid ift viel dunfler, als das Fruhlingefleid. Auf einem ziemlich dunkeln olivengrunen Grunde ift der Bogel von oben fehr dunkel oder braunschwarz gefleckt, an ber untern Geite, besonders an der Gurgel und in der Ropfgegend, fehr icon rofigelb, mit fcwargen Flecken, nur die Mitte der Unter= bruft und der Bauch weißlich und ungefleckt. - Lebt in gang Europa, liebt befonders aber waldige und bergige Gegenden. 2118 Bugvogel fommt er Ende Marz, zieht aber im Septem= ber mieder fort. Geine Locfftimme flingt wie: Pfichb oder Gribb, faft wie die des Rirfch= fernbeißers. Das Mannchen übertrifft an Befang alle übrigen Pieper, und ahnelt dem Schlage eines Canarienvogele. Er lagt fich gut gahmen und halt fich gut in einem gerau= migen Bauer unten mit frischem Sand bestreut. Ihre Nahrung find Infeften; daher man fie auch mit Fliegen, Mehlwurmern und Umei= fenpuppen an das bei den Gangern angegebene Futter, gewöhnen muß. Auch baden fie fich gern. - Das Reft freht tief auf der Erde im Graße, Beidefraut, Gerfte und dergl. verfteeft, dem Refte der gelben Bachftelze abnlich. legen 4-5 furzovale, garte, glatte, menig glangende Gier, die fehr varifren, bald eine weißliche, bald eine rothliche Grundfarbe ha= ben, mit einem duftern Braungrau oft fo fein punftirt und befrigelt, wozu noch fleine Glecke und Punfte von aschgrauer Farbe fommen, daß man faum dafur bie eigentliche Grundfarbe erfennen fann. Bisweilen ift die Zeichnung gang marmorartig, den Giern der Beideterche fehr ahnlich. Bu bemerken ift noch: daß die auf grauweißem Grunde blagrothbraun bepunt= teten und befrigelten die gemeinften, die roth= braun marmorirten feltner, und die weißlichen die feltenften find. In der erften Salfte des Maies findet man die Gier. Gie machen nur eine Brut. Der Rufuf begluckt auch fie mit feinen Giern. Man fangt fie wie die eiferfuch= tigen Finkenmannchen mit Leimruthen, auch mit Stricknegen.

Der Biesen = Pieper (Anth. pratensis Bechst.) Oben grünolivenbraun, braunschwarz gesteckt; an der Brust licht rostgelb mit braunsschwarzen Flecken. Der Nagel der Hintersche länger als diese, nur sehr wenig gebogen. — Kleiner, als voriger dem er sonst sehr ahnlich ift. Länge $5\frac{1}{3}$ — $6\frac{1}{8}$ 3., Flügelbreite $10\frac{3}{4}$ 3., der Schwanz ziemlich $2\frac{1}{2}$ 3. lang. Schnabelslänge $5\frac{1}{2}$ Linien. Die Nägel sind dunn, unten zweischneidig, nadelspitzig und flach gebogen, der der hinterzehe ungemein dunn. Schr alte

Mannchen haben im Fruhjahr an den Augenfreifen und an der Rehle einen rofenrothlis chen Unflug. Un den obern Theilen ift dann alles olivenbraun. Die Sauptmaufer fallt in den Monat August. Die 2te Maufer, wo sich das fleine Gefieder erneuert, fallt in die Beit, wo sie nicht bei uns sind. - Im Commer ift er im gangen mittleren Europa, im Binter gieht er gum Theil ins nordliche Ufrifa bin= Um liebsten bewohnt er tiefliegende Cbenen, daher haufig in Marichlandern. 2118 Bugvogel erscheint er sehr frühzeitig und verläßt und fehr fpat wieder. Gie fommen und gie= ben fast jugleich mit den Lerchen. - 3br Aufenthalt erftreckt fich uber Biefen, Gumpfe und Morafte, über tiefliegende Begenden an Bluffen, Geen und andern Gemaffern. Gie lieben ihres Gleichen und halten fich beim Buge gern zu einander in Beerden. Seine Stimmo ift ein feines Sift oder Ift. Gie singen eben nicht icon. In einem Lerchenbauer laft er sich mehrere Jahre hindurch halten. Ihre Rah= rung besteht in fleinen Beuschrecken, befonders deren Larven, Mucken, Schnacken zc .. Fangen auch bei den weidenden Beerden Stechfliegen, Bremen 2c. Mus dem Baffer und Moraft ho= len fie viele Infeftenlarven, auch gang fleine Schneckchen. Gie baden fich gern. Und Ctubenfutter gewöhnt man sie wie den vorigen Pieper. — In unfern Gegenden fteht das Reft meift auf Geggenschilfufern, in einem niedrigen Binfenhorfte, in Grasbuicheln, nabe an Gras ben. Das Reft gleicht dem, der gelben Bachftelge. Man findet darin 5-6 Gier, die nach Geftalt und Farbe den Lercheneiern ahneln, find lang oval und wenig bauchig, von einer garten nicht glanzenden Schale. Ihre Grund= farbe ift immer ein grauliches Beif, bald et= was ins Schmutigrothliche, bald ins Gelbliche giehend, welches überall dicht mit graubraunen oder gelblich braungrauen Punkten, Schnigen und Gefrigel bedeckt ift, unter welchen fich auch am frumpfen Ende ofters noch aschgraue Punfte zeigen, ja bisweilen bilden die Beich= nungen am stumpfen Ende einen Fleckenkrang. Sie bruten 2 mal. Befiederte und behaarte Raubthiere verfolgen fie und ihre Brut und vermeiden fo ihre Ungahl. Bei den Brutor= tern werden fie leicht mit der Flinte gefchoffen, fonst werden sie in Fußschlingen und mit Leim= ruthen gefangen. Oft werden fie auch im Berbft mit dem Lerchennachtnet gefangen, ent= wischen fie aber durch die weiten Maschen, fo

ertont ihr frohlockendes: Bift hift! Im Berbft find fie fehr fett und schnecken recht gur.

Der Baffer=Pieper (Anth. aquaticus. Bechst.) Dben tief olivengrau oder braun= grau, mit wenig bemerkbaren fchwarzgrauen Glecken; die großen Guße dunkel kaftanienbraun ober ichwarg. Der Ragel der hinterzehe viel langer als diefe und ziemlich ftart gebogen. -Lange 61 - 73., Flugelbreite 111 - 12 3., Schwang 21 3., Schnabel 6 g. lang. Beim mannlichen Frühlingsvogel find Bugel uud Bar= gen grau; Stirn, Scheitel und Sinterfopf braunlichaschgrau, etwas dunkler geflecht; der Racken lichter oder mit Ufchgrau überlaufen; Rucken, Schultern und Steiß graubraun, an erftern beiden mit obfoleten dunflern Glecken; Bauch und Ufter weiß, der Border= hale und die gange Bruft bleich roffrothlich oder faft ichmutigfleischfarben, in den Geis ten grau überflogen, alles ungefleckt, nur in ben Beiden mit graubraunen vermischten Langenflecken. Die Beibchen feben dem Mann= chen bis auf die blaffere Unterfeite, vollig abn= Die Sauptfarbe des Berbftfleides ift, oberflächlich betrachtet, ein dufferes Maufegrau und trubes: Beiß. 3m Spatsommer maufern diese Bogel ihr ganges Gefieder, und im Fruh= jahr bei einer zweiten Maufer, blos das flei= nere. In Deutschland gehort diefer Pieper in vielen Gegenden unter die größten Geltenbeiten. Es ift ein Bebirgevogel, ber nur felten in un= fern Chenen erfcheint. Er geht fo hoch hinauf bis mo der Solzwuchs aufhort, und wo faum noch die Rrummholzkiefer wachft. Waffer, nacttes Geftein und Felfen muffen nahe vereint fenn, wo er im Commer fich aufhalten foll. In der Schweig, wo er vollig einheimisch iff, begiebt er fich, wenn es auf den Bergen gu febr fturmt, im Berbft tiefer berab, und fommt dann im Binter an die Geen und andere Be= maffer, die nicht zufrieren. Leicht foll er sich in der Ctube, fo wie im Bauer an die Gefan= genschaft gewöhnen laffen. — Safte, Frühlings= fliegen, Muchen, Schnafen und andere am Waffer fich aufhaltende Infekten und deren Larven find feine Rahrung, vorzüglich auch fleine Burmchen und Schnecken (Helix auricularia). Durch Auffuchen und Erhaschung ih= rer Nahrung nahern fie fich den Bachftelgen, durch die Nahrung selbst aber den Sumpf= und Baffervogeln. Ihr Neft freht zwischen Stei= nen und Grafe verfteckt, funftlos und oft mit Thiorhaaren ausgelegt. Es enthalt 4 - 5. Gier,

von kurzovaler Form, so groß wie die, bes Brachpipers. In der Farbe gleichen sie den grauen Spielarten des Baumpipers sehr. Sie sind auf einem blaulichgrauweißen Grunde über und über mit braungrauen oder graubraunen Punften, Strichelchen und Fleeschen, die hausfig an einander hängen, übersat, am meisten am stumpfen Ende, so daß daselbst oft ein Schein von einem Fleesenkranz entsteht. Mit Leimruthen, woren ein Mehlwurm und mit Schlaggarnchen, fangt man sie am keichtesten. In Benedig soll man sie ihres wohlschmieckens den Fleisches wegen zu Markte bringen.

Manafin (Bartmanndjen, weil fie einen Federbart am Unterschnabel haben) Bipra Lin.

The Schnabel ift zusammengedrückt, hoher als breit, ausgekerbt, mit großen Nasenhohlen. Schwanz und Kuße sind kurz; wegen der allgemeinern Berhaltnisse ihres Baues hat man sie lange unsern Meisen ahnlich betrachtet. Sie sind in einige Unterabtheilungen gebracht. Un ihre Spiße muß man als abgesonderte Gruppe stellen:

Felshuhn. (Rupicola. Briss.)

Die 2 hierher gehörigen Arten sind groß und tragen auf dem Kopfe einen doppelten, fenfrecht ftehenden Kamm fächerformig gestellzter Federn. Die Mannchen der beiden Arten haben ein schön orangenfarbiges, die Jungen ein dunkelbraunes Gesieder. Sie nahren sich von Früchten, scharren wie die Hühnerarten in der Erde und machen aus trocknem Reisholzihr Nest in die tiefsten Felsenlocher, worin man nur 2 Gier sindet.

Orangenfarbener Felfenhahn. (Rupicola aurantia Vieill. Pipr. rupicol. Lin.)

Die Grundfarbe des Gefieders pomeranzens farben; im Alter wird sie noch lebhafter; auf dem Kopfe erhebt sich von dem Schnabelforste an ein freisformiger Federbusch, aus einer dopspelten Federreihe bestehenden, vorn sich vereinisgend, hinten abstehend, eine Art von helm vorstellend; die Spige dieses niedlichen Busches ist braun und hellzelb gesäumt; die Mitte der Blügel weiß; die Schwungsedern furz und rathschwarz hellzelbgesäumt, Schnabel und Füße

weißlich rosenroth. Das Weibchen ift kleiner, der Federbusch kürzer, die Farbe schmußigbraun. Sie haben die Größe einer Feldtaube. — Diezser schöne Bogel bewohnt die Felsenhöhlen von Gujana, besonders in der Nähe eines Postens, der Opapoc heißt, und im Gebirge Kurruaga, am Flusse Aprovack. Sie fliegen am Tage, aber nur niedrig, kurz und schnell und sind sehr mustrauisch. Die Weibchen gehen selten am Tage aus ihren Hohlen. Ihre Nester bestehen aus einigen Bastfaden und trocknem Holz. In diese Nest legen sie 2 weiße Sier, den Euleneiern ahnlich, so groß, wie die größten Taubeneier.

Thre Nahrung besteht a s wilden Früchten. Sie scharren nach Urt der Suhner, schlagen mit den Flügeln und bedecken sich auch mit Staub und Sand. Ihr Geschrei last sich durch die Sylbe ke, scharf und ziehend ausgesprochen, ausdrucken. — Man hat sie auch gezähmt.

Grüner Felsenhahn. (Rupicola viridis.)

Die Stirn bildet beim Mannchen einen fleis nen Federbuich, welcher fich über den Edna= bel erhebt. Die Flügel bedecken den viercefigen Schwanz. Die Regenbogenhaut ift blaulich. Alle obern Theile Diefes fconen Bogels find glangend malachitgrun; auf der Ohroffnung ein fammetichmarger glangender Fleck, und auf den großen und mittlern Decffedern der Flugel 3 Schwarze Querbander, diefe Decffedern haben da= neben alle malachitgrune Spigen; die Schwung= federn ichon ichwarz; Schnabel und Fuße schmärzlich hornfarben. Die Lange des Wogels beträgt 6 3. — Beim Weibchen find nur die Rasenlocher mit Federn bedeckt, der Federbusch fehlt. Alle obern Theile find grasgrun, ein Rreis um die Mugen feladongrun; die unteren Theile fehr hellgrun, graulich gemifcht. leben aus dem Pflanzenreiche, entfernt von al= len Wohnungen in Baldern des innern Landes von Sumatra. Sie find felten, und schwer in in dem grunen Laube durch ihre oben beschries bene Farbe ju unterscheiden.

Eigentliche Manafins. (Pipra.)

Schnabel dreieckig, furg, an der Basis etwas breit, an der Spige gusammengedrückt; die obere Kinnlade gebogen und ausgeschweift an der Spiße, die untere spißig. Flügel und Schwanz kurz. Sie sind klein und zeichnen sich fast sammtlich durch lebhafte Farben aus. Sie leben in kleinen Schwarmen in feuchten Wäldern. Um Morgen vereinigen sie sich in kleine Truppen, wobei sie ein angenehmes Geschwäß hören lassen. Gegen 9 bis 10 Uhr zieshen sie sich aber in die diessten Gebüsche zurück, wo sie sich den Tag über verborgen halten. Ihre Nahrung besteht in Beeren und kleinen Früchten, auch Insekten. Man kennt davon über 16 Arten.

Fadenschwänziger Manakin. (Pipra filicauda.)

Mannchen: Kopf, Sals und Schultern glanzendroth, alle übrigen obern Theile, Flügel und Schwanz schwarz; die innern Schwanzsestern der Flügel haben an der innern Fahne eisnen weißen Fleck, und sammtliche Schwanzsestern enden mit einer fast 2 3. langen Borfte. Alle untern Theile sind schon gelb, Schnabel und Füße hornfarben. — Größe des Zaunfösnigs, Lange 3½ 3. ohne die Schwanzborsten.

Rothfopfiger Manafin. (Pip. rubrocapilla.)

Ropf, Backen und hinterhaupt glanzend orangenroth, alles übrige ichon ichwarz; die Schenkelfedern weiß, leicht roth angeflogen, Schnabel und Ruße braungelb. Große des Zaunkonigs. Baterland Brafilien.

Beitmun 5. (Euryalimus.)

Schnabel furger als der Kopf, fiart, niederig, an der Burgel fehr breit, die Schnabels wande nach innen umgeschlagen; überhaupt viel breiter als hoch, und an der Burgel breiter als die Stirn. Mundoffnung sehr groß, bis unter die Augen sich erstreckend; Flügel furz.

Die hierher gezogenen Bogel bilden eine Mittelgattung, welche man verschiedenen Familien anreihen kann. Durch ihren großen Mund und Schnabelbau nabern sie sich den Nachtschwalben und Polargen; von denen sie sich aber wieder durch das Gefieder und dem übrigen Bau entfernen. Lesson ftellt sie zu den Fliegenfangern. — Sie bewohnen bie Sumpfe und Ufer ter Fluffe und Seen, hier aber ftets die einfamsten Gegenden. Sie fol- len ihre Nester an die Zweige aufhängen, die über das Waffer hin ragen. Sie leben von Infesten und Warmern, die sie vom Boden auflesen. Die 5 bekannten Urten sind mit schonnen Farben geschmuttt.

Der Corndon. (Euryl. Corydon.)

Der Schnabel deffelben ift außerordentlich breit und frart; die Nander seitlich ausgebreiztet; die Augengegend nackt, roth, so wie auch der Schnabel. Auf dem Scheitel fieht ein Busch langer schwarzer Federn, alle obern Theile, Flügel, Schwanz, Bauch und Unterleib schwarz; Rehle und Borderhals hell tabackbraun. Auf der Mitte des Ruckens ift ein seuerrother Fleck; auf den Schwungsedern ist eine weise Binde, und eine andere läuft über den Schwanz, desen beide mittlern Federn jedoch ganz schwarz sind. Länge 9½ 3., Baterland Sumatra.

Die zweite Familie, enthalt nach Cuvier:

Spaltschnäbel. (Fissirostres.)

Sie ift nicht fehr zahlreich, aber vor allen andern durch den breiten, furzen, horizontal geglätteten, etwas hafigen, tief gespaltenen Schnabel, ohne Kinne, sehr ausgezeichnet. Ihre Nachenoffnung ist deshalb sehr weit, die Mundspalte geht bis hinter die Augen, und so versichlucken sie die Insesten, im Fluge gehascht, sehr leicht. Um nachsten granzen sie an die Blegenschnapper. Es sind ausgezeichnete Zugund Wandervogel, wozu sie besonders ihre Nahrung zwingt. — Man hat sie wie die Naubsvogel, in Tags und Nachtvogel getheilt.

Schwalben. (Hirundo L.)

Darunter begreift man die Tagwogel. Sie zeichnen fich alle durch ihr dichtes Gefieder, außerordentlich lange Schwingen und schnellen Blug aus. Ihre Kuße find sehr furz, schwach, vierzehig, 3 Ichen nach vorn, eine nach hinten, oder alle vier wie bei den Seglern (Cypselus Illg.) vorwärts gerichtet, ganz getrennt, oder nur mit einer sehr furzen Haut an der Wurzel

verbunden; die Rägel sehr scharf und spitig. Ihre kurzen Füße gestatten ihnen nicht, gut zu gehen. Sie halten sich meist nur auf erhabesnen Gegenständen, als: 3weigen, Dachern ze. einige Zeit fest um zu ruhen. Es sind wahre Luftvögel, die besonders zum langen Flug gesbauet zu seyn scheinen. Sie sind über die ganze Erde bis gegen die Polarkreise verbreitet, aber in allen kaltern Gegenden Zugvägel und nur in den Tropenlandern, nicht weit vom Aequator, diess und jenseits Standvögel. Im schnellen Fluge haben sie unter den Landvögeln wenig ihres Gleichen. Man kennt 46 Arten. Unter ihnen kennt man zuerst:

Segler. (Cypselus III,)

Sie haben nach Berhaltniß die langsten Flügel, die fabelformig in die Sohe gerichtet sind, und das startste Flugvermogen. Augen sehr groß, Füße bis an die Behen bestedert, der Schwanz ift gabelformig; ihr Daumen ift nach vorn gerichtet und die mittlern und außern Finsger haben nur 3 Phalangen.

Die Kurze ihrer Oberarmknochen, ihr ovas ler Gabelknochen, ihr Brufibein, das nach unstem keinen Ausschnitt hat, ic. zeigen selbst im Skelet noch, das Geschief zu einem fraftvollen Fluge; allein die Kurze ihrer Fuße, in Bersbindung mit der Lange ihrer Schwingen, macht sie ungeschieft, sich von der Erde aufschwingen zu können. Sie bringen daher ihr Leben schaarenweise, mit Geschrei in der höhern Luft sliegend, Insesten fangend, hin. Sie niften in Mauers und Felsenlöchern und klettern mit Schnelle an den Wänden in die Höhe.

Der gemeine Mauerfegler, Thurm= Sporfcmalbe. (Cyps. apus.)

Die Kehle ist weißgraulich, das ganze übrige Gesieder braunschwarzlich, an den Laufen kleine Federn; Regenbogenhaut des Auges dunkelsbraun. Mannchen und Weibchen sehen einans der im Acubern gleich. Thre Lange beträgt 7½ 3., die Flügelbreite 17½ 3. Bei Jungen ist die Kehle und ein Ning um den Schnabel rein weiß; Schwung= und Schwanzsedern mit einem sehr schwanzel weißen Saum; dergleichen Saum haben auch die untern Decksedern der Flügel.

Man trifft fie in ganz Europa. Den gan= gen Sag durchfliegen fie die Luft. Die Rachte bringen fie unter Dachern, in Thurmen, Mauer= lochern, zuweilen auch in alten Gichen zu. 2118 Bugvogel fommen fie unter den Schwalben am fpateften an; meift in den letten Sagen bes Uprile ober den erften des Maies. Bu Unfang des Augusts ziehen sie wieder weg. Es sind fehr fcheue, muntere, ftets herumfliegende Bo= gel, bei iconem Better fliegen fie wie die übri= gen Schwalben boch, bei schlechtem tief. Bei hellem, warmem Better fieht man fie besonders fehr fruh und fpat des Abende noch in fleinen Wefellschaften von 7-12 Ctuck fpieh, fpieh! fdreiend, die Luft pfeilfdnell durchziehend und dabei immer Schwenkungen machend. bei fternhellen Rachten hort man sie noch bis Mitternacht und vor Tagesanbruch in den Luf= ten, mas ich auch ofters in meiner nabe an einer großen Rirche beobachtet habe. Durch ihr Gefchrei verkundigen fie die schonen Tage, bei regnerifdem und fattem Better laffen fie fich oft mehrere Tage lang gar nicht boren und feben. In ihrem Magen findet man meift nur folche Infeften, die boch in der Luft fliegen. Umei= fen und Fliegen icheinen fie an den Mauern weggufangen. Ruble Witterung gieht fie nach dem Baffer bin, weil da noch immer Infeften hausen, ihren Hunger zu ftillen.

Die Begattung follen sie fliegend verrichten. Das Neft legen fie in Mauerlocher, Thurmluf= fen, unter Dachern, felten in alten Giden an. Es besteht aus Strobhalmen, Blattern, Federn oder Lumpen, welche meift durch Wind ihnen zugeführt werden. Diefe Materialien werden durch eine Schleimige Materie gusammengeflebt, die nach der Meinung vieler Naturforscher, der Speichel des Bogels fenn foll. Das Reft ift gang flach und hart. Die 2, felten 4 Gier, find langlich, fcmal und rein falfweiß. bruten nur einmal. — Ihr schneller Flug er= Schwert ihre Jagd. Lebend fangt man fie nur in ihren Lochern oder ermattet, auf dem Erd= boden, von denen sie sich nicht wieder erheben fonnen. Alls Gefangene laffen fich diese freien Rinder der Natur nicht erhalten. Kleine Raub= thiere Schaden ihrer Brut, ihr schneller Flug entzieht fie übrigens den fleinen Raubvogeln. Schmarober wohnen auch auf diefer Urt, na= mentlich: die Spierschwalbenlaus. (Stenopteryx hirundinis. vid. Meigen. sustemat. Beschr. der zweifl. Infeften. Thl. VI. p. 234. 1830.). Bei der Ankunft ber Spyrschwalbe wurden ei=

nige geschoffen, um zu sehen, ob sie diese Einsquartierung wohl schon mitbringen. Ich fand feine, wohl aber im vorigen Jahre, da sie bald abziehen wollten. Bielleicht verlieren sie sich auf ihrer Reise. — Der Nugen dieser Schwalbe besteht in Bertilgung ungahliger Insetten. Das Fleisch der Jungen schmecht angenehm.

Der Felfensegler (Cyps. Unmerf. alpinus. Temm.) Alle obern Theile des Rorpers einfach graubraun; über die Bruft lauft ein gleichfarbiges breites Salsband. Rehle, Bor= derhals und alle untern Theile reinweiß; Die Laufe mit braunen Federchen befett. Beim Beiben ift das Salsband fcmaler, die Farbe überhaupt heller. Lange 9 3. Man findet fie in den mittaglichen Ulpen der Echweig, Eprols und den Felfen langs dem Mittelmeere, fehr haufig in den Felfen Gibraltars, Sardinien, Malta 2c. auch in Ufrifa bis zum Cap. In der Schweiz felbft in einigen Stadten, als: Bern, Freiburg und Laufanne, wo fie auf den Rirchthurmen niftet. Diefe fommen ichon Une fangs Upril und ziehen erft Ende August oder im September wieder fort. Ihr Gefdrei flingt, wie: Efry, ffry, ffry! Auch ihre Reffer find mit einer harten glanzenden Maffe gufam= mengefittet, fo das es wie mit Echneckenschleim überzogen zu fenn scheint. Db diefe Daffe aus dem Unrath, wie ein Augenzeuge verfichert, ader aus dem Speichel des Bogels beffehe, laßt fich nicht mit Gemisheit behaupten. Gie legen 3 langliche, falfweiße Gier. Saben übrigens mit der vorigen alles gemein.

Der schnauzbärtige Segler. (Cyps. mystaceus.)

Ropfplatte indigoblauschwarz, und diese ift mit einem ichmalen weißen Streif eingefaßt; an dem Schnabelminfel entfteht ein Bufchel weißer Federn, melder mit 2 langen zerschliffenen Fe= dern endigt, gerade wie ein Schnurrbart; Muffen, Reble, Burgel, Bruft und Geiten find braunlich schiefergrau; die Flügel indigoblau= fdmarg, die Decffedern fcneemeiß; Unterbauch und die untern Deckfedern des Edymanges grau= lich; der Echwang oben braun; die beiden au= fern Schwangfedern reichen über 2 3. über die andern hinaus, und find am außern Rande unten weißlich. Der Schnabel ift fehr platt und braun; die Laufe furz und nacht; die Be= ben ziemlich lang, braun, die Ragel nicht febr ftarf; der Daumen fteht nach hinten. Lange 11 3., Flügel fehr lang. — Baterland: Reus Guinca, mo diefe Urt gemein ift und an den sumpfigen Meeredufern oder über fleinen Baschen umherfliegt, Inselten ju baschen.

Eigentliche Schwalben. (Hirundo, Cuv.)

Schnabel furz, dreieckig, an der Burzel breit, platt, bis zu den Augen gespalten; obere Kinnlade an der Spige etwas gebogen. Füße furz, Zehen und Klauen dunn; vorn drei Zehen, die außere durch eine Haut bis zum ersfren Gelenk mit der mittlern verbunden, eine Hinterzehe. Der Schwanz besteht aus zwölf Federn; Flügel lang, die erste Schwungseder die längste. — Das Gesieder anliegend; die Farben in großen Massen vertheilt und sehr oft metallischglanzend, der Flug sehr schwenz mehrentheils gabelsormig, bei einigen mit Spizen am Ende, diese haben nur 10 Schwanzsfedern.

Schwalben findet man über die gange Erde verbreitet, doch nicht über dem Polarfreis hin= aus. Ihr Tummelplat ift mie bei ben Geg= lern, die Luft, wo sie ihre Nahrung suchen und finden, ja felbst die ausgeflogenen Jungen im Fluge futtern. Daß übrigens Schwalben im Schlamme in Binterschlaf fallen, und fo uber= wintern sollen, ift unwahrscheinlich, und ver= dient um so meniger Glauben, da die Bogel als Kinder der Luft, marmeres Blut als felbft Saugethiere haben und um fo meniger bes Uthmens entbehren fonnen. Biele glauben es indeffen und wollen Augenzeugen gewesen fenn, doch die Bitte: mich auch durch den Augen= schein davon zu überzeugen, blieb bis jest noch unerfüllt. Bielleicht daß die, welche man er= hielt, Spatlinge maren und im Buftande einer Erftarrung fich befanden. Dies fann im Fruh= jahr, fo wie im Berbst bei schnell eintretender Ralte geschehen. Gie überfliegen viel eher den Ocean und und unfere europaischen Urten fom= men jahrlich regelmäßig aus Ufrifa über ben Archipel ju und, und geben im Berbft wieder dahin zuruft. Die Rauchschwalbe z. B. geht bis jum Genegal; fie verlagt und Unfang September, und fommt dafelbft ungefahr den 8ten oder 9ten October an. Bur Beit der Ub= reife fieht man die Schwalben einige Sage vorher in großen Schaaren fich verfammeln und zwitschern. Gie figen vor der Abreife auf

Baumen, großen Saufern beifammen. Dann verschwinden fie ploglich. Bei der großen Reife über das Meer, ruben fie nicht felten auf den Segelftangen und Sakelwerk der Schiffe aus. Gern übernachten fie im Rohr der Gluffe und Bei uns fommt die Rauchschwalbe fast immer zuerst an, dann folgt oft gleichzei= tig die Hausschwalbe und dann die Ufer= schwalbe in der 2ten Boche des Uprile. Die Parchen suchen meift ihre alten Wohnungen wieder auf, wie man durch genaue Beobach= tung weiß. Sie machen jahrlich 2 Bruten, jede von 4-5 Giern. Die Reffer find ent= weder auswendig gemauert oder in der Erde angebracht, die Unterlage bildet weiches Da= terial. Gern banen mehrere gufammen, ihre Reffer neben einander an. Bei dem Fang der Infeften bort man immer eine Urt Knacken, was durch die Schnelle und Starfe, womit fie den Schnabel schließen, herkommt. Ihr schnel= ler Flug rettet fie bei dem Rachftellen der Raubvogel. Bei Erblickung derfelben erheben fie ein lautes Gefchrei und verfolgen fie dann in Menge.

Es find fehr nubliche Bogel, indem eine fehr große Menge Infekten durch fie vertilgt wird, die fie hoch in der Luft megfangen. Bei eintretendem Regenwetter fenken fich diefe aber tiefer, und nothigen fie auch dazu, fo daß fie oft dicht über der Erde nach Infeften jagend, hinfliegen; weshalb man sie denn auch für Betterpropheten halt. Der Infeften megen lieben fie auch mafferreiche Gegenden. Diefes Rugens wegen halt man es in einigen Gegen= den für Gunde, eine Schwalbe zu tödten; da= gegen werden in Stalien, wo man viele nut= liche Bogel der Leckerei wegen mordet, und in Franfreich beim Berbitzuge viele Bunderte ge= fangen; auch bei Salle fangen die Salloren im Berbit mit Schlagnegen jum Berfpeifen, jahrlich viele Schoof. — Sie scheinen sich in Gefahren beizuftehen. Linné ergablt: daß, fich ein Sperlingepaar eines Schwalbenneftes be= machtigt hatte, worauf fich die Schwalben vereint, und die zudringlichen Gafte einge= mauert hatten. Ginige Urten von Schwalben, welche die Sundinfeln, den indischen Urchipel und Cocharchin bewohnen, bauen die egbaren Reffer. Rach Beschreibungen und Abbildun= gen mogen es drei Urten fenn, die unter den Ramen Salanganen befannt find. Die ge= fuchteften Refter fommen von der fleinften Urt, die fich nie von den Ufern des Meeres ent= fernt, da die andern hingegen weit ins Land binein fliegen. Ueber die Gubftang ift man noch uneinig; fie gleicht dem getrockneten Era= ganthgummi, oder der Saufenblafe, ift hart, bruchig, halbdurchfichtig. Das Reft gleicht in der Form einem Beihmaffernapfchen, wie man fie wohl in den Zimmern anzubringen pflegt, indem fie mit einer oder zwei Geiten an den Felfen befeftigt find. Einige meinen, fie be= ftehe aus einer Urt von Meerschaum oder Gifch= rogen, andere halten fie fur eine gummiartige Subfrang," und noch andere fur Schleim, der vom Bogel felbft fomme. Aufgeloft gleicht diefe Maffe dem Schneckenschleim. Diefe Re= fter findet man an den Felfen, welche die Meerebufer von Java, Gumatra ic. begrangen, in Menge. Gie follen mit Federchen aus= gefüttert fenn und gewöhnlich 3 Gier enthal= ten. Die Berfertiger diefer Nefter find faum fo groß, ale die Colibrie. Die Rochfunft weiß aus diefem gallitinofen Befrandtheilen ein nahr= haftes und wohlschmeckendes Bericht zu berei= ten, daher werden fie auch theuer bezahlt. Man fammelt jahrlich an 4 Millionen Diefer Refter, die befonders nach China fommen. Ein Neft wiegt etwa 1 Loth und foftet dort, wo man fie findet, 6-8 Gr. Gie haben eine erhigende Eigenschaft. Das Pfund foffet in Offindien 5-6 Louisd'or, der Konig felbft treibt Sandel damit. Man findet auch dergl. Reffer oft weit vom Geftade in Sohlen, wo es schwer zu erflaren ift, wie fie vom Meere her Materialien zu den Reftern finden fonnen. Die Ginsammlung diefer Refter an den Felfen und in den Sohlen ift nicht felten mit Lebene= gefahr verbunden.

Einige Schwalben niffen auch in die Erde, namentlich die Uferfchwalbe. Diese bereitet ihr Reft an perpendicularen ober fehr freilen Ufern oder an Mauern, nahe am Baffer, oft aber auch weit davon entfernt, in Steingruben mit fteilen Manden, wenn fie aus feinem Gerolle Faft unbegreiflich, fragen fie mit ih= ren fcmachen Fußchen, oft über 2 Jug tief horizontal einwarts laufende Gange, deren binteres Ende etwas weiter ift. hier legen fie auf funftlos hingebreitete Strobhalme und Fe= dern ihre 6 gang meißen Gier. Der Boden ift oft fo hart, daß man Meifel und andere Inftrumente brauchen muß, um gu dem Refte ju gelangen. Dadurch find sie gegen das Ein= dringen des Wassers, so wie gegen Erklim= mung der Reffer gesichert. Die übrigen euro=

paifchen Schwalben find Maurer, Die Balfen und Mauerwert, woran fie bauen erft naß machen, dann aber aus Gaffenfoth mit Stroh= halmen vermischt, ihr festes Neft bauen.

Thre großen Gerbstäuge übernachten, wie oben gesagt, im Rohr, wo sie oft zu taufensten sien, dies mag wohl mit Beranlassung gegeben haben, daß sie daselbst auch wohl im Basser erstarrt, überwintern, da sie aber nach genauen Beobachtungen, gemaufert wiederkomsmen, so möchte dies schon ein Hauptgrund gegen jene Behauptung abgeben. Bei ihrem schnelsten Fluge bedürfen sie auch eines solchen Mittels ihr Leben zu fristen, nicht; indem sie in einer Minute beinahe eine englische Meile durchssliegen.

Nachdem wir nun vieles über die Schwalsben vorausgeschickt haben, wenden wir uns zu ihrer speciellen Beschreibung. Man hat sie nach Bildung der Füße und des Schwanzes unter 4 Unterabtheilungen gebracht.

1) Schwalben mit befiederten Fugen und gegabeltem Schwange.

Die Saus=, Mehl=, Leim=, Fenfter= fcmalbe. (Hir. urbica.)

Der gange Unterleib, die Backen, der Un's terrucken und der Burgel find rein weiß, alle andern obern Theile und der Schwang ichwarz mit blauem Glange; die Schwungfedern braun, mit grunlichen Gaumen; der Schnabel fcmarz und die Fuße graubraun. Die Jungen find an den obern Theilen braunschwarz und die Reble graulich; der 2 3oll lange Schwanz maßig gegabelt. Lange 6 3., Flugelbreite 12 3. Diefe Schwalbe ift über gang Europa verbrei= tet und fommt etwas fpater an, als die Rauchschwalbe, gewohnlich Ende Uprile. Gie lieben mafferreiche Gegenden und find in Stad= ten und Dorfern angutreffen, doch findet man fie auch in felfigen Gegenden. - Gie fliegen nicht fo geschwind, wie die Rauchschwalbe, aber defto hoher. Gie locft: gerr! nur das Mann= chen hat einen tieftonenden zwitschernden, an= haltenden Gefang, dem es im Reffe, auf Da= dern figend, auch wohl im Fluge horen laßt. Schon Ende August verfammeln fie fich, wie vorher befdrieben, um in den erften Sagen des Septembers uns zu verlaffen. - Shre einzige Rahrung find Inselten. Ihr Reft bauen fie immer außen an die Saufer an, fo daß ce

überall anliegt, und nur eine fleine runde Deff= rung jum Mus= und Ginfliegen hat. Gie bauet es von Gaffenfoth ohne Stroh fehr feft. Bei der Arbeit gittern fie fcnell mit dem Ropfe, und ob fie dabei gleich fehr fleißig find, brin= gen fie darüber doch 14 Tage gu. Das In= nere ift indeffen fo geraumig, daß Eltern und Junge darin Plat haben. Es ift mit einigen Strobhalmen und Federn ausgefüttert. Belche die alten Reffer gleich mieder beziehen fonnen, niften des Jahres 2 - 3 mal; die aber ein neues verfertigen muffen, bruten oft nur ein= mal. Gie lieben die Gefellichaft, daber freben oft mehrere Refter dicht nebeneinander. -Baufig werden aber auch diefe Refter an Fels fen gebaut, besonders unter die Borfprunge derfelben, fo daß fie auch von oben Schut und Unlehnungspunfte haben, mas fie immer Die 4-6 Gier find langlich ei= beobachten. formig, gartichalig, reinweiß. In 14 Tagen bruten fie dieselben aus. Die ausgeflogenen Jungen werden noch von den Alten im Fluge gefüttert, mobei fie faft fenfrecht gegen einan= der anfliegen.

Unter ihre Feinde gehört der Baumfalke; Raten und andere Naubthiere gelangen selten zu ihren Nestern. Mit Sperlingen gerathen sie der Nester wegen, oft in Streit, die mit Gewalt davon Besitz zu nehmen pflegen. It es ihnen gelungen, so verrathen die herabhangenden Strohhalmen den fremden Besitzer. Uebrigens werden sie noch von der Schwalzbenlauß (Hippobosca hirundinis.) und den Fettwarzen geplagt, wodurch selbst die Jungen, wenn sich diese lästigen Gaste in Menge eingefunden haben, getödtet werden. Auf den Herbstzugen werden viele dieser nuglichen Thiere

jum Berfpeifen gefangen.

2) Schwalben mit nackten Fußen und ge= gabeltem Schwanze.

Die Rauch=, Blut=, Bauren= und Stachelschwalbe. (Hir. rustica.)

Stirn und Rehle rothbraun; Halb, Bruft und alle obern Theile schwarz, ftahlblau glanzgend. Der Schwanz sehr ftart gegabelt, so daß die langste außerste Feder auf jeder Seite 23. über die zweite außerste und beinahe 33. über die beiden mittelften vorragt. Alle Schwanzsedern, mit Ausnahme der beiden mittelsten, haben einen weißen rundlichen Fiert an

der innern Fahne, an der außersten Feder bils det er ein verlängertes Dreieck, die außerste Schwanzseder spilt sich sehr schmal zu. Der ganze Unterleib ift schmungig weiß, rothlich übersstogen, auch der schwarze Halb ift, wegen der schwalen rostfarbenen Federrander, etwas rostsfarben gewölft. Die Lange bis zur Schwanzsfederspile beträgt 7 3. 2 Lin.; die Flügelbreite 14 Joll.

Much diefe Urt ift über gang Guropa und das nordliche Afien verbreitet und ift die erfte Schwalbenart im Fruhjahr, die ankommt. Bei eintretenden falten Tagen zieht fie fich in die Rabe der Fluffe, Geen und Teiche, Infeften ju fangen. Ende September ziehen fie bei uns wieder weg. Rach Spallanzani fonnen fie eine Ralte von 10 Grad unter O aushalten. -Gie fliegen fcnell und fcon, meift mit ausgebreitetem Schwange. Bei regnerifchem Bet= ter fliegen fie von ihrer Sohe nach der Erde tief oder dicht über dem Baffer hin. Bei Er= blickung eines Naubvogels erheben fie einen großen Lerm und verfolgen in Gefellichaft ber andern diefen Dauber, doch erwischt fie nicht felten der fcnellfliegende Lerchenfalfe. 3hr Gefchrei ift ein hellpfeifendes Libift! der Ge= fang nicht unangenehm. - Im Binter gieben fie nach Ufrifa, Oberagnpten und Rubien. Den Menfchen furchten fie nicht, find vielmehr als halbe Sausthiere, die traulich bei ihm woh= nen, zu betrachten. Gobald der Tag. graut, ertont auch ihr zwitschernder Gefang. Ulle flies genden Infeften dienen ihr gur Rahrung. Daß fie hummeln und Bienen freffen foll, beftatigt fich nicht. Nach der Beobachtung meines ge= ehrten Freundes Brn. Raumann, frift fie nur die mit feinem Ctachel bewaffneten Droh= nen. - Gie niftet in Saufern, Scheunen, Ställen, Schornfreinen ac., mo fie ein Bret= chen, einen Ragel oder dergleichen gur Unter= lage findet. Das Reft bildet die Balfte einer Halbfugel und ift aus Roth oder flebriger Erde, mit Etrobhalmen gemischt, gebaut, oben meift offen, inwendig mit trockenem Grafe oder Fe= dern belegt, die fie, meift vom Binde in die Luft gehoben, fangen. Die 4-6 Gier find gart, menig glangend, weiß, und über und über mit hellbraunen und violetten Punften beftreut, besonders am frumpfen Ende. Gie machen meiftens 2 Bruten. Mußer dem Baum= und Bwergfalten, ernahren fie auch noch Feinde auf ihrem Rorper, als die Schwalbenlausfliege und Schwalbenlaus. Uebrigens werden fie felbft von den Menschen in Schutz genommen, da ihr fleiner Haushalt Freude macht und sie eine Menge Insetten todten, die Menschen und Bich plagen. Nur an wenig Orten werden auch sie wie die vorigen gefangen und gespeift.

Bu dieser Abtheilung gehören noch folgende: Die Uferschwalbe, Sand=, Rhein= od. Wasserschwalbe (Hir. riparia.) ift 54 -5½ 3. lang und 12 3. breit, fieht auf bem Ropfe, Rucken, Flugeln und Schwanze braun= lichschwarz aus, Rehle, Bruft und Bauch weiß, vor der Bruft 2 fcmarggraue Flede; Schen= fel braunlichschwarz; Beine schwarzlich und über deren hinterzehe fieht ein fleiner Buichel von furgen harten Federchen, der Schwang hat nicht einen fo farten Ginfchnitt wie bei der Mehl= schwalbe und die niedergelegten Flugel reichen weit über denfelben hinaus. Gie legt ihr Reft in hohe, fteile Ufer der Fluffe und Steinbruche an, worin man tief hinten, wie oben beschrie= ben, 5 ichneeweiße garte Gier findet. Gle leben meift von Infeften, die in und um das Baffer sich aufhalten und von tiefen Thieren begierig weggehascht werden, weshalb man fie auch besonders am Waffer findet.

Die Salangane. (Hirund. esculenta. Lin.)

Dbigen Ramen gaben die Ginwohner ber Philippinischen Inseln einer-fleinen, fehr be= ruhmten Uferschwalbe, deren Refter ale eine fehr fofibare Leckerei verschieden zubereitet ver= fpeift werden. Poivre als Intendant von der Insel Frankreich und Bourbon berichtet als Mu= genzeuge: er rif felbft mehrere diefer Refter vom Felsen los, worin fich Gier und Junge befanden. Rach ihm machen fie es aus Fifch= rogen, mas er aus Bergleichung damit ju be= weisen fucht. Rach neuern Berichten follen fie von dunnem weißlichen Geetang verfertigt mer= den, den die Schwalbe zuvor faut und mace= rirt. Die Materie ift weißlich gallartig und liegt lagenweise übereinander. Um Ende Juli und im Unfang August, durchreifen die Cochin= dinefer die Infeln, welche an ihren Ruften lies gen 20 Meilen weit vom feften Lande, um die Refter diefer fleinen Schwalben gu suchen. Die Salangane befindet fich nur auf diefem unge= heuren Urchipelagus, welche die offliche Grange von Ufien ausmacht.

Dieses Bogelchen hat nur 2 Farben, die schwarzliche, welche auf dem oberen Theile

herrscht, und die weißliche, die auf dem ganzen Untertheil die Hauptfarbe ift, und die sich auf den Spigen der Nuderfedern befindet; die Iris ist gelb, der Schnabel schwarz, die Füße braun. Die ganze Lange des Wogels besträgt 2 Zoll 3 Lin., der Schnabel 2½ Lin., eben so groß ist die Fußwurzel; der Schwanz 10 Linien. besteht auß 12 Nuderfedern und ist gespalten.

3) Schwalben mit geradem Schwange.

Die Felsenschwalbe. (Hirund. rupestris. Hirund. montana Gmel.)

Die obern Theile des Korpers hellbraun: Reble weißlich; Bruft und Unterleib fcmutig rothlichgrau. Flügel und Schwanzfedern fcmarg= lich, lettere mit weißen Flecken. fcmarglich, Fuße fleischfarbig. Lange tes Bogels 5 3. Die Flugel ragen noch einen Boll über den Edwang hinaus, wenn fie in Rube liegen. Gie bewohnt die marmern Felfenge= genden von Europa; gabireich an den Ufern des Mittelmeeres, gemein in Savoyen und Diemont, weniger in den Bebirgen der Schweig, wo fie Bergruinen und Felfen bewohnt. Gie erscheint Ende Marg und zieht im Oftober wieder meg. Mit den übrigen Schwalben-haben fie vieles gemein und leben nur einzig und allein von Infetten. Ihr Reft ift funfilos, in Felfenrigen an fenfrechten Felfen von 4-500 Buß Sohe angebracht. Gie find fcmer ju schießen, außerdem halt es fcmer, ihnen beis zukommen.

4) Schwalben mit Stachelfdmangen, deren furge Schwanzsedern verlangerte Schafte ohne Barte haben. Dazu gehort:

Die Louisianische Stachelschwalbe. (Hirund. pelasgia.)

Alle obern Theile sind braunschwärzlich, Flügel und Schwanz dunkler; über dem Auge ein weißlicher Strich; untere Theile graubraun; Rehle schmuhig weiß; Schnabel schwarz; Füße braun; die Schwanzsedern verlängern sich in Stackeln oder Schäfte ohne Bart. — Die ganze Länge beträgt 4 3. 3 Lin. — Man sinder sie in den vereinigten Staaten von Nordamerika, und von da bis Canenne und St. Domingo. Ihr Stackelschwanz dient ihr zur Unterstügung beim Anhängen an Mauern und Felsen.

Sie niften in hohle Baume und Felsenrigen, und machen nach Bilfon ihr Neft aus einer schleimigen Materie. Zuerft follen sie eine Grundlage von durren Reisern machen, dann allerlei Genifte dararauf legen, und alles zusamen mit Gummi des Storagbaumes (Liquidambar styracistua) zusammen leimen. Nach Andern foll diese Art Leim aus 2 eigenen Drusten am hintersopf kommen. Wilson gibt die Eier weiß an und sagt: daß ihre Zahl sich auf 4-5 belause.

Es gibt noch 2 hierher gehörige Stachel= schwalben: Hir. acuta und Hir. caudacuta, wo= von die erste in Martinique und die andere in Reuholland lebt.

Die 2te Hauptabtheilung der Schwalben enthält: die Nachtschwalben (Hirundines nocturnae.)

3 i e g e n m e l f e r. (Caprimulgus.)

Schnabel fehr furz, biegfam, niedergedruckt, leicht gebogen, wenig fichtbar, Mundoffnung bis binter die Augen gespalten; die Oberkinnlade an der Spige gefrummt, mit fteifen nach vorn ge= richteten Borften befett. Rafenlocher an der Burgel breit. 3 Beben nach vorn, eine nach · hinten, die willführlich auch nach vorn gefehrt werden fann (eine Wendezehe); , Magel furz, det Ragel der Mittelzehe lang, bei einigen Ur= ten fageformig gezahnelt, bei andern glatt. Der Schwang bald grade, bald gabeiformig aus 10 Federn beftehend. Flügel lang, die erfte Schwungfeder furger ale die zweite, welche die langfte ift. Mugen und Dhren groß, wie bei den Gulen. Die Augen find gegen das Tageslicht empfindlich, taber jagen fie nur in der Morgen= und Abenddammerung und beim Mon= denscheine Echmetterlinge. Das Gefieder ift weich und feidenartig, wie bei den Gulen, der Flug fdnell, doch leife. Gie fliegen mit weit geoffnetem Echnabel, um die fliegenden In= feften, ihre einzige Rahrung, gleich zu erhafchen, Die gleich am Rachen hangen bleiben, da der= felbe mit einer flebrigen, im Schlunde abge= fonderten Materie überzogen ift. Gie maufern nur einmal im Jahre; bilden übrigens eine febr natürliche und leicht zu unterscheidende Gattung, deren Urten felbft im Gefieder unter einander Alehnlichkeit haben. Abends fliegen fie oft um Schaf = und Biegenheerden herum, um Infeften

zu fangen, daher der Glaube und Rame bei den gemeinen Leuten: daß sie den Ziegen die Milch ausfaugen follten. In Sudamerika les ben die meisten, doch finden sich auch mehrere Arten in den wärmern Gegenden der alten Welt. Man kennt bis jest 28 Arten. In unserm Basterlande wohnt nur:

Die getüpfelte Rachtschwalbe, Bere, europäischer Ziegenmelfer. (Capr. punctatus. Capr. europaeus. Lin.)

Die Lange dieses Bogels beträgt 114 3. die Flügelbreite 24 3. Schwer lagt fich fein Gefieder beschreiben, es ift ein Gemisch von Grau, Roftfarben, Brandgelb, Schwarz und Beif. Die Bunge ift fehr flein und gang furg jugefpist, der Oberfiefer ift mit langen Barts haaren besett, welche so dick als Schweinsbor= ften und vorn an der Spite gang dunn find. Der Kopf und Niucken ift dunkel aschgrau, die Federn fein schmarzlich punktirt und mit einem fdwarzen Chaftfirid; am hinterfopf ift diefer am breiteften und bildet in der Mitte der Feder ein vollfommenes Langeband. Ueber dem Chuls terrand der Glugel geht ein Streif von fcmar= gen, rofifarben gemifchten Federn, unter diefem ein Streif weißlicher Flecken; die übrigen Deckfedern der Flugel graurothlich, fcmarz punktirt, mit ichwarzen Chaftfedern; die Chwangfedern roftfarben und ichmarz gebandert; der gange Uns terleib roftgelb mit ichmarglichen schmalen Quer= Das Mannchen unterscheidet fich vom bandern. Weibchen durch einen eiformigen weißlichen Bled, an der innern Geite der drei erften Gluz gelfedern, und durch einen andern an der Gpige der beiden erften außern Schwungfedern. Comang ift abgerundet.

Diese Art bewohnt ganz Europa. In Deutschland trifft man ihn in den Waldern, bes sonders in Nadelholgern, die an der Sonne lies genden Schläge, Biesen und Teiche in der Nähe haben, mehr im Borhölzern, als im Gebirge. Um Tage halt er sich gewöhnlich auf dem Bosden, in Diesigten auf und schwärmt des Nachts auf den Begen, Wiesen, Schlägen und an Teichen herum. Als Zugvogel kommt er erst im Mai und verläßt uns Ende Sept.

Es ift übrigens ein rafcher, ungeftumer, scheuer Bogel, ber auch am Sage gut fieht. Rach Sonnenuntergang verläßt er seinen Schlupf= winkel und fliegt umher. Er hat einen schonnen, leichten, schnellen, boch nicht gang ges

rauschlosen Flug, der durch farke Flügelschlage beschleunigt, etwas ichwalbenartiges hat. Bu= weilen Schwebt er eine furze Strecke und rit= telt dann, wenn er etwas Auffallendes bemerft. Bei der Paarung ichlagt das Mannchen, wenn es recht higig ift, die Flugel zusammen und flaticht mit demfelben, wie die Lauben. mondhellen Rachten fliegt er bis am Morgen in Abfagen um auszuruhen; in dunfeln Rach= ten ift er von 10 Uhr Abende bis 2 Uhr Mor= gens ziemlich rubig. Bu Ende Dai bis Ende Juli bort man die Stimme des Mannchens bald nach Sonnenuntergang bis jum volligen Einbruch der Nacht, und dann vom erften Schimmer der Morgendammerung bis jum Un= bruche des Lages. Er fist dabei meift auf ei= nem durren Ufte einer hohen Sichte, von da berab tont fein fcnurrender Son: rrrr, orrrr, das lettere einen Son tiefer. Das Beibchen hat ahnliche Tone, doch schwächer tonend. Auf dicken Aesten sieen sie der Lange nach, mit dem Leibe ruhend. Im Fluge laffen beide Geschlech= ter einen Lockton boren, der wie: bait, bait! flingt. Rabert man fich tem Refte, fo blafen fie wie die Gulen mit aufgesperrtem Rachen. Oft fliegen fie auch dem Menschen in der Nacht um dem Ropf herum, mas vielleicht den Na= men Bere veranlaßt haben mag.

Ihre Nahrung besteht wie der, der übrigen Schwalben aus Infeften, meift Mai= und Rog= fafern und fpatern Rachtfaltern. Der Uppetit ift gut, die Berdauung schnell. Im Berbft ift fein Rorper fehr feift und fein Fleifch wohl= schmeckend. — Gie machen jabrlich nur eine Brut. Das Weibchen legt feine 2 Gier auf die Erde. Man findet fie in Dicfigten, mo Diefe bloge Stellen haben, auf Schlagen im Baidefraut oder auf einem bemooften Baum= fructe, in einer Bertiefung. Die Gier find ver= haltnifmaßig sehr groß, 16 bis 17 Linien lang und 11 bis 12 Linien breit, langlich, an bei= ben Enden faft gleich ftumpf und auf meifti= chem Grunde mit vermafchenen afchblaulichen und deutlichen mondfarbigen Fleden marmorirt, welche bald dichter, bald einzelner ffeben und in einander laufen und ftete unregelmäßig find. (Sich. Naumann und Buhle, die Gier der Bogel Deutschlands Heft I. Taf. I. Fig. 12.) Das Beibehen foll fie allein ausbruten und die Jungen fehr lieben. Rabert man fich dem Refte, fo flattert es wie gelahmt am Boden herum, und fucht fo den Feind vom Refte zu entfer= nen. Die Jungen laffen fich mit Rafern und

Fliegen aufziehen, bleiben aber felten lange am Leben. Die brutenden Beibehen und Jungen haben an den vierfüßigen Raubthieren ihre Feinde. Man erlegt sie mit der Flinte. Uebrisgens nugen sie durch ihre Nahrung. — Eine 2te europäische Art ist der rothhalsige Ziegensmelfer (Capr. rusicollis) und lebt in Spanien.

Der große Ibnau. (Caprim. [Nyctibius. Vieillot.] grandis.)

Much das Gefieder dieses Bogels ift ein Gemisch von Braun, Schwarz, Falb und Beiß. Der Ropf und die untern Theile des Korpers haben feine enge Querftreifen von derselben Farbe. Die Schwungfedern find schwarzlich mit falben ichiefen Streifen; der Schmang braun und roftfarben marmorirt, etwas abge= ftumpft. Die Schnabeloffnung 3 Boll lang; die Ragel find gefrummt und bilden unten gu beiden Seiten eine Rinne, die durch eine Grathe in 2 getheilt wird. Die Lange diefes Bogels beträgt 20 3. Brafilien, Cayenne, Paraguay und andere Theile Gudamerifas find fein Ba= terland. Um Tage lebt er verffecft in hoblen Baumen, die nabe am Baffer fteben. Bum fiten auf Baumen mablen fie die bochften, mo fie fich auf einen dicken Uft, der Lange nach fo fegen, daß die Balfte des Rorpers vorragt und fo den Uft zu verlangern fcheint. diefe Urt find fie schwer zu entdecken. Auf der Erde figend, breiten fie die Glugel aus, um fich auf fie und den Schwanz zu frugen, ohne fich der Fuße zu bedienen. Ihr Gefchrei ift laut, lang und melancholisch, man hort es faft die gange Racht hindurch. Das Beibchen be= antwortet das Gefchrei des Dlannchens. Die Jager die fie fangen mollen, geben bei Une bruch des Tages ihrem Gefchrei nach, und be= muben fich ihren Gig ausfindig zu machen. 3ft dies geglückt; fo fehren fie gegen Mittag juruck und werfen mit einem Strick nach demfelben, mo fie ihn dann lebend fangen. Gie figen am Tage unbeweglich mit geschloffenen Augen; bei eintretender Dammerung aber, durchftreifen fie nach allen Richtungen die Luft. Ugara batte einen lebenden, der wenn man ihn in die Sand nahm, feine unangenehme frarte Stimme: gua! horen lief. - Ihre Rahrung find In= feften. Gie niften in boblen Baumen, mo fie ohne alle Unterlage in eine fleine Bertiefung ibre 2 braunen und dunkelgefleckten Gier bin= legen.

Pobarge. (Podargus.)

Schnabel fart, hart, gang hornartig, viel breiter als boch; fehr erweitert, breiter als die Stirn, Grathe des Schnabels abgerundet. Oberfcnabel von der Burgel an gefrummt, an der Spige fart gebogen; die Rander der Kinnlade fehr ausgedehnt; die Mundoffnung bis hinter die Augen gespalten; die Rafenlo= cher linienformig gespalten. Buge dunn, drei Beben nach vorn, die innere an die mittlere mit einer Saut verbunden, die außere faft gang frei; Ragel furg gebogen, der Ragel der Bin= terzebe platt, die hinterzehe nur gur Salfte verfehrbar. - Die Urten diefer fo merfmur= digen Gattung leben in Java und Reuholland. Ihr farfer Conabel zeichnet fie fehr von den Biegenmelfern aus. Ware er mehr zusammen= gedruckt, fo murde er mehr dem der Gulen gleichen, mit benen fie übrigens im nachtlichen Berfehr und dem weichen Gefieder Uchnlichfeit haben. Bahlreiche Bartborften fiehen am Rande des Oberschnabels vor. Bei einbrechender Dam= merung verlaffen fie ihre Schlupfminfel, um ihre Rahrung aufzusuchen, die ebenfalls in Rachtfaltern und andern Infeften befteht. Uebri= gens weiß man noch wenig von ihnen.

Der gehörnte Podarge. (Potargus corn. Temm.)

Un jeder Seite des Ropfes in der Gegend der Ohren fieht ein ftarfer Bufchel langer, et= was zerschliffener Federn, oberhalb und hinter Diefe Federbuichel fiehen vom den Augen. übrigen Gefieder des Ropfes ab; fie machen mit den gablreichen Borften, mit welchen der Conabel umgeben ift, einen fonderbaren Ropf= put aus, der die Augen fast gang beschattet, und geben fo den Ropfe eine unverhaltnifmas fige Große, gegen die übrigen Rorpertheile. Die obern Theile des Rorpers hell rofffarben mit ichwargen Dreizacklinien, am Racken ift ein weißes halbes Salsband, an den Chultern find große weißblauliche Flecken, und jede Feder endet mit einem ichmargen Salbfreife; die Schwanzfedern find abgeftumpft, hell roft= farb, mit 7-8 dunfel rofffarbenen Bandern, welche fchwarz eingefaßt find, an der Etirn und hinter den Mugen find braungelbe Blecke, Mitte der Rehle und des Salfes weiß. Der Bauch weißlich, mit schwarzlichen Bickzacklinien; die Bufe rofifarben und der Echnabel glangend=

gelb. Die ganze Lange des Bogels ift 8½ 3. In Java und Sumatra lebt er in den dietsten Gebuischen.

Dritte Familie.

Regelfchnabel. (Conirostres.)

Begreift nach Cuvier die Geschlechter mit starkem, niehr oder minder fegelformigem Schnastel ohne Kinne. Sie leben um so ausschließ= licher von Kernen und Saamen, als ihr Schnabel diefer und starker ift. Das erfte Geschlecht bildet:

Lerche. (Alauda Linn.)

Schnabel: nicht lang, fast gerade lang= lich fegelformig rund oder menig zufammenge= drucit; der Oberfiefer dem Rucken nach gewolbt und ein wenig abwarts gebogen, die Schneiden deffelben etwas übergreifend, faum etwas lan= ger, ale der der Unterfinnlade. Rafenlo= cher: nahe an der Schnabelmurgel oval oder Bunge: nicht lang, flach, binten fast rund. nur etwas breiter als vorn, mit abgeftutter oder flumpf ausgeschnittener Spige. · Füße: drei Beben nach vorn, nie hinterwarts gerich= tet; Ragel nur wenig gefrummt, der Ragel der Sinterzehe meift fo lang als diefe, fart und fast gerade. Flugel: etwas groß und breitfederig. Das gange Gefieder etwas derb; die Federn am Sinterfopfe gioß, aufgerichtet, eine icheinbare oder eine wirfliche Saube bil= dend.

In den Farben des Gefieders liegt etwas allgemein ahnliches, was man mit dem Namen lerchenfarbig und lerchengrau bezeichnet. In Deutschland haben wir davon 6 Arten.

Die Felds, himmeld= Ackerlerche, Pardale. (Al. arvensis. Linn.)

Die außerste Schwanzseder bis auf einen schwarzlichen Streif an der innern Fahne, und die Außensahne des zweiten sind hell weiß. Es ift ein so bekannter Bogel daß eine ganz genaue Beschreibung überstüssig mare. Die Größe ist 7—7½ 3., Flügelbreite 14½—14¾ 3., der Schwanz etwas über 3 3. lang, wovon die Flügel fast zwei Drittheile seiner Lange bedecken.

Schnabel 1 3. Sieht man diese Lerche in ei= niger Entfernung, fo hat fie die Farbe lehmiger Erdfloje, mas ein naturliches Schutmittel ift; leicht wird fie dadurch von ihren Feinden über= Mannchen und Beiben unterscheidet nur ein geubtes Muge. Das Beibchen ift ftets kleiner und an den obern Theilen, wie an der Bruft grober und dunfler geflectt, die Feder= kanten fallen oben mehr ins Beifliche und der roftgelbe Unflug an der Ropfgegend ift viel blei= cher. Ihr Berbfiffeid ift viel frifcher und brau= ner, oft ins Rothbraune fallend. Es gibt un= ter ihnen fehr mannigfaltige Barietaten, g. B. isabellfarbene, schwarze und grauweiße, lettere find die feltenffen; auch findet man unter ib= nen verschiedene Difffaltungen am Echnabel und wohl auch an den Gugen; dies ju finden, gibt es in Salle, wo fo viele gefangen werden, oftere Gelegenheit. Die Mauferzeit fallt im August und Ceptember.

Die Lerchen find fehr weit verbreitet, man findet fie in gang Europa, in einem großen Theil von Uffen und felbft in Ufrifa. Um meiften jedoch da, mo der Uckerbau blubt. Es ift eine der haufigften Bogel. Im Berbit ver= laffen fie ihre nordliche Beimath, und übermin= tern in fudlichern Breiten. Gegen das Grub= jahr fehren fie wieder gurudt. Ende Geptem= bers gieben die unfrigen und machen den aus Rorden und Often fommenden Plat; diefe fom= men dann im Oftober zu Saufenden an und giehen durch. Bei gelindem Winter bleiben bismeilen fleine Gefellichaften da. Um Licht= meß, d. i. Unfangs Februar fehren fie meift Schaarenweise guruck. Gie fliegen am liebften gegen den Wind, daher sieht man gegen den Oftober bei frifdem Befiminde, oft Chaaren von vielen Saufenden niedrig über die Erde Alles dies geschieht am Tage, von hincilen. Morgens 8 Uhr bis gegen Mittag; des Rach= mittage liegen fie meift ftill, ruben fich aus Bei schlechter Witte= und suchen Rahrung. rung und contrarem Winde bleiben fie unt wer= den dann fehr fett. Edon gegen Abend, wenn fie fich erholt haben, rucken fie meift weiter, bei hellem Mondschein ziehen sie die ganze Racht bindurd).

Es find ziemlich unftate Bogel, die fich immer herumtreiben, laufen, fliegen und fingen. Sie find zankisch, die Zugzeit ausgenommen, wo sie sehr gesellig sind. Um hitzigften sind die Kampfe der Mannchen im Fruhjahr, wo keines die Granzen des kleinen Neviers dem andern überschreiten laft. Ihre großen Flugel erlauben ihne viele Beranderungen und hoben Aufschwung und Schnelle. Ihre Stimme hat fehr verschiedene Modulationen und ift befannt genug. Gie fingen von Sagesanbruch bis in Die fpate Racht hinein. Rein Bogel fingt an= haltender im Fluge, als die Feldlerche und ent= schwindet oft dem Muge in diefer Sobe, wo fie über Ctadte und Dorfer ihr Liedden hell, rein und fart ertonen lagt. Die Beibchen fingen auch, doch nicht fo gut, als die Mannchen. Im Bauer gehalten, fpringen fie oft auf, fto= Ben fich den Ropf ein, daher muß ein folcher Bauer 2 F. lang, 1 F. breit und 11 F. boch fenn, einen Schieber haben, worauf man Sand streut und auf diese Urt ihn reinlich halten fann. Springholzer bedarf er nicht. Gie lernen jung aufgezogen, musifalische Ctucke, auf der Dreb= orgel vorgespielt. Im Bauer gut gehalten, dauern sie an 8 Jahr, nicht fo lange in den Ctuben .=

Im Sommer leben fie mehrentheils von fleinen Raferchen, heuschrecken, Spinnen und deren Larven, die fie auf der Erde auflesen. Im herbst machen Gefame ihre hauptnahrung. Sie fressen den Samen mehrerer Graearten, auch gern hirfe, Mohn, hafer, Weizen. Die Lerchenjanger behaupten, daß sie vom hirfensgrabsamen (Panicum) am schnellsten sett werzden. Bur Berdauung verschlucken sie fleine Steinchen. Sie baden sich gern, doch nur im Sande oder Staube.

Das Rest steht stets auf dem Erdboden meift in einer fleinen Bertiefung. Das Beib= den baut es und das Dannchen tragt die Materialien dazu herbei, als alte Stoppeln, burre Graeffocichen ic. Der nicht fehr tiefe Rapf ift meift mit Pferdehaaren ausgelegt. Oft fcon im Morg findet man Reffer und im Upril Gie niften 2-3 mal des Jahres. Die Gier find verhaltnifmaßig ziemlich groß, oft großer als die der Saubenterche. Gie find entweder acht eiformig, oder auch fürzer und abgeffumpfter, oder gegen die Mitte fehr bauchig, an den Enden etwas fpigig, eine garte aber nicht glangende Schale, der Grund ift ein trubes gelbliches oder rothliches Beif, von vie= len schwachen grauen Beichnungen noch mehr getrübt, mit Punften und Blecfen von grauli= chem Braun und Grau, aber fo überfact, daß nur felten viel vom Grunde fichtbar bleibt. Manchmal find fie wie gemarmelt, grober oder deutlicher gefleckt, bisweilen auch am frumpfen

Ende ein dunkler Fleckenkranz. Bei der erstenBrut findet man 5—6 Eier, bei der folgens
den stels weniger. Sie werden in 14 Lagen
meist vom Weibchen allein ausgebrütet. Sie
werlassen das Nest ehe sie noch fliegen können.
Man muß sie daher zeitig ausnehmen. Die Alten lieben sie sehr; bei Gefahren warnen sie
dieselben durch die Tone; Tidrir oder fanst
gedehnt, Drier, worauf sie sich gang still vers
halten. Mit Insesten und deren Larven füts
tern sie dieselben groß.

Sie haben fehr viele Feinde. Unter den Do= geln befonders den Lerchenfalten, bei deffen Unblick fie verfrummen, fich auf die Erde drucken ober durch Hochaufschwingen bis zu den Wolfen ihm ju entfommen fuchen. Berfolgt fuchen fie unter Wagen, unter dem Biebe und felbfr bei Menschen Buftucht, wo sie dann oftere auch gefangen werden. Mehrere Falfen jagen fie, 3. 23. der Merlin und Sperber, vorzüglich aber Gier und Junge vertilgen die Beiber, die oft Die Alten felbft auf dem Refte beschleichen. Unter den Caugethieren der Fuche, Marder, Wiefel und mehrere Maufgarten, Igel, Ra= gen 2c. Außerdem werden noch ungahlige Bru= ten durch Plagregen und Sagelwetter ruinirt. Bedenft man nun noch, mas jahrlich durch Menschen von diesen Bogeln gefangen wird, fo muß man allerdings faunen, daß man bis jest boch noch feine Ubnahme bemerfte. -Mußerdem plagen fie Comaroger im Gefieder und auch Eingeweidmurmer.

Sie werden auf mancherlei Art gefangen. Am Sage mit dem sogenannten Spiegel, bei und im Fruhjahr und Serbst von den dazu bezrechtigten Halloren. — Gine Abbildung von diesem so sonderbar gestalteten Lerchenspiegel sindet man in Naumann's Naturg. d. Bozgel Deutschl. Thl. IV. S. 187.

Den ergiebigsten Fang gewährt das sogenannte Lerchenstreichen, was beim Herbitzuge, etwa den October hindurch, auf zweierzlei Urt mit Tag und Nachtnehen betriez ben wird. Die erste Urt wird mit Menschen, auch mit Pferden, die an lange Seile gespannt, die Lerchen gegen die Wände, d. h. Nege die senkrecht herabhängen und an Pfähle befestigt sind, getrieben. Diese Urt ist kosispiezlig, oft aber sehr angenehm und ergiedig. Dieses Zusammentreiben geschicht gegen Ubend. Die Nehe und Leinen dazu kosten an 400 Thir.

Man fann aber in einem Abend 16 - 25 Chock fangen. - Die zweite Urt ift eine faure Arbeit, das Net zu tragen und die Nacht burch bamit über die Felder ju geben. wird von 2 Mann getragen, bat an 2 Geiten eine Ctange. Man tragt dies große Reg fo, daß es einige Suß über dem Ucker horizontal schwebt, sobald die Bogel darunter aufflattern, laßt man es fallen und druckt den Befangenen die Ropfe ein. Stille, trocfne Bitterung bes gunftigt den Fang. Das Ret ju der andern Airt foftet mit Leinen und Stangen 7-8 Thir. Es ift meift 80 Juß lang und 26 Fuß breit, cs ift aus feinem flachsenen Zwirn spiegelicht geffrieft, die Masche 11 3. lang und breit. Man fångt bamit in einer Nacht 4-8 Schock wenn es gut geht. Bei hellem Mondichein, faltem und naffem Wetter, fangt man oft gar nidits.

Um fie lebendig zu befigen, bedient man fich des Lerchenftichs. Dies gefchieht im Frühjahr. Man bedient fich dazu eines leben= digen Mannchens. Diefem werden die Flügel= fpiten über bem Schwanze zufammen gebun= ten, worauf ein kleines gabelformiges Leim= ruthchen befestigt ift, mas in die Sohe fieht, wenn fich nun auf dem Velde ein Dlannchen in die Sohe schwingt, laßt man das feinige Das fingende aufschwingende Mann= laufen. den, fieht in diefem einen Debebenbuhler, schieft darouf los und bleibt an der Leimruthe fleben. Co fann man in einem Bormittage eine große Mlenge fangen. , Sperber, Ler= den = und Merlinfalfen richtet man auch auf fie gur Beibe ab.

Ihres wohlschmeckenden Fleisches wegen werden im Berbft unglaublich viel gefangen und weit verschieft. Salle und Leipzig mit ih= ren Nachbarlandern find in diefer Sinficht auch berühmt. In manchen Sahren foll man nach der lettern Stadt, laut der Uccifeliften 1 Mitzlion eingebracht haben. Fur Jagdbefiger und manche arme Leute, die fich das Richt zu ffrei= den pachten, gibt es ein ergiebiges Ginfom= Außerdem ergobt ihr Gefang im Freien und in der Stube, befonders als erfte Fruh= lingsboten, ftimmt das Berg ju Dant gegen den, der und ihn fehren ließ. Außerdem nus Ben fie noch dadurch, daß fie viele Inseften vertilgen helfen, und durch Bergehren des Ca= mens viele Unfrauter, die fich dadurch weniger vermehren fonnen.

Die Sauben = Lerche, Rothmond, (Alaud. cristata. Linn.)

Auf dem Ropfe eine fpige Saube, Die fich nicht verbergen laßt, und aus schmalen langett= formigen Federn jusammengefest ift; die Un= terflugel matt gelbrothlich. Gie gehert ju uns fern großten Lerchenarten. Lange 7-71 3., Flügelbreite 14-15 3., der Schwang 23 3. lang; die Flugel bedecken ihn bis auf 2 3oll. Der Schnabel 8 Linien lang. Die Bris hell= braun. Die hinterzehe mit dem 6 Linien lan= gen Ragel oder Sporn 11 Linien lang. Die spitige Saube, welche diefe Lerche fehr kennt= lich macht, beffeht aus 6-8 schwarzlichen, graubraun gefanteten, ichmalen, fpigen und faft 1 3. langen Federn. Gie find zu befannt, als daß wir es nothig hatten, fie noch genauer ju beschreiben, da fie besonders im Winter vor und in Stadten und Dorfern, Nahrung fu= chend, häufig herum zu laufen pflegen. Mann= den und Weibchen laffen fich, wie bei vor= hergehender Urt, schwer von einander unter= Scheiden.

Diefer Bogel gehört mehr dem Guden als dem Rorden an. In Franfreich und Deutsch= land ift fie gemein, in der Schweiz dagegen felten. Wo fie aber auch ift, fo ift fie doch nie fo baufig, als die Feldlerche. Bei uns find fie meift Standvogel, nur wenige Strich= vogel. Diese Strichzeit ift im November und December. Die Parchen bleiben Jahr aus Jahr ein an ihrem Brutorte. Gie wohnen gerft in der Rabe der Menfchen. 3m Winter fommen fie in Stadte und Dorfer. Gern frellen fie fich auf fleine Suget und Erdichollen, auf Bande, Mauern und Dacher. Ihr Wohnplat erftrectt fich im Sommer nur einige hundert Schritte langs Fahrwegen, Garten = und Uckerrandern, wo man fie daber immer antrifft. Mußer der Begattungszeit ift diefe Lerche ein filler Bogel, der den Menfchen eben nicht fürchtet. - Mann= chen und Beibchen halten fich immer gufam= men, und findet fich nicht felten im Winter unter Sperlingen und Ummern, fonft hadern fie sich oft mit ihres Gleichen, auch mit andern Bogeln herum:

Thre Stimme ift lerchenartig, doch von den Borigen fehr verschieden. Im Fortfliegen laßt sie ein leises: Said hoid, mas mand,mal wie broid flingt, horen; selten folgt die Lockstimme: guie, die wenn sie vollständig ift, wie: Guiguiguie oder Dudidria lautet. Unge-

nehmer ift indeffen der Gefang des Mannchens, den er im Fruhlinge meift fliegend, ertonen lagt. Bung aufgezogen ternen fie mehrere Lieder pfeisfen und halten fich überhaupt beffer in Stuben und Bauern als die Feldlerche.

Sie leben mehr von Camerei als von Insesten, doch futtern sie mit letztern meist ihre Jungen auf. Unter den Getreidearten fressen sie gern Hafer und Waizen, unter den Gräsern den Samen des Hirschengrases (Panicum Lin.) eigentliche Hirse, Canariensamen ze. Sie basden sich gern im Staube, was sie im Sommer oft auf den Fahrwegen zu thun pflegen. Im Bauer muß man ihr daher auch treefnen Flußsand schütten. Die Jungen füttert man mit Ameiseneiern und etwas in Milch gequellte Cemmel auf.

Ihr Neft findet man in der Nahe menichli= der Bohnungen, vorzüglich in folden Garten, worin man Getreide und Rartoffeln baut, in floinen Bertiefungen auf der Erde, feltner auf alten Lehmmanden zc. Es ift fchmer zu finden; fie fliegen erft auf, wenn fie ein Ctuck davon ge= laufen find; fo laffen fie fich auch nicht gleich beim Reft nieder, um es nicht zu verrathen. Db fich gleich Dannchen und Beibehen fets zusammen halten; so hilft das Mannchen boch das Reft nicht mit bauen, fondern beglei= tet es nur beim Berbeifchaffen der Materialien und Bauen des funftlofen Reftes. Man fin= det gewohnlich 4-6 Gier darin. Un Farbe und Große gleichen fie benen der Feldlerche, doch meift furger geformt, an beiden Enden oft schnell abgeftumpft, die Zeichnungen bestimms ter oder mehr vom Grunde abftechend; auch hat die Echale eigenen Glang und auf gelb= lich = oder rothlichmeißem Grunde fehr viel afd)= graue und gelbbraune Punfte und fleine Flockden über die gange Flache gerffreut. Auch fie variiren fehr und bismeilen fieht man am fumpfen Ende einen Fleckenkrang. Das Diannden scheint das Weibchen mehrmals, am Tage beim Bruten abzulofen. Die Entwickelung und Ernahrung der Jungen ift wie bei der Feld= lerde. Gie bruten 2 mal im Jahre.

Da fie nahe bei Menfchen wohnen, leiden fie weniger von Naubrogeln, defto mehr von Ragen, Mardern, Iltiffen und Wiefel. Sie werden fehr von Schmarogerinfesten geplagt. Diefe harmlofen Bogel werden leicht gefangen mit Leimruthen, Schlingen, Negfallen, felbst mit einem aufgestellten Siebe. Sie haben ein schmackhaftes Bleisch, ihr Gefang erfreut, sie

nugen auch wie die vorige burch ihre Rahs rung.

Die Beibe=, Baum= Bufchlerche. (Alaud. arborea. Linn.)

Der Schnabel flein und fcmach; ber Schwang etwas fur; die Federn des hinter= fopfes ziemlich groß, eine (fcbeinbare) runde Solle bildend, welche mit einem gelblichmeißen Rande umfrangt ift; die Decffedern des Fittigs mit roffgelben oder gelblichweißen Enden, da= ber an den Flügeleifen mehr weißliche Fleite. Bierdurch unterscheider fie fich von der Teld= lerche, mit der fie Mehnlichkeit hat. Ihre Lange beträgt 64 - 63 3., Die Flügelbreite 121 134 3., Schwanzlange 2 3. 2 2. bis 2 3. 4 2. Die ruhenden Flugel decken 3 des Schwanges, welcher aus fehr breiten, am Ende fchief abge= rundeten Federn beffeht, deffen Ende nur wenig ausgeschnitten und an den Gefen abgerundet ift. Der Schnabel 5 Lin. lang, ichwach, langlich, fegelformig. Iris lebhaft braun, bei Jungen grau. Die Binterzohe mit dem 8 Lin. langen Sporn 1 3. lang oft noch bruber. Much hier find Mannchen und Beibchen Schwer zu un= terscheiden; letteres ift etwas fleiner, meniger gelb und matter braun, aber frarter geflecft, be= fonders am Mantel und Ropfe.

Die Beidelerche bewohnt das fudliche, mitt= fere und einen Theil des nordlichen Europas in fandigen unfruchtbaren Strichen bei und in den Baldern; bewohnt auch gebirgichte Gegenden. In Deutschland ift fie Bugvogel, mandert als folder in die fuolichen Theile von Europa und fehrt von dort im Gruhling wieder guruck, Bei und giehen fie im September und fehren im Mary wieder gurud. Gie giehen am Sage gu 12 bis 30 Stud beifammen in den Bormit= tageffunden, liegen dann fill und rucken Rach= mittage nur ein Stuck fort. Gie lagern fich ftets in der Rabe von Batd und Gebufd, auf die, diefen junachft liegenden Stoppelacter oder auf wifte Felder, wo Beide (Erica) machft, gern auch in Beigenftoppeln. Da fie nur vor= züglich die Begenden, die mit Beide befest find, liebt, so verdient sie auch obigen Ramen be= fondere. Gie zieht folche Plage por, auf de= nen einzeln Radelholz, als Riefern zc. fteben. Ihre Rachtrube hatt fie wie die übrigen Arten, auf der Erde. Sohe Baume befuchen fie nur, um fich umzufeben, und die Mannchen, in ih= ren Gipfeln ju fingen. Gie ichlafen zeitig und

feft, fo daß die Lerchenftreicher fie bei dunkeln Rachten überftreichen, ohne daß fie auffliegen.

Es ift übrigens ein fehr angenehmer, fanf= ter und etwas angfilicher Bogel. Bei Befah= ren bruckt fie fich meift nieder und fucht ihnen dadurch zu entgeben. Ihre Stimme ift fanft und angenehm und beffeht aus flotenden, lul= lenden und jum Theil trillernden Sonen. Gi= Bend und fliegend laßt fich das niedliche Mann= chen horen. Mit angezogenen Flügeln Fürgt es dann, des Gingens und Schwingens mude, ploglich herab. Gie fingen vom Marg bis jum Juli, die jungen Mannchen diefes Jahres fin= gen vom Huguft bis in den October. Die al= ten Mannchen fingen in der Brutzeit ju allen Sagedzeiten, fogar um Mitternacht. fingen fie auch im Rafig, mo fie, wie die Ler= chen gehalten merden. Gie leben bier 3 - 4 Jahre, im Bimmer nicht einmal fo lange.

Gie leben mehr von Infeften als Game= reien, unter lettern Mohn, Sirfe 2c., auch fin= det man befonders wenn fie viel Befame ge= noffen, Sand und Steinchen in ihren Magen. Much fie baden fich im Staube und trockenem In der Befangenschaft muffen fie je zuweilen unter Sanf, Birfe, Kanarienfamen, Umeisencier oder auch einen Mehlwurm mit Die Jungen futtert man wie die vo= erhalten. rigen Urten auf. Rur um die Beibchen und Die Brutplage ftreiten fie fich, fonft nie. Bald nach ihrer Unfunft fuchen fie ihre Brutplate und machen Unftalt jum Refibau, mas oft im Marg schon geschieht, so daß man im Upril dann ichon große Junge findet. Go daß fie 2 bis 3 Mal in einem Sommer bruten. Das Reft ift auf der Erde, meift in einer felbft ge= machten Bertiefung, es ift ein lofes Geflecht aus durren Salmden und Grasblattden, etwas Moos, ofters etwas Bolle und Saare inmen= big. Darin findet man 4-6. Gier bei denen Farbe und Beichning varifren; benn bald ift die Grundfarbe ein fdmußiges Bleichroth oder grau= liche blaffe Fleischfarbe, bald ein geibliches Beiß= grau, oder ein grauliches Beif, dort mit Roth= braun und Bioletgrau oder hier mit Gelbbraun und Afchgrau geflecht, getupfelt und punftirt, auch marmoritt; ber Grund wird davon nicht frart bedeckt und dann haben die meiften noch furze Haarzüge und erunde Brandflecke von ichwarzbrauner Farbe, wodurch fie manchen Ummereiern ahnlich werden. In 13-14 Ed= gen werden fie ausgebrutet. Das Mannchen brutet unter Mittage ein paar Stunden lang. Beibe Gatten ziehen indeffen die Jungen mit Insesten auf. Auch diese Jungen verlaffen bas Reff ehe sie noch fliegen konnen. Die Jungen bleiben bei ihren Eltern, bis diese zur zweiten Brut schreiten. Beim Zuge halt sich dann die kleine Familie beisammen.

Die Feinde haben fie mit vorigen Arten gemein. Sie werden auf Beidelerchenheer=
ben gefangen, und da fie der Rockstimme gern
folgen, so werden fie auch in Schlingen, auf Leimruthen und Steckgarnen gefangen. Auch mit dem Lerchenspiegel und Nacht=
negen erwischt man fie. Ihr Fleisch ift de=
likater als das der Feldlerchen, mit der sie

Die Berg=, Alpen=, Schnee=Lerche. (Aland. alpestris. Linn.)

gleichen Rugen haben.

Muf jeder Scite des hinterkopfs fehen ei= nige langere schmale Federn, welche aufge= ftraubt einen fleinen zweitheiligen Schopf, einem Paar Borner ahnlich, bilden. Stirn und Reble fcmefelgelb; ein Streif an den Bugeln und Wangen, nebft einem halsbandartigen Fleck auf der Mitte der Gurget, tief fcmarg. Un Geftalt gleicht fie der Feldlerche, ift aber noch etwas frarter. Gie ift 7 bis 74 3. lang und 13 bis 14 3. breit; der etwas ausgeschnittene Schwanz gegen 3 3., der Schnabel 5 bis 6 Linien lang. Die hinterzehe mit dem faft 8 Linien langen Lerchenfporn über 12 Lin. lang. Unter den 6 einheimifchen Urten ift diese die schönste. Der hinterhals bis an die Seiten der Oberbruft und die fleinen Glugeldeckfedern find braunlichgrau, mit schmugig rosenrothem Ueberflug; Ructen, Schuttern und Burgel braungrau dunkel gefleckt, Bruft und Bauch weiß. Das etwas fleinere Weibchen ift weni= ger fcon.

Diese Lerchenart bewohnt das nordliche Umerika und Nordafien in Menge; sie kommt bisweilen nach Preußen und Schlesien, sehr selten in die Mitte Deutschlands. Es ist ein Zugvogel, der die übrigen Eigenschaften mit unsern Lerchen gemein haben soll. In Deutschland niftete noch keine.

Die Rurzzehige=, Sfabell= Lerche. (Al. brachydactyla. Leisl.)

Schnabel furz und ziemlich ftarf; die Behen furz; die hinterften Schwingfedern fo lang, als die vordersten; an den Seiten des Halfes ein schwarzer Fleck, sonst der übrige Unterkörper saft ungesteckt; Hauptfarbe sehr licht hellelehmfarbig. Sie ahnelt der Feldlerche, doch ist sie kleiner, der Schnabel stärker und die Ichen kürzer. Ihre Lange beträgt 5\frac{3}{4} 3., die Breite 11\frac{1}{4} dis 11\frac{1}{2} 3. Der Schwanz etwas über 3\frac{1}{4} 3.; die in Nuhe liegenden Flügel bedecken davon \frac{2}{3}. Der Schnabel ist 5\frac{1}{2} lin. lang und an der Wurzel (im Durchschnitt) 2\frac{1}{2} lin. hoch. Die Hinterzehe mist 3\frac{1}{2} lin. und ihr nicht sehr großer Sporen eben so viel.

Das Beibchen abnett dem Mannchen gang, nur der braune Halsfleck ift lange nicht fo auf= fallend. Ihr Herbfilleid ift stets schoner, das gange Gesieder ift wie mit einem rothlichen

Roftgelb oder Ifabellfarbe übergoffen.

Diese Lerche ift erft vor wenigen Jahren entdeckt, sie bewohnt das warmere Europa; in Oberitalien ift sie nicht selten. Um Mainz hat man auch einige Exemplare geschoffen. Sie lebt auf freiem Felde, auf bebaueten Fluren, wie auch in oden Gegenden. Sie ift theils Stadt = theils Strichvogel.

Im Betragen soll sie der Feldlerche, noch mehr aber der Kalanderlerche ahnlich senn. Sie soll schon singen, und deshalb in Stuben und Rafigen, wie die unfrige gehalten und auch so behandelt werden. — Ihre 4—5 Gier, welche auf blassem, isabellfarbigem Grunde mit einem schwachen rothlichen Braun so undeutlich marmorirt sind, daß sie, nicht ganz genau bestrachtet, einfarbig milchkassecharben aussehen und man sie daher fast ungesteckt nennen kann.

Die Ralander= Ring=Lerche. (Alaud, calandra, Linn.)

Ein auffallend großer, diefer (finkenartiger) Schnabel, etwas große Flügel und ein furger Schwang; an den Geiten des Salfes ein großer fcmarger oder brauner Fleck; durch den Flügel ein weißer Querffrich, von den Spigen der Schwungfedern zweiter Ordnung gebildet. Es ift die größte unter den einheimischen Lerchenar= Thre Lange beträgt 71 bis 73 3., Flu= ten. gelbreite 16 bis 17 3. Der Schwang am Ende wenig ausgefchnitten 21 bis 2 3. 7 lin, lang; die Spigen der ruhenden Flugel reichen faft bis an beffen Ende. Der Schnabel 7 bis 8 Linien lang, an der Burgel bis 5 Lin. hoch. Bris dunfelbraun. Der Sporn 71 Linien lang. Das Gefieder hat faft die nehmliche Farbe, wie

bas der Feldlerche. Das Weibchen ift ftete et= mas fleiner, unterscheidet fich aber vornehmlich durch den fleinern, mattern, oder vielmehr aus fleinern Gleckchen jufammengefegten Salsfleck, und durch die mehr gefleckten Geiten des Ro= pfes. Als einen füdlichen Bogel fieht man ihn baufig im warmen Ufien, auch im mittaglichen In den beißen Landern ift fie ein Europa. Standvogel, in den meiften von Europa theils Strich = theils Bugvogel. Gie bewohnen die großen Steppen, doch auch Betreidefelder und Biefen, wie die Feldlerche, benen fie auch im Betragen und in andern Cachen gleichen follen, fie aber im Gefang weit übertreffen. Hebrigens werden sie auch wie diese gehalten und behandelt, da sie auch dieselbe Rahrung ver= langen.

The funftlose Neft sieht auch auf der Erde, hinter Erdschollen oder auch nur in einer Berztiefung wie das der Feldlerche. Die Gier 4—5 an der Zahl, sind fast so groß, als die des großen Würgers, von etwas diefer oder fürzer Gestalt, in der Mitte am startsten, auf glanzendem, weißem Grunde, mit vielen gelbbrausnen und grauen Fleckhen und Punkten, die zum Theil in einander fließen, über und über bedeckt, daß sie fast marmorirt genannt werden

fonnen.

Ihr Fleisch ift eine wohlschmeckende Speise; auch nuten sie durch Bertilgung vieler kleiner Beuschrecken und anderer Insekten.

Meife. (Parus. Linn.)

Schnabel gerade, furg, fart, bart, fegelformig, ein wenig zufammengedrudt; beide Rics fern faft gleich lang und jemlich gleich ftart; die Schneiden scharf. Rafentocher: an der Schnabelmurgel, flein, rund. Bunger faft gleich breit, nicht lang und hart; an der Spike abgeffumpft, mit mebreren Bundel, im Grunde jum Theil vermachsener Borften befest, Gufe: furg, fart; Borderzehen getheilt, die hintern besonders fart; Ragel fart, febr gefrummt, mit Scharfer Spige, der hintere besonders groß. Flügel: etwas flein und furg. Gie haben einen furzen Korper, der mit langen, haarar= tigen, zerschliffenen Federn bedecft ift, das auf= geffraubte Gefieder, wie aufgedunfen über die Flügel vortretend, worin fie ichlafend den Ropf ju verbergen pflegen. - Es find fleine unge= mein unruhige, gewande, liftige, fecte, poffir= liche, muthige Bogel; auch find sie sehr neugierig. Außer der Brutzeit leben sie immer gefellig, sind dabei aber doch zankisch, jähzornig
und rauberisch. Auf Zweigen und an Baumen
bewegen sie sich sehr geschieft und klettern wie
die Spechte. Ein leises Zwitschern und Pfeifen haben alle mit einander gemein. Ihr Gesang ist unbedeutend. Ihre Nahrung besieht
aus Insekten, deren Giern und Larven, auch
aus Samereien und Früchten; die Kerne hacken
sie aus denselben mit dem Fuße haltend. Sie
fressen auch Fleisch, Talg, Fett, besonders Gehirn, was sie den kleinen Bogeln, die sie bezwingen konnen, aushacken.

Sie vermehren sich stark, denn die meisten Arten legen 8—12 Gier. Biele werden haussig auf ihrem Herbstzuge gefangen, wo sie oft Reugierde in die Falle lockt. Sie haben ein nohlschmeckendes Fleisch. Berdienen aber doch ihres großen Nugens wegen bei Bertilgung der Insekten Schonung. Es sind Zug=, Strich= und Standvogel. Sie reisen gesellschaftlich oft mehrere Arten zusammen. Sie wohnen in Waldern, Gebuschen, einige auch im Rohr.

In Europa sind 8 Arten befannt. In Deutschland leben davon 6 Arten. Sie find in mehrere Kamilien getheilt, als:

Batomeifen. (Pari sylvatici.)

Mit sehr hartem, starkem Schnabel; an der abgestühten Spige mit 4 vorwärts gerichteten Bundeln steifer Borsten besehter Zunge. Füße von hellblauer Farbe. Bei allen europäischen Arten sind Schläfe und Wangen weiß, die Rohle meist schwarz. Sie wohnen in Wälzdern und Garten, und niften stets in Höhlen. Ihre Gier sind auf weißem Grunde auf vielerzlei Weise roth getüpfelt und punktirt. Sie vertilgen eine große Menge von Blüthen und Knospeninsekten.

Die Rohl= Spiegel=Meise. (Parus major. Linn.)

Scheitel, Rehle und ein Strich auf die Gurgel herab schwarz; Wangen und Schläse weiß; ein Fleck am Nacken grungelb; Obersrucken grun; Unterleib gelb. Dieser so bekannte Bogel ift 5½ bis 6 3. lang, wovon 2½ 3. auf den am Ende fast geraden Schwanze abgehen, die ruhenden Flügel bedecken ihn kaum zur

Halfte. Flügelbreite 83 bis 94 Zoll. Die Schnabellange 5 Lin. Die Gris tunkelbraun. Die weißen Wangen des Mannchens und das glangende tiefe Comurg, mas den gangen Ober= topf, von der Stirn und den Bugeln bis jum Genick einnimmt, und von der ebenfalls schwarzen Reble in einen nach unten breiten Streif, auf der Mitte der Bruft bis an den Ufter hinab lauft, hebt fich befonders gut auf dem fcon fcmefelgelben Grunde des Unterfor= pers; Edultern und Ruden fcmutig gelblich= grun. Beim Beibchen find alle diefe Farben nicht fo lebhaft, das Edmarge matter, der fcmarge Streif auf der Mitte der Bruft fcma= ler und geht nur bochffens bis ans Ende des Brufibeins; Es ift ein weit verbreiteter Bo= gel, und in Deuischland überall befannt. Bei und ift er Bugvogel, fie ziehen im Ceptember und October gefellschaftlich, theils familienweife, theils in großen Schaaren in westlicher und fudlicher Richtung. Einzeln mifchen fie fich un= ter die Buge der Blau= und Sannenmeife, Goldhahnchen, Baumlaufer ze. Diefe durch= ftreifen taglich eine Gegend fo, daß man fie taglich ju gemiffen Zeiten beobachten fann, wie ich dies oft in frubern Zeiten in einer Gartens ftube taglich beobachtet habe. Im Mary und Unfang Upril febren fie wieder guruck. laffen fie, wie die übrigen Meifen einen gifchen-Den Laut: fit, boren, feben fie etwas Auffallendes, fo-rufon sie schnell: Ti-trarrarrarrar, im Chreck: pint trarrarrar, fich lockend: pint, pint, pint. Diefe und abntiche Tone, bort man besonders im Frubjahr, mo es Beit mird, die Pelze abzulegen. Die Rinder der Landleute deuten die Sone: Schiftr'n Delg! Wird es aber doch noch falt, fo fagen fie, der Bogel habe gerufen: Flict'n Del3!

Shres poffirlichen Betragens wegen, halt man fie in ben Stuben, wo sie an frei aufgehangten Kaden, woran man eine halbe Ruß oder eine andere Frucht hangt, sich gern schaufeln. Anfanglich sied sie wild und froßen sich auch oft den Kopf an den Fenstern ein, woran sie oft piesen und das Blei losmachen. Sie durchkriechen alle Winkel und sind stets in Beswegung, werden sehr zahm und leden selbst in den niederen, dumpsen Bauernstuben mehrere Sahre. Rieinen schlummernden Kindern sollen sie nach den Augen hacken. Andere Stubensvögel morden sie gern, nach ihrem Gebirn lüssternd. Ihre Nahrung besteht in Insesten, Samereien, Baumfrüchten, auch Fleisch. Den

gangen Sag find fie mit Auffuchen ihrer Rah= rung beschäftigt. Gie suchen fie an Meften, 3meigen und Baumen, felbft an den dunnften Spigen deffelben hangend. Bier fuchen fie be= fonders Infeften. Im Berbit freffen fie aller= lei Beeren, Rerne und Camen verschiedener Bewachse. Im Binter fommen fie oft an die Baufer, hacten den Salg von den Fellen geschlachteter Thiere ab, geben auch auf las; felbft auf hochgerichten suchen fie diefe Rab= rung. Sacten auch Bienen heraus und ver= gehren fie. Uebrigens freffen fie in der Stube alles, mas die Menfchen effen. Bei lleberfluß an Leckerbiffen suchen fie etwas zu verfreden und es für die Bufunft aufzubemahren. Flie= gen freffen fie auch febr gern, fuchen die Gpin= nen in den Stuben auf, trinfen viel und ba= den sich gern.

Ihr Nest sindet man in Sohlen der Walder, Garten, Gebuich, überhaupt mo Baume machfen. Das Reft hat eine Unterlage von trochnen Salmen, Burgelchen, Moos, Thier: haaren und Federn. Die Ungahl der Gier freigt von 8 bis 12, felten 14. Gie find gart, et= mas glangend, reinweiß mit vielen feinen und groben Punkten, von einer schönen Rofffarbe oder hellem Roth überfaet, am frumpfen Ende find die Beidnungen haufiger, doch ohne einen Bleckenfrang ju bilden. Gie gleichen den Giern der Grachelichmalbe, find aber der Form nach ftete dicker. Dannchen und Beibchen bruten fie medfelsmeife in 2 Wochen aus. Die Jun= gen merden mit Infeften, befonders grunen Raupchen aufgefüttert. Erft gang flugge ver= laffen sie das Reft. Lange noch laffen sie sich von den Alten futtern und verfolgen fie mit dem Gefdreit Biadadedn Tadetetet. Gie machen 2. Bruten, doch wieder in ein anderes Reft, wo man dann nur 6-8 Gier findet.

Sabichte und Falfen verfolgen die Alten und die Jungen werden oft in Garten eine Beute der Ragen. Schmaroger plagen auch diese Bogelchen.

Sie haben ein wohlschmeckendes Fleisch, daber fangt man sie auch in Menge auf den Meisenhutten oder Meisentanz mit Kloben oder in Sprenkeln, auch mit Bogelleim, in Dobsnen, auf Bogelheerden, auf Trankheerden und in Meisenkaften. Diese Arten gewähren viel Bergnügen, doch es ift, da sie so viele Insekten vertilgen, nicht rathsam, ift deshalb auch schon in vielen Landern bei Strafe verboten, westhalb wir uns also einer nahern Beschreibung

überheben fonnen. Ein geübter Fanger fangt von 8-11 Uhr Bormittags oft 5-6 Cooch. Genaue Befchreibung und Abbildung des Meisfentanges nehft Befchreibung mehrerer andern beluftigenden Fange, findet man in hrn. Nausmann's Naturgefch. der Bogel Deutschlands

1829. Ehl. IV. 6.24.

Sie nußen ungemein durch Bertilgung der schädlichsten Insesten unserer Obstbaume, ohne sie konnten wir unmöglich diese Unholde so vermindern, daß sie und nicht jährlich den größten Schaden zusügen sollten. Ja sie sind unersehlich, da die Natur bei ihrer Gefräßigsfeit ihnen alles gab dies zu erreichen, daher sie auch in aller Hinsicht Schonung verdienen. Dem ausmerksamen Jäger verrathen sie öfters durch besondere Tone Naubvögel und Naubsthiere, zuweilen selbst das Bildpret.

In den Dohnenftegen thun fie einigen Scha= den, indem fie im Spatherbst und Binter dies felben ausbeeren, ohne sich zu fangen; ja den

Befangenen das Begirn aushacken.

Die Sannen=, Pech= Meife. (Parus ater. Linn.)

Ropf und Hals schwarz; ein großes Feld auf den Bangen, und ein Langesteck am Ratz fen weiß; der Oberrücken aschblau; der Unterzleib weißlich. Ihre Lange beträgt $4\frac{1}{2}$ und ihre Blügelbreite $7\frac{1}{2}$ 3., des wenig ausgeschnittenen Schwanzes 2 3. Die rubenden Flügel bedecken ihn über die Halfte. Der Schnabel $4\frac{1}{2}$ Linien lang; die Junge ift vorn abgestußt, mit 2 Faserbundein beseit; Iris schwarzbraun.

Mannchen und Beibden find wenig unter-Schieden, das lettere ftete fleiner, das Schmarze am Ropfe nicht fo glangend und am Ropfe nicht fo tief berabgebend; das Beife fcmugi= ger, der Rucken grau. - Die Sannenmeife ift weit verbreitet, fommt in Guropa, im nordli= den Ufien und in Rordamerifa vor. Mitten im October, beginnt ihr Bug und dauert 2-3 Bochen. Gie bewohnen die Radelmalder, gu benen fie im Marg zurückfohren. Die ziehen= den Beerden haben gewöhnlich auch Goldhahn= chen bei fich, auch Saubenmeifen und Baum= Es ift ein munteres fectes Bogelchen, immer in Bewegung; hatelt fich an Die garte= ffen Spigen der Baume, Rahrung fudjend. Gie fliegt mit fchnurrendem Geraufch ruchweife. Ein leifes Git ift ihr gewöhnlicher Son; ihre Locfftimme ift: Tuiti, fitui und tuititi! Thr Gefang ift ziemlich abwechseind, man hort ihn fcon im Fruhjahr bei den erften Connens bliden.

Im Zimmer find es artige Bogel, doch vers tragen nicht alle den Berluft der Freiheit, machen fie fich ftruppigt und fugeliormig und freden den Ropf unter die großen aufgedunfenen Ruckens federn, fo gehen fie meiff darauf und man thut wohl, fie fliegen zu laffen, wo fie fich dann wieder erholen. Beim Fregtrog find fie fehr ganfisch gegen ihre Mitgefangenen. - Gie les ben im Freien von Inseften und Camereien, besonders von denen, die fich auf Nadelbaus men befinden. Auf großere Infetten treten fie mit den Sufen und hacfen ihnen die Gingeweide aus, Die fie dann freffen. Bon Infeftens eiern leben fie besonders im Berbft und Bina ter; dann fuchen fie auch den Gamen der Ras delbaume auf, fuchen diefen auch von der Erde auf. Gie fammeln fich davon auch Borrath, wenn fie Heberfluß daran haben. Rußferne und Gefangen ge-Chereschbeeren freffen fie gern. wohnt man fie am leichteffen mit Sanf, Radel= holgfamen und Rufternen an Gerffenfchrot in Mild geweicht. Much hier tragen fie Borrath ein.

Sie niften in Nadelmaldern in einer Soble; am ofterften an der Erde in hohlen Baums ftrunken, oder in einer alten Erdhohle von Maufen oder Maulmurfen verfertigt, in Felfens und Mauerrigen. Es ift aus furgem grunen Erdmood gebauet und inwendig mit weichen Birfd =, Deh = oder Bafenhaaren ausgepolftert. Darin liegen 6-8 Gier von einer niedlichen, etwas fpigen Gifgrin, von reinweißer Schale, mit fleinen und großeren rofffarbigen Punften überfaet. Gie merden von beiden Gatten in 14 Tagen gemeinschaftlich ausgebrutet und dann mit fleinen glatten Raupchen aufgefuttert. Gie verlaffen das Reft nicht, ehe fie fliegen fonnen, wo fie dann noch lange von den Alten gefüts tert merden. Ende Upril findet man meift ichon Gier. Gie machen 2 Bruten in jedem Commer.

Ihr vorzüglichster Teind ift der Sperber. Ihre Brut leidet fehr von Füchsen, Mardern, Wiefeln und Mäusen. Sie laffen sich leicht schießen und auf Meisenhütten fangen. Kommen sie im October häufig, so hort der Meisenfang bald auf.

Ihr Fleisch hat etwas Bitteres, schmeckt aber boch gut. Sie todten unglaublich viel Insesten und werden dadurch eine Wohlthat in den Nazdelholzwaldungen; weshalb man sie auch sehr schonen muß.

Die Sumpf=, Platt=, Blech=Meise. (Par. palustris. Linn.)

Der Oberkopf bis auf dem Nacken hinab tief schwarz; Wangen und Schläse weiß; das Kinn schwarz; der Oberkörper rothlich braunsgrau; der Unterleib weißlich. Sie hat eine kugelichte, diekköpfige Gestalt. Länge 43 3.; Flügelbreite 8 3. Die ruhenden Flügel decken die Hälfte des 2 3. langen Schwanzes; der Schnabel 4 Linien lang; Tris fast schwarzsbraun. Beim Weibchen ist der schwarze Fleck am Kinne kleiner, auch der untere Nacken nicht so tief schwarz und der rothgelbe Anslug der Seiten und Bruft schwächer und matter.

Sie seben in allen Theilen Europas. Es find bald Stand=, bald Strich=, weniger Zugwögel, denn manche verlaffen selbst im firengsten Winter ihre Geburtsgegend nicht. Im October und Marz sieht man sie am häusigsten, besonders in den Vormittagestunden, wo sie ziehen und freichen. Ihren Sommeraufenthalt haben sie in Laubholzwäldern, welche viel dich= tes Unterholz und wenig hohe Baume haben, auch in Garten, doch immer in der Nahe vom Wasser und Sumpf.

Es ist ein hochst lebhaftes, unruhiges, ge= mandtes, flinkes, luftiges und poffirliches Do= gelden. Gin verliebtes Parden hupft jum Fruhjahr unter allerlei fomifchen Stellungen und und Gebehrden Futter fuchend herum, und futtern einander, die Stimme der Jungen nach= ahmend. Die ichon angegebene Meifeftimme: Sit, fit, ift auch ihnen eigen; ftogen fie auf. etwas Besonderes, fo rufen fie: fpit dah fpit= dah, auch fpiigidahdah; lockend: gia gia! Co geben fie auch noch einige Tone von fich, Die in ihrem vieltonigem Gefange vorfommen. Ulb Stubenvogel find fie fehr poffirlich, friechen überall herum, doch vertragen nicht alle den Berluft der Freiheit. Gie fchlafen in der Ctube auch gern in einem Loche, einer Schachtel zc.

In ber Art sich zu ernahren, gleichen fie ber Kohlmeise, boch geniesen sie mohr Samereien als die übrigen Arten. Im Winter suchen
auch sie Gier und Raupchen der Insesten, und
Wespennester wegen der darin steckenden Larven.
Kerne von Sonnenblumen, Hanf, Spinatsasmen ze. suchen sie begierig auf. Sie sammeln
sich auch Borrathe. In der Stube gewöhnt
man sie anfänglich mit Hanf, Hafer ze. an ein
Stubenfutter. Sie frinken und baden viel.

The Neff findet man in Laubholzwaldern an mafferreichen Stellen bei Graben, Bachen, Fluffen und Seeen zc. in fumpfigen Balbern. Das Reft fteht frets in einer tiefen Boble, mo moglich mit engem Eingang bald nahe an der Erde, bald auch boch, auf abgefopften Weiden= baumen, mo fie eine vorgefundene Sohle, mit ihrem scharfen Ednabel fich nad Gefallen er= Es besteht aus Moos und Bolle und enthalt 8-12 Gier, die man ichon den Mai findet. Sie machen 2 Bruten. Die Gier find etwas furz geformt und dicker als andere Meiseneier, sehr zartschalig, blaugrunlichweiß, mit roffrothen Punften beftreut, die bald hau= figer, bald sparsamer, größer und fleiner er= Scheinen. Das Blautiche des Grundes wird in den Sammlungen bald weiß und fo werden fie dann den andern Meiseneiern abnlicher. Gie merden in 13 Tagen von beiden Gatten ausges brutet. Die Jungen werden meift mit fleinen Raupen aufgefüttert, und es gewährt dem Be= obachter ein Bergnugen, wie die geschäftigen Alten immer Nahrung herbeischaffen und keines der vielen Rinder, die oft bei engem Raum dreifach übereinander hocken, vergeffen, fondern fie alle bis jum' Ausfluge futtern und dann noch lange von ihnen gefütter werden, bis fie selbst Nahrung suchen und sich ernahren kon= nen, dann fchreiten fie zur zweiten Brut. Die Parchen halten fich febr jufammen; und die man im Commer und Berbft in fleinen Ge= fellschaften beisammen trifft, find immer die Jungen aus einem Gehecke, ohne die Alten.

Die Feinde baben sie mit den übrigen Urten gemein. Sie treibt nicht Neugierde, sondern Estust in die Falle, daher man sie weniger auf dem Meisentanz als im Meisekassen songt; auch in Sprenkeln und mit Leimruthen, die man z. B. an Sonnenblumen, Hanf und andere saamentragende Gewächse steckt. Ihr Fleisch schnieckt angenehm. Ihr großer Ruthen besteht in ihrer Nahrung, im Vertilgen der Insekten. Bon nühlichen Gesamen halt man sie durch hingehängte alte Naubvögel und flatternde Federn an Faden gebunden, ab.

Die haubenmeise, Meisenkonig. (Par. cristatus. Linn.)

Der Kopf hat einen zugespihten Federbusch; die Reble und ein Strich durch das Auge sind schwarz, die Wangen weiß; der Oberforper rothlich braungrau; der Unterleib weißlich.

5 3. lang, die Flügelbreite 8% bis 8% 3., ber etwas ausgeschnittene Schwanz 1% 3. lang, wovon die ruhenden Flügel etwas über die Hälfte bedecken. Der Schnabel etwas über 4 Linien lang. Der spisige, immer etwas aufrecht stehende Kopfpuß besteht auf stufenweise langer werdenden, schwalen Federn, wovon die lange ken hinterwarts sehr schwal und 1 30ll lang sind, und etwas aufwarts gedogene Schäfte hazben; sie sind sämmtlich schwarz mit weißen Kanten. Die Stirn ist weiß schwarzlich gesschuppt; die Länge von der Stirn bis zur Spige dieses Federbusches beträgt 1% 3.

Das Beibchen unterscheidet sich vom Manns den durch einen kleinern Federbusch, die schwars ze Kehle geht auch nicht so weit auf die Gurgel herab und das Halsband ist viel schmaler, oft undeutlich, das Beiße am Ropse u. s. w. noch schmußiger, und die Ruckenfarbe grauer.

Diefe Meife lebt in gang Guropa, den boch: ffen Rorden ausgenommen, in Radelmaldun: gen, doch nirgends fehr gahlreich. Gie ift theils Stand:, theils Strichvogel. Im Gpat: herbft und im Fruhjahr ift der Strich am be: deutendfien, mo fie fleine Feldholzer von Riefern und Tannen, ja große englische Garten befu: den. Mengfilich durchflattern fie dabei Laubhols und Garten und eilen dem Radelholze gu. Mit Goldhahnden, Tannenmeifen, Baumlaufern 2c. bilden fie nicht felten familienweise ziemlich ans febnliche Gefellichaften, Die den gangen Binter hindurch tägliche Streifereien durch den Bald machen; Die Saubenmeifen icheinen Dabei Die Sauptlinge gu machen, indem ihnen alle folgen und auf ihr Loden allein gu achten icheinen. Im Uebrigen gleicht Diefe Meife in ihrem Betragen den vorigen Arten. Unter den gewöhnli: den Deifenlaut mifcht fie noch ein gedehntes Zah, tab. Außerdem ein hellflingender Ruf, ale Lodftimme, macht fie fehr fenntlich: gid gurre und gurrefi, oder flurrre! Uebris gens ift ihr Gefang unbedeutend. Poffirliche Stellungen und Bendungen und Strauben der Saube fieht man bei ihr, besonders gur Beit Der Begattung. Deshalb halt man fie auch in ber Stube, nur Schade! daß man nur wenige Dazu gewöhnen fann, da fie als gartliche Bogel oftere bald fterben; vielleicht gludte es, wenn man zugleich mehrere gufammenbrachte. Shre Sauptnahrung machen Infecten, porzuglich der ren Gier und Larven aus, weniger Gamereien. Sie find alfo eine Bohlthat den Radelmaldun: gen. Sanf freffen fie gern, auch Radelholifa:

men, wenn fie keine Insecten finden. Im Walbe sieht man fie haufig an den Tranken, wo fie sich baden und ihren Durst löschen. Gefangen muß man ihnen unter das Grasmuckensutter viel Ameisenier mischen, mit Mohn und gequetschem Sanffamen gemengt. Am besten gerlingt es mit den Jungen, wenn man die Alten mit einfangt und diesen dann durch Ameiseneier die Auffütterung besorgen läßt.

Gie niften in unfern Radelmaldern gebir: giger und ebener Gegenden, in manchen haufig, in andern einzeln, in ju fleinen nie. Ihr Reft befindet fich ftete in einer Baumhohle mit engem Eingange, von flarem Moos und Flechten ge= bauet, mit Thierhaaren oder Pflangen weich ausgepolftert. Darin befinden fich 8 bis 10 niedliche ichneeweiße, mit roffrothen fleinern und großern Puntten bezeichnete Gierden. Bei-De Gatten bruten fie binnen 13 Tagen aus. Die Jungen merden mit fleinen Raupchen auf= gefüttert. Gie machen 2 Bruten. Ihre Feinde find Sperber, Buhnerhabichte und Der Merlin. Marder, Biefeln und Gidhornden gerftoren ihre Brut. In Nadelmaldungen fangt man fie auf Meisenhutten, Rloben, Sprenkeln und auf Leimruthen. Ihre Rahrung gebietet fie gu icho= nen, ob fie gleich ein mohlschmedendes Gleifch haben.

Die Blaus, Pimpels, Jungfermeife. (Par. coeruleus. Linn.)

Flügel und Schwang blau; der Ruden grun, der Unterforper gelb. Lange 5 3. Flu: gelbreite 81 bis 83 3. Schnabel 4 Linien lang; Gris dunkelbraun. Es ift ein bekanntes prach= tiges Bogelden, bas, wie bas vorige, gang Guropa bewohnt, den hochften Rorden ausge= nommen. Die Blaumeife liebt mehr das Laub= als das Radelholz. Gie bilden gegen den Berbft große Saufen, doch nicht fo große, als die Roblmeifen. Die legte Salfte des Geptembere und die erfte des Octobers ift ihre rechte Bug= zeit, wo fie in großer Menge von Dften nach Beffen ziehen. Gie mandern am Tage, befon= ders Bormittage, bochftens bis 2 Uhr Rach: mittage. Gie folgen auf Diefen Touren dem Bald, dem Gebufch und folden Baumreiben, Die fie fublich und westlich bringen. Rommen fie an das Ende derfelben, fo wird es oft lan: ge, ehe fie fich entichließen, uber große baum: leere Strecken ju fliegen, mas man an ihrem angstlichen Benehmen und Loden deutlich bemerken kann. 3m Marz kommen fie wieder jurud. Gine große Anzahl derfelben find nur Strichvögel, einzelne Parchen bleiben bei uns als Standvögel, die dann in Gesellschaft mit Goldhahnden, Baumlaufern zt. tag-liche Streifereien nach Nahrung machen und Freud und Leid mit einander theilen. Saufig find fie in Baumgarten, die an Bald grenzen, lieben auch das Wasser.

Stete Bewegung, große Gewandtheit und ein frobliches munteres Befen zeichnet fie por andern ihres Gefdlechte aus; fich an fcman: fenden Reifern gu hateln, an fenfrechten Salmen und Steden auf: und abzusteigen, und alles auszufpaben, fuchen fie ihres Gleichen. Raubvogel bemerft fie leicht und giebt den an: bern Baldvogeln ein Zeichen fich ju buten. Conderbar und auffallend ift das Betragen Des Mannchens bei ber Begattung, begleitet mit 3witidern und Pfeifen, Muf: und Abfteigen von einer Baumtrone gur andern. Sat fie ein Raubvogel verfolgt, und fie hat dann in einer Dede fich gerettet, ruft fie: Biftererrretet, auf dem Buge bort man noch ein flagliches: Tjatata. Ihr ermuthigender Ion auf Der Reise ift hellpfelfend: tgi tgi tgie und bell wie ein Glodden: gi gi girrre ze.

Es ist ein fehr artiger Stubenvogel, der fehr zahm wird, das Futter aus hand und Mund nehmen lernt, doch muß sie etwas besser als die Kohlmeise gehalten werden. Jung aufgezogen kann man sie zum Aus: und Einsliegen gewöhnen, wo sie dann oft andere mitbringen.

Gie leben fast allein von Infekten, deren Giern, Larven und Puppen, auch von Kernen verschiedener Beeren und einigen Gamereien. Die Jungen geben gern nach den Guffirschen. In der Gefangenschaft freffen fie gern Ruß: terne. In Milch gequellte Gemmel genießen fie gern, am beften befommt ihnen aber bas Rachtigallen : ober Grasmudenfutter. Junge futtert man mit Umeiseneiern auf. Gie baden fich gern und trinfen oftere. Im Marg oder Anfang Aprile ftellen fie fich an ihren Brut: ortern ein. Bei uns find es die Baldungen, großen Garten und Beidenpflanzungen. Much ibr Reft feht meift in einer Soble in alten Baumen, morfden und halb faulen Meften, felten in einem Mauerloche; ber Gingang ift meift - fehr enge. Das andere Jahr fuchen fie gewöhnlich den alten Ort wieder auf. Bur zweiten Brut in Demfelben Jahre mablen fie einen andern Drt. Das Reft machen fie von Flechten und Moos,

und legen es noch mit Saaren und Rebern aus. Darauf legen fie nun bie niedlichen Gierden, wovon man Unfang Maies in Der erften Bede 8 bis 10, in ber 2ten aber nur 6 Stud findet. Gie find fehr garticalig und gerbrech: lich, bald vollkommen oval, bald etwas lang: lichter, rein weiß, mit vielen roftfarbigen ober roftrothen Bunftden bestreut, worunter fich felten einige größere befinden. Frifch icheint ber Dotter gelbrothlich durch, den Giern ber Saubenmeife fehr abnlid. Mannden und Weibden bruten fie gemeinschaftlich in 13 Lagen aus und Bieben Die Jungen meift mit fleinen Raupchen groß. Sie vertheidigen fich auf dem Refte bru: tend. Die geflügelten Reinde haben fie mit den porigen gemein. Ragen ichaben oft ber Brut, Die fie aus dem engen Loche beraushafeln.

Der Fang ist wie bei den vorigen Arten. Ihr Fleisch ist eine angenehme Speise; doch wer wollte auf einen solchen Bissen nicht gern Berzicht leisten, da diese Thierchen unersättlich im Bertilgen der Eier und kleinen Brut der schädlichsten Feinde der Obst: und Waldbaume sind. — Im Spatherbst und Winter haken sie gern die Kerne der Ehereschberen aus und zerzhaken nur Bluthen, in welchen verderbliche Inzesten hausen.

Die Lasur= Prinzchenmeise. (Par. cyanus. Pallas.)

Der gange Dberfopf weiß; am Raden ein lafurblaues Querband, der Dberleib hellblau, der Unterleib weiß; Die hintern Comingen und Die großen Flügeldedfedern lafurblau, mit fehr großen weißen Enden. Lange 54 bis 6 3., Flügelbreite 94 bis 93 3., Schwang 21 3. lang. Die ruhenden Flugel bededen mit ihren Spigen ein Drittheil feiner Lange. Schnabel & 3. lang, Bris dunkelbraun. Das Mannchen fieht vorzüglich fcon, ob es gleich nur 2 Farben, Blau und Beiß gieren. Das Beibchen ift fleiner, das Blau viel matter, ber Salering fomaler, der blaue Brufifled fleiner. Diefer icone Bo= gel gehort dem nordlichsten Theile Guropas und Dem nordlichen Uffens an. Ale Bugvogel ver= lagt diefe Meife ihre nordliche Beimath mit Unfang des Berbfies und fommt dann, wiewohl felten, auch in unfere Begenden. Gie follen Beiden und Beidengeftrauche an Fluffen lieben.

Gie gleicht übrigens ben vorigen Deifenarten an Sitte und Rahrung. Die Entfernung macht, bag man von ihr nur wenig weiß.

3meite Familie. Langgeschwanzte Meifen. (P. longicandati.)

Der Schnabel: febr furg, von der Geite febr gufammengedrudt, mit fcmalem Ruden und etwas verlangerter Spige; das punftfor: mige Rafenloch nabe an ber Schnabelmurs gel; Bunge: von unten einen verlangerten, pergamentartigen, dunnen, breiten, in mehrere garte Borffenbundel gerriffenen Fortfag; Bus Be: nicht hoch, fomachlich. Das Gefieder: lang und groß, haar : oder wollartig, fehr weich. Der feilformige aus fehr fcmalen Be: dern bestehende Schwan; langer, als der Rorper. Sie leben von Infetten im Balbe auf Bau: men und Gebufd, gefellig mit ihres Gleichen, find behende, unruhige aber gartliche Gefcopfe; bauen außerft funftliche beutelformige Refter, mit engem Gingangeloche. In Deutschland nur folgende Urt:

Die Schwang= Schneemeife, Teufelsbolzen.

(Par. candatus. Linn.)

Sauptfarbe weiß und ichwart; das Mugen: liederrandden fahl und gefarbt; der lange schmale Schwanz feilformig, doch nicht die Mit: telfedern, fondern das nachftfolgende Paar die langften; Die 3 außerften Schwanzfedern mit weißen Reilfleden. Diefes fleine artige Bogel: den hat einen diden runden Ropf, furgen Sals und Rumpf, welche mit außerordentlich großen lodern Federn befleidet find, daß fie Die un: bedeutende Rorpergroße verbergen. Der lange Sowang fieht an dem fugelformigen Rorper, wie ein Dunner Stiel aus. Das furge Cona: belden ftedt gur Salfte unter Federn. Dies und die weiße, fcmarge und fcmugig ziegelro: the Farbe zeichnet fie vor allen Meifenarten aus. Lange 6 bis 65 3., wovon der Coman; 35 3. mißt; Flügelbreite 73 3. Un dem ab: gerundeten Ende der faft gleichbreiten Bunge, befindet fich ein breiter, fehr dunner, hornarti: ger Fortfat, deffen Rand in unregelmäßige Bundel fleifer Borften gertheilt ift; Die Gris duntelbraun. Schnabellange 3 Lin. Das un: befiederte Augenliederrandchen ber Jungen hell: roth, der alten hochgelb.

Das alte Beibchen fieht im Gangen eben fo wie bas Mannchen, nur ift bas Schwarz und Roth matter, auch ift es etwas fleiner. Gie

feben in Europa, auch im nordlichen und mitt: fern Affen. Es find Strid: und Stand: voget, gewiffermaßen auch Bugvoget. Im Berbfte folagen fich Die einzelnen Familien in beträchtliche Beerden zusammen und ziehen fo dem Gebuiche nach, mit andern Meifen fort, welches bis in ben Rovember, fo lange Die Laubholger noch nicht gang entblattert find, Dauert. Jin Marg und April tommen fie gurud. Gie leben in allen Arten von Baldungen, je-Doch nicht im reinen Radelwalde. Biel Bufch: holz, vorzüglich wo fich auch noch Baffer befindet, lieben fie; baber haufig in unfern Muen: malbern. Im Binter tommen fie nicht felten in die Garten der Dorfer und Stadte, oft in Begleitung der Goldhahnden. Laubholg gieben fie ftete dem Radelholze vor. Befteht die Ge= fellichaft aus vielen Individuen, fo halten fie die Rachtruh allemal auf einem horizontalen Baumzweige, im dichten Gebufch, in hoben Dornen zc. Im Binter weichen fie davon ab, und fuchen dazu Sohlen auf. Ihre Meifenna= tur befunden fie durch ihre unendliche Unruhe, durch große Geschidlichkeit im Rlettern auf Den 3meigen, und im Unhangen an Die dunnften Spigen in oft verkehrter Stellung, fich fo in der Luft wiegend. Gie eilen immer weiter, obne fich aufzuhalten und durchstreichen ihren Bezirf taglich zu verschiedenen Malen. Menschen find fie fehr gutraulich. Aber bei Er= blidung eines Raubvogels flüchten fie mit gro= gem Gefdrei bem didften Gebuich gu, und warnen dadurch zugleich auch andere vor ber Drohenden Gefahr. Die Lodftimme bes Teu: felebolzen ift ein hohes pfeifendes: Ei, ti, tib und ein schneidend helles: Ziririri, ziriri! Der Gefang des Mannchens ift unbedeutend. Sperrt man mehrere zugleich ein, fo haften fich die fleinen poffirlichen Beichlinge langer, als einzeln gehalten. Das lange in der Sand herumtragen konnen fie fo wenig als die Gold: habnchen aushalten.

In dem Raturguffande leben fie blos von Infekten. Im Winter besuchen fie vorzuglich Pflaumenbaume und hohen Comargdorn, Die vielleicht ihre Lieblingeinseften enthalten. Def= ters geben fie auch jum Baffer, um ju trinten und fich zu baden. Mit lahmgedruckten Fliegen, frifden Ameifeneiern , auch mit Mehlmurmern, gewohnt man fie anfänglich an das Universal= futter. Gie niften in allen Laubholzwaldungen, besonders wo fich Baffer findet, felbft in der Rabe menfchlicher Bohnungen.

Das Reft ift febr merkwurdig, sowohl in Form ale Bauart. Es hat die Geftalt eines Gies ober eines gefüllten Beutels, und Das fleine Gingangeloch gur Geite gang oben. Der Boden ruht meift auf einem unterftugenden 3weige. Es ift 7-83. hoch und im Durch: ichnitt zwischen 4 und 5 3. breit. Die Bande find ungemein icon aus grunen Laubmoofen, mit untermischtem Infettengespinnft, gewebt, und dann nach Beschaffenheit der Umflande, mit einem leberzuge aus weißen und gelben Baumflechten, Puppenhulfen und feiner weißer Birtenschale überkleidet, welche eine Menge von Raupen: und Spinnen: Gefpinnft, auch feine Baumwolle, jufammenhalt und mit dem Moofe verbindet, fo daß es wie aufgeflebt und dabei Doch mit jenen verwebt ift. Diefe außere Be: fleidung wird allemal aus der Rabe und mei: ftens von dem Baume, worauf das Reft fieht, felbft genommen. Dadurch wird es einem Stud alter Borte, oder einem alten bemooften Afte fo pollfommen abnlich, daß man es nur beim Gin: und Ausfliegen des Bogels bemerkt. Wie weise Der, der diesem Thierchen Diesen Inflinkt gab! -Gie bauen baran nur bei fconem guten Better, weshalb fie dazu auch 2-3 Boden nothig has ben. Das Beibden ift auch hier Baumeifter und Das Mannchen holt meift nur Materialien dazu berbei. Ift alles von außen fertig, bann geht es an den innern Ausbau, der aus ungemein vielen und zum Theil großen Febern, etwas Wolle und Pferdehaaren besteht. Gegen die Mitte Aprile findet man die Gier der erften Dede icon vollzählig, gewöhnlich 9-14 Stud; in der zweiten bede Unfange Juni felten uber 7 Stud. Zwischen der Große der Gier der Blau: meife und der Goldhahnchen fteben Diefe fleinen Gierchen in der Mitte. Gie find bald eimas Turzoval, bald etwas langlichter, ihre garte Schale weiß, zuweilen rein, ofterer noch mit blagroftrothen Bunftchen bestreuet, Die fich je: Doch nur meift am flumpfen Ende zeigen, fonft fast ohne Glang. Gie bruten 13 Tage, mobei Das Mannchen fein Beibchen abloft, doch fo, Dag jenes weit langer bruten muß. Gin foldes Beibden fann man leicht megen des auf eine Geite gebogenen frummen Schwanzes erfennen, mas eine Folge des engen Reftes ift. Die Jungen figen daber auch im Refte neben und übereinan: Der und erweitern es endlich fo, daß es Locher bekommt, und wenn fie es verlaffen, jufammen finkt und gang gerlumpt aussieht. Die Jungen merden gleichfalle mit Infetten aufgefüttert.

Der Sperber, der Suhnerhabicht und der Merlin find ihre vorzuglichen Feinde, im Binter der große Burger. Ihre Brut verwuften Krahen, Elftern und Seher, Kagen, Marder, Biefeln und felbft Baldmaufe.

Leicht find sie mit Blasrohren zu schiegen und in Meisenhutten zu fangen. Dat man erst eine auf dem Meisentanze und sie schreit, so stürzen die andern auch darauf los mit Larm und schreien: ziriririr, ziriri, ziert, tert, tert u. f. w. und werden gefangen.

Ihr Rugen in der Saushaltung der Natur ift zu groß, als daß man fie fangen und verspei=

fen follte.

Dritte Familie. Rohrmeisen. (Par. arundinacei.)

Der Schnabel schwächlicher als an den Waldmeisen, von sehr abweichender Gestalt; das Nasenloch nahe an der Schnabelwurzel, dem der Aten Familie ähnlicher, die Füße mit sehr großen schlanken Krallen bewassnet. Sie leben von Insetten und Samereien, besonders von Rohrsamen; leben stets am Wasser und halten sich im dichten Rohr und Weidengesträuche auf. Sie sind behende, aber ungesellig. Sie bauen ihr hängendes, beutelformiges Nest ins Rohr. In Deutschland haben wir folgende zwei Arten.

Die Bartrohrmeise. (Par. biarmicus, Linn.)

Schnabel rundlich, oben fanft abwarts gebogen, mit verlangerter Spige; die hintern Schwungfedern schwarz, außen zimmetfarbig, auf der Innenfahne weißlich gefantet; der Iange, feilformige Schwanz matt rostbraun, die Seitenfedern mit weißlichem Ende und schwarzer Burzel oder Langostreif.

Diese Meise hat eine schlanke Gestalt, eine seidenartig weiche Bekleidung und ungemein sanfte Farben. Das alte Mannchen ist in der That ein sehr niedliches Bögelchen. Lange 6½ bis 7 3., davon kommen 3½ bis 3½ 3. auf den langen keilsormigen Schwanz. Flügelbreite 7½ bis 8 3. Schnabellange 4 bis 4½ Linie. Die Bris der alten Mannchen schon hochgelb. Die Farbe der Füße und Nägel schwarz. Eine ganz vorzügliche Zierde dieses Bogels ist ein sogenannter Knebelbart, welcher unter den Zügeln

anfangt und zu beiden Geiten ber Rehle berabgeht, aus langeren Febern befieht, Die megen ihrer flartern Schafte fich auszeichnen, auch et= mas derber als die andern find, und bei alten Mannchen durch ein fammetartiges Schwarz febr auffallen, wenn fie gleich meiftens glatt anliegen, ober boch nicht oft fo geffraubt merben, bag fie fehr weit abfteben. bielt man die Beibden fur bartlos, ftraubt man indeffen die Federn an jenem Theile bei ihnen auf, fo bemerkt man deutlich Die viel langern und ftraffen Bartfedern, beren ftartere Schafte von unten berauf bis uber Die Balfte fdmars find. Die langften derfelben find faft 5 Linien lang, mabrend fie bei gang alten Mannchen gegen 9 Linien meffen.

Diese Meisenart bewohnt einen Theil des nordlichen oder nordöstlichen Europas und das mittlere Affen, wo sie an den Usern des Caspissien Meeres und dasigen Flüssen gemein seyn sollen. In holland ist sie häusig. Un den Usern des Calssees, im Mannefeldischen, besindet sie sich zuweisen und ist auch daselbst geschossen worden. Sie bewohnen indesten nur Gegenden, wo Rohr (Arundo phragmitis) große Flächen bedeckt, dicht und hoch wächst, so daß es von Menschen so leicht nicht besucht werden kann.

Es ift ein lebhafter, unruhiger, feder und Biemlich fraftiger Bogel, gleicht bierin ben an: dern Meisen und flettert wie Diefe an Zweigen, fo mie an Rohrstengeln mit großer Gewandtheit auf und ab. Gelten trifft man Gingelne, im: mer Barden und Familien, felten große Beerden. Ihr Flug ift leicht; der Gefang unbedeutend; unaufhorlich laffen fie dagegen ein furg melodi: iches: git - git horen. Zuweilen flingt Dies auch icharfer und harter, ale: gipe, gipe. Als angenehme Stubenvogel bringt man fie paarmeife aus Solland. Gie verlangen gute Abwartung, einen geraumigen Drahtfafig, mo fie aus: und einfliegen tonnen, mas ihr Gefieder beffer erhalt, verlangen aber eine fuhle Temperatur. Die Parchen lieben fich febr und wenn fie fich in der Stube nicht gleich wieder finden, rufen fie fich angftlich und machen bann beim Biederfinden artige Manveuvre. Beide Gatten lieben fich gartlich und liebtofen fich den gangen Lag durch fanftes Schnabelpiden an Reble und Raden, worauf oftere Die Begat: tung erfolgt, fie legen jedoch in der Gtube fels ten Gier und bann fommt es boch nie gum Bruten. Im Ctande der Freiheit leben fie wie fcon bevorwortet, von allerlei fleinen Infeften

und deren Brut, dann von Rohrsamen, bei Mangel an Insekten. Im Zimmer füttert man sie vorzüglich mit Mohnsamen, hanf: und Karnariensamen, weil sie viel Abwechselung des Futters verlangen. So müssen sie auch, will man sie lange erhalten, Ameiseneier und Mehle würmer mitvekommen. Nachtigallenfutter mit Beimischung von Nohn würde ihnen wohl am besten zusagen. Sie baden sich gern, die Stubenvögel meistens Bormittags zwischen 9 — 11 Uhr, wobei sie sich durchaus naß machen. Es ist dies zur Erhaltung ihrer Gesundheit unentzbehrlich; auch trinken sie viel. Die Samen, die man ihnen giebt, mussen etwas gequetscht oder angeknickt werden.

Gie niften in ben bichteften Didichten ber Robrwalder, Die im Gommer meiftene fur Menfchen gang unzuganglich find. Ihr febr funftliches Reft hat eine langlich : eiformige Geftalt, wie ein voller Beutel; ift oben an einigen fic freugenden Rohrstengeln befestigt, feitmarts und unten gang frei und ichmebend, gur Geite gang oben mit einem engen Gingangeloch, Dem zuweilen gegenüber noch ein zweites angebracht ifi. Die Stoffe, aus dem der fehr dide und Dichte Filz gewebt ift, find Baftfafern verfchies dener am Baffer machfender Pflangen, feine Rispen bon Grafern, und eine große Menge Samenwolle von Beiden, Pappeln, von Rohr, Rolbenschilf (Typha) u. dgl., womit es inmen: dig dicht belegt ift und deshalb einen diden Boden hat. Ghe aber bas Rohr bei uns im Juni zu einer folden Sohe aufgewachsen ift, ton: nen fie nicht bauen, denn altes mablen fie Dazu nie. Rad Sching follen Die Gier weiß, mit feinen fdmarglichen Strichelchen befest fenn. Die Angahl wird auf 5 - 8 angegeben. Gie werden im Berbft, da fie nicht fcheu find, gefcoffen, auch im Spatherbft burch Lodvogel in Fallen, Sprenkeln und auf Leimruthen gefangen. Ihr Bleifc ift moblidmedend. Gie nugen ale Infekten vertilgende Bogel und find angenehm ale Gefangene.

Die Pendulin=, Beutelrohrmeise. (Par. pendulinus: Linn.)

Schnabel gerade, nach vorn etwas jufammengedrudt und fehr bunn jugefpist, die bintern Schwungfedern braunschwars, auf beiden Seiten mit breiten, weißgrauen Kanten; ber Schwanz etwas ausgeschnitten, feine Jedern braunschwars, fomal weißgrau ober rothlich:

weiß gefantet; die untern Schwanzfedern mit bunkeln Schaftstrichen.

In seinem Ansehen hat das Bogelchen nebst dem Meisenartigen etwas von den Sangern, gerade wie die Gold hahnchen. Ihre Lange beträgt $4\frac{1}{2}$ bis $4\frac{1}{3}$ 3., wovon $1\frac{7}{3}$ 30sl auf den am Ende seicht ausgeschnittenen oder stumpfgabelichten Schwanz abgehen; die Flügelbreite $6\frac{1}{2}$ bis $6\frac{3}{4}$ 3. Die Iris sehr dunkelbraun. Der Schnabel endet in eine dunne, sehr gerade Spige. Das Gesieder ist sehr weich und weitestrahlig, aber nicht so groß, als bei den Waldemeisen.

Bei dem alten Mannchen find Stirn, Ziegel, die Gegend ums Auge, Schläfe, Ohrenz gegend und der angrenzende oder hintere Theil der Bangen tief schwarz; das Uebrige des Scheitels, Genick, der ganze hinter: und Seittenhals graulichweiß, am legtern fast reinweiß; der Oberrücken und die Schultern schön rothe braun oder dunkelrosstfardig, der Burzel dunzkelrostgelb mit graulicher Mischung, die Rehle reinweiß; Brust und Bauch weiß rostgelb angestogen. Das Beibchen und die Jungen sind nicht so lebhaft und schön gefarbt.

Diefe tleine Meisenart ift über einen gro-Ben Theil von Guropa verbreitet. Bei uns fommt fie fehr felten vor, dagegen wird fie in Schlessen und Deftreich alle Sahre bemerft. Um Galgfee im Mannsfeldischen, zeigt fie fich auch fast alle Jahre. Im Rorden ift fie vermuthlich mehr Bug: als Strichvogel, im Guden dagegen Standvogel. Das Lichter: werden ihrer Baffermalder, mo fie leicht beob: achtet werden fonnen, zwingt fie gum Abmarich, was im Ceptember und Rovember gefchieht, indem das reifende Rohr dann feine Blatter verliert. Mit den Bartmeifen theilen fie Diefe Aufenthaltsorter, doch fieht man fie haufiger auf niedrigen Ropfweiden und hoherm Beiden= geftrauch als jene.

Die Beutelmeise ift ein außerst sebhaftes, gewandtes und fedes Bogelchen, gerade wie die Bartmeise. Beim Zuge halten sie sich in Familien zusammen, wobei sie sich immer locken, besonders wenn sie zerstreut wurden. Sie locken wie die Meisen, wobei sie dann noch ein: Du hören lassen.

Ihre Nahrung besteht aus allerlei kleinen Insekten, die im Rohre leben, nebst deren Giern und Larven, als: Spinnen, Mucken, Blatt: laufe zt., gerade wie die Bartmeisen, die dar; nach auch den ganzen Tag das Rohr durchsu

chen. Im Binter gleichfalls wie jene von Rohrsamen zc. Gefangen wird man fee daber auch wie jene behandeln muffen.

Daß fie auch bei und niften, haben die alten Reffer, die man in den großen Rohrwals dern fand, binlanglich bemiefen, 3. B. am Salgfee, in Bruchen unweit des Bufammen: flusses der Saale und Elbe zc. In Lithauen, Polen 2c. findet man fie dagegen in einigen Strichen in Menge. Unter den einheimischen Bogeln ift ihr Reft bas funftlichfte. Es hangt vollig in ber Schwebe und ift nur an feinem obern Ende an Rohrstengeln oder an Bufch= weidenzweigen befestigt, etwa einen Sug bod uber dem Baffer fdmebend. Die Umgebungen find fete dichtes Rohr und verworrenes Geftrupp. Es bildet ein großes Dval, oben breiter als unten, bis auf den fleinen Gingang zugebauet. Reft und Gingang weichen in der Form oft von einander ab. Die Dobe des Reftes ift 6-8, feine Breite Dicht unter bem Gingange 4-5 Boll. Die Materialien gu Diefem Reffe find Baftfaden von Reffeln und andern am' Baffer machfenden Pflangen, garte- dunne Graehalme ze., eine gange Menge Samenwol: le von Aspen, Pappeln, Beiden, Beiderich (Epilobium), Rolbenfdilf, Rohr und Difteln. Mdes ift in einen gaben, Dichten Filg gufammengewebt. Die Bande zuweilen faft fingeredid, das Innere mit vieler Samenwolle ausgelegt, Die meiftens in fleine Rlumpchen gufammenge: filgt ift, welche den Boden fehr did bededen. Die Gier find fo groß, als die von der Schwangmeife, von langlicher Form, foneeweiß, glatt, glangend und fo gart, daß das Dotter durch: fdimmert, 5 bis 6 an ber Bahl. Gie follen fie in 12 Tagen ausbruten.

Die Vollendung des Restes kostet ihnen 2 Bochen und da bei uns das Rohr selten früher als im Juni dazu die erforderliche Sohe und Dichtigkeit hat, so kann es kaum vor Ende Juli schon ausgeflogene Junge geben. Brüten daher bei uns wohl nur einmal.

In Rußland benugt man die Nester zu einer erwarmenden Fußbekleidung, indem sie in der That schon Aehnlichkeit mit Filzschuhen oder sogenannten Soden haben; man kann sie am Eingangsloche nur aufschligen, so ist es gleich für ein Kinderfüßchen fertig. In Bolen soll man damit handeln, auch als heilmittel, vielzleicht durch die Erwarmung, sie nüßen. In Italien, namentlich in Bologna, sollen geweine Leute sie zu abergläubischen Dingen be-

nugen, ja fur heilig halten, fie über ber haus: thure gegen Ginfchlagen bee Bliges aufhan: gen 25.

Ammer. (Emberiza, Linn.)

Sonabel: furs, oft flein, furg fegelfor: mig, fpig, an ber Burgel bid, nach vorn fehr jufammengedrudt; ber Dberfcnabel fcmaler als der untere, der ftartere Unterschnabel von der Mitte an etwas aufwarts gezogen und fcneller zugespist als ber obere, Die Schneide um Die Mitte etwas eingebrudt, gefdweift und Der Mundminfel fart abwarts gebogen. Im Dberichnabel am Gaume befindet fich ein mehr oder meniger hervorftebender boder. Bunge: lang, fcmal, unten halb malgenformig, an der Spige in einen Bundel Borften gerriffen. Fu: Be: furg; Flügel: nicht groß; Schwang: etwas breitfederig, ziemlich groß, am Ende ausgeschnitten oder gerade. Der Ropf hat eine flache Stirn. Es find angenehm geftaltete fraf: tige Bogel. Die Mannchen find fconer gefarbt ale die Beibden. Ihre Rahrung fuchen fie auf dem Erdboden oder an gang niedern Pflan: gen. Gie leben von allerlei Gamereien, im Commer auch von Infetten und deren Larven. Ihre 5 - 6 Gier haben außer Puntten und Fleden dunfle Aberguge. Die Jungen futtern fie mit Infeften auf. Mue baben ein mobl: fdmedendes Bleifd.

Man hat fie wegen ihrer verfcbiedenen Lebensart in 2 Familien getheilt. In Deutschland

leben 8 Arten.

Erfte Familie:

Eigentliche Ammern (Buschammern.)
(Em. fruticetae.)

Der icarfe Gaumenhoder im Dberichnabel tritt fart hervor; der Nagel der hinterzehe ift furger ale diefe, und ziemlich fart gefrummt. Es find Stand: und Strichvogel.

Der Golbammer, Gehling, Grunsch=

(Em. citrinella. Linn.)

Ropf, Sals und alle untern Theile im Grunde icon gelb; ber Burgel fcon roftfarbig. Ein fehr hubiches befanntes Bogelchen, bas

vorzüglich im firengen Winter, bei hohem Schnee, und in Dorfern und Städten oft bes such tund baher auch bekannt genug ift. Seine Länge beträgt 63 bis 7½ 3., wovon 3 3. auf den am Ende etwas ausgeschnittenen breitsederichten Schwanz abgehen. Flügelbreite 11 bis 11½ 3. Der Gaumenhöder ist start ausgedruckt. Der Schnabel 5 Linien lang.

In Deutschland ift er allenthalben gemein; er gebort unter Die Stand: und Strichoo: gel, Die im Berbft und Binter meift heerdenweise nach guten Sutterplagen herumschweifen. Indeffen findet man auch Parchen und Fami: lien, Die fich taum eine Stunde von dem Drte entfernen, mo fie niften ober ausgebrutet find. Man findet fie in Balbern , am liebften, mo viel niedriges Bufcholz, ift. Ift der Bald von Biefen begrengt und diefe mit niederem Geftraud und einzelnen Baumen befegt, fo gieben fie dies vor; lieben feuchte Gegenden und Rabe des Baffere. Im Berbft fclagen fie fich in Beerden gufammen, find dann am Tage in den Robladern, auf Stoppelfeldern und an ben Strafen überall, und nur des Nachte im Balde und Gebufch. Sobald im Fruhjahr die Witte: rung gut mird, gieben fie binaus an ihre Standorter und vertheilen fich dort paarmeife.

Bei aller Gefelligkeit ift ber Goldammer boch ein gantifcher Bogel, ber fich oft mit feines Gleichen nedt und herumbeißt. Merkmurdig ift es, daß fie gang eigene Buneigung gu ben Bachholderdroffeln haben und mit ihnen fpielen. Die Lodftimme ift ein icharfes Big ober Bitid. Die Stimme bes Manndens, Die er oft von einem boben Baume ertonen lagt, ift bell und filbertonend. Die Rinder ber Land: leute abmen fie oft durch Borter nach, ale: "'s ift, 's ift, 's ift, noch fruh," oder: "Benn ich ein' Giechel hatt', molft' ich mit foniet" (fcneiben). Man bort ben Gefang Diefes fleißigen Gangers vom grauen: den Morgen bis jum dammernden Abend. Ge find gute Stubenvogel, Die im Rafig aber am besten fingen. Gind aber unreinlich.

Im Commer leben fie meift von Infekten, nebenbei auch mit von Kornern, und besuchen gern hafer : und hirfenader. Mehlhaltende Camereien ziehen fie den übrigen vor, die fie aber erft von den Spelzen und Schalen, durch ihren dazu so gut eingerichteten Schnabel, bestreien. Sie fressen viel schädliche Insekten und beren Larven, als: Rohl :, Rüben : und Raps weißlinge 200 Sie baden sich gern. — Dafer

und Canariensamen giebt man ihnen in der Gefangenschaft; dann und wann auch Mehlewurmer und Ameiseneier, besonders in der Mauser.

Gie niften überall im Gebufche; bei gun: fliger Bitterung findet man ihr Reft fcon im Marg. Do das Mannden haufig figt und fingt, fann man auch auf Das Dafenn feines Reftes foliegen, im niedrigen Geftrauch zwi= fchen Stammen und altem Buft verftedt. Es besteht aus groben Materialien, ber Boden ift erft mit feinen Salmden und gulegt mit Pferdebaaren ausgelegt. Man findet darin 4-5 mehr furg, ale langevale Gier, feinschalig, glanzend oder matt. Die Grundfarbe ift trubeweiß, fein grau befprift mit Puntten, Hederchen und feinen Saarzugen, von einem rothlichen Schwarg: braun, nicht fehr fark, ja oft nur fparsam be: zeichnet; bisweilen ift auch der Grund rothlich weiß, fehr fein und bleich violetgrau befprigt, Die deutlichen Adern, Saarzuge und Punkte aber rothbraun. Go variiren fie oftere. Das Mannchen hilft mit bruten, indem es fein Beibchen taglich mehrere Stunden abloft. Binnen 13 Tagen ichlupfen die Jungen aus, Die fie mit Infetten und beren Larven großfuttern. Dft perrathen fich diefe durch ihr zwitscherndes Befdrei, und icon ausgeflogen hort man im niedrigen Gebuich ihr: 3n, 3n! Im Juni findet man meift fcon Die zweite Brut.

Bu ihren Feinden gehören: der Suhnerund der Finkenhabicht, der Merlinfalke, der große graue Burger im Binter. Füchse, Marder, Ragen, Natten und Rause wurgen die Brut. Schmarogerinsetten und eine Taenia

plagen auch Diefe Bogel.

Man schießt und fangt fie mit Schlagnegen, im Meisenkaften, in Schlingen unter Sieben Ic. Ihr Fleisch ift im herbst fehr schmachaft, auch kann man fie wie Ortesane maften. Die Berztisgung vieler Insekten und ihr frühzeitiger Gefang gebieten ihre Schonung.

Unmerk. Go wie fcon vorher, fugen wir auch hier die noch bei und lebenden Ammern, die nicht mit abgebildet, in furgen Be-

fdreibungen bei.

Der Zip: Ammer (Emb. cia. Linn.) Sauptfarbe roströthlich; die Kehle hell aschgrau oder weißgrau; die kleinen Flügeldeckfedern breit aschgrau gekantet. Die Roskfarbe verbreittet sich über das ganze Gefieder. Sat ziemlich die Größe des Goldammers, doch schmächtiger. Er bewohnt das mittägige Europa. In Italien

ist er gemein. Bei halle an der Saale murde por einigen Jahren ein Stud gefangen. Seinen Namen hat er von seiner Stimme: &i, &i, &i, auch wohl wie zip. Es ist ein angenehmer Stubenvogel, der viel mit dem Borigen gemein hat; selbst auch die Nahrung.

Der Zaunammer (Emb. cirlus. Linn.) Kopf, hals und alle untern Theile im Grunde hellgelb; der Burzel schmußig olivengrun. Gleicht sehr dem Goldammer, besonders dem jungern Beibchen desselben. Sehr leicht unterscheiden sich dagegen die Mannchen durch ihre schwarze Kehle und Zügel; auch ist der Zaunammerschle und zügel; auch ist der Goldammer. Auch er ist ein südlicher Bogel, der selten nach Deutschland kommt. Nahrung und Betragen haben sie mit dem Goldammer gemein. Ihr Kleisch sehr wohlschmedend.

Der Rohrammer. (Emb. schoeniclus. Linn.)

Bom untern Schnabelwinkel lauft ein weiß: licher Streif neben der Kehle herab; die kleinften Flügeldeckfedern find roftroth; der Burgel afchgrau, braunlich gemischt und schwarzlich geftrichelt.

Diefer Bogel, der bei uns befannt genug ift, variirt nach Alter und Gefchlecht, besonders nach den Sahreszeiten, fo daß man diefe Urt in 2 verschiedene trennte. Auch in der Große giebt es bedeutende Abanderungen von 61 3. Lange und 103 3. Breite, dagegen von 53 3. Lange und 93 3. Breite. Der Schnabel nur 4 Linien lang. Im Allgemeinen find am Gefieder von oben eine braunliche und gelbliche Roftfarbe, mit fowarzen Fleden, am Unterleibe weiß, die berrichenden Farben an diefem Beim gang alten Mannchen ift der Schnabel bleischwarg; Der gange Dberfopf, bis ins Benid, Bugel, Mugengegend und Bangen, Rinn, Rehle und Gurgel bis an den Ropf herab glanzend fowarz; vom Mundwinkel lauft ein weißer Streif zwischen Reble und Bange herab und vereinigt fich unter den Bangen mit einem weißen Salering. Dies ift fein Grub: lingefleid.

In Deutschland ift er Zug: und Strich, voget, es überwintern aber auch einzelne und fleine Gesellschaften bei und, die vielleicht nord: lichere Gegenden bewohnten. Die eigentliche Zugzeit ift September und October, im Fruh: jahr der Marg. Sie lieben das Baffer und

finden sich baber ba, wo Gumpse und Moraste, Teiche, Landseen sind. Mit Weidengesträuche bewachsene Inseln zwischen jenen, die Seggenzund Binsengesilde in den Brüchen bilden, und da wo die hohe Sumpseuphorbie wächst und der Schisfrohrsänger haust, ist er am liebsten. Im Derbst sindet man sie auf Rohls und Rübensäckern, zwischen Stoppeln und besonders auf Dirfeäckern.

Uebrigens ist es ein munterer, angenehm gestalteter, netter Bogel, der in der Farbung seines Gesieders einige Aehnlichkeit mit den Sperlingen hat, und deshalb auch wohl Rohrs fperling heißt. Seine Lockstimme klingt wie: zieh oder tichih. Es ist ein fleißiger Sanger, ob es ihm gleich schwer zu werden scheint. Zuweilen sind es folgende Tone: Zia, tit, tai, ziffiß — tai zier, ziffiß. Er sist dabei nie sehr hoch. In der Gesangenschaft, ob sie gleich sehr zahm werden, dauern sie doch nicht lange.

Die Nahrung besteht aus Samereien und Insetten. Legtere besonders im Sommer durch. Er steigt an den Sirsenstengeln wie an den Rohr: und Grashalmen, was die andern Amsmern nicht thun, in die hohe und klaubt die Saamen aus den Rispen. Sie baden sich gern. Die Gefangenen suttert man mit hirse, Canariensamen und Mohn. Ameiseneier und das berkannte Grasmuckenfutter ist ihnen aber zuträg: licher.

Das Reft fteht fehr verftedt, meift zwifden alten Storgeln und Stammen Des Beidenge: ftrauches; es ift folecht gebauet, außerlich aus Grasfioppeln und durren Grasblattern, Die grobften nach außen, Die feinern inmendig, mo fich auch einige Pferdehaare, zuweilen auch et: mas Rohr : und Beidenwolle mit findet. Darin liegen meift 5, felten 6, niedliche, meiftens furg pvale, an dem einen Ende ziemlich fpige, bau: dige Gier. Die Grundfarbe Diefer fleinen Gier ift verschieden, bald grauweiß, ine Brauntiche oder Rothliche fpielend, bald braunlich weiß, mehr oder weniger duntel, auch mit braungelb: lidem Schein. Gelbft die Zeichnungen find un: endlich verschieden, bald afcgraue, bald vio: letgraue Saarzuge, Puntte und fleine Flede, Sonorfel, Rederden und haarzuge von einem tiefen Schwarzbraun auf Der Flace verbreitet, doch nicht febr gablreich, es finden fich darunter auch gewöhnlich folche, Die einen rothlichbraun vertufchten Rand, wie Brandfleden baben. Diefe und Die Mederchen find in Diefen Beidnun: gen dieser Gier charafteristisch. Diese Zeichnungen bilben oft recht artige Figuren, wie Zahlen und Musitzeichen. Die Schale ift übrigens sehr dart, glatt, aber wenig glanzend. In 13-Lagen werden sie meist ausgebrutet, woran bas Mannichen auch einigen Antheil nimmt. Sie machen meist 2 Bruten. Das brutende Beibchen sitt sehr fest und verrathet oft das Rest durch das verzögerte heraussliegen.

Mit vorigen haben fie die Feinde gemein. Man kann fie leicht ichießen, auch mit Schlingen fangen. Ihr Fleisch ist wohlschmedend, ihr Gefang nicht unangenehm, auch vertilgen fie viele

Infetten.

Der große Grauammer. (Emb. miliaria. Linn.)

Der dide Schnabel schmußig gelb; die obern Theile des Bogels licht mausegrau, mit dunkeln Schaftsleden; die Seitenfedern des Schwanzes ohne keilsormigen weißen Fled. Es ist die größte unter den einheimischen Arten. Lange 7½ bis 8; Flügelbreite 13 3. Der 3 3oft lange Schwanz merklich ausgekerbt. Der Schnabel 6½ Linie lang.

Dieser Bogel ift in ganz Europa verbreitet, in Marslandern am häufigsten. In Brüchen und andern feuchten Gegenden ist er auch bei und gemein. Er ist bald Striche, bald Standvogel und liebt besonders den Binzterrapps (Brassica Napus), worin er sich sehr gern aufhält, wählt sie auch zum Brutplage. Er liebt feuchte mit Seilweiden bepflanzte Biessen, auch mit Kopfweiden beseste Felder. Im Derbst durchstreichen sie die Stoppelfelder, bei ftrengem Binter kommen sie auch in die Dörfer auf die Misstätten und vor die Scheunen. Auf ihrem Zuge werden sie öfters unter dem Rachtenge mit den Lerchen zugleich gefangen.

Es ist übrigens ein etwas träger, schwerfals liger und träftiger Bogel. Die Lockstimme klingt wie die Sylbe: Knipps oder Zicks. In der Begattungszeit hort man ein fanftes: Lick—tick. Der Gefang des Männchens ähnelt den Tonen; welche ein Strumpfweber bei seiner Arzbeit seinem Stuhl entlockt; es sick dabei meist ganz frei und erhaben auf einem Stein, Pfahl 2c. Gefangen wird er sehr zahm. Sämereien und Insekten sind auch seine Nahrung; mit lesteren suttert auch er seine Jungen auf. Hirse, Hafer u. Baigen liebt er besonders. Badet sich auch oft.

Ihren Riftbegirt vertheidigen fie muthig; das Reft findet man meift auf der Erde, zwifchen farten Pffangen im Grafe, von groben Mate: rialien erbauet, mit mehr ober meniger Pferde: haaren ausgelegt. Im April findet man barin meift fcon 4-6 Gier, von ber Große der Feld: lerden : Gier, von Form bald langlich, bald furzopal, biemeilen auch fcon eiformig; fie ba: ben eine feine, wenig glangende Schale, beren Grundfarbe nicht fehr mandelbar ift, Die aber in der Zeichnung defto mehr abandern. Die erftere ift immer ein mattes, grauliches, mehr ober weniger in ichmugige Fleischfarbe fpielenbes Beig, worauf manche mit violetgrauen Bunften und Fledchen über und über befaet und bann noch am flumpfen Ende mit dunkelrothbraunen Rleden und Puntten bezeichnet find. Bei an: deren fieht man nur wenige fehr feine Puntte, aber am flumpfen Ende fehr große gleden von violetgrauer Farbe, Die oft große Stellen ein: nehmen oder einen Fledenfrang bilden, doch ift feines ohne einzelne, feine, kurze Aberzuge, aud haben viele Brandfleden. Binnen 2 Bo: den hilft das Mannchen fie dem Beibchen mit ausbruten. Die Jungen werden mit Raupchen und allerlei Infetten aufgefüttert. Gie lieben fie febr und verrathen das Reft nicht felten durch ibr angftliches Gefdrei. Bei der geringften Sto: rung verlaffen die oft noch nicht flugbaren Jun: gen bas Reft, wie die Jungen der Feldlerche. Sie machen 2 Bruten. Bei der fruhzeitigen Reife Des Rappfes geben beim Abbringen Deffelben viele ber zweiten Brut verloren.

Mehrere Raubvogel verfolgen auch fie, Die Brut: Ruchfe, Marder: Arten, Ratten und Maufe. Leicht tann man fie fciegen und in Fallen fan: gen; mo es viele giebt, lohnt es, fie auf eigenen Deerben ju fangen. Man fann fie bei ihren Lieblingeplagen anlegen, und fich felbft ber Goldammer, ale Lodvogel, Darauf bedienen. Ihr Bleifch ift im Berbft fehr fett und mohlichmedend. Gie fonnen auch wie der Driolan gemaftet werden. Rugt durch Bertilgung fcab: licher Infetten, befonders der Raupen ber Beiflinge, der Beufdreden und ihrer Larven, ber Beimden und Maulmurfsgrillen.

Der Ortolan, Gartenammer. (Emb. hortulana. Linn.)

Schnabel und Fuße fleischfarbig; Die Reble, ein Streif vor ber Bange und ein fleiner Rreis ume Auge ftrohgelb. Den roftrothen Unterfor: per hat er mit dem Bipammer gemein. Lan: ge meift nur 6, Flugelbreite 1013. Das Gemicht 14 bis 14 Loth, gemaffet auf 3 Loth. Schnabel an 5 Linien lang. Um alten Mannchen im Frub: langefleide find Rehle, Gurgel bis in die Mitte ber Rropfgegend, ein fleiner Rreis ums Muge und ein Streif, welcher vom Mundwinkel an Die Bangen vorn und unten begrengt, trube fcmefelgelb oder blagrofigelb; Bugel und Ban: gen gelbbraun. Jungere Mannchen haben weni: ger gelb, eine bleichere Roftfarbe. Beim Beib: den find im Fruhling Scheitel und hinterhals braunlich afchgrau, mit fleinen, dunkler braun: grauen Schaftfleden.

Diefer Ammer bewohnt das mittlere und fubliche Guropa. Er gehort unter Die Bugvo: gel, welche nur in ber marmeren Sahredzeit bei uns verweisen und ben Binter in fublichern Landern gubringen. Ende Aprile erfcheint er in Deutschland und im Geptember verschwindet er aus unfern Gegenden. Bor einigen Sahren wurde bier bei Salle ein Eremplar gefangen. Er gieht einzeln, felten familienweife, liebt bas Baffer, mit Baffergraben durchfdnittene Feld: beden, von großen Bruden nur die Rander, wodurch er fich vom Rohrammer unterfcheibet. Er halt fich gern verftedt und fucht feine Rab: rung auf der Erde.

Es ift ein ftiller, harmlofer Bogel, Den man nicht ftreiten fieht. Gein Lodton flingt wie : gub, gub - gne und zwit, zwit, auch pied oder ped, ped, ped ze. Er wird febr leicht gahm, und gewohnt fich leicht ans Futter, fingt auch fehr fleißig, felbst in der Racht beim Mondichein. Gie murden langer dauern, menn fie nicht zu fett murden und zulegt im eignen Fett erflikten. Im Commer ift die hauptnab: rung Infeften, nebenbei auch Gamerei, Die fpater Die Sauptnahrung wird. Liebt Safer und Birfe u. dgl. Er badet fich gern.

Birfe, Safer (Safergruge) find Das gewohnlichste Futter, bei dem fie fich ordentlich maften. Bill man fie indeffen lange behalten, fo giebt man ihnen das Grasmudenfutter und zuweilen Ameifeneier und Mehlmurmer. Dabei barf Baffer zum Trinken und Baden nicht fehlen.

Das eigentliche Maften Diefer Bogel mar fcon den alten ichwelgerischen Romern befannt. Es geschicht auf folgende Art: Man thut fie in eine duntle Rammer, in der durch Laternen immer einerlei Licht fenn muß; fo daß Die Bogel Lag und Racht nicht unterscheiden konnen; ober man fperrt fie alle in einen großen Rafig, um den ftete auch Lichter brennen muffen, fo daß auch bier gleiche Delle ift. Dier erhalten fie Da: fer und hirfe, fest frifches Waffer hin, und giebt ihnen Futter und Getrant vollauf. Go werden fie in turger Zeit fehr fett. Andere geben ihnen auch in derfelben Absicht in Milch einge- quellte Gemmel, die noch befonders mit feinem Gewürze vermischt ift.

Ihr Reft follen fie nach Urt ber übrigen Ammern machen und 4 bis 6 Gier legen. Bech: ftein befdreibt fie: Graulich, auch grauroth: lich, mit braunen Strichelden befprigt. Gie ha: ben, wie bie übrigen Ummern, abnliche außere und innere Feinde. Gie merden auf eigenen Deerden: Ortolanheerden, gefangen, Die auf einem grunen, mit einer niedrigen Bede umgebenen Plagden, am Rande eines Balbes oder fonft nahe am Gebuich, mo fie haufen, angelegt find. Bum Lodvogel nimmt man einen Goldammer, bis man einen Ortolan hat. Un= fange August geht der Fang an, bis Ende Diefes Monate und zwar Bormittage von Tagesanbrud bis 11 Uhr Mittags. Gie find felten und mer: ben bas Stud mit 4 bis 16 Gr. Fanggeld be: jablt. Ja gemaftet follen fie von Ledermaulern mit einem Dufaten bezahlt merden. Rach ben Regeln der Rochfunft werden fie halb von einan: Der gefchnitten, mit Peterfilie und geriebenem Beigbrot auf dem Roft allmählig gebraten. Im fudlichen Europa verfendet man fie gerupft und in Mehl oder Safer gepadt. Bon den Griechi: fchen Infeln, auf Eppern namentlich beim Dorfe St. Stoppa, verschickt man fie fehr weit nach den großen Stadten Guropa's, indem man fie in beißem Baffer aufwallen lagt und ohne Ropf und Fuge, mit Effig und Gemurg in fleine Gag: then verpact, wovon einige 200, andere 400 Stud enthalten, und bergleichen follen in man: chen Sahren an 400 von dort aus verfendet mer: ben. Gie nugen übrigens, wie die andern Am: mern, Durch Bertilgung der Infetten.

Der schwarzkappige, Rappenammer. (Emb. melanocephala. Scopoli.)

Die Schwanzsedern ohne weißen Reilfled; die Deckedern unter dem Schwanze und den Flügeln hoche oder hellgelb. Dieser schöne suder siche Bogel war sonst eine Tanagra, jest aber hat man ihn mit vollem Recht zu den Ammern gebracht. Er sieht eigentlich zwischen beiden inne, doch das im ganzen Gesteder vorherrschende Gelb, der Gaumenhöder und sein ganzes Betragen gellt ihn zu den Ammern. Die Länge beträgt 7

bis 7% 3., Rügelbreite 11 bis 11% 3. Der Schnachel 6 bis 6% Linie lang. Die Fris duntelbraun. Das alte Mannchen im Frühlingstleide ift ein prächtiger, ja der schönste unter den einheimisschen Ammern. Seinen Obertopf bededt eine glanzende schwarze Rappe so, daß sie bis zum Genick, Jüget, Wangen und Schläfen sich hersunterzieht und rundum von einem prachtvollen Dochgelb abschneidet, was die halsseiten, Rehle, Gurgel und alle untern Theile einnimmt, am Bauche und After blässer. Gine schöne Rostfarbe ziert die obern Theile. Die Weibchen sehen min; der schön.

Man trifft ihn nur im warmeren Europa und Asien. In Wien hat man einzelne gefangen. Es ist ein fleißiger Sanger. Als Gefangene kann man sie lange halten, wo sie selbst des Nachts beim Mondschein und beim Licht in der Stube singen. Insetten und Gesame, was auch er erst entspelzt, nahren ihn. In Dalmatien nistet er häusig in heden und Gesträuche. Er hat 5 bis 6 Eier, die von Einigen weiß mit deutlichen sehr kleinen grauen Punkten, von Andern weißgrünlich mit rostbraunen Punkten, besonders am stumpsen Ende bestreut, angegeben werden. Sein Fleisch halt man für wohlschmerkend.

Unmerf. Der Fichtenammer (Emb pithyornus. Pallas.) Die Mitte des Cheis tels, Bange und Gurgel weiß oder weißlich, erstere beide mit fcmarglicher Ginfaffung; Der Burgel roftfarben; am Mannden die Rehle roft: roth, am Beibden weiß, gur Geite roftbraun gefledt. Diefer niedliche Ummer ahnelt bem Rohrammer, doch großer. Lange 62 bis 63 3.; Flügelbreite gegen 12 3. Das alte Mannchen im Fruhling: auf dem Scheitel bis ins Genick hinab ein helles Beiß; dies umgiebt von der Stirn an uber Die Augen hinweg ein braun: fcmarger Streif, nach dem Genid ju etwas grau gefledt. Die Reble bis auf Die Gurgel rofibraun. Die Mitte der Bruff und der Bauch weiß, Die Seiten der Dberbruft graulich rofffar: big gefledt, ber Raden braunlichgrau, Ruden und Schultern roftfarbig, grau gemifcht. Dem Beibchen fehlt die roftrothe Rehle. Es ift ein fudoftlicher Bogel; an der Uralifden Bergfette foll er gemein fenn. Bon den Fichtenmalbern Sibiriens hat er feinen Ramen, ob er gleich wie die übrigen an Ufern der Bache und Fluffe lebt. Uebrigens gleicht er den übrigen Ammern.

Zweite Familie. Spornammern (Lerchenammern). (Emb. calcaratae.)

Der Gaumenhoder flein, wenig bemertbar, ber Ragel ber hinterzehe ein wahrer Lerchensfporn; die Flügel viel langer, schmaler und spizer als bei vorigen; balten fich ausschließlich auf platter Erde auf, figen gern auf Felsen, scheuen bas Gebusch, betragen sich wie Lerchen, laufen schrittweise; nisten im hohen Norden auf den Erdboden, zwischen Steinen; bloß im Winter kommen sie zu uns.

Der Schnee=, Schneespornammer. (Emb. nivalis. Linn.)

Muf dem jusammengelegten Flugel 2 meiß: liche Binden und ein weißer Langeffreif (jun: ger Bogel), oder eine weiße Binde und ein großer weißer Langefled (alterer Bogel); oder der Flugel ift, bis auf die fcmargen Daun: febern und die letten 2 Drittheile der großen Schwingen, gang weiß (gang alter Bogel); Die 2 legten Schwungfedern haben, im mehr oder meniger volltommenen Buftande, einen roftbraunen Rand, welcher aber im Commer febr fomal und licht wird. Go haben Alter und Sabredzeit fo viele Beranderungen im Gefieder bervorgebracht, daß, ehe man dies genau fann: te, mehrere Urten daraus gemacht murden. -Lange 6% bis 74 3. Flugelbreite 113 bis 13 3. Schnabel 4 bis 5 Linien lang.

Diefer Bogel fommt nur, wie der Seidenfcmanz, in der kalten Jahreszeit zu uns. Im
Sommer an den Kuffen des Eismeeres und andern Landern in der Nahe des Nordpols. Bon
dort aus drangt ihn der Winter oft in großer
Anzahl nach mehreren Landern hin, auch bei
uns ist er dann nicht felten, und im hohen
Schnee im December findet man sie dann auf
den Feldern. Tritt Thauwetter ein, so eilen sie
ihrem Norden wieder zu. In ihrem Baterlande
leben sie in felsigen Gegenden, auf Klippen,
und von allen Reigen entblößten Gegenden.

Es find unruhige Bogel, in Gefellschaft wild und icheu; einzeln find fie es weniger. Untereinander leben fie friedlich auch mit andern Bogeln. Die Stimme dieses fraftigen Bogels ift ein pfeifender Ton: Fid und Fud und ein flirrendes zirre. In Island fingen fie ichon im Marz fehr fleißig. Man kann fie in einem Bauer gut erhalten, wo sie aber die Stuben-

warme nicht gut ertragen. Sie leben meift von Samereien, nebenbei von Insesten, mit denen sie auch ihre Jungen auffüttern. Im Kafig giebt man ihnen hafer, hirse, Canariensamen 26. Sie baben fich oftere.

Ihr Nest bauen sie zwischen Steine und in Felsenspalten, außerlich aus Moos und Flechten mit Grashalmen vermischt, inwendig mit Haaren, vorzüglich vom Blaufuchs, ausgepolstert. Sie legen 5—6 Eier, schon eisörmig, zartschalig, glanzend und so groß als Feldlercheneier. Ihr blaulich weißer Grund hat blasse, rothlichzgraue und sehr dunkel blutbraune Flecke, Strische und Punkte, besonders am stumpfen Ende, während die übrige Fläcke nur wenig Zeichnungen hat.

Füchse und Wieseln schaden ihrer Brut, die Alten jagen: der Merlinfalke und der Sperber. Im Gefieder beherbergen sie Schmarogerinsekten. Bei und schieft man sie. Im hohen Norden, wo sie in großen Zügen fliegen, soll man auf einen Schuß 20 bis 40 Stud herabschießen konnen. So werden sie auch mit Leimruthen und in Laufschlingen gefangen. — Sie beleben im Norden die traurigen Einoben mit ihrem angenehmen Gesang, auch schät man ihr Fleisch sehr. In Schottland werden sie in ungeheuern Massen zur Speise gefangen.

Anmert. Der Lerchenspornammer (Emb. lapponica. Nils.) Gin weißlicher Streif lauft über das Muge und umgiebt die Wangen größtentheils; Die Glugelfedern braunfdmarz, mit bellen Gaumen, ohne Beiß; Die Beichen mit deutlichen fomarglichen Schaftstrichen und Langefleden; am Mannchen Die Reble mehr ober weniger fcmarg. Aehnelt bem vorherges henden in der Lebensart, variirt auch fo wie iener in Farbe und Zeichnung. Lange 63.; Flugelbreite 11 3. Es ift auch ein Bintervogel, denn er bewohnt im Sommer Die arktifchen Pofarfreife. In Sappland ift er gemein. Bei uns erfceint er nur einzeln und felten; fommt im October an und verläßt und im Februar. Er foll Die Gebirge den Gbenen in feinem Bater: lande porgieben. Baume liebt er nicht; bei und große weite Felder; hat überhaupt viel von den Feldlerchen, ju benen er fich auch gern halt, und auch wie Diefe lauft. Der Gefang Des Mannden ift angenehm lerchenartig.

Gr lagt fich leicht an Die Gefangenschaft gewohnen und wird bald gahm. Bei uns lebt er von Samereien, im Commer von Infetten, womit er auch feine Jungen groß futtert. Entsbulft die Korner im Schnabel und frift gern Dafer. Er babet fich gern. Man schießt fie, fangt fie aber auch in Negfallen, Leimruthen ec. Ihr Fleisch ist wohlschmedend, oftere kommen fie mit den Lerchen auf den Tisch.

Finfen. (Fringilla. Linn.)

Mit kegelformigen, an der Base mehr ober minder didem Schnabel; aber feine Commissurist nicht winkelig. Sie leben im Allgemeinen von Samen und find meist gefräßige und schabzliche Bögel. Nach Cuvier werden sie in mehrere Abtheilungen gebracht, als:

Debervogel. (Ploceus. Cuv.)

Ibr Schnabel ift fo groß, daß man fie gum Theil unter Die Caffican's ordnete, aber Die gerade Commiffur unterfcheidet fie. Außerdem ift ibr Dberfdnabel leicht gewolbt. Gie leben in beiden Belten. Die meiften aus ber alten, flechten aus Grashalmen funftreiche Reffer, ba= ber obiger Rame. Der Trieb zu flechten icheint Diefen Thieren inniges Bedurfniß; felbft im Ra: fig, wenn fie Faden finden, benugen fie Diefe. In Ermangelung berfelben nugen fie bagu bie vermauferten Schwung : und Schwanzfedern, um Dieselben am Gitter ihres Behaltniffes gu ordnen. Giebt man ihnen verfchieden gefarbtes Garn, so umspinnen fie in 2 bis 3 Tagen ein Stud Drahtgitter vom Umfang eines Schuhes in Quadrat, wie eine undurchfichtige Wand. Bei eigener Bahl ergreifen fie gelbe und braune Kåden zuerst. Eine Fringilla oryx umfolang einen 8 Boff langen Faden 48 Mal um 6 Draht: fabe. Giebt man ihnen Plag und Materialien genug, fo bauen fie felbft ein unvollfommenes beutelformiges Reft. In der Gefangenschaft be: mertt man biefen Trieb nur bei den Rannden. Der bengalifche Beber hangt fein Reft an Palm: baume über einen Bach auf. Es besteht aus langen Pflanzenfafern oder durren Grashalmen, Diefes funftlich gewebte Reft hangt er dann ver: mittelft einer Gonur, Die auf eine Gle lang ift, an Die auferfte Spige eines gang dunnen 3meiges, fo daß es vom Binde bin und ber bewegt wird. Es bat Die Gestalt einer Blafche. Der enge enlindrische Gingang führt ju bem wei: tern Theil bes Deftes, bas aus 2 bis 3 Abthei: lungen besteht, in ber erften Abtheilung fift Das Mannchen und in ber zweiten brutet bas Beibchen bie Gier aus.

Es find übrigens gefellschaftliche Bogel; fie foreien viel, fingen ichlecht und thuen in ben Pflanzungen oft großen Schaben.

Der Tufnameurvi. (Ploceus philippinus. Fring. philip.)

hat bie Größe eines Sperlings; Geficht und Stirne schwarz, Ropf, hals und Brust schön gelb; hinterhals und Ruden gelb, schwarz geflect; Bauch weiß; Schwungsedern schwarz, weißlich gefaumt; Schnabel schwarz, desgleichen der Schwanz, gelblich gefaumt. Sein Nest hat die Form eines Destillirkolbens mit langer Röhre, an einen Baumzweig befestigt.

Unmerk. Es gehort hierher auch noch ber Reifbieb, (Fring. Quiscula). Schwarz, foillert in alle Linten bes angelaufenen Stahls. Er vermuftet in zahllosen Schwarmen bie Felsber in mehreren Gegenden Amerikas.

Eigentliche Sperlinge. (Pyrgita.)

Ihr Schnabel ift etwas furger als bei ben vorhergehenden, kegelformig und nur gegen die Spige hin etwas gewolbt. Sie leben von Samereien, Kirfden und andern weichen Früchten, Beeren und im Sommer auch von Insecten. Baben sich balb im Basser, balb im Staub und Sande. Die haufigen Arten thun Schaben.

Der haussperling, Spat, Rauch=

(Fringilla domestica. Linn.)

Die Mitte des Scheitels ift duffer afchgrau oder braungrau. Die Seiten des Ropfes hinter den Augen find beim Mannchen kastanienbraun, an welcher Stelle sich beim Beibchen und den Jungen ein schmuchig rostgelber Streif besindet. Die Kehle des Mannchen ist schwarz. — Uebrigens ist dieser Bogel so allgemein bekannt, daß eine nahere Beschreibung nur überflussig zu senn schene Länge 6½ 3., Flügelbreite 10¼—10½ 3. Schnabel 6 Linien, an der Burzel 4½ Linie hoch und eben so breit. Iris dunkelbraun. Man hat unter ihnen auch Spielarten, als rein weiße, gelblichweiße 26.

Es giebt auch Baffarben vom Canarienvogel, som Feldfperlinge und auch vom Saussperling.

Sie find in Guropa bis Affen verbreitet. Im mittlern Guropa ungemein haufig, und wo nur Aderbau getrieben wird, da niften fie fic auch ein. In Deutschland find fie fast über: all haufig, ale mabre Standvogel. Raube Bebirge, Radelmalder und unfruchtbare fandige Chenen, find ihnen zuwider. Dorfer mit gro: Ben Gehöften lieben fie und halten fich der Giderheit wegen, gern bei Rirden, Thurmen und alten Schlöffern auf. Im Fruhlinge find fie in einzelnen Parchen in den Gehöften vertheilt. Als gefellige Bogel fuhren fie Die Jungen in Die Garten, mo fie Die Familie in fleine Deer: den vereinigen, die dann ju Schaaren anwach: fen und bis in den Berbft fich dort herumtreis ben. - Um liebsten find fie immer da, mo Gebufch, eine Dornhede und Baumreiben fic finden, wo fie fich im Rothfall verbergen tonnen. Bei eintretendem Froft und Gonee gieben fie fich in die Stadte und Dorfer wieder gurud und leben dafelbft in fleinen oder gro: Bern Gefellichaften. Im Fruhjahr befuchen fie Die Garten.

Des Nachts verfriechen fie fich unter Spar= ren, in Lochern zc. und ftreiten fich nicht felten um ihre Schlafftellen. Den meiften Laum ma: den babei im Commer die aus Jungen befte= benden Beerden auf fart belaubten Baumen. Im Winter mablen fie gern die alten Neffer, Laubenhöhlen ze. Die Rabe ber Menfchen bat Diefe Bogel liftig, verschlagen und migtrauisch gemacht. Dies fann man taglich beobachten.

Sartnadig find die Rampfe ber Mannchen um die Beibden, wobei fie fich oft fo verbei: gen, daß fie von einem Dache berabpurgeln und dabei wohl gar gefangen werden. Ihre bekannte Stimme: Schilp, Schelm und Dieb, laffen fie oftere boren. Zone ber Bartlichkeit: Durr und Die Die Die und ber Gefahr find: Terrr, mas auch andern Befieder: ten verftandlich ift. Rabert fic Die Gefahr, fo wird daraus ein hastiges: Tell, terelf: telltelltell zc. Ift Die Gefahr vorüber und der Raubvogel oder die Rage hat fich wieder entfernt, fo ruft ber Sperling ein fanftes: Durrr. Beim Streit der Mannchen befonders im Frühling hört man die Tone: Tell tell filp, ben dell dieb fcilt zc. Bei Diefem bekannten garm giebt es berbe Schnabelbiebe. Biel andere flingt auch der mit: gworr, burr und abnlichen gartlichen Tonen untermischte

Gefang nicht. Die Jungen foilpen wie Die Alten, nur einformiger. In der Stube halt fic der Sperling gut, ift aber manchen Rrank heiten, ale: der fallenden Gucht, Blindheit, lahmen Sugen, da fich Fafern und haare leicht

daran hangen, unterworfen.

Er nahrt fich von Camereien, mehlhalten: ben Getreidearten, garten Blattern junger Pflan: gen , Anospen , Bluthen , jungen Erbfen, Rir= ichen, und andern weichen Baumfruchten, Beeren, allerlei Infecten und deren Larven. 200 Diefe Bogel fehr haufig find, thun fie vielen Schaden. Freffen auch gern ben Rafe, meshalb fie Die Rafetorbe oft besuchen. Camereien bulfen fie guvor und genießen nur den Rern. Rafer und beren Larven, fo wie Beufdreden, Schmetterlinge ic. verzehren fie fludweise.

Gie bauen in Locher, unter Dachsparren, und Balten, in Schwalbennefter, Taubenhohlen, wo fie die Tauben heraustreiben, ja felbst auf Baume und an Stordnester. In der Regel bauen sie gern sehr hoch, wie in alte Mauern, Thurme 2c. Go niften fie auch gern in an Die Gebaude aufgehangten Raftden, Korbden und eigende baju gefertigten irbnen Gefage. Die alten Sperlingsparden bauen icon im Darg. jungere 2 bis 3 Bochen fpater. Gie niften jahrlich drei mal. Da fie aber oftere verftort werden, findet man Junge von Ende Marg bis in den Geptember. Beim Refibau ichleppen beide Gatten viele Materialien gusammen, die oft lang herabhangen und fo das Reft verra: then. Das Gemebe ift unordentlich und luberlich, im Innern aber fehr weich und warm. Der Act der Begattung wird 20 und mehremal hintereinander wiederholt, meift an erhabenen Drien in ber Mabe bes Reffes.

Die Gier find gartichalig, glatt aber wenig glangend, icon eiformig, am flumpfen Ende ftart abgerundet. Gie variiren fehr, wie ich in meiner Sammlung nachweifen fann, auf blaulich = auch blaugrunlich = felten rothlich wei= gem Grunde find fie broun und afdgrau ge= fledt, besprift und punttirt, bald mit groben, bald mit dichten feinen Zeichnungen, ich habe ein fast rein meißes, bagegen find andre wieder wie marmorirt zc. Die Zahl der Gier belauft fich meift auf 5, felten 6-8. Gie mer= ben von beiden Gatten binnen 13-14 Lagen wechselsweise ausgebrutet. Die Jungen merden meift mit fleinen Raupchen, fpater mit größern Infetten und Rafern aufgefüttert, wonach fie oft weit herumfliegen. Gie fliegen bald aus, und begleiten bie Alten unter beständigem Schilten, immermahrend um Futter bittend. 8 Ta: ge nach dem Ausfliegen schreiten die Alten schon jur zweiten Brut und in 14 Tagen hat bas Beibchen wieder Gier.

Alle Falten, der große Burger, felbft Gl= ftern, vorzüglich aber der Sperber, den Die Landleute deshalb auch Sperlingsftoßer nennen, find ihre Feinde. Legterer fucht fie in den Gehöften auf, und bei feinem Erfchei: nen flieben alle, unter einem beft'gen Gefdrei: Tell, tell tell aus einander. Auch Gulen bolen zuweilen einen Sperling aus dem Schlafe bervor. Bon andern Raubthieren ftellen ihnen Ragen, Marder und Biefeln, felbft Ratten nach. Bor allen aber am meiften der felbstfüchtige Menich, ber fie auf alle Urt verfolgt und oft graufam behandelt. Auch in ihrem Gefieder wohnen Schmarogerinsetten und in den Gingeweiden außer einem Bandwurm (Taenia fringillarum) noch einige andere Burmer : Arten.

Als fehr folaue Bogel geben fie auf alles genau Acht, lernen gar bald Flinte, Wind= buchfe, Blaferohr, ja felbft die Perfon des Sougen fennen. Die vorfichtigen Alten marnen bei annahernder Gefahr, mit heftigem Gefdrei Die unerfahrenen Jungen. Gelbft Leim: ruthen, Chlingen und Dete lernen fie fennen. Am leichteften fangt man fie noch mit Baigen: ahren mit Bogelleim beftrichen. Gin luftiger Fang ift der mit einem lebenden Sperber; es schleichen sich zwei Personen damit auf den Dof, mo Sperlinge figen, ber eine lagt ben Sperber an einen Faden gebunden fonell flie: gen; fogleich fiurgen fich die Sperlinge in Die erften beften Loder, Rige zc. wo bann Die zweite Perfon, die dies alles beobachten muß, fie fonell hervorzieht, und fo fangt. Go merben fie auch in den Lochern Abende, mo fie uber= nachten, burch vorgehaltene Rege gefangen.

Sie nugen durch ihr wohlschmedendes Fleisch, laffen sich auch durch in Milch gequilte Semmel masten. Uebrigens nugen sie durch Bertilgung einer großen Menge den Obstbaumen und Feldfrüchten schädlichen Insetten. Die Berechnungen, wie viele davon ein Sperlingsparchen für sich und ihre Jungen brauchen, so wie auf der andern Seite, die Nachzählung der Körner, die von ihnen verzehrt werden, geht ins Kleinliche. Indessen geht nach reiflicher Erwägung des Nugens und Schadens hervor: daß auch sie in dem großen haushalt Gottes ihre Stelle ausfüllen, und daß nur Mangel

an Aufmerkfamkeit und Fleiß bei Uebermaaß ihrer Bermehrung die Schuld tragt. Im Berbik gut angebrachte Flintenschusse, mit feinem Schrot, Nege, Fallen, und Zerstörung ber Nester, wo sie sich übermäßig vermehren, tilgt sie bald.

Das sonflige Liefern ber Sperlingstopfe ift in vielen Landern jest auch in eine Geldabgabe verwandelt worden.

Der Felds, Baums; Rohrs, Walds, Ringelsperling. (Fringilla montana. Linn.)

Den Oberfopf bis auf ben Ruden bebeckt ein einfaches, mattes Aupferroth; Zügel, Kehle und ein Fled auf den Wangen schwarz, das Uebrige der Kopfseite weiß; über den Flügeln 2 weiße Querbinden. Lange 6, Flügelbreite 9½ 3. Der Schnabel 5 Linien lang. Bei dem Mannchen sind die Zügel, Augenlieder, ein kleiner Strich unter dem Auge nach den Schlafen zu, ein runder Fled auf der Wange, in der Ohrengegend und die Kehle bisauf die Gurgel herab, tief schwarz. — Spielarten giebt es auch unter diesen, wie bei vorigen.

Much Diefe Art ift weit verbreitet und bewohnt viele Theile der alten Belt von Guropa. Es ift ein Bewohner des Baldes und liebt befonders die Gichen und Beiden, auch Baum: anpflanzungen bei Dorfern und Stadten. In allen Jahredzeiten durchftreifen fie Die Felber, bald in großen Schaaren, bald nur paarweis, Rahrung fuchend. In der rauhen Sahreszeit find fie meift die ungertrennlichen Gefährten der Goldammern. Ihre Nachtruhe halten fie meift in Baumhohlen, auch übernachten fie im hohen Rohre der Teiche, wo fie gewöhnlich ein febr lautes gemeinschaftliches Gefdmag halten und fo viel garm machen. Uebrigens ift Diefe Art weniger listig und scheu als die vorherge= bende.

Ihre Stimme hat Aehnlichkeit mit ber bes Saussperlings, so hort man zuweilen auch: Dieb, doch hoher und fanfter; sonst gewöhnlich aber: demm und dam, bilp und blu i. Bor ihren hohlen sigen sie Abends oft lange und schmettern dann: tettettettettet ac. und rufen dann in Zwischenraumen oft ihr gezdehntes: Dam. Im Fluge: ted, ted; dann hort man ofters auch ein sanftes: Dlib und Dlu i. Das Beibchen ladet sein Mannchen zur Begattung mit einem fanften wiederholten:

Duid uid uid uid ze. ein. Die ausgeflogenen Jungen fchreien fast wie die Alten: demm, demm. Er giebt einen guten und

Dauerhaften Stubenvogel ab.

Allerlei Gamereien, befonders mehlige, und Infeften find abmechfelnd auch die Rahrung die: fes Sperlinge. Im Fruhjahr fuchen fie auch Erlensamen auf, felbft von Difteln, Rletten und andern Syngenefiften, daneben aus den Knospen der Baume Heine Raupchen, befon: Ders auf Dbftbaumen. Spaterhin werden Diefe und andere Infetten nebft ihren Larven ihre Dauptnahrung. Den Maitafern fellen fie be= fonders nach. Gonft auch alle andere Infeften, wie der Saussperling. Das mildende Getreide fuchen fie febr beim, Gerfte und Baigen, befonders lieben fie Die Birfe, der fie vielen Schaden zufügen. Im Winter kommen fie auch mit auf die Bofe und untersuchen auf Den Strafen den frifden Pferdemift. Gie baden fich oft, bald im Baffer, bald im Staube oder trodnem Sande. - In der Gefangen: Schaft erhalt man fie leicht bei hafer, Baigen, Dirfe, Brot ac.

In Deutschland niffen fie in allen Gegen: Den, Die nicht gar ju arm an Baumen find, in Dbstgarten, Kopfweidenpflanzungen, am liebsten in Laubholzwaldungen, in Soblen mit einem engen Gingange. Ihr Reft ift unordentlich be: reitet und besteht aus verschiedenen Materia: lien, wie bei dem Saussperlinge, in der Mitte mit Federn ausgepolftert. - Meift icon im Marg bereiten fie ihr Reft, bei jungern findet man es erft im April. Daber bruten Die jungern Parchen jahrlich 2 mal, Die altern aber 3 mal. Sm Genug der Liebe gleichen fie den Saussper= lingen. Alte Beibchen legen bas erfte mal 6 bis 7, nachher weniger, und die jungen Beib: den meift nur 5 Gier. Die Gier find fleiner, als die vom Saussperlinge, meift von furger Geffalt, pariiren febr in Form und Farbe. Denn bald find fie nur einzeln gepunftet und gefledt, bald wieder mit der Zeichenfarbe fo Dicht marmorirt, daß wenig Grundfarbe durch: Scheint, Dies ift meift ein trubes Beiß, mas aber bald in's Gelbliche oder Rothliche, bald in's Blaulice spielt, und oft fo abweichend, daß man fie mit den Giern bes Baumpiepers leicht verwechseln tonnte. Meine Ginfammlung enthielt davon auch ein Spurei von einer Erb: fengroße. Beide Gatten bruten fie medfels: weise in 13-14 Tagen aus. Gie lieben ibre Jungen fehr und futtern fie mit Infetten auf. Sobald die Jungen ihrer Pflege und Aufficht überhoben find, machen fie wieder Anstalt zu einer neuen Brut. Mit der legten bede geben fie erft mit in die Felder.

Mit vorigen haben fie bie Feinde gemein. In ihren Eingeweiden findet man einige Arten von Burmern, 3. B. Pistomum elegans. — Einzeln kann man fie leicht mit dem Blaserohr schießen, in heerden find fie scheuer. Man karnste auch mit Bogelleim, unter Sieben, in Kastensfallen zc. fangen. Ihr Fleisch schmeckt besser, als das vom haussperling. Uebrigens vertilegen sie viele Bluthen = und Knospenraupchen und andere Insesten und deren Larven. Schazden auch weit weniger als die haussperlinge. Ihr Schaden ist nur individuell und örtlich, ihr Rugen aber allgemein. Leicht vertreibt man sie durch Knallen mit Peitschen, Klappern und Schießgewehr.

Der Steinsperling. (Fring. petronia. Linn.)

Ueber dem Auge ein lichter Streif, alle Schwanzfedern am Ende, auf der innern Fahne, mit einem weißen Bled. Bei alten Bogeln ftes het an der Gurgel ein gitronengelber, bei den Jungen ein weißer Fled. Gleicht bei einem flucht'gen Blid bem Beibden bes haussper: lings. Ift indeffen 6-73. lang und 12-13 3. breit. Er bewohnt nur das marmere und gemäßigte Guropa g. B. Spanien, gang Italien 2c. Liebt gebirgige Gegenden. Lebt übrigens wie die übrigen Sperlinge, benen er an Rab= rung und im Betragen gleicht. Gie niften in hohlen Baumen auch in Lodern der Felemande. Die Gier feben bann benen ber haussperlinge taufdend abnlich, boch großer und variiren auch fehr. Die Grundfarbe ein trubes Beiß, mit afdgrauen und braunen Punften, Strichel: den und Flecken überfaet zt. Ihr Bleifc ift fomadhaft. Rugen burd Bertilgung ber Infetten, wie Die Borigen.

Garten=, Bud=, Cbelfink, gemei= ner Fink.

(Fring. coelebs. Linn.)

Ueber ben Flügeln eine weiße und eine gelbweiße Querbinde. Der Burgel gelbgrun. Auch dieser Bogel gehört mit unter die bekannteffen. Länge 64 bis 62 3. Flügelbreite 105 bis 114 3. Das alte Männchen hat im Früh:

jahr einen blauen Schnabel; Die Stirn ift tief fdmart, Scheitel, Genid und Raden fcon fcie: ferblau; Dberruden und Schulter fcon roth: lich braun, an bem legtern mit hervorfdim= merndem duntel Afchbraun; Reble und Gur: gel licht Rofibraun oder blag Braunroth. Das Beibden im Fruhling: Dberkopf und hinter: hale braungrau; Die Wangen olivenbraunlich; Rinn, Reble, Gurgel und Dberbruft meiß: braunlich; das Uebrige des Unterforpers trube weiß. Dberruden und Schultern graubraun, Burgel zeifiggrun. Im Berbft feben die Beib: den braunlicher aus. Es giebt unter ihnen auch Spielarten. Diefer Binte bewohnt gang Guropa. In Deutschland ift er fehr haufig. Es ift ein Bugvogel, nur einzeln bleiben fie bei une. Im September ziehen fie. Gie fommen oft icon im Marg an, wenn gutes Better ift. Die Mannden tommen meift fruber an, als Die Beibden. Gie bewohnen Baldungen aller Art, Garten u. andere Unpflanzungen, Pflaum: und Beiden: Aupflanzungen. Die Geftalt Die: fes Bogels ift angenehm, fein Betragen lebhaft, ift gutraulich und wenig icheu. Beim Buge find fie gefellig, in ber Begattungezeit fehr gantifch, fo auch beim Freffen, felbft in der Gefangen: fcaft. Ihre gewohnliche Stimme ift ein furges gedampftes: Supp - jupp; ihr hauptlod: ton: Fint ober pint. Lagt fich ein Raub: vogel bliden, fo vernimmt man ein gifchendes: Gib, mas auch andern Bogelarten verffandlich iff. Bei einer naben Gefahr beim Refte bort man Die Gilben: Ruip pint pint.

Ge ift ein beliebter Gingvogel und fein Befang mird, weil er die verfchiedenen Gilben fo bart von einander absondert und gleichsam ausspricht, ein Golag genannt. Die Mann: den fdeinen Diefen Schlag jahrlich auf's neue einzustudiren. Man bort dann ein leifes Bir= pen und oftmale ein gedampftes: Urrer, mas mit dem nachherigen Schlage gar feine Mehn= lichfeit bat. Die Bogelliebhaber nennen Dies Dicten. Im Freien Dauert Dies mohl Lage lang, bei eingesperrten Finten oft einige Bo: den hindurd. Das Dichten hat auf der Reife mobl fcon begonnen, denn bei ihrer Unfunft, nach Befinden ber Witterung im Marg, beginnt fogleich ihr Schlag, vom grauenden Morgen bis nach Connenuntergang. Gegen Ende ber Fortpflanzungezeit mird er trager, im Juli, wo die Maufer eintritt, verftummt er. Mert: murdig ift es, daß einige Gegenden vorzugliche Solager haben, fo gieben einige die vom barg,

andere die vom Thuringerwalde vor. Die Benennungen und Bezeichungen jeder Art des Gefanges, wird von den Endfilben beffelben genommen, die fich haufig auf bier endigen. Die Liebhaber haben hier einen großen und fleinen Schigkebier, Rutichfebier, Reitherzu Deutschebier, Reitzu, u. a. m. Gie haben meift 2 Melodien, wovon Die erfte ein viel ichnelleres Tempo hat, als die andere, die mehr gedehnt wird. Gine lange beobachteter fang zuerft: Lititututut afdigfebier und gleich darauf: Rlingfling= flingrerre a fchigfebier. In andern Gegenden bort man bagegen wieder bas Reigzu baufiger. Ginige Finten wechseln damit auch und ichlagen bas eine mal Reigzu, bas andre mal Schiffebier. Golde ichagen die Liebhaber porzuglich. Sangen fie an den gewöhnlichen Solug noch ein furges Tutt oder Pint (man nennt es bas Amen), fo liebt man fie noch mehr. In andern Gegenden hat man auch noch andere Benennungen, j. B. am Thuringermald: Dodgeitgebuhr, Burggebuhr 2c.

Als einen beliebten Schläger hat man auch mancherlei Runfteleien angewendet, um den Schlag noch zu verschönern. Man pflanzt Diefe Schlage Dadurch fort, daß man Junge aus dem Rofte beraus nimmt und fie neben einen fol: den Birtuofen hangt, wodurch es die Jungen nach und nach fernen und es dann mit eigenen oft noch verschönern, auch mohl verschlechtern. Dies geschieht besonders in den Fabritdorfern des Thuringerwaldes, wo man eine Urt Lurus Damit treibt, danrach weite Reisen macht und gute Schlager theuer bezahlt. - Ja man er= gablt: Dag ein armer Defferschmiedt in Der Sucht fur Finken, fogar eine Ruh gegeben habe. Bechstein spricht in feinen Schriften viel über funftliche Fintenfolage. Er bat fie nach ber Rangordnung aufgestellt, als: den Brauti: gam, der klingt fo: Fink, fink, fink, fink, borft du, willft du, mit dem Brauti: gam gieren; der Ruhler gute Beingefang foll wie Soboetone klingen, der scharfe aber fol= gende Gilben haben: Frig, Frig, Frig, willft bu mit jum Bein gebn; u. a m.

Man sperrt die Finken in kleine dustere Bauer, worin sie am besten schlagen. Rach dieser Zeit muß man sie in eine lustige Kammer thun, wo sie sich mausern, halt man sie zu dieser Zeit gut, so leben sie lange. Bechmein erzählt: daß ein jung aufgezogener Finke 24 Jahr gelebt habe. Wer sie jung aufziehen

will, muß fie aus dem Refte nehmen, wenn Die Schwangfedern aus ihren Scheiden hervor: brechen. Man hangt fie hernach bei gute Schla: Gie lernen auch andere Bogelgefange, Doch nicht im Busammenhange. Man hat Diefe armen Thierden auch ihrer Gehfraft beraubt, Damit fie im Gingen nichts fore. Ja, Diefe und auch andere Bogel pflegen Bogelfieller einzudampfen, d.h. fie in einen finftern Schrant oder Raften mit dem Rafig zu hangen; Sauf: und Freggefaße muffen fie vorher icon gewohnt fenn. Sier bleiben fie bis jum Berbft, mo man fie dann hervorholt, und fie auf den Bogelheerd jum Singen und Loden ihrer Gefahrten braucht. Sie halten ihr dunfles Gefangnig fur eine lange Racht und fangen nun erft ihren Fruh: lingegefang an bis gur Maufer. Mit ber Beit merben biefe armen Gefchopfe fast gang feber: Tos. -

Im Sommer leben fie gewöhnlich von In: feften, und futtern damit auch ihre Jungen auf. Die übrige Zeit freffen fie Gamereien von vielen Pflangen, auch feimenden Samen und das garte Grun der jungen Pflangden. Deblige Gefame haben den Borgug g. B. Sanf: famen, Sommerrubfen zc. Gie lefen ihre Rah: rung nur vom Boden auf. Die Chereschbeeren fuchen fie ber Rerne megen auf. Gamereien enthullen fie, auch merfen fie Die Flugel der Infetten bei Der Dahlzeit meg. Gie baden fich gern. Rubfaat giebt man ihnen gewohnlich als ein gefundes Futter, Dabei aber flets frifches Baffer und einen reinlichen Bauer. Safer und Sirfe mifcht man Diefem Futter bei, wenn fie au fett merben follten. Mit in Milch eingemeich: ter Gerftengruge oder Gemmel futtert man an: fanglich die Jungen auf; bis fie allein gequell: te Rubfaat freffen tonnen. In der Maufer giebt man diefen auch wohl Ameifeneier.

Jhr Nest ist eins der schönsten und kunstlichsten, kugelförmig. Es besteht aus grünem
Erdmoos, zarten Würzelchen und sehr feinen Hälmchen, hat aber außen einen glatten Ueberzug von den grauen Flechten des Baumes, worzauf es stehet, welche sehr niedlich mit Insestenz gespinnsten unter sich und auf dem Neste selbst befestigt ist, so daß dadurch das Ganze wie ein bemooster Ust erscheint. Der innere Napf ist ziemlich tief, rund und glatt, sehr weich mit Pflanzen, und Thierwolle, Haaren und Federn gepolstert. Sie machen jährlich 2 hecken, das erste Mal sindet man 5—6, das zweite 3—4 Eier. Sie sind klein, die Schale zart, wenig glanzend, fehr blaß blaugrunlich, mit einem bleichen rothlichen Braun schwach gewolft und mit schwarzbraunen Punkten verschiedener Größe beseth, die wie Brandflede aussehen. Man finz det auch darunter viele Barietaten.

Sie bruten fie in vierzehn Tagen aus, wo: bei das Mannchen das Beibden taglich einige Stunden abloft. Zwei Bochen nach dem Mus: fliegen der Jungen, werlaffen fie diefelben und fdreiten gur neuen Brut. Bu ihren Feinden gehort der Duhner : Fintenhabicht und andre Raubvogel; Glftern, Beber, Rra: hen und Raben zerfforen ihre Brut; besglei: den Marder, Biefeln, Gidhornden und Maufe. Go haufen auch in ihrem Gefieder Schmarogerinfetten, und in den Gingeweiden Burmer. Gie find leicht gu fchiegen. Dan fangt fie auf eigenen Beerden, Fintenheerden. Das Fintenftechen ift ein angenehmer Fang. Man macht es wie es beim Feldlerchenfang be: fdrieben worden ift. Fangt man die Mann: den aber, wenn ihre Beibden ichon Gier ba: ben, fo harmen fie fich in der Gefangenicaft gu Todte.

Ihr Fleisch ist wohlschmedend und gesund. Ihr Schlag angenehm und es sind gute Stubenvägel. Sie vertilgen auch viele schädliche Insetten, und felbst ihr angstliches: Finf, finf macht den Juger bei Annaherung eines Raubthieres, ausmerksam. Ihr Schaden besteht darin, daß sie frischen Samen, so wie den keizmenden gern fressen, doch lassen sie fich leicht durch Fäden, die man darüber zieht, und Papier oder Federn daran bindet, abhalten.

Der Berg=, Bald=, Golbfint, Geg= ler, Quafer.

(Fring. montifringilla. Linn.)

Der Unterruden in der Nitte weiß, an den Seiten schwarz; die unternFlügeldeckedren schweselgelb, in den Weichen stehen ovale mattschwarze Flecke. Seine Gestalt und die angenehme bunte Farbe, zeichnet ihn aus. Lang 6% bis 7 3. Flügelbreite 10% bis 11% 3. Schnabel 3. lang, die Farbe ist schon wachsgelb, mit schwarzlicher Spise. Das Kinn beim Nannschen gelbweiß, Kehle, Gurgel und Kropfgegend bis auf die Oberbrust, angenehm hell rostig pomeranzenfarben. Die Weibchen sehen nicht so schon.

Es ift ein nordlicher Bogel, der auf feinen Banderungen auch über bas gange übrige Gue

ropa fic verbreitet. In Someben und Ror: wegen niftet, und die Baldungen des Rordlands, Finnlands und ber Lappmarten find bann gang von Diefer Fintenart belebt. Unfanglich gieben fie familienweife, bann tommen große Gefell: icaften, und endlich unermeglice Schaaren, Die da verweisen, wo fie hinlanglich Rahrung finden. Strenge Ralte und Schnee treibt fie fudlicher. Im October tommen fie bei uns an, wandern dann in die größern Gebirgewaldungen nach Guden und Beffen, mo fie bann übermintern. Im Marg gieben fie bei une mie: der durch nach Rorden gu. Bieweilen finden fich auch einige unter unfern Bintervogeln, und treiben fich mit Diefen in Dorfern vor Scheuern und Stallen und auf Landstraßen ber= um. Ihre Rachtruhe halten fie auf hohen Baumen. In ihrem Baterlande bewohnen fie Ra: Del = und Laubwalder.

Auf ihren Bugen und in großen Gefellschaften find fie fehr verträglich und theilnehmend, das gegen in der Gefangenschaft fehr gantisch, jaht gornig und beißig gegen ihre Art, wie gegen anderes Lödtet fogar schwächere Bogel, die ihm zu nahe kommen. Ihr Biß ist empfinde lich, und bei garten handen kommt das Blut. Uebrigens find es kraftige und dauerhafte Bogel.

Ihr gewöhnlicher Ton klingt wie: jad, jad, jad, oder jad, jad; aber der Hauptslocken ein weittonendes Quak. — In einer eigenen luftigen Kammer halten fie sich langer, im Rafig höchstende Gefame vieler Pflanzen, der Nadelbaume und Rothbuchen, im Sommer, Insekten. Gern weilen sie in großer Menge in den Buchwäldern, wo sie sich von Buchnussen nahren, dann gehen sie auch nach den Fichten und Tannensamen. Im strengen Winter suchen sie auch in den Hickensund Tannensamen. Im strengen Winter suchen sie auch in den Hickensund Kamensamen. Sie enthulsen die Samereien. In großen Waldungen verdunkelt oft die auffliegende Menge die Luft.

Gefangen gehen sie gleich an das Futter und befinden sich bei blober Rubsaat vortreff- lich. Ihre Brutplage sind im hohen Norden. Ihr kunstliches Rest besteht aus einem dichten Gewebe von Moos, und zarten Salmchen und von außen mit den Flechten des Baumes, worrauf es sieht, so bedeckt, daß man es von einem bemoosten Asse nicht unterscheiden kann, inwendig weich ausgepolstert, wie das Nest des Buchsiens. Auch die Gier ahneln sehr den Giern dieses Geschlechtsverwandten. Sie legen

5 — 7 Gier. Die Jungen werden auch wie bei jenen mit Insetten aufgefüttert. — Der Sperber und andere Raubodgel verfolgen sie sehr. Taenia fringillarum wohnt in den Eingeweiden, und Schmarogerinsetten in dem Gefieder.

Leicht laffen fie fich schießen und da fie oft in Menge da find, viele auf einen Schus. Bon den Baumen, wo fie übernachten, werden fie bei Fadelschein mit Blaserohren herabgeschossen. Diese Jagd ift in den Rheinlandern, wo sie überwintern, wichtig. Dies ist die beliebte Bohmer jagd jener Gegenden. Man fangt sie auch auf dem Finkenheerde. — Sie werden häusig verspeist, obgleich ihr Fleisch einen bittern Beigeschmack hat. — In Buchenwäldern, wenn sie in so großen Schaaren fommen, thun sie Schaden, sonst nugen sie, indem sie Insetten und manchen Saamen von Unfrautern verstilgen helsen.

Der Schnee=, Alpen=, Steinfinke. (Fring. nivalis. Linn.)

Der Schwanz weiß mit wenigem Schwarz am Ende und mit schwarzen Mittelfedern. Seine Länge ist 6½ bis 6¾ 3., die Flügelbteite 14 3. Beim alten Mannchen sind Oberkopf, Wangen, hinter: und Seitenhals licht aschgrau, am duntelsten der Scheitel, die Zügel und zum Theil die Wangen, der Rucken kasseebraun, Kinn schwusig weiß, Kehle bis auf die Gurgel berab im Grunde schwarz, die Mitte der ganzen Brust bis auf den Bauch grünlich weiß. Die alten Weibchen sind im Neußern wenig von den Mann= chen verschieden.

Dieser Bogel findet sich auf den höchsten Bergruden des mitteln Europa und der Schweig, im sublichen Frankreich, auf den Phrenaen 2c. In der Schweiß bewohnt er die höchsten Regioznen der Gebirge, da wo der holzwuchs aufzhört und in der Rahe des ewigen Schnees, sie gehen nur in die hohen Bergdorfer, wenn es start flurmt und schneit.

Ge ift ein ansehnlicher, munterer, unruhisger, fraftiger Bogel. Die Stimme foll ein ihm ganz eigenthumlicher, pfeifender furz abgebroschener Ton senn; wie die Silbe: Tri, tri 20. klingen; der Lockton foll fip, fip senn.

Sie leben von vielerlei Samereien und von Inseften. Im Binter fressen sie besonders Tannen : Lerchenbaum : und Fichtensamen. Im Rafig fann man biese Bogel mit hanf: und Rubfamen erhalten. — Ihr Rest steht auf Felzen, zwischen Steinen, oder in Felsenrigen und Löchern; auch unter den Dachern der Pospitien, wie auf dem Bernhard und auf dem Simpson. Erst im Mai bauen sie. Das Rest besteht aus trocknen Grashalmen und Moos, inwendig mit Federn und Haaren ausgelegt. Man findet darin 4—6 Gier, auf hellgrunem Grunde mit aschgrauen und dunkelgrunen oder braunen unregelmäßigen Fleden und Punkten bezeichnet. Ihre Jungen füttern sie mit Insekten groß. Sperber und Wieseln sind ihre Feinde. In der Schweiß schieft man sie. Sekten versliegen sich einige zu uns. Ihr Fleisch ist wohlschmeisend.

Der Stieglit, Distelzeisig, Jupi= teröfink.

(Fring. carduelis. Linn.)

Muf dem ichwarzen Flügel ein hochgelbes Beld; Die ichwarzen Schmanzfedern haben weiße Spigen und die zwei außern, auf jeder Geite Des Schwanzes, in der Mitte auf der Innen= fahne einen großen weißen Bled. Es ift an Beffalt, Farbe und Betragen ein befanntes niedliches Bogelden. Geine Lange 5% bis 5% 3. Flugelbreite 10 3. - Das alte Mannchen ift ein niedlicher Bogel, Bugel und Salfter fcmars, dann folgt eine breite Umgebung, die Stirn und Bordertopf einnimmt, boch farmin: roth, glanzend oft mit gelblichem Schein; Ra= den, Schultern und Ruden gelblichbraun, Die Gurgel weiß; Flugel tief fcmarg. Das Beib: den ift fdmer vom Mannden zu unterfdeiden. Gein Roth am Bordertopfe ift etwas lichte, gelblicher und von geringerm Umfange, befon: ders an der Reble. Auch unter ihnen giebt es viele Spielarten, mit Canarienvogeln fallen perschiedene Baftarbe.

Der Distelfinke bewohnt Europa vom mittlern Schweden an, bis zu den Kusten Afiens
und Afrikas. Im herbst schwarmen sie in heer:
den herum. Im Binter findet man dagegen
nur 12 bis 20 Stud beisammen. Im Marz erscheinen sie wieder in großen Gesellschaften.
Sie nisten in Laubwäldern, Baumgarten, Obstpflanzungen, Alleen und Feldhölzern. Disteln
und Kletten suchen sie auf, und lassen sich da,
wo diese häusig sind, lange halten. Im Binter besuchen sie die Samen tragenden Birken
und Erlen. Im Frühjahr besuchen sie alte Uspen, Pappeln und Ulmen.

Es ift ein lebhafter, gelehriger, luftiger Bogel, gewandt, flettert gut und fingt flei-Big. Er figt gern boch, um fich weit umfeben gu fonnen und Gefahren gu vermeiden. Seine Lodftimme flingt fast wie flieglig ober flich= lit! - Pidelnid; im Bluge: Pint, pint, pinkelnink zc. Gin fanftes: Mai ift der War= nungeruf. Banten fie mit andern Bogeln, fo bort man ein raubes: Rararara. Das Mannden fingt febr angenehm. Man richtet fie jum Futter : oder Bafferziehen ab, weshalb man fie auch anlegt, dies geschieht mit einem Riemden, bas über den Ruden por und hinter den Flügeln berumgeht und auf der Bruft vereis nigt ift. Sieran macht man bas eine Ende ber Rette, das andere wird mittelft eines weiten Ringes, um ein Stabden, woran es fich bin und ber fcieben läßt, geschoben. Es ift indeffen Doch eine Thierqualerei. - Gin folder angelegter lebt felten 2-3 Sahr, dagegen der im Bauer 20 — 24 Sahr lebt. Bergamottobl um die Rafenlocher bestrichen, betaubt ihn, damit fangt ber erfte Grad der Dreffur an, daß er erft ru= big auf dem Finger figen lernt und fic frei: deln lagt. Go werden fie bann nach und nach zu vielen Runfistuckhen abgerichtet und für Geld gezeigt. Jung aufgezogen fernen fie ben Gefang der Canarienvogel.

Sie nahren sich vorzüglich von allerlei ohligen Samereien, fressen auch Insetten und
füttern damit die Jungen auf; trinken oft, baden sich aber selten; verschlucken viele grobe
Sandkörnchen zur Beforderung der Berdauung,
auch picken sie gern Salz. Um besten halten sie
sich im Rass dei Mohn und nur zuweilen et:
was geknicktem Hanf und grunem Salat. Die
Jungen werden von den Alten in einen Bauer
gethan, aufgefüttert, auch lassen sie sich mit in
Milch aufgeweichter Semmel, und später mit
eingequelltem Mohn großfüttern.

Ihr Rest bauen fie auf Baume 20 - 40 Fuß boch, von der Erde auf Die obersten Aeste und in Baumkronen.

Ihr Rest ist tunstlich, fehr dicht gefilt und an die Zweige befestigt, mit grunem Baum: Erlenmoos und grauen Flechten gebauet, durch Insettengespinnste, Salmchen, Fasern und Fazden durchstochten. Inwendig Pflanzenwolle, darzauf eine dunne Lage von Pferdehaaren und Schweinsborsten. Das Weibchen bauet sehr emsig, das Mannchen singt meist dazu. Sie bauen erst im Mai. Die Schale der Eier ist sehr aut und bunn ohne Glanz, Form und Farbe

variiren febr. Der Grund ift weiß ins Blaugrunliche ziehend oder grunlich blauweiß, bald dunkler, bald blaffer. Die Zeichnung besteht aus fparfam violetgrauen Puntten, Die am flumpfen Ende fich haufen und hier noch mit blagblutro: then dunkelbraunen und einzelnen rothlich fowarzen Bunftden ober Strichelden abmed: feln, bieweilen einen undeutlichen Krang bildend. Die Angabl der Gier ift 5 bis 6, Die Das Beibchen allein binnen 14 Tagen außbrutet, aber unterdeffen vom Mannchen aus dem Rropf gefut: tert mirb. Unfanglich futtern fie Diefelben mit Infetten, bann mit gefcalten Gamereien aus bem Rropfe. Ausgeflogen werden fie noch lange gefüttert. Falten, Rraben, Giftern und Deber, wie Ragen und Marder find ihre Teinde. Im Gefieder wohnen Schmaroger: infetten. - Man erlegt fie mit ber Glinte. Sonft fangt man fie auch auf Fintenheerden, wo Difteln, Rragfrautstengel, Galatstauden u. f. w. aufgestellt find. Conft bestedt man auch folde Bufdel mit Sprenkeln ober Leim: ruthen. Da fie legtere icheuen, fann man fich auch fatt Diefer der Schweinsborften be: Dienen und fie mit gutem Bogelleim beftrichen über Die Difteltopfe legen.

Ihr Fleisch ift wohlschmedend, ihr Gefang angenehm. Sie vertilgen Difteln, Kletten, Kraffraut, wovon fie die Samen verzehren, auch Bluten- und Knoopeninsekten werden durch

fie vermindert.

Flache:, Berg:, Neffel:, Karmin: Birken: Zeisig. Schattchen. (Fringilla linaria. Linn.)

Zügel und Rehle braunschwarz; der Scheiztel glanzend roth, oder rothgelb; der Burzel weißlich; die mittlern Schwungfedern mit feiznen lichtbraunen Saumden. — Das Mannchen Bruft und Burzel farminroth. — Dies Bögelzchen ähnelt dem Berghanfling, mit dem man es oft verwechselt; allein es ist standhaft kleizner. Länge 5½ bis 5½, Flügelbreite 9 bis 9½ 3. Eine befondere Zierde giebt dem Bogel die runde Kopfplatte von einem dunkeln Carmoisuroth. — Mit Canarienvogeln bringen sie Bastarde.

Es ist ein nordischer Bogel. In das mitte fere Europa fommt er nur auf feinen periodischen Banderungen im herbst und Binter, Ansfangs November, felten früher. Sie suchen die Balber, wo Erlen und Birten machsen. Zuweilen follen einzelne nach Bechftein im

Sommer in Thuringen in Fichtenwalbern in der Rabe von Gumpfen fich aufhalten.

Es foll dieses Bögelchen gegen die Menschen sehr zutraulich fenn. Artig sieht es, wenn sie sich in verschiedenen Stellungen an die Spise der längsten und dunnsten Zweige anhätelnd, vom Binde schauteln lassen. Einzelne befinden sich nicht selten unter den Erlenzeisigen, zu denen sie sich sehr halten. Ihre Lockstimme ist tich att, tich att oder tich utt, tich ütt, ihr. Gesang schlecht. Werden indessen sehn, und sind sehr gelehrig. Mit Zeisigen, hänfelingen und Canarienvögeln wird er sehr vertraut und liebkost und schnäbelt sich mit ihnen in der Gefangenschaft.

Allerlei kleine öhlige Samerei ist auch ihre Rahrung, Birkensamen ihr Lieblingsfutter;
in ihrem Baterlande der Samen der Zwergsbirke; sonst Distels Lein: Rubsaat 2c. Sie huls
sen alles aus, trinken oft, baden sich aber nicht.
In der Gefangenschaft erhält man sie am bestem
mit Mohn. Die Parchen, die hier bleiben, sols
len ihr Rest auf kleine Fichtens und Erlenbaume
sehr sich von heu und Mood gebauet, inwens
dig mit Graswolle und Puppenhulsen ausges
füttert haben und 4 bis 6 weiß: oder bläulichs
grüne, am stumpfen Ende dicht rothlich gestecks
te Gier enthalten.

Sie haben mit den vorigen gleiche Feinde Leicht laffen fie fich schießen und leicht fallen fie auf die Bogelheerde. Das Rifeln mit einem an einem langen dunnen Steden befestigten Leimzruthden, womit man sie berührt, geht auch recht gut, weil sie sehr firre sind. Ihr Fleisch wird gesfpeist, hat aber einen etwas bittern Geschmad.

An berk. Da fie felten erscheinen, hielten fie die Alten als Berkundiger der Pest, daher Pestvögel. Und da fie dieselben im Sommer gar nicht sahen, glaubten fie sogar, daffie sich in Rause verwandelten, daher der unsfinnige Name: Maufevögel.

Der Blut=, Rothbruftige=, Grauer= hanfling.

(Fring. cannabina. Linn.)

Me Schwanzsedern, die mittlern ausgenomemen in der Mitte, dem Schafte entlang, schwarz, an ber außern Fahne und an der innern sehr breit weiß; die großen Schwingen mit weißem Außensaum; der Schnabel grau. — Seine Lange 5½ bis 5½ 3. Flügelbreite 10 bis 10½ 3. Das ganz alte Mannchen fieht sehr niedlich aus. Das

Roth an der Brust und auf dem Kopfe sieht sehr schön, in der Gefangenschaft bekommt er nie eine rothe Brust. Das brennende Karminzroth geht ins Gelbroth, dann in röthliches Gelb, und wenn das eingesangene Mannchen sich mausert, in blasses Eitronengelb über. In der Gefangenschaft bekommen sie dies schöne Gesieder nie wieder. Die braune Farbe bleibt stets die herrschende. Das Weibchen hat gar kein Roth und sieht überhaupt unansehnlicher aus. Dieser Farbenwechsel hat viele Namen und Verwirrungen hervorgebracht. Uebrigens giebt es auch viele Spielarten, auch hat man Bastarde mit Canarienvögeln erzeugen lassen.

Diefer Bogel ift fast über gan; Europa vers breitet. In Deutschland gehört er unter die Strichvögel. Sie überwintern in gelinden Binztern zu Tausenden bei und. Die leste Salfte des Octobers ist die eigentliche Strichzeit. Im Marz fehren sie zu ihren Brutörtern zuruck. Decken, Dorngesträuche, junge Kiefern: und Fichtensaaten, Gebusche und Garten in Dorfern und Städten, wählen sie dazu. Nach der Begattungezeit sind sie auf Feldern, oft in groz

Ben Deerden angutreffen.

Diefer bekannte Bogel ift fehr munter, fluchtig, gelehrig und vorsichtig, gefellig, und ein gartlichliebender Chegatte. Die Gatten hals ten fich das gange Jahr zusammen. Die frohliden Mannden fingen immer, felbft bei fconen Derbst: und Bintertagen. Die Lockstimme ift: Gad, Gader oder Anader. Jung aufge: zogen werden fie fehr firre, find fehr gelehrig, Iernen Kunststude, fremde Bogelgefange und funftliche Melodien. Sie lieben-ohlhaltige Samereien, auch das garte Grun junger fangen. Die Jungen futtern fie mit geschälten und im Rropfe erweichten Gamereien auf. den dieselben auf der Erde auf, flauben fie aber auch wohl aus den Rapfeln und Schoten auf den reifenden Pflanzen aus. Gie fliegen haufig gum Baffer, um zu trinfen, baden fich felten, zuweilen jedoch im Gande. Diden gern Calz. In der Gefangenschaft erhalten fie Rub: famen, zuweilen etwas Mohn, Canarienfamen und Sanf. Die Jungen nimmt man aus dem Reste, sobald sie Riele bekommen und futtert fie mit in Milch gequellter Gemmel, mit Dohn= famen vermifcht, nachher mit eingequelltem Rubfamen auf. Die alten futtern fie auch auf, wenn man fie in einen Bauer neben bas Deft bangt. Gern niffen fie in immergrune Sol= zer, als Laxus, Sadebaum zc. Das Rest siebt felten bod, es beffeht aus bidem Mechtwert, nicht befonders foon gebauet; aus Stengelne Salmen und Burgelchen, inwendig mit Bolle gepolftert, worauf Pferdehaare und Schweins= borften liegen. Gie machen zwei Bruten. Das Beibden ift auch hier die Baumeisterin. Die erfte Bede besteht aus 5-6, die zweite nur aus 4 Giern. Ihre Form ift felten fcon ei= formig, fondern immer etwas furger, : fogar furz oval und oft ziemlich bauchig. Die garte: Schaale ift glatt, fast ohne Glang, blaugrune lich oder blaulichweiß, mit fcmachern oder flar= fern grunlichem Schein, fo dunn, daß oft der rothgelbe Dotter durchicheint. Muf Der Grund= farbe erblicht man fehr feine Bunftchen und nach dem ftumpfen Ende ju auch Fledchen, theils von einem bleichen Biolettgrau, theile von einem matten Roftroth und dann noch einzelne bunfelbraunrothe oder rothlichschwarze tleine Puntte; manchmal find die meiften Puntte und Gleden auch wohl von einer blaffen Blutfarbe, oder fte find fleischroth. Es giebt barunter auch mehrere Abweidungen. Gie bruten Die Gier binnen 13-14 Lagen aus. Binnen 12 Lagen find die Jungen flugge. Gie lieben ihre Brut fohr und wenn man felbst im Refte herumftort, verlaffen fie es doch nicht. Man hat Dies benugt, ihnen ihre Gier genommen und bafur Die Gier ber Canarienvogel untergelegt, Die fie ausgebrutet und aufgefuttert haben.

Falten jagen sie, und die Brut zerftoren Ragen, Marder, felbst Elstern und Burger stellen ihnen nach. Man schießt und fangt sie auf Bogelheerden, auch auf Lockbuschen, mit Leimruthen und in Sprenkeln. Ihr Fleisch ift wohlschmeckend, ihr Gesang angenehm, und

Die Abgerichteten lohnen ber Mube.

Anmerk. Der Berge, Steine, Gelbeschnablige banfling. (Fr. montium. Gmel.) Rehle und Zügel rofigelb, der Bürzel weißlich, am Mannchen roth überlaufen, die mittlern Schwingsedern mit hellweißen Saumen. Der Schnabel stets gelb. Es ist eine Mittelart zwieschen Bluthanfling und dem Birkenzeisig. Lange 53, Flügelbreite 93 3. Das alte Mannchen im Wintersleide: Schultern und der Rücken braungelb, start und freifenartig schwarzbraun gesslecht, Nacken und halbseite eben so, nur heller; der Bürzel schmußig purpurroth, ein gelbweister Duerstreif durch den Flügel. Alle Schwanzesedern braunschwarz. Das Weibchen unterscheisdet sich durch den Mangel alles Rothen, die

Reble reiner rofigelb, Die Bangen weniger ge: fedt. Das Roth auf bem Burgel bes Mann: den wird gegen ben Commer lichte und viel feuriger, farminroth und ber ichmargliche Gona: belftrich verschwindet. - Die Beimath Diefes Bogels ift der hohe Rorden von Guropa und Affen. Er tommt auch bei uns, boch felten nur im Binter vor, fonft fannte man ihn nicht als eigene Art, mas jegt aber ausgemacht ift. Im Commer lebt er in fehr rauhen Gegenden auf Bergen und Rlippen, da mo ber Schnecam: mer lebt. Gie leben gefellig und fuchen Die Gefellfcaft der Bluthanflinge und Birtenzeifige. - Ge ift ein angenehmer munterer Stubenvogel, ber fich leicht an die Gefangenschaft gewohnt und fingt fleißig. Theilt die Nahrung mit vorigen.

Gemeiner, Erlen=Zeisig, Engelchen. (Fring. spinus. Linn.)

Die 5 außersten Schwanzfedern, fo wie die Schwingen von der vierten bis zur vorlegten, an der Burgel gelb; in den Beichen

Deutliche, ichmargliche Schaftstriche.

Ein fehr bekanntes Bogelchen. Es ift das fleinste unter Diefer Familie, 4 bis 5 3. lang, Flügelbreite 8 bis 9 3. Es ahnelt dem Bitro: nenzeifig, doch mehr noch die Beibchen, da fich Die Mannchen unfere Zeifigs fehr deutlich durch den ichwarzen Scheitel unterfcheiden laffen. Der Schnabel ift etwas geftredt, nach vorn et= mas zusammengedrudt, fehr fpigig. Im Gefieder Diefes Bogeldens ift ein grunliches Gelb oder ein gelbliches Grun (Zeifiggrun) vorherr= ichend, und über den Flügel laufen 2 ftart gezeichnete hellgelbe Querbinden. Des alten Mann: dens Stirn und Scheitel ift tief fdmarg, Reble fcmarg. Die Beibden feben meniger fcon. Uebrigens trifft man auch bei ihnen Barietaten, als: weiße, bunte, fcmarge; fo wie auch Baftarde mit Canarienvogeln.

Der Zeisig ist weit verbreitet; in Europa ist er sehr gemein. Es ist ein Strichvogel, der in großen Schaaren im Derbst aus nördlich gezlegenen Gegenden zu uns kommt, besonders wenn er hinlangliche Nahrung findet. Im October und November beginnt der rechte Strich, wo man dann Schaaren von Tausenden beisammen sieht. Im Frühjahr im Marz und April kehren sie wieder. Es sind Waldbewohner, die auf Baumsamen angewiesen sind. Im Sommer sind sie in den Nadelwaldungen. Das Gerathen und Nistrathen der Baumsamen fesselt oder vertreibt

fie aus einer Gegend. So bleiben fie felbst ben ganzen Winter hindurch, wo viele Erlen reich an Samen fleben. Eben so ift es etwas spater, mit den Birtenwalbern. Sie lieben bie Kronen der Baume, wo fie am liebsten figen.

Dies niedliche Bögelchen ist angenehm an Gestalt, Farbe und Betragen. Immer munter, start und ted, klettert und wiegt sich an den Zweigen gleich den Meisen. Ist dabei nicht scheu und erträgt leicht die Gefangenschaft. Sie sind schreckhaft und lieben ungemein die Gefellschaft, liebkosen in der Gefangenschaft auch andere verzwandte Bögel, als: hänflinge und auch anz dere Zeissgarten. Bloß am Frestroge zeigt er sich neidisch. Strenge Kälte schadet ihnen nicht, und nur duftiges Wetter und Rohreif, was das Aussuchen seiner Rahrung erschwert, macht den sonst so muntern Bogel, still und traurig.

Seine gewöhnliche Stimme sind eigene Tone, schwach, wie: trettet, — trettertettet,
dann: di, die und ein lautpseisendes: Dih,
Dil und Dei, die Locktone; die letztern läßtbesonders das Mannchen am lautesten und sehr
gedehnt hören, so daß sie wie: Did el und
Did leih klingen. Der Name Zeisig scheint
von diesen, dem Borte ähnlich klingenden, Tonen entnommen zu senn. Es ist eine der fleißigsten Sanger. Der Gesang besteht aus einer
Menge zwitschernder Tone, und einer eigenen
gezogenen Schlußstrophe, die wie: did id lidlideid äh eben nicht schon klingt. Werden sie
aufgescheucht, so tont aus allen Kehlen der zischende Ion: tscheh oder tschei.

Den Berluft der Freiheit erträgt er leicht, wird fehr zahm, ist gelehrig und ermuntert durch feinen unaushörlichen Gesang die andern gefangenen Sanger. Läßt sich auch zum Ausund Einstiegen gewöhnen. Sie begatten sich auch in der Gefangenschaft, legen Eier, bringen aber die Jungen selten auf. Mit Canarienvögeln erzeugen sie Bastarde, die gute Sanger werden.

Mancherlei Baumsamereien sind seine Sauptnahrung, auch andere öhlhaltende Samen, im
Sommer Insecten, womit er auch seine Brut
auffüttert. — Erlen Samen ziehen sie allen
vor, dann folgen die Samen der Birke, Fichte,
Kiefer, des Hopfens, der Disteln, Kletten, des
Löwenzahns zc. Sie schälen die Samen, die
sie fressen. Sie trinken und baden sich gern.
In der Gefangenschaft ist die beste Nahrung:
Mohnsamen. Etwas Grünes, als: Sasat, Sühnerdarm (Alsine media) ist ihm, dann und
wann gegeben, so wie etwas grober Sand, zur

Erhaltung ihrer Gefundheit erfprieslich, auch darf Waffer zum Trinken und Baden nie fehlen.

Sie nisten in Nadelwaldungen allenthalben in Deutschland, wo man die Nester 25 Fuß, und noch höher vom Boden auf Nadelbäumen trifft. Das Nest ist schwer zu finden, daher die alte Fabel, daß sie einen Stein darin hätten, der es unsichtbar mache. — Bon Nadeln und Flechten versteckt, sieht man es von unten durchaus nicht. Beide Gatten bauen das Nest, was künstlich durch Insettengespinnste, Moos und Salmchen sest verbunden, tief, gut gerundet, gegen 2 3. weit, inwendig mit seinen Fädchen der Bartslechten und Wolle ausgesüttert ist.

Die 5-6 Gierchen, die fie legen, find flein und niedlich. Die Schale fehr gart, glangend, fehr blag blaugrunlich oder blaugrunlichweiß, was an ausgeblafenen fehr verblagt. Auf Die: fer Grundfarbe fteben febr viele, außerft feine Punttden, auch einzelne Strichelden und nach Dem flumpfen Ende ju flartere Puntte von ei: nem blaffen Blutroth und roftigem Braun oft nur bleich, bei andern dagegen fehr fart auf: getragen, bei manden fogar einen Fledenfrang bildend; überhaupt variiren fie fehr. Gie niften 2 Mal im Jahre; fo daß man oft fcon im April Gier und im Mai flugge Junge findet. Rach: Dem fie 13-14 Tage gebrutet, futtern fie Die Jungen mit Infetten auf, fuhren fie bann beim Ausfliegen in Laubholzer, Garten und Dbft: baumpflanzungen, Die ihnen reichlichere Infet: ten gum Auffuttern liefern. Benn fie nun felbft Rahrung nehmen konnen, Schlagen fich die Jun: gen in Beerden gusammen, die dann im Berbft in großen Bugen Baumfamereien aufsuchen.

Die Feinde haben sie mit den Vorigen gemein. Diese harmlosen Bögelden werden leicht
in Menge geschossen; auf Vogelheerden fangt man
sie oft zu Schocken. Auf Lockbuschen kann man
sie auch in Sprenkeln, mit Leimruthen und
Rehfallen erwischen, die man auch auf Samen
tragenden Stauden anbringen kann. Bei Rohreif kann man auch das schon beschriebene Kikeln als einen angenehmen Fang anwenden.
Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend; sie vertigen
viele schädliche Bluthenraupen und sind angenehme Stubenvögel. Das Verzehren einiger Sämereien kommt dagegen nicht als großer Scha-

den in Betracht.

Der Bitronen = Beifig, Citrinfein. (Fring. citrinella. Linn.)

Sauptfarbe gelbgrun; Raden und Salefeisten alchgrau; Stirn und Rehle gelbgrun; der Untertorper ungeflect.

Dies artige Bögelchen gleicht fehr dem Bafard vom Canarienvogel und Erlenzeisig erzeugt. Die Länge ist 5½ bis 5½, und die Flügelbreite

9 bis 91 3.

Bei dem zweijahrigen Mannden ift Stirn, die Gegend um das Auge, Kehle, Gurgel und Bruft schon gelbgrun (hell zeisiggrun), welches am Bauche ins Grüngelbe und am After ins Hochgelbe übergeht; die untern Schwanzdecksebern blaßgelb, in der Mitte grau; desgleichen die Zügel; der Scheitel olivengrun; Nacken, Wangen, hinters und Seitenhals aschgrau, ersteres olivengrun überlaufen; Dberrücken und Schultern graubraun, start olivengrun überlaufen; Unterrücken und Bürzel schon grungelb; über die Flügel ein grungelbes Band. Die alten Mannchen sehen noch grungelber. Die Weibchen sind dagegen stets etwas kleiner, viel grauer, weniger und bleicher gelb.

Dieser Bogel bewohnt die sublichern Lander Europa's und des angrenzenden Uffens und Afrika's. In Griechenland ist er gemein. Bei uns hat man ihn noch nicht angetroffen, ob es gleich ein Zugvogel ift. Im Sommer bewohnt er die Gebirge, wo er so hoch geht, bis fast

der Solzwuchs aufhort.

Es ist ein munterer unruhiger Bogel, und dabei ziemlich scheu. Seine Stimme ift ein sanft tes Pfeifen. Uebrigens soll sein Gesang recht anmuthig senn und die Mauserzeit ausgenommen, stets gehört werden, weshalb man ihn auch gern als Stubenvogel halt, und ihm dann Mohn zur

Rahrung giebt.

Ihr Rest bauen sie bald in die diden struppigen Alpentannen und auf andre Nadelbaume, bald unter die Dacher der Sennenhutten. Ihr fünstliches Rest besteht aus durrem Grase, mit Moos und Flechten durchwebt und mit Thierhaaren, Federchen und Puppenhullen sehr schon ausgepolstert. Man sindet darin 4-5 Gier, au Form und Farbe den Stiegligeiern sehr ähnlich, doch tleiner, braungrunlichweiß, mit größernoder kleinern Punkten von graurothlicher und blutzrother Farbe, meistens am stumpfen Ende, jesdoch nicht dicht besett.

Man fangt ihn auf Lodbufden und Beerben nach ber Lode andrer Zeifige. Gein Bleifc ift wohlschmedend.

Der Girlig = Hanfling, hirngrill. (Fring. serinus.)

Mit furgem diden Schnabel; Reble weißlich oder hellgelb; Sauptfarbe mehr oder meniger Gelb und Grun, Ruden und Geiten des Unter: forpers fomarglich gefledt, über bem Flugel zwei lichte Binden. Begen der entfernten Mehnlich: feit mit dem Borbergebenden, hielt man ibn für diefelbe Art, doch mit Unrecht. Lange 43 bis 5 3. Flugelbreite 83 3. Das alte Mannchen im frifden Berbstfleide hat folgende Farben: Bugel und Salftern find weißbraunlich ober grauweiß, ein Strich über dem Muge, melder nachber die Wangen umgiebt, Reble, Gurgel und die Mitte der Bruft, auch Unterruden und Burgel icon grunlich bochgelb; das Uebrige vom Scheitel, Stirn und Bangen olivengrun, Der Dbertopf mit ichmarglichen Schaftstrichen; Das Genick grungelb, olivengrun geflecht; Sinterhals und Dberruden icon olivengrun; Die Geiten Der Bruft und die Beiden blaggelb mit braun: ichwarzen Langefleden, Die nach der Mitte der Bruft fleiner werden; Die Flugelfedern fcmart: braun, Die Schwanzfedern braunfcmarg. In Den Bogelheden bringen fie mit Canarienvogeln Baftarde, Die ben grunen Canarienvogeln gang abnlich feben.

Es ift ein fublicher Bogel, der in Spanien, Franfreich, Der Schweig zc. oft vorfommt. Bu uns fommt er nur fehr felten. Er halt fich meift in Dbftgarten, in Unpflanzungen ober 21: Icen von Dbft : und Ballnugbaumen, in Bein: bergen zc. auf. Durch feinen Gefang macht er fich von boben Baumen berab fehr bemerfbar. Sein Futter fucht er großtentheils auf der Erbe. Es ift ein niedliches, frohliches und unruhiges Bogelden, das fich paarmeis, auch in fleinen Truppen beifammen halt. Ihre Loctione find bellflingend, wie ein Glodden: higrifi und girlig. Das Mannchen fingt vom Marg bis tief in den August hinein, weshalb man ihn auch gern ale Stubenvogel halt, mo er fich febr gabm und liebevoll gegen feine Gattungeverwandte be: tragt. Er hat mit Borigem Die Rahrung gemein. Die fleinen meift öligen Gamereien fucht er am Boden auf Beeten, zwifden Gartenpflanzen fieht man ihn baber oft berumbupfen. Im berbft be: fuct er mit den Zeifigen Die Erlen und Birfen. Die Samen hulfet er auch aus. Im Rafig un: terhalt man ihn leicht mit Mohn und Rubfaat. hunger und Durft tann er nicht lange ertragen. Die Gier baben Die Große ber Erlenzeifigeier, boch furger und runder, fehr gartichalig, grun= lich weiß mit feinen Bunftchen und einzelnen furgen Strichelden von einem blaffern ober buntlern Blutroth, ober rothlichem Braun am ftumpfen Ende fich franzartig haufend. Deift 4-5 Stud an Der Bahl. Das Brutgefcaft beforgt bas Beibden in 2 Bochen und mird bas bei von bem gartlichen Gatten aus dem Rropf gefüttert. Die Feinde haben fie mit ben vorigen gemein. Mit bem Beifig mirb er auf Deerden und Lodbufden gefangen. Gein Bleifch ift moblidmedend.

Der Canarienvogel. (Fring. canaria.)

Dieser Bogel ift bei uns, als Gefangener, einheimisch gemacht und die gewöhnliche Farbe gelb ober weißlich, und durch Zeugung mit andern, als Bastard, in mannigfaltigen Barietaten ausgeartet, bekannt genug. Im Batersande ist Scheitel, Hals und Rucken braunlich; Stirn, Seiten des Kopfes, Burzel, Gurgel, Brust grungelb, an den Seiten mit braunen Langsstreisen, die untern Theile weißlich; die großen Deckefedern, Flügel und Schwanz braun. Am Beibechen sind die Farben weniger lebhaft.

Auf den Canarischen Inseln trifft man fie am Ufer tleiner Fluffe und Bache in feuchten Gebufden. Rach einer Sage follte um die Mitte des 17ten Jahrhunderts ein Schiff nebst andern Baaren auch eine Menge Canarienvogel nach Livorno bringen, verungludte aber an Elba's Rufte, wodurch die Gefangenen in Freiheit gefest, and Land geflogen und fich dafelbft ver= mehrt haben. Doch follen fie alle wieder einge: fangen fenn. Der Gefang ber Bilblinge foll folechter fenn, ale der Bahmen. - Ihre Stim: me ift befannt. Gie werden fehr gahm und find als Stubenvogel beliebt. Leicht paaren fie fic mit andern verwandten Bogeln, wie mir icon bemerft haben. Ueber Canarienheden, ihre Bartung und Pflege hat man besondere Unweifungen und der Sandel mit diefen Bogelden mar fonft beträchtlich.

In der Freiheit leben auch fie von allerlei Samereien. Gie lieben ben Camen bes Canariengrafes (Phalaris canariensis). Das Canarienfutter, das man ihnen giebt, fann man gleich unter diesem Ramen kauflich erhalten. Daneben giebt man ihnen Salat, Rohl zc., tage lich aber frisches Wasser. Das Weibchen macht jährlich 2-3 Bruten. Die 4-5 Gier sind sehr gartschalig, meergrun mit mehr oder weniger rothbraunen Fleden und Strichelchen am Ende und über die ganze Schale verbreitet. Die Brutzeit dauert 14 Tage.

Der geflectte Bengali. (Fring. amandava.)

Bur Beit ber Begattung find Schnabel, Fuße, Ropf und andere Theile Des Rorpers dunkelroth, auf den Schwungfedern braun, Sowangfebern fdmarg mit weißem Saum. 3m Winter ift das Dbere des Ropfes, Die Geiten Des Salfes, Ruden und Burgel braun, Die obern Dedfedern des Comanges braun; die Geiten, Baden und bas Rinn rothgelb; Die andern Theile des Salfes graulich weiß; Bruft, Bauch . und Flugel Dunfelbraun. Die Beiboen find Ueberhaupt variiren fie febr. meniger fcon. Die Lange betragt 3 3. 4 Linien. Bengalen und andere Gegenden Dflindiens find fein Ba: terland. - Die Beibchen haben die fonderbare Gigenfchaft, ihre Begierden durch einen gwar minder lauten, aber doch angenehmen, Gefang auszudruden.

Die Paradies = Witwe. (Fring. paradisea. Linn.)

Das Mannden ift ein iconer Bogel. Im Commer fcmarg am Salfe, mit einem breiten goldgelben Saleband; Bruft orangegelb, Bauch und Schenfel weiß. Der Schwanz befieht aus 12 Federn, Die 4 mittlern fleben mit der Fahne perpendicular, 2 davon find fehr breit und furg, mit einer nadten Spige an ber Borfie, 2 ande: re febr lang, bis auf 13 Boll. - Rach der erften Maufer wird er dem Bergfinten fehr abnlich. Diefer Bogel ift gemein im Ronigreich Angola, auch in Mozambique. Der nicht eben angeneh: me Gefang bes Mannchens fangt bann an, wenn Die langen Schwanzfedern feimen, und bort, wenn fie ausfallen, damit auf. Man bringt fie ofters lebend mit nach Guropa. Rahrung: Birfe und abnliche Gamereien.

Anmerk. Die Bitme mit Epaulet: ten (Fring. longicauda). Nach Baillant verliert Diefer Bogel nach ber Begattung sowohl feine rothen Schulterfebern, als auch die langen Schwanzsedern und befommt die einfache Lerchenfarbe des Weibchens, wogegen das Weibechen auch die langen Schwanzsedern bekommen soll. Die Weibchen sollen in Gesellschaft nisten, so daß eine solche Gesellschaft aus ungefähr 80 Weibchen besteht, welche nur etwa 42 bis 15 Wännchen in Gemeinschaft hätten, diese Bögel also in Volngamie leben wurden, was sonst bei keinem andern sperlingsartigen Bogel der Fall ist.

Der Kirsch = Reenbeißer, Rernbeißer. (Fring. coccothraustes. Meyer.)

Die mittlern Schwungfedern find am Ende bedeutend breiter, ale in der Mitte und flumpfe winkelig ausgeschnitten. Geine furge, Dide Befalt, mit dem diden Ropf und Schnabel zeich: nen diefen Bogel vor vielen einheimifchen Arten Diefer Gattung aus. Geine Lange ift 7 bis 74 3., Flügelbreite 13 bis 133 3. Ginige Schwungfe: bern find in einen Bogen tief ausgeschnitten. Der große dide Schnabel ift vollig freiselformig, er ift 10 Linien lang, an der Burgel 82 Linien hoch und 8 Linien breit. Das Mahnchen im Berbft: Dbertopf und Bangen icon gelbbraun, Die Schnabelmurgel umgiebt eine fcmarge Linie, welche mit den schwarzen Zugeln und der fam= metidmargen Reble zusammenhangt; Genick und Raden hell afdgrau; Dberruden und Schultern fcotolatbraun, mit fastanienbrauner Difdung; Der Unterruden lichter; Die Unterfeite eine Duftere grunliche Gleifchfarbe. In den Schwingen zeichnen fich einige, ber fo eigen gebildeten Federn icon fahlblau und violett glanzend, aus. Ges gen das Fruhjahr werden die Farben an Ropf, Sale und Burgel lichter. Das Beibden bat fast gleiche Farben, aber matter und mit Grau gemifcht.

Die gemäßigten Zonen find fein Baterland. In Deutschland überwintern viele bei gelinden Wintern. Und wir konnen ihn hier als Strickvogel betrachten, der gefellschaftlich wandert. Zur Zeit der Kirschreife vereinigen fie fich schon
in Familien. October und November ift die
eigentliche Zugzeit. Im Marz trifft man fie
wieder an ihren Brutortern.

Sie bewohnen nur waldige Gegenden, porsauglich Laubholzwalber, auch in großen Baumsgarten niften fie. Im Commer aber vorzüglich häufig in Rirschgarten. Im Anfange des herbates besuchen fie die Rohlgarten, im Binter aber

leben fie in ben Balbern. Gern halten fie fich oben auf hohen Baumen auf, besonders in ber Begattungegeit

Es ift ein schauer Wogel, ber fehr vorfichtig ift. Die gewöhnliche Stimme ift ein hober schneidend scharfer Lon: Zids oder Knipps und ein langer gezogenes Zih. Der Gesang ist schlecht und beginnt schon im Februar. Seine Eigenschaften als Stubenvogel sind eben nicht empfehlend, ob er gleich leicht zahm wird. Ist gegen andere Bögel in der Stube sehr beißig; ja er verwundet den Finger empfindlich.

Die Ratur hat ihn auf Die fehr hartichaligen Samenterne verfdiedener Baume angewiefen. Seine Lieblingenahrung find die Kerne der Kir: fden, der Sain: und der Rothbuchen und noch andere; baneben frift er auch olhaltenbe Ga: men, Baumfnofpen und zuweilen Infetten, mit welchen er eigentlich auch feine Jungen auffut: tert. Er braucht viel zu feiner Gattigung und Das Auffnaden der harten Rerne und das Scha: Ien bes inneren Rernes nimmt viel Zeit meg und nimmt feine gange Thatigfeit in Unfpruch. Mus Rirfden, Ebrefconbeeren u. a. nimmt er nur Die Rerne. Die Gauerfirschen nimmt er am liebften und bas Auffnaden ber Rerne fann man fon 30 Schritt weit horen. Das von ihm unbenugte Fleifch hangt theils an den Stielen, theils liegt es unter ben Baumen jum großen Merger der Baumbefiger. Gie befigen im Auf: fnaden ber Rerne eine besondere Fertigfeit, fie menden Diefelben in dem befondere dazu einge: richteten Schnabel fcnell fo, daß Die Schneide Deffelben jederzeit die Raht des Rernes treffen muß; und nur ein Drud der farten Rinnladen: musteln und beide Salften fpringen auseinander, entfallen dem Schnabel, und der innere Rern wird theilweis von feinem Sautden befreit, und gang, ober auch in grobe Studen gerbiffen, ver: In Der Stube nimmt er als Futter foludt. Rubfaat, Sanf, Lein, Connenblumenterne, Safer u. bgt. an. Rerne von frifden Rirfden, grune Choten u. bgf. giebt man ihm bann ale Lederbiffen.

Laubholzwaldungen mahlen fie vorzüglich zu ihren Brutplägen. Sie find unverträglich und leiden nicht gern ein anderes Parchen in ihrer Rabe. Gewöhnlich steht das Nest hoch; es ist ziemlich anfehnlich breit und die Grundlage bile ben trocene Reiser, dann folgen feine Burzelecen, Pflanzenstengel und Grasblätter, Schweinsborsten, Schafwolle, auch wohl einzelne Pferdeshaare. Die Gier gleichen denen des kleinen

Bürgere (Lanius minor) an Form und Farbe. Die Schale ift bunn und glatt, faft ohne Glang, blag grunlich, bald mehr, bald meniger ins Blautiche oder Gelbliche fpielend, in Gammlungen ericheinen fie oft graulich. Die Fleden auf Diefem Grunde find nie fehr gahlreich, am mei: ften am flumpfen Ende, meiftens rund, einzeln auch ftrichformig ober wie furge Schnorfel und Aleberden geformt. Die Farbe ber meiften afch= grau, ber einzelnen buntelbraun, auch biemeis fen ine Gelbliche fallendes Braun. Ueberhaupt Man findet 3-5 Gier in pariiren fie fehr. einem Refte, Die Das Beibchen größtentheils allein in 2 Bochen ausbrutet. Gie lieben ihre Jungen fehr und menn fie Diefelben ausführen, futtern fie fie noch lange, ba fie die harten Rer: ne fo leicht noch nicht auffnaden tonnen. Bahr: fdeinlich machen fie nur ein Gehede im Jahre.

Die Feinbe haben fie mit ben vorigen ges mein. Man schieft fie, fangt fie auch auf den Bosgelheerden, auch mit Schlingen und Leimruthen, in Rohlgarten in Reffallen, im Berbst und Binter in Dohnen. Ihr Fleisch schmedt nicht besons dere. In Kirfchgarten thun fie viel Schaden, dest gleichen in Gemusegarten an den Samereien 2c.

Der Schwunsch=, Grun = Banfling. (Fring. chloris. Temm.)

hauptfarbe gelbgrun; der Flügelrand, die großen Schwingen auf der Außenfahne, und die meisten Schwanzsedern an der Burzelhalfte hochgelb. Auch dies ist ein bekannter Rogel. Lange 6, Flügelbreite 11 bis 11½ 3. Das Mannchen ist von oben schon gelblich olivengrun, am lichtesten und schönsten auf dem Kopfe und an den kleinen Flügeldecksedern, an Stirn und auf dem Burzel in schönes Grungelb übergehend; Bangen und Halbseiten schön aschgrau, die Rehle gelb; Brust grunlich gelb, am Bauche in weiß übergehend. Beim Beibchen fallen die Farben hier viel mehr ins Graue, als ins Grune. Die Bastarde mit Canarienvögeln erzeugt, haben oft schöne Farben, sind aber schleckete Sanger.

Ge ift ein weit verbreiteter Bogel, denn man findet ihn in Europa, Affen und Afrika. In Deutschland gehört er mit unter die bekanntesten Bogel. Im nördlichen Deutschland ist es ein Zugvogel. Einzelne überwintern auch bei und In Auen, an Flussen sind sie fehr gemein. Kopfweiden scheinen ihnen am liebsten zu senn. Gern leben sie in den Umgebungen der Städte und Dorfer und leben gern auf dem Freien.

Der Locton ift: Gid ober Jid. Die Stimme bei Unnaberung eines Feindes ift: Imuih ober 3mui. Da es ein fruhzeitiger Ganger ift, findet man feinen Gefang nicht un: angenehm. Ale Stubenvogel gewohnen fie fic balb, und jung aufgezogen werden fie fehr gahm. In Bogelfammern pflanzen fie fich auch fort, lernen auch jung aufgezogen einige Strophen aus dem Gefang andrer Bogel. - Shre Rah: rung besteht aus meift olhaltenden Gamereien, felten aus Baumfnospen und garten grunen Pflangentheilchen. Sanffamen lieben fie por: juglich. Gie freffen aber auch ben Samen von perschiedenen Bolfsmildarten, felbft Samen von den Rellerhalsbeeren. Im Winter die Rerne Der Bachholderbeeren. Im Fruhjahr Erlenfamen und besuchen frifc befaete Bemufebecte. Die Samen ichalen fie; faufen und baden fich gern. Man unterhalt fie mit Rubfaat, und futtert mit Diesem eingequellten Gamen, Die Jungen auf. Salat und überhaupt etwas Grunes freffen fie gern. Ihre Refter findet man vorzuglich auf Anfangs Mary bort man die Ropfmeiden. Mannchen icon am Brutort fingen. Gie bauen nicht boch. Das Reft bauet meift bas Beibchen allein. Es ift ziemlich groß und nicht fehr tief. Wollenklumpchen im Innern oder auch am Meu-Bern, machen es fenntlich. Uebrigens find Die Baumaterialien ziemlich verfchieden, als Queden und Burgelden, Erd: Baummoofe, Redern, Thierhagren zc. 4 bis 6 Gier, Die eine langliche Form und eine glatte garte Schale baben, findet man barin. Ihre Grundfarbe iff weiß mit einem blaugrunlichen Schein, welder mandmal nur gang fdmad, juweilen auch ftarfer ift, in Sammlungen bildet es ein trubes Beiß. Die Zeichnung besteht in menigen fleinen Fledchen und Punften von einem bleichen Blutroth und Grauroth, aus deutlichern blut: braunen, auch einigen rothlich fcmarzbraunen Dunkten, melde alle fast nur am flumpfen Ende fteben, bier oftere einen lofen Fledenfrang bil: den, felten aber über Die gange Schale verbrei: tet find. In 14 Tagen werden Die Gier meift allein vom Beibchen ausgebrutet. Die Jungen futtern fie mit erweichten Gamercien, aus bem Rropfe auf. Gie machen 2 Bruten.

Die Feinde haben fie mit den vorigen Arten gemein. Man erlegt fie mit Flinten. Fangt fie auf Finkenheerben. Sanf in Saufen geftellt und Sprenkel und Leimruthen barauf angesbracht, bringt viele in unfere Gewalt. Ihr Fleisch ift wohlschmedend. Sie fresen Sanf-

und andres Gefame weg und schaden dadurch nicht wenig.

Der Cardinal=Fink, amerikanische Nachtigall.

(Fring. cardinalis.)

Das Mannchen scharlachroth, der Schwanz lang, an der Spige abgerundet, etwas weniger lebhaft roth; Stirn und die Gegend zwischen Augen und Schnabel sammt Kehle sammetschwarz; auf dem Kopfe ein sehr hoher aber zugespigter Federbusch; Schnabel dunkel fleischfarb; Beine gelblich.

Beibden: Gegend um den Schnabel nur schwarzlich; Scheitel, Sale, Seiten des Unter-leibes und Aftergegend schmugig weißrothlich; Brust und Bauch roth; Federbusch kleiner und nur an der Spige roth; hinterhale, Schultern und Oberrucken grau; Flügel und Schwanz

braunroth. Lange 7 3.

Diefer icone Bogel lebt in den vereinigten Staaten. In Penfplvanien findet er fic das gange Jahr an den Randern der Geholze und am Ufer der Bache. Thut im Maisfelde großen Schaden. Mannden und Beibden fingen fcon. Man liebt fie deshalb ale Stubenvogel. Die Mannden tampfen beftig um die Beibchen. Gin Spiegel neben bem Rafig eines Mannchens gebangt, reigt ibn jum Streit, bis er endlich feis nen Gribum einfieht. Gie fingen jung eingefan: gen 6 - 8 Monat des Jahres hindurch; era nabren fich mit bem Gamen vieler Fruchte, befonders des Mais. Ihre 4 Gier find auf fcmu= gig weißem Grunde dicht mit olivenbraunen Rleden besprengt. Es ift einer von den Bogeln, welche die Gier des Ruhvogels (Pharocolius pecoris) ausbrutet, der es damit wie unfer Guduf macht. Sein wohlschmedendes Bleifc macht ihn fehr beliebt.

Der Roth-Gimpel, Dompfaffe. (Fring. Pyrrhula.)

Burzel und Unterschwanzdeckfedern rein weiß; ber am Ende gerade Schwanz mit seinen obern Deckfedern glanzend violettschwarz. Beisde Geschlechter haben eine schwarze Rappe. Die Lange ist selten nur 63, und eben so selten über 7½ 3. Die Flügelbreite 11½ bis 12 3. Der Schnabelist sehrturz, dick, stumpf, freiselfsormig, dem flachen Rucken nach start herabgebogen, die Seiten, besonders des Oberkiefers gewölbt oder

ffart aufgeblafen, fdmarg. Das Gefieber ift weich und fanft anzufühlen. Das alte Mannden ift ein febr fcones Bogelden. Gine tieffdmarge, oben ins fahlblaue glangende Rappe, bededt den gangen Dbertopf. Gin berrliches fanftes Roth, fomudt den Borderhals und die ganze Unterfeite bis an den weichen Bauch; hinterhals, Coultern und Ruden fanft blaulich afcgrau. großen Flugelbedfebern fahlblaufdwarg, mit bell afcgrauen, nach hinten fehr breiten Enden, wodurch eine lichtgraue Querbinde im Schwarzen Des Flügels gebildet wird. Die fcmarge Ropf: zeichnung ift beim Beibchen nur wenig glangend, Die fcmarge Reble viel fcmaler. Gleich unter dem afcgrauen Raden, fangt ein braunliches Grau an und vertritt an Ruden und Schultern jenes foone Blaugrau; alles, mas ferner am Mannden roth ift, erscheint hier fanft rothlich grau, bald lichte, bald dunfler. Bei den Jun: gen fehlt vor der erften Maufer Die fdmarge Ropfplatte und Rehle. Uebrigens giebt es auch unter Diefen Bogeln verschiedene Spielarten. Much mit bem Mannchen ber Cangrienvogel hat man mit dem Beibden unfere Bogels Baffarde ju erzeugen fich bemubt. Im Rorden von Gu= ropa und gum Theil von Uffen, findet man die: fen Bogel. In Des Werfaffere Begend ift er gwar im Commer feitner, aber in der Bug: und Strichzeit, in ben großern Balbern gemein. Er ift theils Bug:, theils Strichvogel. Gie flie: gen gefellig oft ju 30 Stud beifammen, wo faft immer die Beibden Die Mehrzahl ausmachen. Unfer Rothgimpel ift eigentlich ein Baldvogel. Gelten fieht man fie andere ale auf Baumen und in Beden, meift boch oben und nur Mangel an Nahrung gieht fie gur Erde herab.

Der beschimpfende Ausdrud: Du bift ein rechter Gimpel, fann mit Recht, nicht von Der Dummheit unfere Bogele abgeleitet merden. Bahricheinlich haben Dies nur einzelne Gigenhei: ten veranlaßt, ale: fein fanftes, gutmuthiges Raturell, fein gutrauliches Befen gegen Die Menfchen und besonders der Umftand dazu Ber: anlaffung gegeben, daß viele Diefer gefangenen. Bogel bas vorgelegte Futter nicht zu feben fchei: nen und lieber ben Sungertod ferben, ale Die: fes annehmen. Uebrigens ift er fehr gelehrig, ein harmlofer fanfter Bogel. Die Locfftimme ift ein ungemein fanfter flotender Zon, melder wie Diu, - Diu - flingt. Diefer angenehme, aber melancholische Ton, ift nicht allein Lockton, fondern bezeichnet auch noch andre Umftande, dient gur Barnung, ale Rlage u. f. m., ein fanftes

But - but gebort unter bie zartlichen Tone. Ihr naturlicher Gefang ift beiden Gatten eigen, boch fingen die Mannchen lauter und fleißiger; er besteht aus einer Menge furz abgebrochener Tone, manchen unangenehm zu horen.

Als Stubenvogel ift er fehr beliebt. Geine Farbe, Geftalt, fein jutraulides, fanftes Befen, wodurch er fehr gahm wird, vorzuglich aber feine Gelehrigfeit, empfehlen ihn. Man halt ihn gern in Glodenbauern, von Drabt gemacht, morin Mannden und Beibden fich fehr gartlich behandeln. Leicht, felbst die Alten lernen noch Runftfiudden, j. B. Futter aus ber band und aus dem Munde nehmen, auf Befehl das Gona: belden offnen u. f. m. Bernen Aus: und Gin: fliegen, befonders Die Parden, wenn man eins nach dem andern fliegen, und das eine aber im Bauer im Fenfter fteben lagt. Gie begatten fic auch in ber Gefangenschaft. Um besten laffen fie fich abrichten Melodien gu pfeifen, nur muß bies mit Gefdmad gefdeben. Gie merden dagu jung aufgefüttert und babei ftete Die Melodie in bema felben Tone und Tempo vorgepfiffen. Es darf aber dabei nichts andres, als andere Tone von Thieren u. Inftrumenten dagwifden vortommen, mas fie fonft febr miderlich Dagmifden mifchen. In der Maufer verlernen fie es oftere, meshalb es auch nachher wieder vorgepfiffen werden Beide Mannden und Beibden lernen muß. Lieder pfeifen.

Ihre Nahrung beffeht aus mancherlei Baum: famen und Beerenternen, auch den Gamereien vieler andern Pflangen und Baumknospen. Im Berbft freffen fie Beerenterner verfchiedener bolg: arten, 3. B. Bogelbeeren, Rreugdorn ac. Gie bulfen die Samen. Infetten freffen fie nicht. Gie freffen viel, doch langfam; baden fich im Baffer, doch felten. Den Berluft der Freis beit ertragen einige nicht lange. Man gebe ihnen Daber Ebrefcbeeren in Menge, um fie gum Frefs fen ju reigen. Dann erhalten fie Rubfaat, mor= unter etwas Sanf gemengt wird, wobei fie fic recht gut halten. Dit gequellter Rubfaat futtert man die Jungen auf. Auf dem Thuringer Bal= de und auf dem barge niften fie fehr baufig. Die Parchen lieben fich febr gartlich. Dichte Bal= dungen mablen fie ju ihren Brutplagen und vor= züglich die Plagden, wo es hohe Bufche und Baumden von Radelholzanflug giebt. Das Reft gleicht dem des Grunhanflinge, ift nicht unfunft: lich, aber etwas loder gebauet. Die Grundlage bilden trodine Reiserchen, bann folgen Burgel: den mit Bartflechten vermengt, inwendig mit Baaren und wohl auch mit Wolle ausgepolstert. Die Eier 4—5, sind kurzoval, febr zart, glatt und glanzend von bleichgrunlicher oder grunblauslicher Grundfarbe, mit violettgrauen, violetten und dunkelbraunrothen oder purpurbraunen feisnen Punkte und kleinere Flecken besinden; von denen manche fast braunschwarz aussehen, meist einen Kranz bildend. Das Weibchen brutet sie allein in 2 Wochen aus, wird aber vom Mannchen mit Futter versehen. Die mit schwarzgrauen Dunen versehenen Jungen werden von den Ektern mit im Kropfe erweichten Samereien aufgezfüttert.

Feinde haben sie mit den Borigen gemein. Man schieft und fangt sie leicht. Sie folgen der Lockstimme, und dem, der sie gut nachahmen kann. Auf Lockbusche und alle Art Bogelheerde gehen sie, fangen sich auch in Dohnen. Man speift sie. Gut abgerichtet werden sie mit 1 und mehrern Louisd'ors bezahlt. Rach Bechstein werden oft schon in kleinen Districten Thuringens gegen 200 folche Bogel abgerichtet und verkauft.

Sie icaden durch das Abnagen der Anospen im Fruhjahr, freffen die Dohnen fehr aus und entfleiden die Ebreschbaume von den jum Dohenenfang nuglichen Beeren.

Ueber bas Zahmmachen und Abrichten hat Bechftein bas Rothigfte mitgetheilt.

Rreuzschnabel. (Loxia.)

Mit zufammengebrucktem Schnabel, bessen beibe Kinnladen so gekrummt sind, daß sich ihre Spiken bald auf der einen, bald auf der andern Seite kreuzen, je nach den Individuen. Dieser so eigen gebildete Schnabel dient die Samen aus den Schuppen der Fichtenzapfen hervorzuholen. Es giebt 2 einheimische Arten.

Der Fichten=Kreuzschnabel, Tannen= papagei.

(Lox. curvirostra. Linn.)

Der Schnabel gestreckt, sanft gebogen, unten an der Wurzel nur 5 Linien breit, die sich kreuzenden Spigen lang und schwach, so daß die des Unterschnabels meistens über den Rücken des Oberschnabels emporragt. Länge 6½ bis 7 3., Flügelbreite 11½ bis 12½ 3. Gewicht 2½ bis 3 Loth. — Der haken des Oberschnabels biegt sich bald auf die linke, bald auf die rechte Seite neben dem des untern herab, und so har man Rechts und Linksschläger. Bei ganz Jungen passen die noch sehr kurzen Spigen beider Kinneladen auf einander. — Die Farbe variirt sehr. Das alte Mannchen ist hochroth; die unvermaus serten Jungen sind gestedt, nach der ersten Maufer werden sie gelb oder gelbgrun, nach der 2ten roth zc. Die Weibchen zeichnen sich durch ihre dusterere Mischung aus, da ihr Gesieder viel mehr Grau hat.

Diefer Bogel findet fich überall im Rorden ber alten Belt. In den Radelmaldungen von Schleffen und Bohmen, im Erzgebirge, auf dem Barge und Thuringermalde zc. ift er einheimisch. Er ift bald Stand :, bald Strichvogel, woju ihn Ueberfluß oder Mangel an Rahrung bestimmt. Gie ziehen oft in Deerden ju 30 bis 50 Stud, fich durch ihre Loctione immer gufame men rufend. - In feinem Betragen liegt viel Ginfalt, boch ift er babei gewandt, burtig und gefellig. Gie flettern wie Die Papageien, mobei fie ihren Schnabel ju Bulfe nehmen. Der Lode ton ift: Rip, tip und fup, fup, fup. Der einladende Zon, den man gern bei den Lodvogeln auf dem Beerde bort, ift: 30t, got. 3hr eben nicht unangenehmer Gefang besteht aus alz ferlei zwitschernden und mehreren lauteren Tonen und Strophen. Gie ertragen frenge Ralte und gewohnen fich leicht an Die Gefangenicaft. Bolgerne Bogelbauer zernagen fie, vertragen fich aber gut mit ihres Gleichen eingesperrt. Der Aberglaube hat mit diesen Bogeln auch sein Spiel getrieben; fo follen fie g. B. Krantheiten ber Menfchen an fich ziehen, ale: Reißen, Die Rechte: ichnabler die der mannlichen, die Linkofdnabler Dagegen Die ber weiblichen Perfonen zc. Gewittern follen die im Rafig befindlichen febr unruhig werden.

Ihre Nahrung besteht besonders in den Samen der Nadelbaume, der Erlen, Ebreschbeezren, Distelsamen, Nepfelternen 2c., zuweilen auch Insetten. Sie haben übrigens guten Appetit. Die Fichtenzapfen beißen sie oft ab, tragen sie auf einen bequemen Zweig und öffnen sie dafelbst. Sie fliegen täglich zur Tranke, baben sich auch zuweilen. Rubsamen, Hanf, Hafer und Waigen giebt man ihnen, auch Ebresch; Wache holber: und Elseberkerne.

Sie nissen in Nabelwaldern. Das Beibe den bauet allein das Rest, das Mannchen unters balt es dabei mit Liebkofungen und Gefang, und brutet es, so versorgt er dasselbe mit Futter. Rerkwurdig ift es, daß sie sich an gar keine Jahe

reszeit binden, benn fie niften in manden Jahren in jedem Monat, vom Januar an bis De: cember. Es fcheint fich lediglich nach dem Gera= then des Richtensamens, ihrer Sauptnahrung, Bu richten. In ber Regel ift December und Jas nuar die Paarungezeit. Den Fichtenfamen fut: tern fie geschalt und im Rropfe eingeweicht ben Jungen. Gie follen 2 Bruten machen. bauen fiets fehr boch auf dichte Zweige, fo daß ein barüber febender bas Reft gegen einfallenden Sonee fougt. Das Reft bildet ein fehr nettes Gewebe, ift weich und warm. Der Boden Des Reftes über 2 3. fart und die Beite 21 - 3, Die Tiefe 11 3. Das Weibchen legt meift nur 3 Gier, deren Schale gart, glatt, doch ohne Glang ift. Die Grundfarbe ift fomungig grunlichweiß, ober etwas ins Grunblauliche ziehend, nie bicht gefledt, am meiften noch am flumpfen Ende, wo fie bismeilen einen Rrang bilden. Die Puntte find flein, theile bleich violett, theile blag blutroth, zuweilen dunklere Aderzüge. Gie variiren im Gangen febr. In 14 Tagen bruten fie Die Gier aus. Die Jungen merden lange gefüttert, Dann aber bei halb geoffneten Bapfen an bas Gelbsternahren gewöhnt.

Raubvögel, wilde Ragen und Eichhörnchen vermindern ihre Zahl; auch werden fie von Schmarogerinsekten und Eingeweidemurmern geplagt. Leicht laffen fie fich schießen. Beim Genuß der Ebreschbeeren kann man fie mit einem Blaserohr erlegen, ja fie sogar kickeln. Auf Bogelheerden mit Leimruthen und Sprenkeln fangt man fie leicht. Man speist fie verschieden zuberreitet. Sie nugen durch das Berzehren der Blattslüge, erfreuen im Winter durch ihren Gesang in stillen Nadelwäldern und gewähren im Rafg Bergnügen. — Sie schaben durch das Berzehren

des Radelholzsamen.

Der große oder welsche Riefern= Rreuzschnabel.

(Lox. pytiopsittacus. Bechst.)

Der dicke, hohe, papageienartige Schnabel ift unten an der Burzel 7 Linien breit, und jezde Rinnlade läuft in einen hohen kurzen haken aus, so daß die Spige der untern sehr selten über den Ruden des Oberschnabels vorragt. Länge 63 bis 7 3. Flügelbreite 12½ bis 13 3. Schwere 3½ bis 4½ Loth. Die Füße, wie bei voriger Art, zum Rettern und Anhakeln sehr geschickt. Das herrliche Roth, womit das Gesieder alter Mannchen übergossen zu sehn scheint, if

bald ein lichtes ober trubes Mennigroth, bald ein helles oder dunkeles Zinnoberroth; oder Zinnoberroth; oder Zinnoberroth mit einer Mischung von Karmin 2c. In der Gefangenschaft geht dies verloren. Uebrizgens variiren sie nach Alter und Geschlecht wie die vorige Art. Ein dusteres Grau und schwusiges Grun, durch wenig Grungelb gehoben, ist die Karbe des Gesteders des Weibchens.

Der Morden von Guropa und Amerika ift Diefes Bogels Baterland. Er ift Strich: und Standvogel, wie der vorige. Riefern : oder Fohrenwalder find fein Aufenthaltsort. Er ift fcmerfalliger ale vorige Urt, ber er fonft in vie: len Studen abnlich ift .- Gie besigen viel Starte in ihrem Schnabel und fneipen empfindlich. Ihr Loction ift um eine Gerte tiefer, ale wie bei vo riger Art, und flingt, wie : fop oder fop, und festere andert noch zu einem tiefern 3 of ab. Ihr Gefang ift nicht unangenehm, es fommt in feiner Mitte ein eigenthumliches fcnurrendes Erre vor. Much die Beibchen fingen, doch Der Bauer, in welchem fie immer fdmåder. herumschaftern, muß von Draht fenn, fonft ger= schroten sie ihn. Sie vertragen sich meist gut in ber Gefangenschaft, leben aber felten lange.

Auch diese Art ist auf den Samen der Nas delbaume angewiesen, Erlensamen und die Bos gelbeeren frist sie gern. Im Bogelbauer fressen 'sie außer Nadelholzsamen Sanf: und Rubsas men, auch Safer. Sie trinken viel, baden sich aber nicht.

Sie niften in Radelmaldungen, mo fie lichte Stellen und den Rand des dunkeln Baldes mablen. Auch fie find nicht ftrenge an die Zeit im Bruten gebunden. Ihr Rest steht fehr boch, wie der vorigen Art und ift fcon gebauet, Die Wande find 1 - 3 Boll did. Much hier baut das Beibden nur allein, brutet auch und wird vom Mannden mit Rahrung verforgt, beim Legen des erften Gies bleibt fie wie die vorige Art gleich figen und bringt auch die Jungen in 14 bis 15 Tagen aus. Die Gier, nur 3-4 an der Babl, benen bes Fichtenfreugschnabels gang gleich, aber fete großer. Die Futterung der Jun: gen ift fo wie bei der vorigen Urt. Feinde haben fie auch mit Diefer gemein. Diefer einfaltige Bogel wird leicht gefchoffen und gefangen, eben fo wie der Borige. - Ihr Fleifch hat einen bargigen Gefchmad, wird aber doch gefpeift, es widersteht auch lange Zeit ber Faulnig. In Der Gefangenichaft laffen fie fich mit Sanf und Safer maften. Ihr Gefang ift im Rafig, wie im Freien, an ftillen Wintertagen angenehm.

Sactenfernbeißer. (Corythus. Cuv.)

Der nach allen Geiten gewolbte Schnabel bat feine Spige uber Die Unterfinnlade gebogen.

Der hadenfink, Sichtengimpel. (Coryth. enucleator. Pyrrhula enucl. Temm.)

Mit fehr ausgezeichnet hatenformigem Gona: bel, ber Scheitel roth oder gelb; über den Glu: gel laufen 2 meiße Querbinden. Droffelgroße. Gin iconer Bogel, hinfictlich feines Farben: medfele ben Rreugichnabeln abnlich. Lange 83 bis 94, Flugelbreite 135 bis 144 3. Denn fein Gez fieder ift faft gleichem Farbenwechsel unterwor: fen, wie das der Kreusschnabel. Rach der erften Maufer ift das Rleid bei mannlichen Bogeln von trubem Dergelb, durch alle Abftufungen bis gu einem hoben Pomerangengelb, und bis gum tru: ben Roth, bis jum Johannisbeerroth. Die weiblichen Bogel tragen Diefelbe Farbe, aber nur bis jum rothlichen Gelb, nie jum Roth. Im Berbfifleide feben die Mannchen am fcon: ften. Im Rafig ichwindet Diefe icone Farbe, und fommt nie wieder. Auch machfen in der Be: fangenschaft die Rrallen unformlich, fo verlan: gert fich auch oftere ber Saden bes Schnabels bis gur Unformlichkeit.

Als nordlicher Bogel bewohnt er Europa, Mfien und Amerika. Gehr felten fommen fie bis zu uns ber. 1790 fing man um Riga im October bis December einige taufend Paar, woraus man auf ihre Menge foliegen tann. Es find gefellige Bogel, Die fich truppmeife zusammenhalten. Solde Radelmaldungen, wo Bachholder Das Unterholz bildet, find ihnen vorzüglich ange: nehm, auch die mit Laubholz gemischten. - Ge ift ein harmlofer, einfaltiger Bogel, Der febr Teicht gefangen und gefcoffen werden fann. Die Mannden find portreffliche Ganger. - Gie werden fehr gahm und freffen bas Futter aus ber Sand, laffen fich auch ftreicheln. Im Win: ter muß man fie in eine falte Rammer bringen, Da fie bie Barme nicht ertragen tonnen.

Auch fie find auf den Samen der Radelbaume angewiesen, besonders der Fichten, Tannen und Lerchenbaume, auch der Buchen, Aborn, Eschen, Ulmen, Erlen, Birken, Aspen, Pappeln und Weiden. Im herbst, Beeren, wovon sie nur die Kerne fressen, auch Baumknospen 2c. In der Gesangenschaft gewöhnt man sie mit Ebreschbeeren an Rubsaat, Leindotter und hafer, worunter man hanfsamen mengt. Legterer
macht fie fehr fett. Ebreschen = und Wachholder=
beeren find ihnen fehr dienlich. Sie fressen sehr viel. — Die Feinde haben sie mit vorigen Arten
gemein. Leicht werden sie geschoffen und in mancherlei Fallen gefangen, selbst viele im Dohnenftege.

Ihr Fleisch fomedt fehr angenehm. In Betersburg bringt man fie jahrlich zu Taufenden auf den Markt, desgleichen in Konigsberg. Im Winter beleben fie durch ihren Gefang die Wals der, in denen viel Ebresch = und Wacholder=

beeren machfen.

Der Karmin=Gimpel. (Coryth. erythrina. Pyrrh. erythr. Temm.)

Mit fehr folbigem Schnabel, rofenrothem oder grunlichgrauem Scheitel. Finfengroße. Das alte Mannchen ift ein fehr fconer Bogel. Das Beibden hat dagegen ein dufteres Unsehen und ift ihm fehr unahnlich. Diefer, der folgende und Pyrrhula purpurea feben fich fo abnlic, Dag man fie mit einander verwechfelt hat. Un den Schnabeln find fie indeffen leicht zu unterfcheis ben, der unfrige hat g. B. den folbigften Schna: bel. Lange 6, Flugelbreite 10 bis 11 3. - Das alte Mannden Scheint am Ropfe und Border: halfe in eine liebliche Rofenfarbe getaucht, Die fich hin und wieder an den andern Theilen nur als schwacher Unflug zeigt. Rehle, Bugel und Augentreise graulichweiß, Gurgel und Kropfge= gend rofenroth, mit farminrothen Enden der Redern; Die Dberbruft farminroth, weißlich ge: mifcht, Schenfel, Bauch und die untern Schwang: Dedfedern fdmußigweiß; Scheitel fcon farmin= roth, der hinterhals hell braungrau, farmin= roth überlaufen; Die Comingen dunkelbraun. Je alter Das Mannchen, je fconeres Rarmin= roth befommt es. In der Gefangenschaft verliert er Die icone rothe Farbe. Die Jungen find meift braungrau gefarbt. Die Beibchen haben Sanflingefarbe mit einem gelbgrunlichen Un= flug, an Flügeln und Ruden, befonders be: mertbar. Der Rorden von Guropa und Affen ift ihr Baterland. Gie lieben feuchte Gegenden und die bufdreichen Ufer der Fluffe mit Beiden und Robr befegt. Gie leben vom Gefame, in Der Gefangenschaft giebt man ihnen Fintenfutter.

Sollen in Straucher bauen und 5 — 6 grunliche Gier legen. Ihr Fleisch schmedt gut. Der Rofen: Gimpel. (Coryth. roseus. Pyrrh. ros. Temm.)

Mit ziemlich feilformigem Schnabel; ber Scheitel roth, mit filberweißen Bledchen, oder braun. Sperlingsgroße. - Diefer prachtige Bogel hat Aehnlichkeit mit dem Karmingimpel, von dem ihn der gang andere geffaltete Schna: bel unterfcheibet. Die Lange Des Bogels betragt 61, und Die Breite 111 3. Gein Schnabel ab: nelt dem bes gemeinen Sanflings; er ift bid, oben etwas gebogen, und fpigt fic freifelfor: mig, doch folbig. - Beim alten Mannchen fal: Ien 2 Sauptfarben besonders auf, Die braune und ein herrliches Rarminroth, die legtere, womit er übergoffen zu fenn icheint, macht ihn ju einem der iconften unter den nordifchen Bo: geln. Alle Flügelfedern haben eine matt bun: felbraune Farbe und zwei weiße Querftreifen über Die Flügel. - Diefen icone Bogel be: wohnt vorzüglich das nordliche Affen und dafelbft Die mit Beiden und anderm Gebufch befegten Flugufer in Sibirien. Im Winter fommt er von dort aus auch in das Europäische Rugland. Er lebt von allerlei ohligen Gamereien und Rernen verschiedener Beerenarten. Conft weiß man noch nicht viel über ihn zu fagen.

Regelschnabel. (Colius.)

Es kommt dieses Wort aus dem griechisschen und man versteht darunter eine fleine Art von Krahen. Ihr Schnabel ift kegelformig, kurz, did, etwas zusammengedrudt, beide Kinnladen gebogen, ohne einander zu überreichen; Schwanzfedern abgestumpft und sehr lang; sie haben eine Wendezehe; ihr seidenartiges feines Gesieder hat im Ganzen dunkele Farben. Es sind afrikanische oder indische Bögel, die fast wie die Papageien klettern, in Schaaren leben, selbst ihre Rester in großer Anzahl auf demselben Strauche verzeinigen, und an den Zweigen aufgehängt dicht an einander, den Kopf nach unten, schlasen. Sie nahren sich von Früchten.

Der Regelschnabel=Quiriva. (Col. quiriva, indicus.)

Der Schwanz 3 mal fo lang als die Lange bes Bogels. Um die Augen eine nachte rotheliche Saut. Er hat einen Federbusch, die Stirnift mit einem falben Bande geziert, hinterkopf und Seiten bes halfes rothlich gelb oder falb;

der übrige Theil des Körpers blaugrau, in gewissem Lichte ins Grunliche schillernd; die Kehle
hell falb; Borderhals und Brust hell graublau
falb gewölft; der Bauch rostfarben, die Uftergegend und Schenkel graufalb überlausen; der Schnabel an der Basis röthlich, an der Spise
schwarz; die Füße röthlich, die Augen rothbraun.
Beim Weibchen die blausiche Farbe weniger rein,
und ein Röthlichgrau ist die herrschende Farbe
bei den Jungen. Baterland Afrika. Die Eier,
5—6, weiß, mit braunen Flecken. Der Rame
von ihrem Geschreix: Dutriva!

Dd fenhader. (Buphaga, Bechst.)

Ein kleines Geschlecht, dessen maßig langer, anfangs cylindrischer Schnabel von feiner zierz lich stumpfen Spige an beiden Kinnladen ansichwillt, und dem Bogel dient, die haut der Rinder zusammenzudrücken, um die darin sterdenden Bremsenlarven herauszutreiben, von denen er sich nahrt. Es sind wilde Bogel, welche in Truppen von 5-8 Stud umherziehen.

Der rothschnablige Ochsenhader. (Buph. erythrorhyncha. Temm.)

Schnabel und Augenring schön roth; Dberzfopf, hals und Ruden graurothlich, Backen und Rehle aschgrau; Vorderhals, Brust und Unterzleib gelbrothlich, fast isabellfarben; Deckfedern der Flügel, Schwingen und Schwanz aschgrau, röthlich, die Schwungsedern mit isabellfarbizgen Saumen, der Schwanz abgerundet und mit abgestumpsten Federn, die beiden äußersten Schwanzsedern an der schwalen Fahne mit eiznem isabellfarbigen Endsted; Füße braun. Größe der Singdrosset. Baterland Afrika.

Staardohle. (Cassicus. Cuv.)

Ginen großen fegelformigen Schnabel, an der Basis did und an der Spige ausgezeichnet zugesfpigt; die Bereinigung der Kinnladen in einer gebrochenen Linie, d. h. einen Bintel, wie bei den Staaren bildend. Ihre Sitten sind denen der Staare ahnlich, leben in Schaaren, bauen ihre Rester zusammen, wobei sie viel Kunstfertigkeit zeigen. Diese amerikanischen Bogel leben von Insekten und von Samen, daher sie auch bei ihren großen Schaaren den Feldfrüchten vielen Schap

ben gufügen. Ihr Fleifch fdmedt folecht. Man bat fie in mehrere Unterabtheilungen gebracht.

3 weibindige Staardohle. (Cass. bifasciatus.)

Schnabel und Stirnschilb schwarz, an der Burzel und an der Spige mit einer rothen Binde; am Scheitel ein Federbusch aus einigen sehr lanz gen schwarz, nicht glanzend; Ropf und ganzer Sals schwarz, nicht glanzend; Ruden, Steiß, Decksebern des Schwauzes und die obern der Flüzgel, auch alle untern Theile des Körpers lebhaft fastanienbraun, einfarbig, Brust und Oberzbauch etwas mehr ins Schwarze fallend; Schwungsedern an der innern Fahne schwarz, an der äußern hell kastanienbraun, die übrigen einfarbig eitronengelb. Baterland Brafilien.

Rothflügelige Staardoble. (Cass. phoenicens.)

Schnabel fdmart, Regenbogenhaut weiß, ganger Korper foon fowarg glangend, Die fleis nen Dedfedern ber Flugel lebhaft roth, Die Ranten der Federn ins Carmoifinrothe fpielend, fo daß dadurch auf den Flugeln ein 2 3. fan: ger Querfled entfeht. Das Beibchen ift flei: ner, fein Gefieder mattidmars, der Flugelfled ins Braune ziehend. Große des Staare. Lebt in Schaaren in Rordamerifa. Fruber trieb man Sandel mit den iconen Flugeln und Die Ur: einwohner nahmen die Federn gum Pug. Im Binter 1770 brachte ber Argt Lebeau gegen 40,000 Flugel Busammen, die er als Modear: tifel nach Rochelle ichidte. Der Preis von tau: fend Flügeln mar 1775, achtzehn Franken. Der Flug Diefer Bogel ift fonell, und Die gange Schaar fliegt bicht gebrangt. Gie haben einen angenehmen Gefang, und figen viel auf einem Baume. Ihr Aufenthalt ift an Bachen und im Schilfe, wo fie ihr Reft bereiten. Gie freffen neben Infetten, befondere gern den Mais, da= ber beißen fie auch Mais biebe. Man ver: folgt fie beshalb, ja man vergiftet Maistorner mit einem Aufguß von Riegmurg, um fie gu ver= tilgen. Gie niften im Rohr und befestigen ihre Refter durch Schilfbufchel an Daffelbe, über das Deft bauen fie eine Urt Dad, inwendig legen fie Das Reft mit weichen Rrautern aus. Die 5-6 Gier find weißgrau mit fcmargen unre: gelmäßigen Gleden. Gie bruten jahrlich 2 mal. Das Fleifch wird wenig gefchast.

Staar. (Sturnus. L.)

Unterfcheiben fich von ben vorigen Gattuns gen, nur durch einen, besonders an der Spige, etwas niedergedruckten Schnabel, seine scharfen Rander etwas vorstehend. hauptnahrung Insekten.

Der gemeine Staar, Eprehe. (Sturnus vulgaris. Linn.)

Schwars, mit violettem und goldgrunem Glang, und meiflich getupfelt. Das Gefieder fehr fcmal und fpig; Die Spigen der Federn weiß oder hellbraunlich, im Berbft auffallender, als im Fruhjahr, mo fie theilweis ganglich ver: fdminden. Die jungen Bogel feben braungrau, mit weißer Reble und weißlicher, fdmarggrau gefledter Bruft. Es ift ein befannter Bogel, Der Ropf ift flein, febr fpig mit fo flacher Stirn, daß der Schnabelrucken mit ihr in einer fast gleichen Gbene liegt. Er ift 7-8 3. lang, und 151 - 164 3. breit. Im Fruhjahr ift bei dem febr alten Mannchen, Schnabel und Rachen rein citronengelb. Das gange Gefieder ift fcmarg, Ropf und Sals bis an Die Bruft fehr foon pur: pur : violett metallglangend, Die Dberbruft, Ruden, Schultern und gum Theil auch die Ded: federn der Flügel haben einen goldgrunen, die übrigen Flugeldedfedern, Die Unterbruft und Seiten einen fahlblauen Schiller. Un Ruden:, Shulter = und fleinen Flugelbedfedern zeigen fich weißlich : gelbbraunliche, feine, breiedige Spigenfledchen, am Steig und Bauch derglei: den weiße, am Ufter großere. Die jungen Mann= den find mit mehrern weißen und weißlich gelb= braunlichen Spigenfledchen und breitern Gaumen an Flugel: und Schwanzfedern verfeben und ahneln badurch mehr bem Beibden. Im Berbftleide feben fie viel bunter aus, als im Frühlinge.

Es ist ein sehr weit verbreiteter Bogel, den man ziemlich häufig und in Menge beisammen in Europa, Asien und Afrika findet. Sie lieben Wäseler, und daselbst die Stellen, in deren Rabe Baster ist. Nach der Brutzeit sieht man sie in großen Schaaren auf abgemähten Biefen, auf den Triften bei den Viehheerden, welche sie späterhin auch auf die Felder begleiten, und bei Flüssen, Teichen und Seen, in welchen viel Rohr wächst, worinnen sie so gern überznachten, ja, daß sie meisenweit darnach fliegen.

In nördlichen Landern find es Zugvögel, im füdlichen Europa ziehen fie nicht weg. Rach Deutschland tommen fie gewöhnlich im Marzan. Im October wandern fie in noch größern Schaaren, als im Frühjahr, wieder fort, und überwintern im südlichen Italien, im nördlichen Ufrifa und im warmern Affen.

Es ift übrigens ein liftiger, munterer und febr gefelliger Bogel. Gie lieben auch die Gefell: ichaften anderer Boget, baber fieht man fie oft heerdenweis unter Raben, Dohlen zc. Gie find fehr lebhaft, immer luftig und in fleter Bewegung. Sie trinfen und baden fich gern, daber fie auch gern bes Rachts im Rohr figen und fich an den fühlen Ausdunftungen Des Baffere laben. Gie fturgen fich bei ihrer Untunft in daffelbe aus Der Luft herab, und fobald fie figen, pfeifen und fcmagen fie untereinander, und jeder neu ankommende Trupp wird mit frohlodendem tau: fendflimmigen Gefdmag empfangen, mas bis in die Dammerung binein, ununterbrochen fort: gefest wird. Dit Gintritt der Morgendamme: rung beginnt bas Gefdmage und garmen von neuem und dauert bis eben die Conne aufge= hen will, dann erheben fich die Beerden, wie fie Abends angefommen gum neuen Schaften in der Saushaltung Gottes.

Thre Lockstimme klingt fast wie ihr Name: ftoar, bei den Jungen wie fquar, fquarr. Benn sie sich fegen wollen, rufen sie bell und scharf: fpett, fpett. Ihr Gesang ift sehr abmechselnd, lang, aus einer Menge Strophen zusammengesett, worunter ein pfeisendes gedehntes Dooid und ein hohes Jieh sich auszeichnet.

Leicht lagt er fich gabmen, und ift dazu ber drolligfte und angenehmfte Stubenvogel. Er ift nach feiner Urt flug, fiebt auf Dienen und Geberden feines herrn, immer luftig, in feinen Bewegungen fonell, aufmertfam auf alles, neu: gierig, alles ju beguden und ju befchnabeln, mobei er fodann den Schnabel wie einen Bir: fel einfest und auffperrt; fo zirkelt er befonders Die Rigen in den Dielen ihrer gangen Lange nad auf, um Infetten darin ju fuchen, mas er dann noch vorzüglich haufig thut, wenn man Dann und wann einen Mehlmurm Dabinein fedt. Mit andern Bogeln im Zimmer lebt er zwar verträglich, wird ihnen aber burch feinen Muthwillen, laftig. Benn Diefe &. B. bauen, fo reigen fie ihnen Die Baumaterialien meg, werfen die Gier heraus, und ichleppen die nachten Jungen beraus. Gie find Dabei boch febr gelehrig. Jung aufgezogen, den man die Junge nicht zu lofen braucht, lernen sie nicht nur allers lei Bogelgefänge und Melodien, die man ihnen vorpfeift, sehr gut, sondern auch deutlich und vernehmlich, menschliche Borte und kurze Redensarten nachsprechen, ja man führt Beispiele an, daß ein Staar das Unser Bater, Bort sur Bort, ohne Anstoß hersagen konnte D. Ein schwahendes Staarmähchen muß man aber isoliren, indem es andere Bogelstimmen und fremde Tone leicht nachahmt und vergist dadurch das schon Gelernte. Beide Geschlechter sind gleich gesehrig. Jum Trinken und Baden verslangen sie immer frisches Wasser.

Im Fruhjahr in Regenwurmern, Schneden 2c. Im Sommer ist ihr Lieblingsfutter heuschreden und deren Larven, die sie fehr emsig auf Wiesfen aufsuchen. Auch andere Insetten und deren Larven verzehren sie. Besuchen auch Acfer, der Maden wegen, und vor allen die Biehhutungen und Triften. Im Juli trifft man sie in große

Ihre Sauptnahrung besteht in Infetten.

und Triften. Im Juli trifft man fie in große Gesellschaften vereinigt, anfänglich auf abgemäsheten Wiesen, dann vorzüglich bei Schafheersden, wo sie das Bieh von Bremen, Stechfliegen und Schafzeden zc. befreien, und deshalb auch von ihnen willig mit herum getragen werden. Wegen der Insektenlarven und Raupen gehen sie auch auf Erbsenader, in Kohlstuden zc. Ge-

gen den Berbft freffen fie viel fleine Schneden

^{*)} Unter die Bogelanekdoten unfere Staars gehoren folgende: Ein Cantor hatte einen Staar abgerich: tet, der ein rothes Bandchen um hatte, und her: umflog. Ein jeder kannte und liebte den fleinen Schwäger. Ginft folgte er einer Schaar, die auf dem Juge begriffen, fich auf einen Bogetheerd warf und gefangen wurde. Der Bogelfanger, indem er den Gefangenen die Ropfe eindruckte, fah zufällig das rothe halsbandden des ihm unbefannten Staars und redete ihn an : 3 Manden, wie tommft denn du hierher? Darauf erwiederte der Bogel zufällig, aber doch fehr paffend: "Per compagnie." Dies wurde bald allgemein befannt und es entstand daraus das bekannte Sprichwort: Per compagnie, wie Cantors Staar. - Gin anderer auch gut abgerichteter Staar wurde auf gleiche Weise gefangen. Schon war ein großer Theil fei: ner Mitgefangenen gemordet, und es follte das Todesurtheil auch an ihm vollzogen werden, als er in der Todesangft rief: "halt, ich gehöre nach Deffau!" Der Vogelfänger erfdrack anfänglich und ichenete ihm bas Leben. Die Geschichte murde bekannt. Der rechtmäßige Gigenthumer erfuhr es und befam nach Erlegung eines guten Lbfegeldes den fleinen Flüchtling wieder. C. A. B. . . .

mit und ohne Scalen, Rirfden und allerlei Beeren; zuweilen fleine Samereien. Rach ber Deuerndte findet man fie fchaarenweis auf ben

abgemabeten Biefen.

Junge Staare zieht man mit Semmel in Milch gequellt auf; bester ist es jedoch, sie mit Insetten und Regenwurmern aufzufüttern, oder sie doch unter obiges Futter zu mengen. Altzgefangenen giebt man Nehnliches, was man unter das Futter für Drosseln bestimmt, mischt. In der Stude fressen sie dann alles, was auf

Den Tifc fommt.

In Deutschlande Baubholgern pflangen fie fich fort, befonders ba, wo Diefe mit Biefen und Aedern abmechfeln und in deren Rabe Baffer ift, &. B. in Auengegenden. Bauen in Soblen und Lochern und in fur fie bingebangte Raficen und thonerne Gefage mit engen Lochern. Aus durrem Laub, Strob, trodnen Salmen, Bolle, Saaren und Federn bilden fie ihr Reft. Sie fuchen es alle Sahre wieder und machen 2 Bruten Darin. Gie legen 4 bis 7 Gier. Die Farbe ift ein febr lichtes Meergrun oder blag Grunfpanfarbe, Die beim Bebruten etwas fcmu: giger wird, fich aber bei ausgeblafenen in ein grundlauliches Beif vermandelt. Das Beib: den brutet fie allein in 14 Lagen aus, mobei fie Das Mannchen dann mit Futter verforgt.

Sie beherbergen Schmarogerinsetten und Eingeweidewurmer mancherlei Art. Die Alten verfolgen mehrere Falten, die Jungen Krahen und Elster, auch Marder, Wieseln, Ragen und Sichhörnchen zerstören die Bruten. Der Fuchs beschleicht sie im Rohre. Man schieft sie, fangt sie aber auch auf abgemäheten Wiesen mit Lockfaaren in Negen in großer Menge bei Salle. Auf Maulbeerbaumen mit Schlingen, im Rohre

mit Regen, in Die man fie treibt.

Jung ichmeden fie recht gut, mogu man fie ausnimmt. Ihr Rugen besteht besonders im Begfangen der uns fehr laftigen Insekten. Gie ichaden den Kiriden und Beinbeeren.

R a b e. (Corvus.)

Mit fartem, an den Seiten mehr ober minder abgeplattetem Schnabel, dessen Rafenlocher mit steifen, nach vorn gerichteten borstenartigen Federn bedeckt find. Zunge knorpelicht, vorn mit hornartiger, gespaltener Spige, am hinterrande gezähnelt, mit vorstehenden Eckzahnen. Es find folaue Bogel mit fehr feinem Geruchfinn und haben die besondere Eigenheit, glanzende Dinge zusammen zu tragen und zu verfteden. Es find gesellige Bogel, die nicht selben in heerden beisammen leben.

Die größern Sattungen, mit nach Berhaltniß ftarten Schnabeln, dessen Firste gebogen, nennt man Raben oder Krahen. Ihr Schwanz ist rund oder viereckt. Cuvier hat mehrere Un-

terabtheilungen gemacht.

Es find Allfrage (omnivorae) und werfen in Bugen oder Gewolle das Unverdauliche meg. Ihre Gier find meift grunlich, braun und grau geflectt. Jung aufgezogen, lernen fie menschliche Worte nachsprechen.

Der Kolf = Rabe, Aasrabe. (Corv. corax. Linn.)

Der Schnabel ift fehr stark, an der Burgel 1½ 3. hoch, von gleicher Lange mit der Fußwurzel; der Schwanz keilformig zugerundet; der ganze Bogel tief schwarz, mit stahlblauem und graulichem Glanze. Es ist bei uns die größte Urt. Lange 21½ bis 26, Flügelbreite 50 bis 56 3. Der Schnabel 3 bis 3½ 3. lang, start gewölbt, an der Spige gezahnt. Schnabel, Junge und Rachen schwarz.

Man findet Diefen Bogel in gang Guropa. Baldige Gegenden, befonders mo Feld, Die: fen und Gemaffer mit einander abmedfeln, liebt er vorzüglich. Er ift ein Standvogel, und nur im Winter ift er bei uns ein Strichvogel. Sau: fig ift er nirgende. Er fdreitet gravitatifch ein= ber und feinem liftigen, verfchlagenen Blide entgeht nichts. Es ift einer der flugften Bogel, Dabei aber gankifd und beißig. Dies fieht man nicht felten bei Mefern, wenn er mit andern dabei jusammen trifft. Er ift fehr vorfichtig, und umfreift erft ein paar mal die Gegend, wo ein Mas liegt, ebe er fich dabei niederlagt, ob er es gleich ftundenweit wittert. Leicht be= mertt er durch feinen feinen Geruch den Sager. Sein gewöhnliches Gefdrei flingt tief und fart: frach, frach und in einem hohern Tone: fruch! Bei Annaherung von Sturm und Regen fiogt er folgendes aus: Rladledlade. Uebrigens lakt er auch noch ein tiefes; Rorrr, ein boberes Rlud Hlud zc. boren. Jung aufgezogen laffen fie fich fehr gahm machen und mit Brod, Rafe, und mas auch menschliche Rahrung ift, gut aufziehen und fernen verfdiedene Borte gut

and deutlich nachsprechen ") Sie stehlen wie ihre Geschlechtsverwandten, woher die Redenszart: Er stiehlt, wie ein Rabe. Die Geschichte in Merseburg, wo ein Rabe einen Ring gestohlen, und wo wirklich ein unschuldiger Mensch, auf den man Berdacht hatte, hingerichtet wurde, ist bekannt. — Sie erreichen übrigens ein hohes Alter. —

Der Rolfrabe lebt mehr aus dem Thier: als aus bem Pflanzenreiche. Gein Lieblings: futter ift Has. Sonft jagt er Maufe, Samfter und Maulmurfe, fucht auch auf Medern und Biefen Maitaferlarven, Regenwurmer, Beu: fdreden und andere großere Infetten, befonders Den Commer hindurch. Laftig mird er bem Jager, daß er junge Safen und Rebhuhner, Die Gier ber Fafane und andere Bogeleier ausfauft , auch Die jungen Bogel verzehrt. Im Dothfall hartes und grunes Getreide. Das Mas im Didicht, vom gefallenen Bildpret, fucht er auf. Todte Fifche frift er gern; auch Frofche und Schneden. Schalthiere foll er verzehren. indem er fie auf Steine und Felfen herabfallen lagt, wodurch fie zerfcmettern. Rleine Thiere ergreift er mit Dem Schnabel, großere mit den Rlauen. Menfoliche Leichname auf den Doch: gerichten follen fie auch angeben.

Bei gelinder Witterung sieht man schon die Kolfraben im Februar, da wo sie brüten wollen, in schönen Schneckenfreisen sich himmelan drezhen und mit einander spielen, und haben dann Anfangs Marz schon Gier. In Wäldern, auf unersteiglichen Bäumen sieht das Nest (Dorst). Bisweilen auch auf Felsenüberhängen und auf hohem Mauerwerf alter wüster Bergschlösser. Das Rest besicht aus durren Reisern, mit Erde, Lehm, Moos, Paaren und Borsten weich ausz gefüttert. Man sindet darin 4 — 5 grünlich, braun und grau gesteckte Gier, die von beiden Gatten in 3 Wochen ausgebrütet werden. Die Jungen werden mit Aas, todten Thieren, Inssetten und Regenwürmern aufgefüttert. Lestere

tragen fie ihnen in ber hautigen elafifchen Unterfeble gu, Maufe im Schnabel und großere Thiere in ben Klauen.

Sie werden von Eingeweidewürmern und Schmarogerinsetten geplagt. — Schwer lassen sie sich schwer jagen wehren sie sich tapfer gegen Menschen und hunde. Im hohen Morden pflegt man ihr zahes Fleisch zu effen, auch ihre haute mit den Federn, zu Kleidungstücken zu verarbeiten. Wir nuhen nur die Schwungsedern zum Zeichnen, Schreiben und Berkielen musikalischer Instrumente. Uebrigens vertilgen sie uns schälliche Thiere und verzehren das Aas. Der Jagd ist er sehr nachtheilig. Im Morden tödtet er neugeborne Lämmer, holt die zum Trodnen aufgehängten Fische zu.

Der Krähenrabe, Raben=, Aastrabe. (Corv. corone. Linn.)

Der Schnabel und die Mittelzehe von gleischer Lange, furzer als die Fußwurzel; der Schwanz fast gerade oder nur wenig gerundet, das Gefieder ganz schwarz. Ist übrigens kleisner und der Schnabel weniger gekrummt, als bei vorigem. Lange 18—19 J. Flügelbreite 40 J. Der Schnabel 2 J. lang, an der Spige gezahnt. Der Schnabel schwarz. Die Nasenzlöcher von borstenartigen, schwarzen Federn dicht bedeckt. Das Weibchen unterscheidet sich wenig vom Mannchen. Nicht selten findet man Bastardbrut von dieser und der Nebelfrähe.

Sm gemäßigten und warmen Guropa ift er allgemein bekannt, auch im nordlichen Ufrita, Mien und Amerika trifft man ihn, doch nicht im boben Rorden. Er liebt die gebirgigen Ge= genden, befondere Die maldigen Borberge und Feldholzer, auch die, welche von Biefen und Baden durchschnitten werden. Bum Theil find es Standvogel, theils auch Strichvogel, welche fic dann im Spatherbft in großen Schaaren versammeln, auch Dohlen gern unter fich feiden und bei eintretender rauher Witterung und Frost mit diefen fudlich mandern; bei gelinder Bitterung aber icon Ende Februar oder Un= fange Marg gurudtehren. Im Binter lagern fe fich gern auf Biefen, Diftadern und auf Saferfloppeln und übernachten gern in Reld: bolgern.

Sie find listig und verschlagen in einem hohen Grade und nahern fich nur dem arbeistenden Landmanne und dem nicht auf fie achtenden Wanderer, doch immer mit vieler Bors

^{*)} Ein so abgerichteter sprach sehr deutlich: "Wie heißt du?" Einst besuchte ein Jäger mit seinem Hunde den Herrn des Naben. Man ging in den Sarten, wo sich zufällig der Rabe im hohen Grase befand. Der Hund, der bald dessen Spur sand, stand, als er ihn gesunden. Der Nabe, der dies bemerkte, richtete sich auf und rief mit lauter Stimenne: Wie heißt du? Der Hund, hierüber erschroschen, begab sich schnell auf die Flucht. Oft wurde nachber dieser Spaß von jenen Zuschauern erzählt und belacht.

ficht, denn fobald man fie anfeht ober fteben bleibt, ergreifen fie Die Flucht. Geficht und Geruch ift febr gut, legterer fo fcarf, daß fie felbft unter der Dberflache der Erde und unter tiefem Schnee ihre Mahrungsmittel wittern. Gie geben madelnd, doch in ftolgen Schritten einher; fliegen mit langfamen Schwingungen der Flügel, aber feft und gerade, bei beiterem Wetter bober, bei fturmifder Bitterung niedri: ger. Ale fehr gefellige Bogel lieben fie nicht nur ihres Gleichen, fondern auch ihre Befchlechteverwandte, ale Rebel: und Caatfraben und Dohlen, wohin auch das Sprichwort deu: tet: ", Reine Krabe hadt der andern ein Auge aus!" - Ihre Stimme ift von der Rebeltrabe wenig gu unterscheiden, es ift ein bobes Rrab und Rraoh und ein tiefes Grab. Leicht laffen fie fich zahmen, und jung aufgezogen und wenn man ihnen das Zungenband loft, fernen fie gut und deutlich Borte nachfprechen. Allerlei Gewurme, Infetten, Reld: und Baum: früchte machen ihre gewöhnliche Nahrung aus. Mas ift ihre Lieblingespeife. In Der Brutgeit find fie besonders rauberisch, ftellen den jungen Enten, Ganfen ; Fafanen , Rebhuhnern und allem andern jungen Geflügel fehr nach, auch faufen fie allen Bogeln die Gier aus und ger= foren dadurch viele Bruten, deshalb darf man fie auch im Sause und Sofe nicht frei berum: laufen laffen. In den Mifthaufen mublen fie nach Insetten und Rornern, fangen Maufe und im Binter fuchen fie Anochen auf den Gaffen und hofen auf, die fie benagen. Im Commer befuchen fie icon in der Morgendammerung Anger, Biefen und Rafenplage, ber Regen: murmer megen, die ihre Sauptnahrung mit ausmachen, dann geht es in das Reld, um in den frifch gepflügten Furchen, dem Pfluger fich vertraulich nahernd und immer folgend, Die Raferlarven (Engerlinge), auch ausgepflugte Mäufe aufzusuchen und zu verzehren. Im Berbst fangen fie auch viel Maufe, fuchen Getreidetor: ner, Kartoffeln, Ruben, auch wohl Dbft und Beeren. Gie geben auch nach Rirfden und Ebreschbeeren. Ihr feiner Geruch lagt fie im Binter unter dem Schnee liegende Saferforner bemerken; auch fallen fie gemeinschaftlich über angeschoffene Safen und Rebbuhner ber, tobten und verzehren fie, suchen Mas und Unrath auf und freffen felbft Menfchentoth. In Stadten, Die öffentliche Bleisch : und Getreidemartte ha: ben, gieben fie ichon Ende Octobers ein. Diefe Allfraße verzehren auch Fische, Frosche, Arebse,

Rafer, Raupen, Schneden it., auch Grunes, Rohltopfe, grunes Getreide zc. Rurg fie leben wie die Schweine, bald von animalischen, bald von vegetabilischen Stoffen. Im Marg geht die Begattungszeit an, fie fonabeln fic Dabei wie Die Tauben und beide Gatten bauen das Deft. Bei und niften fie in einzelnen Barchen in den Balbern gerftreut, meift auf hoben fchlanten Baumen. Das Reft befieht erft aus einer Lage trodner Reifer, bann aus einer von Schlamm, Erde und Mood und ift inwendig mit Bolle, Schweinsborffen und andern Thierhaaren aus: gefuttert. Man findet in biefem festen Refte 4-5, bellgrunliche, grau und dunkeloliven: braun besprigte und geflecte Gier. In 3 Do: den fommen die Jungen aus, die anfangs blind find. Gie werden zuerft mit Burmern, Daufen, jungen Bogeln und bann mit Mas aufgefuttert. In diefer Periode holen fie nicht felten das junge gahme Geflügel. - Ihre Keinde find die großen Raubvogel, die fie auch fehr mit Gefchrei verfolgen. Schmaroger plagen fie von außen, und von innen verschiedene Arten von Burmern. - Man ichieft fie am leichteften auf Krabenhutten mit dem Uhu und auf den Luderhutten. Un einigen Drten, ob fie gleich einen aasabnlichen Geruch haben, ift man Die Alten, als wohlschmedend auch Gier und die Jungen. Ihr Rugen und Schaden geht aus ihrer Rab: rung hervor.

Der Nebelrabe, Schilde, Nebele, Aase, Schneee, Winterkrahe. (Corv. cornix. Linn.)

Ropf, Reble, Flugel und Schwanz fdwarz, das Uebrige afchgrau. Die Farbe und das Ba= terland ausgenommen, benn die Rebelfrabe gehort mehr bem Morden an, gleicht fie ber Borigen an Bildung der übrigen Theile, ja felbst in Rahrung und Lebensart, auch paaren fie fich mit einander und bringen fruchtbare Baffarde; fo daß der berühmte Drnithologe or. Raumann beide fur eine Urt halt und Dies durch Beobachtung und lange Erfahrung Darguthun fucht. - Die Lange unferes Bogels beträgt 183 und die Flugelbreite 40 3. 72 3. lange Comang ift am Ende beinabe ge= rade abgestumpft, oder boch nur wenig gerun: Det. Der farte, fcmarge, etwas gebogene, am Ende meift icarf gezahnte Schnabel ift 2 bis 21 3. lang, am Ende meift fcarf gezahnt, an der Burgel bis über Die runden Rafenlocher

mit fcmarzen borftigen Feberchen bededt. Das fcone dunkele, glanzende Schwarz und das fanfte reine Afchgrau flechen angenehm gegen einander ab und geben diefem Bogel ein artiz ges Aeußere. Mannchen und Beibchen untersichen fich nur wenig von einander.

Der Rorden von Uffen, Amerika und Gu: ropa ift ihr eigentliches Baterland. Rur Die Strenge bes Winters treibt fie nach Guben und fo find fie bei une ale Bugvogel. Gie lie: ben befonders folde Gegenden, Die mit 2Bald, Biefen und Gemaffern abmedfeln. Im Binter fieht man fie aber in allen Gegenden. Im Dctober geht ihr Bug an, wo fie in fleinen beerden bei uns ankommen. Im Februar oder Marg verlaffen fie une mieber, bis auf die Benigen, Die bei und niften. Gie geben bann zu ihren Standortern und fuchen ihre Refter wieder auf, beffern fie wieder aus, oder bauen in der Rabe neue. Beim erften Gonee befuchen fie Gtabte und Dorfer, und ber fonft fo fceue Bogel mird Dann fo gabm, wie die Lauben und Sperlinge.

Es find liftige Bogel, Die in allen ihren Sandlungen Borficht bliden laffen. Gie halten fich gern gu ber Rabenfrabe, gu Doblen und Saatfraben. Geficht und Geruch find fehr gut. Gie find am luftigften bei voller Rahrung, mas man befondere beim Mas, von den Luderhutten aus, febr gut bemerten fann, mo fie fpringen, fich im Schnee malgen ze. Uebrigens ftimmt alles mit ber porigen Art überein. Gie geben fdrittweise und hupfen mitunter einmal, woher Denn vermuthlich Das Sprichwort: " Die Krabe lagt bas Supfen nicht," gefommen fenn mag. Stoft eine auf etwas Unerwartetes, fo folagt fie mit ben Flugeln und bem Schwanze wie eine Droffel. Um vorfichtigften find fie bei ih= ren Bruteplagen. Gie leben bann ungefellig, ob es gleich Drte giebt, wo in einem fleinen Umfreise mehrere Barchen nabe bei einander niften. Des Rachts fchlafen fie auf hohen Bau: men. Gie folafen wenig und fehr unficher. Ihr gewohnliches Gefdrei ift: Rrah, Das verichieden abgebrochen, auch verlangert ausgefto: Ben wird. - Jung aufgezogen werden fie gabm, lernen auch leicht Worte nachsprechen, find aber wegen ihrer Unarten, daß fie g. B. fleine glan: gende Dinge fiehlen, junges Federvieh, felbft junge Sunde und Ragen todten, nicht gu em: pfehlen.

Ihre Nahrung richtet fich nach Zeit und Umftanden. Im Sommer vorzuglich Infekten, Deren Larven und Gewurme, weshalb fie auch

dem Pflüger folgen. Im Fruhjahr haden fie gern Die erfrornen Fifche aus bem Gife. Fifche freffen fe fehr gern, felbft noch lebende merden von ihnen gefangen und verzehrt. Bur Brut: geit fuchen fie Die Gier und jungen Bogel auf und murgen felbft viele junge Safen. freffen fie auch Geldmaufe, Samfter und Maul: murfe. Mas ift ihre Lieblingsfpeife. Gie geben gern nach Rirfden, lieben befondere Die Berg: firfden. Im Berbft: Dbft, Bogelbeeren, Ball: nuffe, befonders Ropftoht, grunes und hartes Getreide. Legteres fuchen fie an ben Landftra :. gen aus dem Pferdemift, weshalb fie oft die Rubrwagen begleiten und im Binter auf Difthaufen in Die Sofe geben, Diefe Rahrung fu: dend. Bei ftrengem Binter fangen fie ermat: tete Rebhuhner, franke Saustauben, jagen Raubvogeln ihre Beute ab, verfolgen angefchof: fene Safen , benen fie die Augen aushaden und fangen dann meift am After an fie gu verzehren, ja felbst menschliche Leichname geben fie an. Bu Diefer Zeit fuchen fie allen Abfall der Ruche auf ben Strafen und in den Sofen auf. Saufig trifft man fie beshalb auch bei Scharfrichtereien, wo fie fich oft um einen Anochen und ein Stud Fleifch hartnackig ganten und es einander mit Lift oder Gewalt zu entreißen fuchen.

Bum Riften mablen fie gern folche Bufde ober fleine holzungen, Die im Felde liegen, ober an Biefen, Gumpfe ober große Biehtriften flogen, fonft auch hohe Baume in Dorfern und Stadten. Bei iconem Better bauen fie fcon im Februar. Gewöhnlich beziehen fie ihr altes Reff mieder. Sonft bauen fie ein neues in 3 Lagen fertig, mogu bas Mannchen und Beib: den eine Menge durrer Zweige gufammentra: gen. Darauf legen fie Moos, Lehm und Erde, womit fie es gleichsam ausmauern, dann folgen meift Schweinsborften und andere Thierhaare. Im Refte findet man 3 - 5 grunlich afchgrau und bunkelolivenbraun befpriste ober geflecte Gier, Die binnen 3 Bochen beide Gatten aus: bruten. Die Jungen werden blind geboren und mit Regenwurmern und Infeftenlarven, Rafern, Maufen und Mas aufgefüttert, auch fchleppen ihnen die Alten, wie die vorige Art, junges gahmes Geflugel gu. Gie machen 2 Bruten. -Much fie merden von Gingemeidemurmern und Schmarogern im Gefieder geplagt. Der. Uhu ichadet ihrer Brut und der Sabicht (Falc. palumbarius) fångt fie figend, daher verfolgen fie ihn unaufhorlich foreiend. Den Laubenfal= fen (F. peregrinus) furchten fie fehr. Alle

Raubvogel, ja alle Raubthiere verfolgen fie und verrathen dem Jager nicht felten diese durch ihr Befdrei, befonders Sudfe, die nicht felten eine bei Diefer Gelegenheit ermifchen. Man fangt fie mit Angelhaten, woran man tleine Studden Bleifch, die fie leicht verschlucken konnen, macht und nachdem fie den Saden verfchludt, bleiben fie an dem befestigten Faden hangen, desglois den in Tellereifen, Die man gut verfteden muß, fo daß fie das Gifen nicht mohl, aber das Stud Fleisch darauf leicht feben. Auch mit. der Nux vomica (Rrahenauge); man erhalt diese Fruchte in der Apothete, zerftogt fie und mifcht fie un: ter gehadtes Rleifch. Gie werden Damit vergiftet. Man muß dabei Borfict brauchen, um Damit fein nugliches Thier zu todten. Auch mit Papiertuten, worein man ein Stud Fleifd thut und den Rand mit Bogelleim beschmiert; man Reckt Diese in Schnee oder Mift. Um leichteften fcieft man fie auf Rrabenbutten, vermittelft Des Uhu's.

Rugen und Schaden mit vorigen gemein.

Der Saatrabe, Saatkrabe, Grind:

(Corv. frugilegus. Linn.)

Der fehr geftredte Gonabel 21 - 21 3. lang, an der Burgel 10 Linien boch, flumpf= Schneidig, ungezahnt, der obere Riefer etwas langer als der untere; die Flugel lang, Der Schwang fart: abgerundet; Farbe des gangen Bogels fcmarg, mit blauem und violettem Schiller. Alter Bogel: die Gegend über Den Rafenlochern und um Die Schnabelmurgel herum mit einer weißlichen, tahlen und icabi: gen Saut bededt, in welcher fich hin und wie: Der Die Stoppeln im Aufteimen erftickter Federn zeigen. Junger Bogel: Die Gonabelmur: geln (Balftern) mit Federn und Die Rafenlocher mit ftarren Dicht anliegenden Borftenfedern be-Dedt. Lange 18, Flugelbreite 3713. Mannchen und Beiben find femer zu unterfcheiden.

In Europa bewohnt sie nur die gemäßigten Theile. Sie ist ein Zugvogel und überwinztert nur in milden Gegenden Europas. Im October und November ziehen sie in ungeheuzen Schaaren weg. Ihr Lieblingsaufenthalt ist das Feld. Sie leben gern in großen Gesellschaften bei einander, um so drohende Gefährlichkeiten zu bemerken und ihnen zu entgehen. Dohlen leiden sie gern unter sich. Bei hellem, sillem, warmen Wetter schwingen sie sich im Sommer oft.

ichaarenweise gu einer Sohe hinauf, daß fie bas Auge kaum erreichen kann; drehen sich da eine Beit lang in beständigen Rreifen herum und fturgen fich fodann oft pfeilfcnell, mit angezon genen Flugeln, wie Sturmgebraufe auf Die Erde herab. Man prophezeit daraus farten Bind. Gern ichaufeln fie fich beim Binde, und rufen dabei hoch und angenehm: firr; turr, frua u. f. m. In der Rabe ihrer Reffer machen fie zur Brutzeit oft allerlei artige Comentungen, fets in fleinen Gefellschaften, dabei beständig. fcreiend. Den Tag über suchen fie ihre Rahrung auf den Feldern, des Rachts ichlafen fie in Bor: und Feldholzern. Gpat geben fie gur Rube. Mit Anbruch Des Lages fliegen fie mieder im großen Truppen auf die Felder. Ihre Stimme ift ein tiefes, heiseres Rrah, Kroah, auch bieweilen ein hohes Rirr, - Rurr,-Rroja. Jung laffen fie fich leicht gahmen, lernen aber nur mit Dube menfchliche Worte nachfprechen. Ihre vorzuglichfte Rahrung ma: den Regenwurmer, Infetten und deren Larven, auch nadte Schneden, aus, weshalb fie auch gern bem Pfluger folgen. Die Maitafer haben es bei ihnen schlimm, fie fuchen fie auf ben Baumen auf, und die durch ihr Fliegen auf die Baume, herabfallen, lefen die darunter geben= den auff. Ja die foon gefattigten Rraben fout: teln fie fur bie noch unten herumlaufenden hungrigen Rraben berab. Ihr Geruch leitet fie Die Regenwurmer und unter der Erde lebende Larven und Infekten zu mittern und fie berauß: Buhaden, mober ber Grind am Schnabel und Ropfe kommt. Bei Mangel an Insekten und Burmern freffen fie allerlei Getreidekorner, porzuglich Safer und Baigen, auch feimende Samen. In Die Schoten geben fie der Infetten wegen und freffen dann auch die wurmflichigen. Ruben und Rartoffeln nur im Rothfall. Gern freffen fie Rirfden, Brombeeren und Gbrefd: beeren.

Schon im Februar, bei warmem Wetter, fommen sie wieder zu uns und suchen die alten Brutorter wieder auf. Rleine Feldholzer, Enzden und Eden größerer Balder, wahlen sie zur Anlage ihrer Nester. Dier sind sie in so großen Gesellschaften beisammen, daß ein Baum oft 12—15 Rester aufzuweisen hat. Es herrscht um die Baustellen ein großer Streit. Stets muß eins von dem Parchen da bleiben, sonst wird die Baustelle sammt dem Material eine Beute der Nachbarn. Die Unterlage besteht aus durren Reisern, inwendig ist das Nest mit haaren,

Soweineborffen, burrem Grafe, Moos und Erbe ausgefüttert, fo fann es, in beträchtlicher Dobe, einem Schuf Schrot widerstehen. Diefe Colonien in der Rabe der Menfchen find durch ibr fortmabrendes Gefdrei vom Morgen bis in Die Racht unausstehlich. - Das Beibchen legt 3-5 Gier. Ihre Form ift langlicher ale Die ber vorhergehenden und die Grundfarbe blaß: grun, mit aschgrauen und dunkelbraunen Gle= den und Punften bezeichnet. Die binnen 3 2Bo: den ausgebruteten Jungen find anfanglich blind und nadt. Gie merden mit Infetten, beren Larven und Regenwurmern groß gefüttert. Gie tragen fie ihnen in der fich weit ausdehnenden Unterfehle gu. - Much fie merden von Coma: rogerinfetten und Gingeweidemurmern geplagt. Der Banderfalte, Suhnerhabicht und Uhu find ihre Sauptfeinde. Den Fuche verfolgen fie mit Gefdrei; nicht felten ermifcht er eine. Im Bin: ter fann man fie auf Bogelheerden fangen. Biele Junge buffen ihr Leben bei dem fogenannten Rrabenfchießen ein, wo fie außerhalb des Reftes figend, unter furchtbarem Gefchrei ber Alten, jum Bergnugen berabgefcoffen werden. Arme Leute effen fie bei uns gern. Gie todten außer den Infetten auch die Maufe in Menge. Ihr Rugen und Schaden ergiebt fich aus ihrer Rahrung.

Der Dohlenrabe, Schneegace, Thurmrabe, graue und schwarze Doble! (Corv. monedula, Linn.)

Der Scheitel, Flugel, Ruden und Schwang fdwarz, der Unterleib fdmarggrau, Bangen und'Dberhals afchgrau, an der Salswurzel fieht auf beiden Seiten ein glanzend grauweißer Fled. Es ift Die fleinste unter den deutschen Raben: artent Lange 13, Flugelbreite 281 3. Der 58 3. lange Schwang nur wenig gerundet. Der Schnabel 14 3. lang, zugespigt, ungezahnt, Der Augenstern blaulichweiß, bei ben Jungen braun. Mannden und Beibden fdmer zu un: terscheiden. Gie bewohnen Guropa und Affen. In unferem Erdtheile treffen wir fie haufiger im Morden, als im Guden. Gie wohnen bei uns nicht in großen Balbern, fondern in Feldhol: gern, wo es hohle Baume giebt, oftere bei den Saatfraben, deren Gefellicaft fie fehr lieben; allein mo fie es nur irgend haben tonnen, gieben fie den Aufenthalt in Stadten und Dorfern vor, wo fie dann auf Thurmen, Schloffern, Rirchen und andern boben Gebauden, worzuglich den

alten gothifden, wohnen. In ben größten und volfreichsten Stadten find fie am liebsten. Um Lage besuchen fie in Schaaren Biefen und Meder; Die Nacht bringen fie auf Dadern hoher Gebau-De ober auf Baumen, befonders den Grien gu. Ihre Buggeit fallt in ben October und Rovem: ber mit ben Gaatfraben, mit benen fie auch gern mandern. Biele bleiben auch bei une. Un= fange Marg tommen fie wieder. Bei hohem Die hier bleiben Schnee geben fie fublicher. besuchen in Stadten und Dorfern Gaffen und

Sofe, Mahrung fuchend.

Es find unruhige folaue Bogel, Die viel Gewandtheit befigen. Unter fich find fie gantifc und neden einander beständig. Gie feben fehr liftig aus, fliegen fcnell und ihre Buge erheben fich oft fehr hoch; fie dreben fich dabei, theils fo ju ruben, theils fich wieder ju fammeln. Bei vorstehender übler Bitterung, ale Regen, Conee: bufden, Sturm ic. find fie außerordentlich un: ruhig, fliegen in großen Schaaren und mit un: unterbrochenem Gefdrei. Gie fpielen fehr gern, ergogen fich im Fluge oftere durch fuhne Ben: dungen, durch Steigen und Fallen, und machen besonders bei fartem Binde allerlei artige Schwenfungen in der Luft. Ihre Stimme ift ein hohes Krah, ein noch hoheres Jad, Ja= de, Ria und Rrichab. Diefe Stimmen laffen fie beständig unter einander horen. Junge und alte Dohlen werden fehr gahm. Die Erfteren lernen, wenn ihnen die Bunge geloft, Borter nadfprechen. Leicht laffen fie fich erhalten, in: dem fie mit dem Sausgeflugel freffen. Ja eine Gegahmte fernte fraben wie ein Sahn und ahmte das Gefdrei der Buhner nach.

Ihre Sauptnahrung besteht in Infetten, De: ren Larven und Regenwurmern, weshalb fie auch auf den Diefen das Gras auszupfen, um Die an den Burgeln figenden Maden gu befom: men. Schafen und Schweinen lefen fie das Un= geziefer ab. Begleiten auch die Pfluger, um die mit ausgepflügten Burmer und Insetten zu fpeifen. Gie freffen auch Getreide, befonders gern Maizen, weshalb fie auch befaete Felder und Misthaufen mit besuchen. Freffen auch gern Maufe und junge Bogel, auch gern Feldknoblauch (Allium vineale und A. oloraceum), movon fie in dieser Zeit finten. Gie gehen auch nach Rirfden, Pflaumen und Bogelbeeren.

Gie niften in Gesellschaft. Gern mablen fie ju Brutortern die Sohlen und Rlufte der Mauern. Gie machen in ihr Reft geringe Unterlagen von Strob und Reifern, Deu, Saar und eini:

gen Federn und legen 4 - 6 Gier, Die blag blau: grunlich, fcmargbraun und afchgrau getupfelt find. In 18-20 Tagen fommen Die Jungen aus, die mit Infetten und Gemurme aufgefüt: tert werden. Bo Dohlen wohnen, nimmt auch Bant und Streit unter Diefen muthwilligen Ge: Schopfen fein Ende. Denn bald ftreiten fie um Die Sohlen und andere Bruteplage, bald ftehlen fie einander Die Baumaterialien. Saben fie Junge, fo fliegen fie bald ab, bald gu, und er: bliden fie einen Raubvogel, fo bricht die gange Shaar mit graflichem Larm gegen ihn los und verfolgt ihn ftundenweit. Fuhlen fich die Jungen einigermaßen, fo machen fie es wie die jungen Rraben, fleigen aus dem Refte und fegen fich por die Soble, wo fie ausgebrutet; tehren aber Abende wieder ins Rest zurud, bis fie den Alten ins Feld folgen tonnen. Banderfalten, Sabich: te, Marder und Ragen verzehren fie und ihre Brut; auch merden fie von Schmarogerinfeften und Gingeweidemurmern geplagt. Man fcbießt fie, fann fie auch auf frifden Medern auf Deer: ben mit einigen lebendigen Dohlen fangen, auch mit abgerichteten Falfen baigen. Das Fleifch der Jungen ift mohlichmedend. Jung aufgego: gen lernen fie fprechen und ergogen durch ihr Betragen, fehlen aber auch glanzende Sachen. In Stimme und Geberben fann man bevorfte: bende Betterveranderungen bemerten. Rugen und Schaden geht aus ihrer Rahrung hervor. Im Binter ruiniren fie neue Strohdacher febr; allein Das Aufhangen einiger todten Dohlen oder Rraben fdeucht fie bavon gurud. Ueberhaupt überwiegt ihr Rugen den Schaden weit.

Die glanzende Krahe. (Corv. splendens.)

Die Lange 14—15 3. Das Mannchen etmas größer als das Beibchen. Stirn, Gesicht,
Gurgel glanzend schwarz, Kopf, Racen und
Brust aschgrau, ins Rothliche schillernd; Bauch,
Schnabel und Unterleib schiesergrau; Flügel,
Rucen und Schwanz glanzend schwarz, mit
Biolet und Purpurglanz; Schnabel und Füße
schwarz. Dieser Bogel lebt in Menge an den
Ufern des Ganges, wo zahlreich der indische Geier (vurt. indicus) bei den Cadavern
weilt, welche der Ganges an die Ufer wirst,
da dieser Fluß den unteren Kasten der hindu
zur Grabstätte dient. Die dortigen Geier haben
eine große Art Läuse, welche diese Krabenart,
auf ihren Rucen sigend, ihnen abliest, was

fie fo gedulbig, wie mehrere Saugethiere, Denen es ahnliche Bogel thun, leiben. In ber ubrigen Lebensart ift fie unferen Krabenarten gleich.

E 1 st e r. (Pica.)

Rleiner ale eine Rrabe, ebenfalls mit mehr gewolbter Dberkinnlade und langem abgestumpften Schwans.

Der Elsterrabe, Elster, Aelster, Gartenfrahe.

(Corv. Pica. Linn.)

Schwarz mit verschiedenem Schiller, Unter: bruft und Schulterfedern weiß; der 10 3. lange Schwang feilformig. Lange mit dem Schwange 173 3. Flugelbreite 233 3. Die in Rube liegen: den Flugel bededen faum ein Drittel des Schman: zes. Der Schnabel 12 3. lang, die runden Rafenlocher bedecken Borftenfedern. Es ift bei seinen einfachen Farben doch ein recht niedlicher Bogel. Die Bruft, vom Kopf bis an den Bauch und die Schultern' find ichneemeiß, der Unter: ruden in Gestalt eines 1 3. breiten Gurtels, weiß mit grau gemischt; alles Uebrige, bis auf Die inneren Sahnen ber großen Schwingen, fdmarg. Diefe legteren find nehmlich nur auf der außern schmalen Fahne und an den Spigen fcmars, das Uebrige Derfelben weiß. Gin berr: lider Metallidiller ift auf dem Gefieder verbrei: tet. Das Beibden gleicht Dem Mannden, Doch ift der Glang auf dem Gefieder matter.

Diefer Bogel ift über gang Guropa, das nordliche Uffen und Amerika verbreitet und in Deutschland überall bekannt. Die Elfter balt fic gern in der Rabe der Stadte und Dorfer auf, in großen Baumgarten und fleinen Solzungen, mo: von Feld und Biefen und menschliche Bohnun: gen nicht weit entfernt find. Die Barchen hal: ten fich das gange Jahr beifammen und in dem: felben Begirt. Die Jungen ftreifen im Binter von Dorf zu Dorf. Schon von weitem erfennt man die fliegenden Elftern an dem langen Schwanz und den abgerundeten Flugeln. Der Flug ift fcwerfällig, gerade, mit haufigen Flus gelichlagen. Mit bem Schwanze mippen fie be: ftandig. Ihr Gang ift madelnd. Hebrigens find fie listige, muntere und fede Bogel, dabei fcheuund vorfichtig. - Jung mit Fleifc, Brot, Quart zc. aufgefüttert lernen fie Borte nach:

fprecen und turge mufitalifde Stude pfeifen, laffen fic auch jum Mus: und Ginfliegen gewöh: nen. (Bir hatten einft eine folde abgerichtete Elfter, Die unter andern die Worte: Jatob und gnadige Frau fehr Deutlich fprach, babei aber auch gern glanzende Gaden fahl. Spaghaft verfeste fie oftere Die Borte und fagte: fatt gnabige

Frau, gnabige Jatob.)

Ihre gewöhnliche Stimme ift ein rauhes Shad ober Rrad - Shaderad - und Schadaraf:faf; welche Tone fie bei Erbli: dung einer Gefahr fehr heftig und oft hinterein: ander ausrufen. Sonft hort man auch noch ein abnliches freischendes: Schaaf od. Rraaf und ju Anfang bes Frublings eine Art von Gefang. Man bort es am anhaltendfien bei der Begat: fung, auch wenn mehrere Mannden um eine Braut werben, und ihre Gefdmagigfeit ift daher jum Sprichwort geworden. Ihre Rahrung befieht in Infetten, beren Larven und Puppen und in Gemurmern. Im Berbft Dbft, Bogelbeeren und allerlei andere Baum : und Feldfruchte; im Binter Mas, im Nothfall Getreibeforner. Sm Fruhjahr wird fie am ichadlichften; fie plundert dann die Reffer anderer Bogel, ale Rebhuhner, Fafanen 2c., raubt Gier und Junge, fcont auch bas Sausgeflugel nicht. Fangt Maufe und alte Bogel, die fich deffen gar nicht vermuthen, und padt fie wie ein Raubvogel mit den Rrallen. Mle ein Alfraß genießt fie fast alles aus bem Thier : und Pflanzenreiche.

Ihr Reft bauen fie oft fcon im Februar fertig, in der Rabe bewohnter Drte, gewohnlich in die ichlanten, oft unerfleiglichen Gipfel der hochften Baume, felten niedrig. Die erfte Unlage beffeht in durren Reifern und Dornen; in: wendig mit Roth ausgeflebt, und die innerfte Lage besteht aus feinen Burgeln und Thierhaa: ren; oben hat es eine Dede von Dornen und trodnen Reifern und ber Gingang geht auf einer Seite hinein. Man findet darin 7-8 grunliche mit Braun gesprenfelte Gier, Die in noch nicht vollen 3 Bochen ausgebrutet werden. Die Jun: gen merden mit Infekten, Gemurmen, Erdmaft, auch wohl mit jungen Bogeln und Mas aufge: futtert. Der Buhnerhabicht ift ihr Sauptfeind. Sie laffen fich fcmer fchiegen, am leichteften noch auf der Rrahenhutte und da, mo fie Racht: ruhe halten. Gie fcaden durch ihre Raubereien fo fehr, daß man fie mit Recht in die Acht er:

flårt hat.

Die gehaubte Elfter. (Pica gubernatrix. Temm.)

Etwas größer als vorige; 19-20 3. lang. Baterland: Mexifo. Auf dem Borderfopfe fieht ein Federbufd von 10 - 12 fcmalen, gerade auf: fichenden Federn, am Ende find fie breiter, fcwarz, mit blauem Schimmer; über Die Augen weg lauft lange bem Rande des Schnabels eine fcmarze Linie, Die fich gegen ben Sals hinunter= Bieht, und auf der Bruft einen Gurtel bildet; eine 2te fdmarge Linie lauft von ber Schnabels ede gegen ben Raden und folieft die Sollafge= gend ein, welche reinweiß ift. Bugel, Borber: hale, Bruft und die untern Theile des Rorpers find ebenfalls meiß, das hinterhaupt grunlich, Die übrigen Theile Des Dberforpers grau blaus lich; Die 4 mittleren Schwanzfebern und ber größte Theil der Seitenfedern des Schwanzes hellblau, Die Seitenfedern mit reinweißer Spige.

Die himmelblaue Glfter. (Pica, azurea. Temm.)

Co groß wie die europaische, der Schwang furger und tonifc, Die Flugel etwas langer, bis gur Mitte des Schwanzes reichend. Ropf und Borderhals icon ichwart; Die andern Theile des Korpers, Flugel und Schwang himmelblau. Mannchen und Beibchen feben einander gleich. Baterland: Brafilien und Paraguan; wird leicht gabm und halt gut aus.

Saher. (Garrulus.)

Beide Rinnladen wenig geftredt und rafc in eine gleichformige Rrummung endigend. Ihre folaffen gefchligten Stirnfedern richten fich im Borne mehr oder weniger auf.

Der Cichel=Beber, Baber, Rughader, Solaschreier.

(Garrul. Corv. glandarius. Linn.)

Sauptfarbe graurothlich, Die Dedfedern ber vordern großen Schwingen mit abmechfelnden fcmargen, blauen und weißen fcmalen Quer: binden durchzogen. Die Lange Diefes fconen Bo: gele beträgt 131, Die Flugelbreite 221 3.; Die Lange Des wenig abgerundeten Schwanzes faft 7 3. und die ruhenden Flugel bededen denfel: ben faum jur Salfte. Der ichmarge Gonabel etwas über 1 3. lang, nabe an ber Spige ge-24 *

gabnt. Die runden Rafenlocher merben von borftigen, weißen und fcwarz gestrichelten Federn bededt. Die Gris perlfarben. Die Scheitelfe: dern find lang und konnen als eine Solle ober Bederbufch aufgerichtet werden. Ihre Farbe ift weiß mit einem lanzenformigen schwarzen, blaulich begrengten Gled in der Mitte; Die Bugel gelblich weiß, fdmarg gemifcht, und von der un: tern Rinnlade läuft ein langlichter, fcmarger Fled neben der Rehle herab; Die Rehle weiß; der hintertheil des Ropfes und Salfes bleich braunrothlich oder fcmugig purpurfarben, mit Afchblau überlaufen, der Ruden von gleicher Farbe, nur dunfler, und die Dedfedern Des fdwarzen Schwanzes nebft Bauch und After weiß. Alle fleinen Federn find zerschliffen und fo meich wie Seide anzufuhlen. Am Beibchen find Die Ropffedern etwas furger und Die Farben des gangen Gefieders meniger lebhaft.

In allen nordlichen und gemäßigten Thei: len Guropas und Uffens findet man diefen Bo: gel, besonders in den Bormaldern, wenn fie aus gemischtem Laub : und Radelholz bestehen und viele Giden haben. Die bei uns wohnen, find. Strichvogel, die meiter nordlich mohnenden aber Bugvogel, Die im Berbft bei uns antommen. Gie ziehen Unfangs Geptembers und Anfangs Detobers heerdenweise und weilen da, mo es viel Gicheln, Buchedern und dergl. giebt. Er hat einen ziemlich schwerfalligen Flug und macht ungern weite Streden. Auf Der Erde hupfen fie ziemlich ungefchidt. Es find muntere, fede, listige und außerst verfclagene Bogel, Die aller: lei poffirliche Stellungen machen und bald die Ropffedern hoch aufftrauben, bald glatt nie: berlegen. Ihre gewohnliche Stimme ift ein frei: fdendes, durchdringendes: Raatfd, ratfd, und ein gedampftes Rraa, Dies icheinen Freu-Dentone zu fenn. Da die folgenden das Gegen= theil zu bezeichnen icheinen, als: fraeb, fab, oder fraah, fraa, mas oft wiederholt mird. Der Zon : Diab fceint ihre Lodftimme gu fenn. Sonft machen fie es auch wie eine Rage: mau, desgleichen vernimmt man auch die Gilbe: Marfolfus. Ueberhaupt ahmen fie wie die Bur: ger, Stimmen anderer Thiere nach. Die Alten werden fast nie gabm, dagegen lernen jung auf: gezogene Melodien nachpfeifen und menfcbliche Worte nachfprechen.

Ihre Nahrung besteht im Commer in Regenwurmern, Insetten und deren Puppen und Larven, Die fie unter dem Moofe aufsuchen, in

fleinen Frofden, Maufen, Bogeleiern und jungen Bogeln, allerlei Dbft und Beeren. Im Berbft und Binter Safelnuffe, Gicheln, Buchedern und allerlei Baldfruchte. Bei gutem Berbftwetter tragen fie fich auch Borrath ein. Reife Mehren von Roggen oder Baigen verschluden fie gang. Die Gideln, welche ber beher gang verfdludt, erweicht er erft im Rropfe. Gicheln frift er febr gern und weiß fie fogar im Binter unter bem Conee durch feinen Geruch aufzufinden. Bei fehr ftrenger Ralte fucht er in Radelmaldungen Cous. Dem jungen Geflugel thut der Deber viel Schaden. Die Jungen futtert man mit Gemmel in Mild gequellt auf, fonft freffen fie alles, mas auf den Lifch tommt. Gie niffen in allen großern Baldungen Deutschlands, fo daß man oft Unfange Upril Die Gier findet. Bald fieht das Reft im Gipfel, bald in ber Mitte eines Baumes. Der innere tiefe Rapf des Reftes ift mit dunkelbraunen garten Bur: zelchen ausgelegt. Man findet darin 5-7 meiße etwas langliche Gier von grobtornichter Schale und matter Dberflache, die auf einem fcmugig gelblich weißen oder weiß grunlichen Grunde mit mattem Graubraun und Braungrau überall befprigt und punktirt find, an welchem die dunkle Farbe am flumpfen Ende oft in einen Krang Bufammengefloffen ift und nicht felten bier noch einzele Saarzuge und Puntte von ichwarzer Farbe haben. In Sammlungen verschwindet Die grune Farbe bald gang und die Fleden und Punfte werden auch bleicher. Gie bruten 16 Lage, Die Jungen werden mit Raupchen, Infektenlarven, Rafern, Regenwurmern und jungen Bogeln auf: gefüttert. Die Jungen verlaffen das Reft bald. Der Suhnerhabicht, milde Ragen, Baummarder und der Uhu find ihre Feinde. Go plagen fie auch Schmarogerinfetten und Gingeweidemur: mer. Es find icheue Bogel, die fich ichwer ichießen laffen. Man fangt fie auf Bogelheerden in Dobnen entweder nach den vorgehangten Beeren, oder nach den gefangenen Bogeln, auch in Gpren: teln, wenn man einen Bufdel Safelnuffe por= bangt. Auf Beherhutten, einem eigende fur fie angestellten Fang, werden fie mit Leimruthen haufig gefangen, indem man fie mit eigenen To= nen auf der Gulenpfeife oder Bichtel anlocht und eine lebendige oder ausgestopfte Gule aufstellt, die fie begierig, wie den Uhu und andere Raub: thiere, mit großem Gefdrei perfolgen. (Bedft. Gemeinnug. Raturg. Deutschl. B. II. G. 1252 ift Diefer Fang genau befdrieben.)

Ihr Fleifch schmest gut. Sie vertilgen viel schabliche Insetten. Ihr angstliches Geschrei dient dem Jäger als Anzeige eines Auchses oder anzbern Raubthieres, und durch das herumtragen der Eicheln und anderer Baumfrüchte pflanzen sie diese Baume fort. Den Baumansaaten thut dieser Bogel Schaden. Der heher frist auch junzge Achren des in der Nahe seines Aufenthaltes stehenden Getreides; fliegt nach reisen Kirschen, Pflaumen und frühen Birnen; in den Dohnen gefangenen Bögeln hacht er das Gehirn aus und thut den Bruten anderer Bögel viel Schaden; verrath auch oft dem Bilde den anschleichenden Jäger durch fein ängstliches Geschrei.

Nußfnacer. (Caryocatactes. Cuv.)

Ihre Kinnladen find gleichformig zugespigt, gerade und ohne Biegung. Rur eine Art.

Der Tannen = Heher, schwarzer Holz=

(Caryocat, Corv. Caryocatactes, Linn.)

Mit geftredtem, fast geradem, rundlichen Schnabel, Sauptfarbe dunkelbraun, mit tropfen: artigen weißen Gleden, Der Schwang fdmarg mit weißem Ende. Der gange Sabitus ift ra: benartig. In der Lebensart gleicht er dem Gidelheher. Geine Lange beträgt 121, Die Flu: gelbreite aber 23 bis 24 3. Der abgerundete Schwanz ift 45 3. lang. Die ruhenden Flugel bededen fast & der Schwanzlange. Der glangend ichwarze Schnabel ift gegen 2 Boll lang, beinabe gang gerade. Inwendig hat der Unterfiefer einen bornigen erhabenen Bulft der Lange nach, Der ziemlich in der Mitte anfangt und fast bis gur Spige reicht; ift dem boder in einem Ammerschnabel abnlich, nur daß er im Unterficfer feinen Gig hat. Die Gris im Muge braun. Diefer Deber hat einen etwas großen Ropf und ein ziemlich loderes, feines, feibenartig weiches Gefieder. Die Flugel find fcmarg mit einem fdmaden blauliden Schimmer. Der Flugelrand braun und weiß geflecht. Bei dem Beibchen ift Die Grundfarbe lichter, Die weißen Glede nicht fo icharf begrengt, auch haben fie meift einen großern Umfang, weshalb fie mehr geflect ericheinen. Man bat von diefem Bogel mehrere Barietaten.

Diefer Bogel ift weit verbreitet, nicht allein uber gang Gurapa und das nordliche Affen, fondern auch über viele Theile von Nordamerita. In Deutschland gehort er nur in manchen Gegenden zu den feltenen Bogeln, boch ift er nir: gende gemein, im fudlichen haufiger, ale im nordlichen. Er liebt fille Gebirgemaldungen und ift daber haufig in der Schweiz. In fud: lichen Gegenden ift er blos Strichvogel, in den nordlichen mehr Zugvogel. Doch ift er einer von den Bogeln, welche nicht regelmäßig alle Sabre ziehen, fondern nur in gemiffen Sahren. Sie gieben in Meinen Gefellschaften ju 6 bis 8 Stud, foreien felten und verlaffen bas Gebufc nur aus Roth, daher merden fie meniger bemertt als andere.

Im Commer bewohnen fie die flillen einfamen Baldungen der Gebirge, fowohl von Nadel : als Laubholz, besonders da, wo es freie Plage und Quellen giebt. Im herbst streifen fie aber dahin, mo es Gichen : und Buchenmal: der giebt und vorzüglich viel Safelnuffe machfen. Im April eilen fie ihren Brutortern wieder gu. In hiefigen Gegenden feben mir fie felten, aber in dem Thuringer Balde fieht man fie zu allen Sahreszeiten. Man halt fie fur dumm, es fcheint indessen mehr eine gewisse Zutraulichkeit zu den Menschen zu fenn. Dies zeigt er befonders ba, wo er wohnt, vorsichtiger ift er auf feinen Bugen. Auf dem Refte, wo fie bruten, foll man fie mit einem Stode todt fclagen, und die Jun= gen von den Zweigen mit den Sanden nehmen tonnen, weshalb ihn auch die Thuringischen birten den Unfduldevogel nennen follen. Indeffen ift er doch weit rauberischer und gefraßi= ger als der Gichelheher. Seine Stimme ift ein freischendes, weittonendes: Kraf, fraf, fraf: und ein etwas hoheres oft hinter einander aus: gerufenes: Rorr, forr, forr! Legteres bort man am haufigsten im Frubjahr. Erfteres bei ihnen auffallenden Gegenflanden.

Diefer heher lagt fich leicht zahmen, ahnelt im Betragen dem großen Burger und gewöhnt fich an allerlei Nahrungsmittel, darf aber nicht unter andere Bogel, indem er fie wurgt, den Cichelheher nicht ausgenommen. Er außert hier steinen rauberischen Sinn, ein unbandiges Benehmen und ist unerfättlich. hat er feine Ruffe und dergl., so zermeißelt er das holz seines Kafigs. Wahrscheinlich braucht er auch seinen starten Schnabel in der Freiheit die Rinde der Baume aufzuhaden um die darunter befind.

lichen Inseften bervorzuholen. Die Rahrung bat er mit dem Borigen gleich, frift aber noch lieber Fleifch ale jener. In ben Dohnenftegen frift er die Gefangenen, hadt ihnen aber ftete erft das Gehirn aus, ehe er fie frift, holt die Lodvogel vom Bogelheerde, ja aus den Raffe gen. Er tragt auch Borrath ein. Gicheln er: weicht er im Rropfe, fpeiet fie bann aus, loft Die Schale ab und verzehrt nur den Rern. Safelnuffe haut er auf. Deift lefen fie erft fo viel Dafelnuffe, als der weite Schlund faffen fann, auf, fliegen damit an eine bequeme Stelle und fpeifen fie dann. Bo Safelnuffe find, weilt er fo lange, bis fie alle find. Buchnuffe gicht er ben Gideln vor und die Ruffe des Arvenbaums (Pinus Cembra) gehören zu feinen Lederbiffen. Er frift in der Gefangenschaft alles, mas auf Den Tifch kommt, fonst Gemmel in Milch gequellt, dabei oftere Bleifch, befondere Rindeberg.

In Gebirgemaldern niftet er, gern in ber Ra: he von Quellen in boble Baume, Anfange Aprile. Sie legen 5-6 Gier, welche fcmugig gelbgrau aussehen und mit einzelnen roftbraunen und feinen dunkelbraunen Flecken und Punkten bezeichnet fenn follen. Gin Anderer befdreibt fie glangend, einfarbig hellgrau und von fehr run-Der Gestalt. Die Jungen werden mit Insetten, beren Larven und Regenwurmern aufgefüttert. Gie follen bas Reft bald verlaffen und fich ne= ben einander auf Zweige fegen und leicht greifen laffen. Feinde des Borigen. In der Brutzeit und bei Safelnugbufden find fie leicht gu foie: Ben, fonft fangt man fie in Dohnen und auf Bogelheerden. Ihr Fleisch fcmedt nicht übel. Bo fie haufig find, wie in der Schweis, thun fie den Solgansaaten viel Schaden, indem fie fogar den Samen aushaden. In manchen Begenden lofet man die Fange, wie bei dem Bo= rigen, bem Jager aus.

Feber fchnabel. (Kitta. Temm.)

Mit kurzem converem Schnabel, gebogener Firste, die Spige zur Seite mit einem kleinen Zahn versehen. Die Rafenlocher an der Schnabelwurzel, in einer Grube, rundlich, mit Federn, welche nach vorwarts und hinterwarts fleben, gang bedeckt. Das reiche Gefieder fehr weich.

Der meergrune Federschnabel. (Kitt. thalassina. Temm.)

Lange etwas über 11 3. Baterland: Java und Sumatra. Der größte Theil des Körpers feladongrun, am Mundwinkel entsteht eine sammetschwarze Binde, geht durch die Augen und umgiebt das hinterhaupt; der Schwanz dunzkelgrun; die Flügel lebhaft kastanienbraun; Regenbogenhaut, Schnabel und Beine lebhaft lactroth. Mannchen und Weibchen unterscheiden sich nicht in den Farben.

Der grüne Federschnabel. (Kit. virescens. Temm.)

Långe 13 3. Baterland: Reuholland. Auf ben Flügeln eine weiße Fledenreihe. Dben ichon grun, hinterhals olivengrun, weiß gefledt. Borz dethals graugrun mit weißen Fleden. Bruft und Oberbauch olivengrun, mit weißen Fleden, Unterbauch und Steiß weißgrau, mit weißlichen Schaftstrichen, die Schwungsedern an der insern Fahne mattschwarz, die außere grun. Schwanz: olivengrun. Mannchen und Beibchen fast gleich.

Rafe. (Coracias: Linn.)

Ropf bicht mit Febern bededt. Gonabel mittelmäßig, von den Geiten nur wenig gedrudt, beide Rinnladen an der Spige etwas abwarts gebogen, Die obere mehr und etwas langer, Die Schneiden mefferformig; an den Binteln ftarre Bartborften. Die Rafeniocher nabe an der Conabelmurgel, feitlich, rigenformig, nur nach unten geöffnet, von oben der Lange nach, mit einer harten Saut halb gefchloffen. Die Bunge fdmal, fast linienformig, an der Spige perga= mentartig und in Frangen gerriffen. Die Fuße turg, ziemlich fart, 4zehig. Die Flügel lang. Im Sabitu haben fie Aehnlichkeit mit den Bienenfressern (Merops) und in der Lebensart mit Den Burgern. Gie leben von Insetten und Burmern, find icheu, ungefellig und bewohnen die Walder. Die einzige in Deutschland vortommende Art, ift ein Zugvogel. Ihre Anatomie zeigt mandes Merkwurdige, mas fie ben Gie: vogeln und Spechten nabert; 2 Ausschnitte im Bruftbein, ein einziges Paar Musteln am untern Larnnx, einen bautigen Magen, viele Luft: gellen, und der großte Theil der Anochen ift pneumatifd.

Der Blau : Rate, Mandelfrabe, beutscher Papagan.

(Coracias garrula. Linn.)

Sauptfarbe blaugrun; ber Ruden bell gimmt: farbig, Die Schwingen auf Der untern Geite prachtig lafurblau, die Fuße gelb; hinter jedem Auge ein nadtes Fledchen; Die Schwanzfedern in der Lange unter fich wenig verfdieden. Die prachtvollen Farben machen ihn mit gu einem ber iconften ber beutiden Bogel. Er mißt 13; 3. in der Lange, Die Flugelbreite betragt 27% 3. Die Blugel bededen & bes faft 5 3. langen Schwanges. Der Schnabel 14 3. lang, fdmarg: bornfarbig. Der Rachen und die Bunge feben gelb aus. Die gang alten Beibchen feben ben Mannchen febr abnlich.

Bom sudlichen Schweden und Norwegen bis jum Genegal in Ufrita findet man Diefen Bogel. Bier lebt er vorzuglich in ebenen, fandi: gen Baldftrichen, mo es Birten : und Riefer: maldungen giebt. Ge ift ein mahrer Sommer: pogel, der Ende Aprile fommt und im Geptember fortgieht. Man fieht fie bann oft auf ben Rorn: baufen, Mandeln figen, (woher dann der obige Rame Mandelfrabe) und auf Infeften lauern. Er ift außerordentlich fcheu, immer un: ftat und fluchtig von Baum gu Baum eilend. Sonnenfdein ift ihm fehr angenehm; bei Re: genwetter ift er bagegen ftill und traurig. Auf Baumen fleigt er von Uft auf Uft, auf ber Erbe hupft er. Gein Flug ift ichnell und leicht. Dft gantt er fich mit feines Gleichen, mit andern Bogeln lebt er in Frieden. Mit Recht nennt man fie Schmager (Garrulas); benn ihren Aufenthalt verrathen fie durch beständiges, Den Elfterstimmen abnliches Gefdrei. Gin bobes, fonarrendes: Rader, rader! laffen fie im: mer ericallen, beim Zanten mifchen fie noch ein freifchendes Rrah, rrah! mit ein. Rubig figend hort man : Rad - und rad fad! Ihr Lodton ift: Rrah! Daher mohl ihr Beiname Rrabe entlehnt ift. Die Alten werden nie gahm, mobl aber Die Jungen, Die man mit Inseften, Regenwurmern und Rindshers auffuttern fann; fie follen auch Borter nachfprechen lernen. Rach und nach gewöhnt man fie an ein Universalfutter.

Sie leben von allerlei Infetten, Rafern, Deu: foreden, Gewurmen und fleinen Frofden. Das Unverdauliche merfen fie als langlichrunde Bugen oder Gewolle aus. Getreide freffen fie nie. Gie follen nicht faufen, fic auch nicht baden. Gie niften in ebenen oder buglichten Sandgegenden, in folden Birtenmalbern, Die mit einzelnen alten Giden' vermifcht find, mit einer Geite an das Feld, und mit der andern an größere Bal: ber grengen. Ihr Reft findet fich in Baumboblen immer über Manneshohe. Die Sohle futtern fie mit trodnen Burgeln, Balmen, Federn und Daaren aus, und legen 4-6 febr glangende weiße Gier, Die mechfelemeife von dem Barden in noch nicht vollig 3 Bochen ausgebrutet mer: ben. In bem weiten Schlunde tragen Die Alten ben Jungen Infetten und Maden gu. Gie ver: laffen das Reft bald, und werden lange von den Alten gefüttert. Die Mannchen tampfen im Frub: jahr fehr um Die Beibchen. Die alten Baum: hoblen, menn fie nicht geftort murden, fuchen fie ftete mieder gum Riften auf.

Der Buhnerhabicht, Baummarder und Bie: fel find ihre Feinde. Uebrigens werden fie auch pon Schmarogerinsetten und Gingemeidemur= mern geplagt. Gie find ichwer ju ichießen. Sonft murden fie von großen Berren auch oftere mit Falten gebaigt. Man fann ihr Fleifch effen. Sie nugen durch ihre Rahrung.

Rolle. (Colaris. Cuv.)

Unterfcheiden fich von Borigen burch einen fürgern, gefrummtern und jumal an ber Bafis fo verbreiterten Schnabel, daß er breiter mie hoch ericheint.

Der violette Rolle. (Colaris violacea.)

Lebt in Madagastar. Ropf, Dberhale, Rus den, Dedfedern der Flugel lebhaft gimmetfar: ben, Ropf und Sale mit iconem Bioletglang; Seiten bee Ropfes und bes gangen Rorpers gim= metfarben mit lebhaftem Bioletglang, Schwanzfedern turtisgrun, Die beiden mittlern olivengrun mit blauer Endbinde; die großern Dedfedern der Flugel und die Comungfedern Indigoblau; Die Dedfedern des Schwanzes oben und unten, fo wie Der Unterbauch und die Schen: fel, turfiegrun; Schnabel citronengelb; Buge totbbraun.

Paradiesvogel. (Paradisea. Linn.)

Sie haben einen geraden, gufammengedrud: ten, farten Sonabel ohne Rimme und bededte Rafenlocher wie die Raben; aber gang mit den

fanimetartigen Federn der Stirne bedeckt; Fuße fart; die Federn der Beichen oft fehr lang und ben Schwang verbergend. Das Gefieder überhaupt reich, Federbufche und andre Zierrathen bildend. Im Bau nahern fie fich dem Raben und find mahricheinlich alles freffende Bogel, fleischige und gemurzhafte Fruchte follen fie besonders lieben. Sie nisten auf Baumen und fin= den sich alle nur auf Neuguinea und den benach: barten Inseln. Der gemaine lebt in Schaaren in großen Baldern des Papulandes; fie find Dort Strichvogel; mas fich nach dem Mangel oder Ueberfluß ihrer Rahrungsmittel richtet. Die Beibchen sammeln fich dann in Truppen, und fegen fich auf die hochsten Gipfel der Baldbaume, wobei fie alle zusammen die Mannchen mit lautem Gefdrei gusammenrufen. Die Mannchen findet man dagegen einsam, mitten unter einer Schaar von vielleicht funfzig Beibchen. Daber wird es mahrscheinlich, daß fie nach Urt ber Buhner in der Bielweiberei leben. Die Menge Diefer Boget, welche von den Ginwohnern auf: bewahrt und zubereitet werden, ift bedeutend und zeigt von ihrer farten Bermehrung. Leffon hat davon mehreres berichtet. Die Papus trie: ben die Jagd der Paradiesvogel zuerft, um da: mit die Turbane ihrer Furften ju fomuden. Man schießt sie des Nachts mit besonders dazu bereiteten Pfeilen. Sie reißen ihnen die Fuße aus, ziehen die Saut ab, fteden einen Stock durch den Rumpf und trodnen fie im Rau: Un Drt und Stelle fostet ein Stud einen Piafter. Man bat fie fcon gezahmt und mit gefochtem Reis gefüttert. Da fie ohne Fuße zu uns gebracht wurden, kam man auf den Gedanken, daß fie diefen Bogeln fehlten und daß fie in und von der Luft lebten. Diefe und noch mehrere abnliche Fabeln find jest aber, da man mehrere vollständige Exemplare bekom: men hat, ganglich verschwunden.

Der große Paradies vogel. (Paradisea apoda.)

Långe vom Schnabel bis zur Schwanzspige 13 3. Lebt in den Baldern von Neuguinea und der Insel Aru, Tidor und Baigiu. Der Körper oben, Bruft, Bauch und Schwanz tastaniens braun; Stirn sammetschwarz, mit smaragdgrusnem Glanze; Scheitel und hinterhals citronens gelb; Rehle grungolden, Borderhals violetz braun; von den Beichen verbreitet fich ein Busch langer, seidenartiger, zerschlissener, weißgelber Febern, melde gegen ihr Ende etwas ins Durpurrothe fpielen, und weit uber ben Schmang. hinausreichen; von jeder Geite des hinterrudens geht ein langer, bartlofer, etwas haariger, hornartiger Faden oder Federfiel aus, der fic gegen die Fuße vormarte umbiegt, und einen Salbfreis von nabe an 2 F. Umfang bildet. Die Bris lebhaft gelb. Beim Weibchen ift Stirn und Borderhals dunkelkaftanienbraun; Ropf, Sals und Ruden gelbrothlich; Flugel und Schwang lebhaft taftanienbraun, Bauch und Bruft weiß; feine verlangerten Beidenfedern. Sat Die Große einer Droffel, ift lebhaft und fonell, halt fich meift in den Gipfeln der bochften Baume auf, movon er feine Stimme: voite, voite, boite fart artifulirt horen lagt. Bei Unnaherung eines Menfchen fdweigt er. Fruh und Abends fucht er feine Nahrung, wegen der farken Sige verbirgt er fich fonft im Schatten ber großen Blatter Des Thefabaumes. Leffon fah 2 gahm gemachte bei einem dinefifden Raufmann, die fehr lebhaft. maren, und mit getochtem Reis gefuttert mur: Den, er verlangte fur ein Stud 500 Franten.

Sie leben von den Früchten des Thekabaumes, und der Frucht eines Feigenbaumes, dort Amisu genannt; sie sind sehr schleimig, ihr Gezschmack fade. Die Gesangenen fraßen gern Schaben.

Der Königs=Paradiesvogel. (Parad. regia.)

Lange von ber Spige des Schnabels bis jum Ende des Schwanzes, 5½ 3. Baterland Reuguinea. Mannchen: obere Theile Rubinroth; Stirne und ein Theil des Ropfes icon pomeranzenfarb, sammetartig; am innern Augenwintel ein fleiner fdmarger Fledt; Rinn und Gurgel purpurfarb; an der Bruft mit einem helleren Querftreif umgeben, und unter Diefem ein breiter, metallifch glanzender, goldgruner Burtel, untere Theile grungrau. Geitenfedern breit, grau mit einem weißen und einem rothli= den Querfreif und am Ende glanzend goldgrun; die untern Dedfedern der Flugel gelb; Schwans rothbraun, die beiden mittlern Federn befleben in langen rothen Faben, welche am Ende Barte tragen, und fpiralformig gewunden find, fo daß fie eine Palette bilden, welche in der Mitte befestigt ift, von herrlich glanzender grunbrauner Farbe; Schnabel hornfarbig. Das Weibchen oben braunroth; unten gelbroth, braun geftreift; Comang ohne lange Federn.

Der fechefadige Paradiesvogel. (Parad. sexsetacea.)

Lange 10 bis 123. Baterland : Reuguinea. Sammetschwarg; Stirn und ein Theil des Schei: tele mit fleinen weißen Febern, mit fleifen vermifcht, welche weiß und fcwarg find, und einen grauen Federbufch bilben; an ben Geiten Des Ropfes fichen 3 lange, fcmarge, nadte Federn, an beren Enden eine eiformige Feder= platte, aus ichmargen feinen Bartfafern befte: bend; die Nackenfedern haben einen grunen Goldglang. Die Geitenfedern find fcmarg, mit zerfdliffenen Barten, und bededen die Flugel im Buftande der Rube gang, bei der geringften Bewegung erheben fie fich ichief, Die Salefedern find breit, ichuppenartig übereinander gelegt, in der Mitte fcmarg, mit goldgrun fcillern= bem Rande; die Schwanzfedern fammetartig, mit einigen langen flatternden Barten; Schna: bel und Fuße fcmarz.

Der prachtige Paradiesvogel. (Parad. superba.)

Lange 8—9 3. Sehr felten, lebt in Reuguinca. Sammetschwarz, ins Grune und Riozlette schillernd; Stirn mit 2 kleinen schwarzen, glanzenden Federbuschen; Schultern mit langen Federn bedeckt, welche aufstehend nach hinten gerichtet sind, und den Bogel wie ein Mantel bedecken, der auch einen Theil der Federn einzhullt; Racken und Unterbrust glanzend goldzgrün; Kehle schwarz, mit kupferrothem Glanze; die Federn des Unterhalses, länger als die ührizgen, dehnen sich auf beiden Seiten über die Brust, wie eine Art Flügel aus, einen schuppizgen, glanzenden Kragen mit Metallglanze bilzdend; Unterleid, Schnabel und Füße schwarz.

Die 4te Familie der fperlingsartigen Bogel nach Cuvier bilden die Dunnichnabler (Tennirostres.) Schnabel dunn, gestredt, bald gerade, bald mehr oder minder gebogen, ohne Rimme. Sie verhalten fich zu den Regelfchnablern wie die Bachstelzen zu den Zahnschnablern.

Spechtmeise. (Sitta. Linn.)

Die hierzu gehörigen Bogel haben einen geraden, prismatischen, zugespisten Schnabel, gegen die Spise hin zusammengedrudt, sie hacken damit, wie die Spechte, die Rinde der Baume auf, der Infetten wegen, ob fie gleich weder Spechtfuße noch Zunge, auch feinen folchen Schwanz, fich zu flugen, besigen. Bei und lebt nur folgende Urt:

Der europäische Aleiber, Aleber= blauspecht.

(Sitta enropaea. Linn.)

Der Oberfopf und alle obern Theile fanft graublau, der Unterkörper gelblich rostfarben; durch das Auge ein schwarzer Strich. Länge 5\frac{3}{4}., Flügelbreite 11 bis 11\frac{1}{2}. Schnabel 8 Linien lang. Das kleine Gesieder, besonders in den Weichen und auf dem Unterrücken, lang und locker. Die hinterzehe besonders lang, die Krallen groß, schön bogenformig, sehr zusammengedrückt und schmal, unten zweischneidig mit sehr scharfer Spige. Beim Weibchen sind die oben angegebenen Farben, doch alle weit blässer.

Diefer Bogel findet fich in gang Guropa, im Guden jedoch weniger als nach Rorden gu. In unsern Gegenden ift er auch nicht felten, einzeln auch paarmeife, doch nirgende in Seerden. Er ift mehr Strich : als Standvogel. Gegen Das Fruhjahr fuchen fie ihre alten Bruteorter wieder auf. Ihre Strichzeit ift im September und Deto= ber, mo fie in Gefellichaft ber Meifen mandern. Bo unter dem Unterholze befonders viel Safeln madfen, ift er am liebsten und hier pflangt er fic auch fort. Uebrigens durchstreift er Gebufche, Feldholzer, Balder, Baumreiben, Garten in Dorfern und Stadten. Da, wo Samen tragende Rothbuchen, Aborn ober Linden und Safelnuffe fteben, balt er fich beim Reifen Die= fer Gamen in einem fleinen Revier lange auf. Dagegen er im Binter Die Stadtgarten in einem weit großern Umfreife durchffreift. Muf einer alten Gide halt er fich oft Stunden lang auf, wo er bald am Schafte, bald an den Meften ber= umfleigt; er hupft aber auch im Bufchholze berum. Im Binter geht er an die Bande, Giebel und Dacher der Gebaude.

Eine immerwährende Unruhe halt ihn in steter Bewegung und sein nettes Gesteder nebst den mannigsaltigen Bewegungen macht ihn zu einem angenehmen Bogel. Im Alettern, hinauf: und hinabsteigen an den Zweigen übertrifft er noch die Spechte, und es ist ein Bergnügen, sein Treiben zu beobachten, worin man deutlich Specht: und Meisennatur vereinigt findet, was

auch fein Rame Specktmeise fehr richtig besags. Seine Stimme ist ein turzes leises, etwas geschärftes: Sit, wie man es auch von Meisen, Golbahnchen st. hort, was auch im Fluge verzsärkt wie Zitt oder Ziht klingt. Sein Lockton ist: Zirr twit twit twit oder twat, twat. Zeitig im Frühjahr an den Brüteplaßen hort man flotende Tone: Tüh, tüh, tüh, vder hell und saut, wie ein Mensch auf dem Finger pfeift: Quei, quei, quei, und abwechselnd hell und rein trillernd: Tirrrrrr!

Leicht lagt er fich gabmen, nur muß ber Bauer von Draht fenn, fonst gerhadt er ihn. En Der Stube friecht er uberall herum und be: fcabigt Bande und Sachen. Geine Rahrung besteht, wie bei den Meifen, in Infetten, Ga: mereien, befonders in großern Baumfamen, Gideln, Ruffen und Radelfamen, auch Sanf und Sonnenblumenternen, im Rothfall felbft Safer und Gerfte. Die Infetten fucht er im Moofe und rauhen Borten auf. Geine Lieblings: nahrung find Ruffe, die er in Spalten der Baume, Die er fich bagu noch ju bereiten weiß, ein: flemmt und aufhadt, um ju dem Rern ju gelan: gen, ben er ftudweise verschludt. Das gewalt: fame Deffnen der Ruffe verrichtet er meift in umgefehrter Stellung, d. h. den Ropf nach un: ten gerichtet, weil er fo mehr Starte gu befigen fdeint. hat er fich gefattigt, fo legt er Borrathe: fammern in Baumspalten, in Mauerrigen und nabe Gebaude, bier legt er mehrere Magagine an, wenn das eine entdedt, doch die übrigen nod Borrath haben. Sie baden fich gern, trin: ten auch oftere. Sanf und Safertorner giebt man ihnen in ber Gefangenichaft; Ruffe und andre Rerne erhalten fie ale Lederbiffen.

Ihr Reft findet man in allen maldigen Ge: genden Deutschlands, befonders in Laubwaldern. Bei foonem Better im Mars, fonft im Februar, bort man ihre Stimme an ihren Brutortern. Sie bauen ihr Reft meift in eine Baumhohle, fel: ten in Mauerfpalten und Dachrigen der Baufer, Die im Balde liegen. Deift hoch, 20 - 60 Fuß, legen fie es an. Gern nehmen fie die Bohnun: gen ber Spechte ein, beren weite Bohlen, fie mit weicher flebriger Erde gutleben oder verflei: ben, fo daß fie nur eben bineinfdlupfen tonnen. Dit ihrem flebrigen Speichel befeuchten fie Die im Schnabel berbeigeschaffte Erde, Die dadurch viel Festigfeit befommt. In dem Refte bilden alte Blatter Die Unterlage, barauf findet man Ende Aprils 6-8 Gier. Ihre Shale ift gart, bunn, leicht gerbrechlich, glatt, wenig glanzend, weiß wenig ins Gelbliche oder Blauliche spielend, darauf befinden sich hell: und dunkele rostrothe Punktchen, die am stumpfen Ende dicter stehen und größer sind, zuweilen auch kleine Fleden bilden. Dier zeigen sich zuweilen auch noch violette Punkte. In 13—14 Lagen werden sie, wahrscheinlich vom Beibchen allein, ausgebrütet, wobei sie dann das Mannchen mit Futter versforgt. Die Jungen werden, wie bei den Meissen, mit lauter kleinen Raupen aufgesüttert, wobei sich die Alten außerordentlich thatig beweisen. Sie wachsen bald heran, verlassen das Nest aber nur erst dann, wenn sie völlig fliegen können. In der Regel machen sie nur eine Brut.

Dabichte und kleine Falken stellen den Alten, Wiefeln und Mause aber ihrer Brut nach. In ihrem Gesieder wohnt die Bogellaus (Hippobosca) und in den Eingeweiden ein Bandwurm. Leicht lassen sie sich im Derbst mit Flinten, Blasseröhren und Armbruften erlegen, besonders wenn sie Russe aufhacken. Im Winter im Neifenkassen, worein Hafer oder hanf gestreut wird, und im Herbst auf dem Meisentanze. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend. Sie nugen durch Vertilgung und schällicher Insetten.

Steigschnabel. (Xenops.)

Unterfcheidet fich von voriger Gattung durch einen etwas mehr zusammengedrudten Schnabel, deffen untere Kante etwas convex ift.

Der hoffmannseggische Steigschnabel.

(Xen. genibarbis. Temm.)

Lange 43. 2 E. Baterland: Brafilien. Der Schwanz ist lang, abgestumpft, Die Flügel bededen nur z feiner Lange; Scheitel und Baden braun, mit rothlichen Schaften; über die Augen läuft eine weiße Binde bis zum Naden, und in der Ohrgegend ein reinweißer Fled. Der Rüden braun; an hals und Brust stehen weißlich rostfarbne Fleden auf braungrauem Grunde, der die übrigen untern Theile bededt. Die Mitte der Schwungsedern rostgelb; der Schwanz schwarz mit rostrothem Fled.

Baumlaufer. (Certhia. Linn.)

Mit gebognem Schnabel. Man hat fie in mehrere Unterabtheilungen gebracht, ale: in

åchte Baumlaufer. Den Namen von ihrer Lebensart auf Baumen, wobei fie fich ihres Schwanzes wie einer Strebe bedienen; die absgenugten Schwanzfedern endigen fich wie bei den Spechten in eine Spige.

Der graubunte, tohrückige Baumrut= fcher, Baumreiter. (Certhia familiaris. Linn.)

Dben dunkelgrau, weiß betropft, unten weiß; Der Burgel roftfarbig; burch den Glugel geht eine meifigelbe Binde; ber Schwang einfar: big. Diefes Bogelden ift mit eine unfrer flein: ften. Dhne Federn meift noch nicht fo fcmer als unfer Zauntonig; mit den Federn wiegt er nur 2 bis 3 Quentchen. Lange vom Schnabel bis jur Schwangspige 5 - 54, Flugelbreite 8 3. Der Schnabel ift etwas lang, ichmach, fanft ge: bogen, fehr fpig, an ber Burgel menig, nach vorn fehr fart gufammengedrudt, mit icharfer Rudenkante, Die Spige Des Dberkiefers etwas langer als Die untere. Die Lange mechfelt von 6 - 10 Linien. Die Rrallen der Bordergeben meffen 3-4, Die Der hinterzehe 4-7 Linien. Mannden und Beibden wenig verschieden.

Der graue Baumlaufer bewohnt Guropa, besonders das mittlere. In Deutschland und Den angrengenden gandern, vorzüglich in mal-Digen Gegenden, ift er gemein. Er gehort gu ben Strichvogeln. Die Beit fallt befonders in den Geptember und October mit den Meifen, unter beren Gefellicaft fie fich gern mifden. Im Dars fuchen fie dann mieder Die Brutplage auf. In allen Arten von Balbern halt fich Die: fer Bogel auf. In der Strichzeit befucht er Dor: fer und Stadte, alle Baumgarten, besonders Ropfweidenpflanzungen. Un alten Gebauden, mifchen Lehmmanden, breternen Giebeln ber Strobdacher flettert er herum. Es ift übrigens ein munteres, ungemein behendes, harmtofes Bogelden, beständig bupfend, flettert an fentrechten Glachen, vorzuglich an Baumfchaften und ftartern Meften binauf, ja felbft an der un: tern Geite magerechter Mefte entlang. Seine folanten Beben, mit den langen, dunnfpigigen icarfen Rrallen bemirken dies, und der etwas lange elastifche Stachelfdmang Dient bei jedem Salt zur Stuge. Man muß erstaunen, menn man dabei feine bewundernsmurdige Leichtigfeit und Schnelle, den Baum doch nur immer auf: marts, benfelben umfreifen fieht, abmarte, wie Der Rleiber, ruticht er nie. Gein Gefieder tragt er etwas knapp, erscheint es aber kuglich, so ist es eine Anzeige von Unbehaglichkeit. Deift fangt er von unten an den Baum hinauf zu rutschen, sich dann von dessen Gipfel wieder zum nächsten herabzusturzen.

Seine gewöhnliche Stimme, ein leifes: Sit, hat er mit Meisen, Goldhahnchen und Kleibern, in deren Gesellschaft er gern zieht, gemein. hat er sich aber gesest, oder lauft den Baum hinauf, so ertönt sein Lockton gewöhnlich ein paar mal hintereinander, welcher schnarrend wie: Frih, frih, klingt. Manchmal lockt er auch: Zi, zi zi frih frih friuh, und ist er erst oben in den Aesten, ertont recht laut: Zit zit zit zitzitzitzitzit, wobei er recht lustig forthüpft, als freue er sich worüber. Im Frühjahr hat das Mannchen eine Art Gesang, der aber einformig und schlecht genannt werden kann.

Er lebt von lauter Infeften und beren Brut, verschludt im Rothfall auch allerlei fleine Ga: mereien. Diefe feine Rahrung fucht er beständig auf, und ift deshalb in feter Bewegung, am thatigften aber ift er, wenn er Junge bat, mas dem Beobachter ein fehr beluftigendes Schaufpiel gewährt. Im Binter fucht er in Balddorfern, besonders an der Sonnenseite, Die Daselbft ver= ftedten Infetten auf. Darnach aufzuhaden er: laubt fein Schnabelden nicht. Im Binter fommt er auch mohl auf die Erde ba, wo die Sonne den Schnee geschmolzen, und fucht fleine Infetten, auch wohl garte Pflangensamen auf. Er trinft und badet fic auch ofters. Alte Ropfmei-Den lieben fie vorzüglich und legen auch in deren Soblen ihr Reft gern an. Gie mablen ju ihrem Refte fets eine Soble, bauen es dann mit Reis ferchen, Stroh, trodnen Grashalmen und Gras: blatterden, Baumbaft, alles mit Raupengefpinnft, Spinnengewebe u. dgl. durchflochten und dann folgt eine Menge Federn. Bei gutem Better, foon im Mars, findet man die Gier und dann im Mai icon flugge Junge, Die 2te Brut aber erft im Juni. Das erftemal legt das Beib: den 8-9, das 2temal oft nur 3-5 Gier, vies len fleinen Deifeneiern, bis gur Taufdung, abn: lich. Ihre Schale ift fehr gart und gerbrechlich, wenig glangend, bald rein, bald trube weiß, uber und über, doch mehr am flumpfen Ende, fonft fparfam, mit fehr feinen und einzelnen größern, roftrothen Bunften beftreut, Die fic am flumpfen Ende bei vielen fich franzartig baufen und wohl einen Fledenfrang bilden. Biemei: len fieht man auch noch violettgraue Punkte dar: unter. Beide Gatten follen fie in 13 Tagen ab; wechselnd ausbruten. Die Jungen werden mit Insesten aufgefüttert. Der Sperber stellt ihnen nach und Bieseln und Mäuse zerstören nicht selzten ihre Brut. Schmaroger von sehr kleiner Art wohnen in ihrem Gesteder, so wie auch fliegende Bogelläuse (Ornithomya) plagen sie. Sie sind mit der Flinte und dem Blaserohr zu schießen. Schweinsborsten mit Bogelleim bestrichen um die Bäume, die er oft besucht, gesteckt, bringt ihn am leichtesten in unsere Gewalt. Sein Fleisch ist wohlschmekend, wäre aber fündlich, ein so nügliches Bögelchen deshalb zu morden, das so viel schälliche Insesten vertilgen hilft. Neuere Ornithologen haben mehrere Arten aus dem angeführten machen wollen.

Retter f ch wan 3. (Dendrocalaptes.)

Diefe bilden die zweite Abtheilung. Ihr Schwanz eben fo gebildet, aber der Schnabel viel ftarfer und breiter.

Der Talapiot. (Dendrocal. picus.)

Långe 7 3. Baterland: Capenne. Mit geradem, an der Spige stumpfem, an der Burgel dreiedigem Schnabel; Ropf und hinterhals rothbraun; die Jedern an der Seite, Borderhals und Brust weiß gestedt und braunroth gesaumt; die untern Theile hell rostroth, die obern lebhaft rostroth; Schnabel gelb; Füße bleisarb. Das Beibchen etwas fleiner als das Mannchen.

Der langichnablige Baumhader. (Dendroc. procurvus, Temm.)

Långe 8½3. Baterland: Brafilien. Der Schnabel gleicht dem der Strupphopfe, der übrige Körperbau aber dem Baumhader. Der Schnabel fehr lang, dunn und start gebogen. Flügel und Schwanz sind lebhaft dunkel rostroth; die Schwungfedern mit braunen Spigen, die Schwanzfedern mit staunen Spigen, die Schwanzfedern mit staunen sivenbraun, eben so hals und Kopf; aber jede Feder an diesen beiseinen mit einem weißlichen Schaftsleden beziehnet, auf Baden und Kehle breiter; Brust und Bauch von derselben Farbe, mit dunnen weißlichen Stricken; der Schnabel rostrothlich, die Füße graulich.

Langflauer. (Orthonyx.)

Schnabel fehr furz, gerade; Spige ausge: schweift, Rasenloder mit Borften umgeben; Razgel langer, als die Zehen, stark, weniger geztrummt, seitlich gefurcht; Flügel fehr furz, Schwanz breit und lang; Schäfte stark, mit steizfer Spige, welche in Borften auslaufen. Nur eine Art.

Der spisschwänzige Langklauer. (Orth. spinicaudus. Temm.)

Lange 7 3. 6 Linien. Baterland: Reu: Seeland. Auf bem Ropfe Des Mannchen ein Dufter brauner furger Federbufch mit fcmargen Schaftstrichen; Raden und Mantel etwas bell: braun; auf jeder Feder ein großer fcmarger Fled; Die Baden graulich; Das Gefieder auf dem Ruden und dem Burgel fehr bid und faffa= nienbraun. Die Dedfedern ber Flugel icon afcgrau, mit 3 fdmargen Querbandern, wovon das 3te am breiteften ift. Die Schwungfedern fastanienbraun, mit einem weißen, einem fcmar= gen und einem rofffarbenen Querbande; Reble und Borderhale lebhaft roffroth, unten fcmare eingefaßt; Unterhale, Bruft und Mitte bes Bauches reinweiß; Die Schafte, welche mit ihrer fteifen Spige fast & 3. über ben Schwang vor= ragen, find aber an diefer Stelle mit furgen dunnftehenden Borftenhaaren befegt. Der fleine Schnabel fammt Sufe fdmarzbraun. Die Rlauen fast gleich lang, wie Die Beben. Das Mannchen hat einen lebhaft roftrothen Sale, beim Beib= den ift Diefer, wie der gange Unterleib, rein weiß.

Mauerläufer. (Tichodroma. Illg.)

Db sie gleich Felsen und Mauern auf: und abklettern, so find doch ihre Schwanzsedern nicht abgenußt, wie bei den Baumläufern, sie haden sich aber mit ihren sehr großen Krallen sest. Ihr Schnabel ist dreiedig und an der Basis breitgezdrückt, dabei sehr lang und dunn. Gine Art, die im füdlichen Europa lebt.

Die Alpen = Mauerflette, Mauer= fpecht, rothflugeliger Mauerläufer. (Tichod. muraria.)

Der zusammengelegte Flügel an ber obern Salfte hochroth; an den Innenfahnen ber großen

Schwingfedern, von ber 2ten bis gur 4ten, zwei runde weiße Rlede. Die Lange, ohne Schnabel, beträgt 5½ - 6 3. Flugelbreite 107 - 11½ 3. Der Schnabel ift an Jungen und Alten von fehr verfchiedener Lange, von 1-23. Er ift bunn und fieht daber febr ichlank aus, ichwarz, wie Gifchbein glangend. Die Bunge & 3. lang und ihre Spige liegt gang nabe an der Schnabelfpige, fpieffor= mig und außerft fpigig und flicht wie eine Radel, hornartig, febr elaftifch, und bei einer geringen Bergroßerung bemerft man überall eine Menge borftenartiger Biderhaten, er befigt Dabei noch Die hinten über ben Sirnichabel elastifchen Bungenbander jum Berausichnellen der Bunge, nach Art der Spechte. Die Rrallen find groß, dunn gufammengedrudt, unten doppeltichneidig mit nadelicarfer Spige, fast im Salbzirkel gebogen, die hinterzehe aber vorzüglich durch ihre außer= ordentliche Große ausgezeichnet, meniger ge= frummt, als die übrigen. Fuße und Rrallen pechichmarg und glangend. Das weiche, fodere Befieder tragt febr fanfte Farben, morunter ein gar berrliches Roth. Es ift überhaupt ein febr schoner Bogel. Im Berbft : oder Winterfleide find die Bugel weißgrau; Scheitel, hinterhals, Ruden, Schultern und Burzel hell afchgrau; Dberichwanzfedern dunkel afchgrau; Rinn, Rehle bis auf Die Dberbruft weiß; Bruft, Geiten, Baud und Schenfel ichiefergrau, Desgleichen Die großen Unterschwanzbedfebern, aber mit gro: fen weißen Enden. Die fleinen Dedfedern boch roffroth. Das Roth auf dem Flügel des Mann: dene, ift gefattigter und feuriger ale beim Beib: den. Im Fruhlinge : und Commerfleide hat das alte Mannchen einen fehr dunkeln afchgrauen Ropf, schwarzliche Bugel, und die Rehle, die vordere Balfte der Bangen und der gange Borderhals, bis auf die Dberbruft herab, find fammet= fcmars. Die Sauptmaufer ift im Juli und Auguft. Im Wintermonate maufern fie jum zweiten Mal.

Diefer Bogel bewohnt die gebirgigen Theile des marmern Europas. In Spanien, Italien und in der Schweiz ziemlich häufig, öfters auch in den füdlichen Provinzen Deutschlands. In der Schweiz bewohnt er die höchsten Gebirge, z. B. die Felsen des Gemmi und andere. So fah man ihn 1763 Klafter über der Meeresstäche. Bisweilen verfliegt er sich, dies war der Fall vor mehreren Jahren, wo er sich an den Ruinen der Morisburg in Halle an der Saale sehen ließ. Sie sind meist einzeln, oder bloß paarweis, nie in großen Gesellschaften. Er ist ein Strictvogel, der, sobald im herbst rauhe Witterung einfällt,

fich in die Thaler herab begiebt und die Berg: ftadte befucht. Wo er übermintert, mablt er fich einen großen Begirt, ben er taglich regelmäßig durchftreift, fo daß er mehrere Bochen lang, ju gemiffen Stunden, allemal an derfelben Mauer und dergleichen Dertern bemerkt worden ift. 216 Alpenvogel durchklettert er am tablen rauben Ge= ftein fenkrechte Flachen, feine Rahrung ju fuden und in den Rigen und Lochern der Felfen fich fortzupflanzen. Bergichloffer, altes Gemäuer, Burgen, Thurme und hohe Gebaude durchfucht er, nach feiner Dahrung. Die foll er fich auf Baume fegen. Im Betragen ift Diefer icone. lebhafte, außerft unruhige Bogel unfern Baum: läufern ahnlich. In flatternden Sprüngen geht es von einer Unebenheit und rauhem Borfprung einer fentrechten Glade gur andern den gangen Lag fort. Gie find zantisch gegen einander und leben daher faft immer einfam, find aber nicht fcheu. Ralte tonnen fie gut vertragen. Beibe Gatten fingen. Der Gefang beffeht aus mehre: ren furgen, lauten, melodifden Strophen, in welchem die furze Strophe: Di didi gaa un: ter fleinen Beranderungen oftere wiederholt, portommt. Much hierbei figen fie nicht fill, breben dabei den Rorper bin und ber, bewegen Flugel und Schwang dazu, oder flattern Dabei immer die Felfen hinan. Im Rafig fingen fie auch. Gie leben von Infetten, deren Larven, Puppen und Giern, namentlich von verfchiedenen Fliegenarten, Die in Felfen : und Mauerrigen Binterfolaf halten. Ginem Gefangenen gab man zerftogene Mandeln, Ruffe und Fliegen, und Schneemaffer gu trinfen.

Sie nisten in unwirthbaren Gegenden in Rigen und locher, die unzugänglich sind. Sie legen 5—6 rundlich weiße Gier. Die Jungen sind im Juli ausgeflogen. Wie sie Rahrung felbst fuchen konnen, trennen sich die Glieder der Familie. Bisweilen verirren sie sich in die Stuben hoher Sauser, wo man sie dann überrascht.

Blumenfauger, Zuckervogel. (Nectarinia.)

Schnabel lang, oder von der Lange des Rvpfes, schwach, ablenformig, mehr oder weniger
gebogen, an der Burgel breit und platt, dreiedig, an der Spige fehr dunn auslaufend;
Schnabelladen gleichlang; die untere mit einwarts gebogenen Randern, jum Theil von der
obern bededt; Zunge lang, ausstrectbar, rog-

renformig, gefpalten; Flugel mittelmäßig. -Diefe Gattung vereinigt eine Menge fleiner jum Theil mit prachtigem metallifch : glangendem Gefieber prangender Bogel, doch nicht nach bem Lichte variirend, wie bei den Colibris. 3m 21: ter, befonders bei den Mannchen, entwidelt fic Das icone Gefieder. Die Frangofen nennen fie nach der Landesfprache von Madagastar Couri-Manga, mas Buderfreffer bedeutet. Es find fonelle Bogel, Die mit ihrer Bunge den Sonig: faft der Blumen aussaugen. Gie halten fich in Dichten Balbern oder an den Randern derfelben auf und verzehren neben bem Sonigfafte auch Hleine Infekten. Das fconfte Gefieder haben Die Mannchen in der Begattungezeit, bann aber ein dufteres Rleid, mas die Beiben immer haben. Ginige niften in Baumlocher, andere bauen fich hangende Refter, die fehr tunftlich aus weichen Materialien gefilzt find. Ginige Arten leben gefellig und die Mannchen haben einen angenehmen, aber feifen Gefang. Dan bat fie unter verschiedene Abtheilungen gebracht.

Der grune Honigsauger. (Nectarinia metallica.)

Da fast alle Mannchen metallifch glangend find, hat man diefen befonders Diefen Ramen beigelegt. Die mittlern Schwanzfedern find beim Mannden viel langer, als die andern. Bei ihm find Ropf, Sale und Mantel icon goldgrun. Der hinterruden und Burgel fahl: blau glangend. Schwungfedern dunkelbraun, Somang fahlblau; der Unterleib citronengelb. Das Weibchen ift an allen obern Theilen hell grunbraunlich, unten citronengelb. Lange des Mannden 33. 10 Linien. Die langen Schwang: federn feben 1 3. 9 Linien über Die übri: gen hervor. Baterland: Dangola, Abnifinien und das fubliche Arabien; lieben Afagienmal: Der. Deift findet man fie paarmeife, oft auch mehrere beifammen. Gern fliegen fie auf blu: bende Afazien, auf welchen fich viele Infetten aufhalten, pon benen fie meift gu leben icheinen. Das Mannden fingt angenehm. Erfdredt lagt es beim Begfliegen einen Ion, wie den von einer jungen Rage horen; auch den Ion: tfcia, wiederholt es oft. Im Marg bauen fie febr fünstliche Reffer an dunnen Zweigen der Afa: gien, aus Astlepias : Geide, Rameel = und Pfer= Dehaaren, auch Spinnengewebe. Es bildet einen offenen Beutel, worin man 3 garte weiße Gier findet.

Der scharlachbauchige Zuderfresser. (Nect. coccinigaster. Temm.)

Lange 3 3. 6 Linien. Muf einer der philip: pinifden Infeln entdedt. Saufig auf Manilla. Mit Budermaffer bat man ihn einige Tage am Leben erhalten. Bahricheinlich lebt er vom Do: nigfaft der Blumen und fehr fleinen Infetten. Das Beibden fennt man noch nicht. Beim Mannchen bededt ein metallifches Grun, mehr oder minder gelblich, Scheitel und Raden; Dberruden, unterer Theil des Balfes und mittlere Dedfedern der Flugel mordoreroth, fammet: artig; Unterruden, Burgel und fleine Dedfedern der Flugel glanzend fahlblau mit Purpur : und Bioletglang; Borderhale und Bruft violetblau, metallifch glangend; ber gange Bauch fcon fcbar: lachroth; Die Aftergegend und untere Dedfedern Des Schwanzes olivenfarb; Flugel fcmar; Somangfedern blaufdmarglich, violet gefaumt.

Der verschiedenfarbige Blumen= fauger.

(Nect. discolor.)

Scheitek und Kehle goldgrun, ein Streif durch die Augen, Backen, Genick, Seiten des Halfes, hinterhals und Mantel schwarz, nicht glanzend; Flügel und Schwanz rosibraun, Borzberhals und Brust herrlich roth, jede Feder stahlzblau gerandet, wodurch schwanze stahlblaue Banzber entstehen, und diese Theile je nach dem Licte, bast rubinroth, bald stahlblau oder beide Farben auf's schönste durcheinander schillernd, erschen. Der Unterleib schwarz; der Schwanzsaft viereckig abgeschnitten. Das Roth erstreckt sich bis in die Oberbauchgegend. Das Weiben unbekannt. Baterland: Senegal.

Der rothbrustige Blumensauger. (Nect. pectoralis.)

Scheitel goldgrun, Rehle und Borderhals rubinroth; diese Farbe ift an den Seiten des Palses mit einem herrlich azurblauen Bande ber grenzt, das am Schnabelwinkel anfangt und an der Brust sid endet, jedes Federchen an diesem Bande hat einen schmalen schwarzen Rand; über diesem Bande lauft vom Schnabel durch die Augen und über die Backen ein breiter sammeteschwarzer Streif, der über den Oberrucken sich ausbreitet; die Decksehen der Flügel purpurzroth, mit metallgrunem Schmmer; Schwung.

febern fcwarz; Bauch schwarzblau glanzend; Unterleib schwarz, ohne Glanz; an ben Seiten des Bauches ein gelber Fleck; der Schwanz et: was abgestumpft, schwarz violet und grun glanzend, Decksedern besselben goldgrun, Das Beibe den soll ganz duntel olivengrun senn. Baterz sand: Java, wo er Pligiztembang beißt; er lebt von Insetten.

Leffon giebt 81 hierher gehörige Arten an, das Dictionnaire des sciences naturelles

nur 75.

Sui = Manga. (Cinnyris. Cuv.)

Ihr langer, fehr dunner Schnabel ift an bem Kinnladenrand beider Schnabelhalften fein fazgeartig gezähnelt. Die Zunge, herausstreckbar, endigt sich in eine kleine Gabel. Sie finden sich in Afrika und auf dem indifden Archipel; sie sind lebhaft, ihr Gesang angenehm. Sie sehen sehr schön aus, vorzüglich die Mannchen. Bei ihrem Farbenwechsel hat ihre genaue Bestimmung Schwierigkeiten.

Der stolze Suismanga. (Certh. superba. Cinn. sugnimbindus. Vieill.)

Die größte Gattung 6 3. lang. Dbenher goldgrun, am Flugel und Schwanz ins Braunliche; der Scheitel ultramarinblau; die Rehle roth, blau und fupfergrun schillernd; die Brust sammetroth, darüber ein goldgruner Streif. Der Bauch dunkelroth. Baterland: Afrika.

Colibri. (Trochilus. Linn.)

Diese kleinen Bogel, schon lange berühmt durch den Glanz ihres prachtvollen Gesieders, besonders durch die Platten vom Feuer der Edelssteine, welche durch schuppige Federchen ganz eizgener Art an ihrer Rehle und auf dem Scheitel gebildet werden, haben einen langen und dunnen Schnabel, in dem sich eine Zunge besindet, die sich fast, wie die der Spechte und durch gleiz den Mechanismus verlängert, und fast bis an ihre Basis in 2 Fäden gespalten ist, sie sollen ihnen zum Aussaugen des Restars aus den Blumen dienen. Indessen sehen fie auch von kleinen Insesten, die man in ihren Magen stets gesunden. Ihre sehr kleinen Füschen, ihr breiter Schwanz, ihre außerordentlich langen und wes

gen ploglicher Berfurgung ber Dedfebern foma: fen Rlugel, ihre furze Schulter, ihr fehr großes Bruftbein, ohne Musschnitt, bezeichnet wie bei Den Mauerichwalben Die Gefdidlichkeit zum Fluge. Mit Leichtigfeit fcmeben Die Colibris wie mande Mliegen in der Luft. Gie fummen um Die Bluthen der Rrauter und Straucher und fliegen nach Berhaltniß rafder ale die übrigen Bogel. Ihr Magen ift fehr flein; es fehlt ihnen der Blinddarm, wodurch fie Aehnlichfeit mit den Spechten erhalten. Gie leben einfach, per= theidigen mit vielem Muth ihr Reft und fampfen mit Buth gegen einander. Die metallifden Farben der oft fo practwollen Mannchen verandern fich nach dem auffallenden Lichte, mas man mit den toftbarften Edelfteinen, als Sapphir, Sma: ragd, Rubin at. vergleichen tonnte. Alle Arten leben in Amerita, vorzüglich in den warmften Theilen. Bul lod befaß mehr als 70 Stud le= bende Colibris, die er mit Buder in Baffer auf= geloft, ernahrte. Er fabe fie auch im Rafig in Aloe : Blumen und andern, die er hingestedt, Den Meftar aussaugen. Gie lieben Blumen mit langen Rohren.

Die meisten bauen fehr funstliche Rester, meist aus Wolle verschiedener Pflanzen; balb fugelformig, oben offen, mit einer klebenden Substanz, theils an den Aesten festgeklebt, theils damit selbst oft überzogen und wie gefilzt; oft auch mit Baumflechten ganz umlegt und bedeckt. Da sie über ganz Amerika verbreitet sind, ist auch ihre Brutezeit verschieden. Sie bringen meist nur 2 Gier, da es aber viele von ihnen giebt, mussen sie wohl jahrlich mehrmal druten. Die Gier sind weiß, sehr zartschalig. Beide Gatten bruten, vertheidigen sich beim Reste heftig gegen alle Bogel, ja selbst Menschen fliegen

fie nach dem Geficht.

Um die Blumen schwarmend kann man fie mit einem Schmetterlingsgarne fangen. Man fangt fie auch mit Bogefleim, was aber die Federn beschmußt, schießt fie auch mit Sand und Waferer. Man kennt an hundert Arten der Colibris, die in mehrere Abtheilungen vertheilt find. Man theilt fie auch ein:

1) mit gefrummtem Ochnabel.

Der grasgrune Colibri. (Trochilus gramineus.)

Der fehr lange Sonabel fcmarg, wie die Fuße, alle obern Theile des Rorpers dunkelgrun

mit Golbschimmer; Rehle und Norderhals smaz ragdgrun; Unterleib sammetschwarz, Flügel matt violet, Schwanz flahlblau, ins Biolette schillernd. Baterland; St. Domingo, hier figt er auf abz gestorbenen einzelnen Zweigen. Größere Rögel balt er von feinem Reste ab, indem er unaufz hörliche Schnabelhiebe gegen die Augen derfelben führt.

Der Topas = Colibri. (Troch. pella.)

Lange des Mannchens ohne Die langen Schwanzfedern 6 3. Gine ber iconffen und größten Arten. Baterland : Guinea, in der Rabe Der Bache und Strome, wo fie auf niedrigfte: benden Zweigen figen. Dft fliegen fie nabe über Das Baffer, wie Die Schwalben. Die Ropfplatte fammetichwarg, und vom Ropf aus, zieht von Den Baden gegen ben Sale ein ichwarzer Saum, welcher die goldene, bald fmaragdgrun, bald topasgelb glanzende goldne Reble gang wie ein Saum umgiebt. Sinterhale, Ruden, Bruft und Bauch fupferroth; ins Granatrothe übergehend, goldglangend; Flugeldedfedern, Sinterruden und Steiß goldgrun, ins Brongefarbige uber= gehend; Schwanzdedfedern grun. Die mittlern Schwanzfedern ragen fast 3 3. über die andern hinaus, fie find fomal, taffanienbraun; Geiten: federn des Schwanzes roftroth; Schwungfedern rothbraun, die innern rofffarb; untere Dedfe: bern des Schwanzes und Steifes goldgrun. Das Beibchen entbehrt Die langen Schwanzfedern und die Reble deffelben hat nur einen rothlichen Schimmer, fein Gefieder ift auf dem Ruden nur dunkelgrun, am Bauche nur etwas heller.

Der geflectte Colibri. (Troch. naevins.)

Der ganze Oberleib goldgrun; hinter den Augen ein schwarzlicher Streif, und über denfelben ein rostgelber; Seiten des halses rostgelb; Brust und Oberbauch, grau, schwarzlich gesteckt; Schwungsedern braunlich violet; Schwanz, die mittlern Federn ganz, die andern zum Theil purpurfarben, das übrige rostgelb. Der Schnabel sehr lang, schwarzlich, und an den Schneiden vorn gezähnelt.

2) mit geradem Schnabel. Der gemeine Colibri. (Troch. colubris.)

Mannchen oben goldgrun, mit rubinroth glubender Reble, der übrige Unterleib fcmugig weiß. Dem Beibchen fehlt die rothe Reble. Lange 2 3. 9 Linien. Baterland: Die vereinigten Staaten, bis Canada. Gin Zugvogel. Schmebend bei einem Bignoinengebufch im Connen: glang, gewährt fein prachtvolles Gefieder einen berrlichen Unblid. Rommen 2 Mannchen gufam: men, fo entfleht Streit, fie fleigen Dabei in Die Luft und umfreisen fich mit Bliges Schnelle, fo daß das Auge nicht folgen kann. Man kann fie mit Budermaffer und frifden Blumen, woraus fie den Rektar trinken, erziehen. Gegen Ralte find fie fehr empfindlich. Im Berbft fliegen fie bei fuhlen Rachten in Die Gemachshaufer, Die fie am Morgen wieder verlaffen. Gie hafden tangende Muden. Der nordameritanische Colibri zieht im Geptember nach Guden und foll in Flo: rida übermintern. Ihre Rahrung boffeht außer Sonigfaft der Blumen, in Tliegen, Muden, fleinen Raferden und andern fliegenden Infetten. Im Mai machen fie ihr Reft auf die Mefte, oft gang frei, auch wohl am Stamme anftebend. In Baldern auf weißen jungen Giden, in Dbftgarten, auf Birnbaumen. Ginen 3. breit und eben fo tief; feine auswendige Seite beffeht aus einer blaugrunen Flechte, welche nach Bilfon mit dem flebrigen Speichel bee Bogele übergogen fenn foll. Inmendig ift es mit wolligen Gub: fangen ausgelegt. Die 2 Gierden find nad Berbaltniß ziemlich groß und an beiden Enden gleich bid. Gie vertheidigen ihr Reft, follen in 13 Za= gen bie Jungen ausbruten, welche dann ihre Schnabelden in der Eltern Schnabel feden und fo den Reftar der Blumen, den fie eingefogen, wieder aussaugen.

Der Langsborfische Colibri. (Troch. Langsdorfii.)

Der Schwanz gabelformig, fehr lang, alle Federn endigen fehr dunn und spisig; die auferste auf jeder Seite 2½ 3. lang, die beiden aufern grauweißlich, die mittlern blau violet. Der Borderhals ift schön smaragdgrun, über die Brust lauft ein morgenrothes Dalsband, unter demselben ist der Oberbauch schwarz violet, der übrige Unterleid rein weiß; Flügel violet. Der

Ropf und der obere Theil des Korpers ift grunsbraunlich golden, auf dem Burgel eine weiße Binde. Schnabel und Fuge fcmarg. Lange bis jum Schwanzende 53. Das Beibchen noch unsbefannt. Baterland: Brafflien.

Der stablglanzende Colibri. (Troch. chalybeus.)

An den Geiten des Salfes fiehen 2 aufges richtete Federbufche von duntelgrunem Gold: glang, mit einem weißen Puntt an ber Spige jeder Feder; Stirn und Baden glangend grun, bei Alten feben auf ber Stirne einige fleine por= marteftebende Federn, einen fleinen Bufch bil: bend; Reble, Sinterhale, Ruden und Geiten des Unterleibes goldgrun, ins Bronzefarbige fpielend; Geiten des Salfes und Bordertheil Deffelben, je nach dem Alter, blau und fomarg geflect, ober braun, weiß und ichwarz gemischt. Bom Schnabelmintel lauft eine fcmale fcmarge Linie nach der Dhrengegend, über die Schwange murgel eine weißgelbe Binde. Flugel violet; Somang abgerundet, braunroth. Lange 3 3. 42. Beibden unbefannt. Baterland: Brafilien.

Der prachtige Colibri. (Troch. magnificus.)

Auf der Stirne ein Federbufch von spisigen sangen vrangerothen Federn; an jeder Seite des halses ein aufstehender Kragen, von weißen, grüngoldenen, gesäumten Federn, Kopf, Mantel und Borderhals smaragdgrün golden; auf der Brust ein kleiner weißer Fleck; dieser und der Unterseib goldgrün, doch weniger gkanzend, als hals und Rücken; die Decksedern der Flügel grün mit vrangeschimmernden Säumen; Schwungsedern dunkelgrün, unten braun; die untern Decksedern des Schwanzes grün, rostfarb gesäumt, an der Schwanzwurzel oben ein weißes Band; Schwanz nebst Schnabel zimmetsarb. Länge 2 3.8 Linien. Baterland: Brasilien.

Der geschilderte Colibri. (Troch. scutatus.)

Gesicht und Reble fmaragdgrun, ind Blauliche schillernd; über ben Kopf lauft eine sammetz schwarze Binde von einem Auge zum andern; zu beiden Seiten des Salfes lauft eine Palatine von langen, bauschigen Federn, gegen Brust und Bauch, welche so wie der lettere, glanzend Koz nigsblau find; auf jeber Seite der Brust steht ein hell isabellsarbner Fled; alle obere Theile sind goldgrun; Flügel braun, ins Biolette spiezlend; Schwanz metallisch grun, sehr glänzend; die Steifgegend rein weiß. Länge 3½ 3. Baterzland: Brasilien.

Der fleinste Colibri. (Troch. minimus.)

Bis jest der fleinste bekannte Bogel; etwas größer als eine Schmeißfliege. Länge 16 Linien. Gemicht 20 Gran. Das Rest von der Größe einer halben Ballnußschale. Die Eierchen kleiner als eine Zudererbfe. Farbe des Bogels graulich, oben goldgrunlich; die außern Schwanzsedern mit weißem Saum. häufig in Brafilien.

Wiedehopf. (Upupa. Linn.)

Mit fehr langem, etwas gebogenem, an der Bafis breiedigem, oben convexem, an der Seite zusammengedrudtem, flumpfem Schnabel. Auch hier werden mehrere Abtheilungen gemacht, als:

Fregilus. Cuv.

Rafenlocher mit nach vorn gerichteten Federn bedeift, weshalb fie auch manche Autoren unter die Raben gebracht haben, denen fie auch in mancher hinficht im Betragen gleichen. Ihr Schnabel etwas langer als ihr Ropf.

Die Steindohle, Alpenfrahe. (Freg. graculus. Corv. grac. Linn.)

Biolett: fdmarg; Schnabel und Fuge fcon forallenroth; der Schnabel langer als der Ropf, ftark gebogen und vorn dunn jugefpigt. Ihre Lange beträgt 15 - 16 3. Die Flugelbreite 321 3. Der Schwang 6 - 61 3. Die Flugel reichen meift in der Rube liegend, noch über fein Ende hinaus. Die Lange des Schnabels 21 3. Die Bunge hat eine hornartige zwei: theilige Spige. Sie bewohnt vorzuglich Die 21: pen der Comeiz und Italiens. Rur felten fommt fie in die Dochgebirge bes fublichen Deutschlands; bewohnt vielmehr bie bochften Gegenden des Alpengebirges, wo man fie 1765 Loifen über der Meeresflache antrifft. Im Commer findet man fie flete uber der Region bes holzmuchses in unzuganglichen Gelfen, bei alten fehr hoch liegenden Ruinen und in Dorfern, Die fehr hohe einfame Lage und Thurme haben.

Es find Strichvogel, die fich im Berbft gu: fammen gefellen und an Die fudliche Geite ber Sochgebirge begeben, einige aber auch an ih: rer Geburtegegend umberichmarmen, am Tage Die hohen Thaler befuchen, Des Rachts aber in Die Gebirge gurudfehren. Ge ift ein milber, fceuer und ungefelliger Bogel. Er fliegt fehr fonell und bod, erhebt fich freifend und lagt fic auf gleiche Urt berab. Auf ber Erde geben fie fehr behende, fegen fich aber fehr felten auf einen Baum, gern auf vorragende Gefteine, wo fie ihre Lieblingeplage haben, um fich gu fonnen. Gie fdreien viel, ihre Stimme gleicht dem Gefdrei der Doblen. Ge flingt rauh und rabenartig: fria oder frubu, Die fie eben fo oft boren laffen, wie dla, dla. Gie laffen fich leicht gabmen und find bann fehr poffirlich, artig und unterhaltend. Jung aufgezogen follen fie Borte nachfprechen lernen. Laftig werden fie aber, daß fie alles megichleppen, vorzüglich glanzende Dinge; auch flopfen und haden fie an den Banden, Infekten fuchend. Gie faufen viel, weichen auch hartes Futter, wenn fie viel Baffer haben, ein. In der Gefangenichaft freffen fie Brod, Fleifd, Beeren, Regenwurmer und Infetten. Im Freien freffen fie alle Arten von Infetten, deren Carven, Regenwurmer und verschiedene Gamereien. Im Binter durchsuschen fie auch den Mift der Thiere nach Kornern. Die herausgeaderten Infetten und Burmer fuchen fie fleißig auf. Borguglich freffen fie gern Sanffamen.

Sie niften nur in den hoheren Gebirgere: gionen, in alten verfallenen Schloffern und auf Rirdthurmen fehr boch liegender Dorfer, auch in Felfenwande. Im Mai haben fie gewohnlich Gier. Das Reft ift groß, von durren Stengeln und beu gebauet, mit Moos ausgelegt, in einer Boble ftebend. Bagehalfe haben fie erklimmt und ausgenommen. Man fand 3-5 Gier, Die auf weißlichem Grunde viele Flede und Puntte von hell brauner Farbe haben. Ungeftort fu: den fie ihr altes Reft wieder auf. Marder ger: floren ihre Brut. Im Gefieder wohnen Schma: rogerinsetten. Wenn fie den Pfluger begleiten oder im Spatherbft Die Bergftragen befuden, lagt fic ein Souf anbringen. Ihr Fleifc ift wohlschmedend, besonders der Jungen. Gie nugen besondere durch Bertilgung der Infetten.

Anmerf. Unbezweifelt ift Geoners Baldrapp (Corvus sylvaticus) unsere Steinfrahe, ein durch Bufall verunstalteter Bogel, den auch Bechstein copirt hat. — Doch hat noch keiner einen fo gestalteten Bogel in Natur gesehen und fo gehört die Abbildung von Geners Baldrapp zu den fabelhaften Bogeln.

Wiedehopf im engern Sinn. (Upupa.)

Diese haben auf dem Ropfe eine Federzierbe, aus einer Doppelreihe langer Federn bestehend, die sie nach Willführ aufrichten konnen. Rur eine Art in Guropa.

Der gemeine Biedehopf, Rufufs: fufter, Dreckframer. (Upupa epops. Linn.)

Die großen Schwingfedern fcmarg, mit einer weißen Binde, unfern der Spige; Der fcmarge Schwang hat in feiner Mitte ein halb: mondformiges weißes Querband. Ropf, Sals und Bruft von angenehmer rothlicher Farbe. Seine Lange ift 101 -11, Flugelbreite 19 - 20 3. Der Schnabel ift fehr schlank und gestreckt. Beide Rudenfanten find erhaben, fast foarf, fo daß jeder Theil des Schnabels, weil er von Der Spige bis da, mo die fehr turge fleine Bunge liegt, nicht wie bei ben meiften Bogeln, ausgehöhlt, fondern voll ift, eine volltommen dreiedige Gestalt hat. Seine Lange beträgt 23. Mitten auf bem Scheitel entlang fiehen 2 Rei: hen großer, langer, am Ende fcmal zugerun: Deter Febern, welche von der Stirn an allmab: lich immer langer werden, in der Mitte Die größte Lange (bei alten Mannchen uber 2 3.) erreichen, nach dem Genid aber an Lange wie-Der abnehmen. Gie liegen gewöhnlich als eine große fpigige Saube nach hinten gu übereinan: Der, bilben aber einen prachtigen Federbufc, wenn ihn der Bogel aufrichtet, und wie einen Facher aufspaltet, mas durch ein Paar Darunter liegende ftarte Sautmusteln bewirft wird.

Mannchen und Beibchen unterscheiden sich nicht auffallend; letteres ist etwas kleiner, der Bederbusch niedriger, und die rostrothliche Sauptfarbe nicht so lebhaft. Dieser Bogel ist über den größten Theil von Europa, einen Theil von Affen und das nördliche Afrika verzbreitet. Im südlichen und mittlern Europa ist er überall häusiger, als im nördlichen. Es ist ein Zugvogel, der Ende Marz ankommt, aber im August schon wieder wegzieht, was aber

langfam gefdieht, indem fie ba, mo es ihnen gefällt, tagelang weilen. Er tommt immer eber, ale der Rufut antommt, baher obiger Rame. Er ift ein Baldvogel, bewohnt aber nur Die Rander Derfelben, wo Die Baume einzeln fehen, und mo Meder, Wiefen und Biehmeiben in der Rabe find. Feuchte Gegenden, befon: bere das jufammenhangende Gebufch in Der Rabe bewohnter Drte, an Flugufern, liebt er. Er ift fceu und furchtfam, wird er ploglich von einer Krabe oder einem andern Bogel, ber uber ibm fliegt, erichredt, fturgt er gu Boben, breis tet augenblidlich Schwang und Flugel auf Die Erde fo weit aus, daß fich die Spigen Der legtern fast berühren und fo die gebanderten Schwing: und Schwanzfedern wie Die Strah: Ien einer Blume ihn umgeben, mobei er ben Ropf jurudbiegt und ben Schnabel in Die Bobe balt. Go lange noch Gefahr brobt, bleibt er fo liegen, mabriceinlich fo ben Feind gu taus fchen, der ihn fo nicht fur einen Bogel halt. Bech fein fagt, bag er fo einem alten bunten Beuglappen abnlich febe. Go flüchtet er fich auch oft in die befaubten Zweige eines naben Baumes. In der Paarungezeit, und befonders wenn fich ein Rebenbuhler feben lagt, entfaltet er den Federbufch, und wenn er feinen Ruf ertonen lagt. Gein Gang auf ber Erde ift febr behend, fdrittmeis, mobei er den Schnabel meift etwas fentt und bei jedem Tritte mit bem Ropf nidt. Gegen Rafte ift er empfindlich. Es ift übrigens ein einfamer ungefelliger Bogel, Der fic mit feines Gleichen oft ftreitet. Beim Lo: den, Unwillen und Banterei hort man einen beifern, fonardenden Ton: Chrr, auch wie Somar flingend. Gein Bobibehagen drudt Mls eine Art ein: Bad ma'd mad aus. Befang und Unloden Des Beibchens ertont ein mobiflingendes: Supp hupp. Gein Fruh: lingeruf hat ihm auch ju den meiften Ramen verholfen, denn: hopfe, huppe, lat. Upupa, griech. Epops (εποψ), frang. Huppe, engl. Hoopoe, holl. Hoppe, zeigen alle jene Zone an, und das Biede- mag Biefe oder Beis De, feinen Aufenthalt, andeuten. Stinfen wie ein Biedehopf, paßt nicht gang auf ibn, ba Dies auch nur ju gemiffen Beiten ber Fall ift, auch ift der Geruch raben : oder etwas bifam: artig gu nennen. Um meiften ffintt bas Reft und die in ihrem eigenen faulenden Unrath figenden Jungen. Im Fruhjahre und beim Begguge ftinft fein Biedehopf mehr. Alt ge: fangen fterben fie bald, jung aufgezogen mer:

den fie aber fehr gahm, begleiten ihren herrn, schmeicheln fich ihm an, liebkofen ihn 2c. Er liebt die Barme, in der Stube muß er aber vom Ofen abgehalten werden, sonst wirft die hige so auf den schlecht schließenden Schnabel, daß er zu weit klafft, und er dann keine Raherung mehr nehmen kann. Uebrigens ift er in der Stube fehr possirilio.

Geine Rahrung beffeht aus Rafern und andern Infetten, vorzuglich von beren garven, Die er vom Erdboben auflieft, ober mit bem fpigen Schnabel aus ihren Lochern bervorholt, deshalb liebt er Triften und Menger, mo er im Dunger, Mift: und Mastafer, Rogtafer, Beu: fcreden, Ameifenpuppen u. f. m. findet. Erd: mastmaden gehoren zu feinen Lederbiffen. Er bohrt mit feinem Schnabel deshalb auch Locher, wie die Erdfpecte, in die Erde, um die Larven der Maitafer u. dgl. ju holen. Großen Rafern folagt er erft bie harten Theile, als Mlugeldeden, ab, ebe er fie vergebrt. Er badet fic nur im Staube und Sande, Grasmuden: futter mit Ameisenpuppen gewurgt, befommt ihnen in der Gefangenschaft am beften.

Der Biedehopf niftet in allen Gegenden Deutschlands, die nicht zu arm an Baumen und Bufdwerk find. Das Reft findet man in hohlen Baumen, Mauer: und Felfenlochern niedrig, auch wohl hoch. Gine Baumhohle, Die eine Unterlage von faulem Solze hat, ift ihm eben recht, gleich darauf ohne Unterlage Die Gier zu legen. Auf dem Erdboden angelegt, findet man allerlei trodne Salme, feine Bur: geln und Geniffe, auch wohl mitunter Studchen Ruhmift vermengt, als Unterlage. fie es blos vom Mifte der Thiere oder Menfchen bauen follten, ift grundlos. Ihre Gier find fehr langlich von Gestalt. Die Schale der Gier iff ohne Glang, und hat deutliche Poren. Die Farbe pariirt, am gewohnlichsten fommen fie in einem fomugigen grunlichen Beig vor, Das aber burch alle Abftufungen in Gelblichgrau, mit grunlichem Schein berabgeht, bis jum braunlichen Grau und an dem dunkelften bie ju einem rothlichen Braungrau ober einem matten Chotolatenbraun, legtere find auch noch mit gablofen außerft feinen weißen Bunttchen überfaet, Diefe find jedoch felten. Die Angahl ber Gier ift 4 - 6. Gie bruten jahrlich nur einmal. Das Beibden brutet Die Gier allein in 16 Tagen aus. Gie werden mit Infeften aufgefüttert und von den Eltern fehr geliebt. Die Refthoble- Der Jungen gleicht einer flinken:

den Cloate, indem fie bis an die Salfe im eige: nen Unrath fiben.

Sabicht und Sperber find ihre Feinde. Der uble Geruch des Reftes Scheint andere Raub: thiere bavon abzuhalten. Denn eine gahme Rage frift nicht einmal junge Biedehopfe. Hebrigens plagen fie Gingeweidewurmer und Schmarogerinsetten. Gie find icheu und nicht leicht zu ichießen. Anfange der Begattungezeit noch am erften, mer ihren Fruhlingeruf nach: macht und fich babei verftedt zu halten weiß, tann fie fo am leichteften beruden. Mit spannelangen feinen Ruthchen, mit Bogelleim beffrichen und an welche man in der Mitte an einem einige Boll langen Pferdehaar einen lebendigen Mehl: wurm gebunden bat, in lodere Erde gestedt, läßt er fich lebendig am besten fangen. Man fiellt fie ba auf, mo man fie am ofterfien laufen fieht. Gobald fie nun an dem Wurm gu: pfen, fallt die Leimruthe auf fie und verhindert fie am Fortfliegen. Die Juden genießen fein Fleifch ale eines unreinen Bogels nicht, ob es gleich im berbft febr fcmadhaft ift. Rugt durch feine Rabrung.

Strupphopf. (Epimachus.)

Schnabel viel langer ale ber Ropf, dunn, ichlant, bis unter bie Mugen gespalten, mehr oder weniger gebogen, der Lange nach gufammengedrudt, Die Rinnladen jugefpigt. Schnabelfirfte geht unter Die Federn der Stirne bin. Die Zunge furg fnorpelig. Die Flugel mittelmäßig. Die hieher gehorigen Bogel find oft mit einem munderschonen Gefieder geziert, mit Federbufchen und andern Bierrathen gefcmudt. Gie finden fich nur in der alten Belt. Die hieher gehörigen Arten find bald unter die Biedehopfe, bald unter die Paradiesvogel ge: bracht. Ihre Gefdichte ift noch nicht hinlang: lich befannt, da man fie befondere, wie die Paradiesvogel, verftummelt erhalt. Gie icheis nen von Infetten ju leben, in Baldern und hoben Gebufchen. .

Der stolze Strupphops. (Epim. superbus.)

Die Sauptfarbe ift fcward; allein fie foillert nach dem Lichte ins Brongefarbige, Goldgrune, Agurblaue und Biolette. Ropf, Stirn und Baden find mit fleinen fcuppenformigen, abgerundeten Federchen bedectt; am Sinterhalfe merden fie langer und zerschliffen, und erfchei= nen sammetschwarz wie der Ruden; auf Diefem fteben unregelmäßig zerftreut lange löffelformige Federn mit gefchloffenen Barten, melde Das Unfeben von fammetblauen Schildern haben, und in Gold ichimmern. Un der untern Rinn= lade fteben haarartige vorwarts gerichtete Fe= dern, welche eine Urt von aufgerichtetem Bart bilden. Die Federn am untern Theile des Korpers find fcmarg violet fcbillernd; jene auf dem Ruden fteben in mehreren Reiben, welche unten an den Geiten des Salfes anfangen, und in der Ruhe liegend um die Deckfedern der Flu= gel einen Rreis von den glanzendften Burpur= farben bilden. Im Fluge legen fie fich an Die Geiten über Die Flugel, zuweilen breitet fie der Bogel facherformig aus, und fo bilden fie einen Salsfragen. Undere Federn, welche an ben Beichen fteben, find lang, zerschliffen und få= belformig nach dem Schwanze gerichtet, Deffen Burgel fie, fo wie die Schenkel befleiben. Die Seitenfedern, fo mie die hintern am Ruden lie: genden Federn der Flügel, find vom tiefften Gam: metichwarg, die andern Schwungfedern haben an den außern Barten einen grunen Schiller, unten find fie fcmarg, ins Braune fdillernd. Schnabel und Fuße ichmarg. Der Schwang ift fehr lang und fart abgeftumpft, und die Geiten deffelben find Sformig gebogen und mit fteifen Barten verfeben, Die zusammen eine Rinne bilden.

Alle Federzierden des Mannchens enthehrt das Beibchen. Der Schwanz ift viel fürzer, und so wie die Schwungfedern, Kopf, der obere Theil des Halfes, Schultern und Rücken rothelich zimmtfarb; der Borderhals schwarz; der übrige Theil des Borderleibes auf braunem Grunde, schmungig weiß gebandert; der Schnabel braunlich; Füße braun.

Die gange Lange des alten Mannchens mit dem Schwanze 3 Fuß, Die langen Schwanzes dern allein 2 Fuß Lange, Des Beibchens 212 3., wovon der Schwanz 12 3. Vaterland: Reus Guinea.

Der prachtige Strupphopf. (Epimach. magnificus.)

Mit kurzem abgeschnittenem Schwanze. Der ganze obere Theil des Kopfes blaugrun, der hintere Theil des Salses und die obern Theile des Korpers sammetschwarz; die Federn

an der Reble find breit und fpatelformig, und bilden einen metallglanzenden Fled, der in Blau, Grun und Purpur fpielt, und an ber Bruft mit einem fmaragdgrunen Salebande endigt; ber übrige Theil des Unterleibes ift schwarz vio: let; Die Blugel find fammetichwarg, Die beiben dem Körper am nachsten liegenden Federn tra: gen einen bogenformigen grunen friffrenden Bled, eben Diefe Farbe haben Die beiden mitt: Iern Schwanzfedern, Die andern find fammet: fdwarg. Bon den Geiten der Bruft geben lange zerfchliffene Federn aus, welche fich bogen: formig frummen und in einen dunnen Faden auslaufen. Das junge hier abgebildete Mann= den ift auf dem Ropfe imaragdgrun, ins Blaue fdillernd, juweilen ins Stahlblaue oder auch fammetidmarg. Die Reble beffeht aus roth: grauen fdmarggewellten Febern, an ber Geite aber aus blauen und imaragdgrun iriffrenden oder fahlblau glanzenden. Alle obern Theile fammetichwarg, die Dedfedern der Flugel aber mit glangend taftanienbrauner Ginfaffung; ber Schwang glangend zimmerblau.

Beim Beiben find die Stirnfedern turz und feidenartig, und alle Federn des Körpers find weich und fein. Dals, Rucken und Burzel hellrothbraun, eben so Schwanz und Flügel. Ueber das Auge läuft ein weiß und grauer Streif; der ganze untere Theil des Körpers hat auf weißem Grunde braune Streifen; Schnabel braunroth. Länge des Männchens über 1 Juß, des Beibchens 11½ 3. Baterland: Reu-Guinea, in den unermeßlichen und tiefen Baldern, welche den hafen von Dorehi umgeben.

Unmert. Bon Epimach, superb. findet fich ein schönes Eremplar auf dem Rabinet der Friedrichs: Universität zu Salle a. d. S.

Bienenfresser. (Merops. Linn.)

Mit gestredtem, an der Basis dreiedigem leichtgebogenem und in eine Spige endigendem Schnabel. Ihr Brustbein hat nach hinten einen doppelten Ausschnitt. Ihre langen zugespigten Schwingen und furzen Füße geben ihnen einen schwalbenahnlichen Flug. Sie verfolgen in großen Schaaren Insetten, zumal Bienen, Wespen, Dummeln u. f. w., von denen sie, was merkwurdig ist, nicht gestochen werden. Sie nisten in Erdhausen, oder in Löcher an den steilen Ufern der Flusse, die sie sich mit dem Schnabel und Jüßen selbst graben und die tief hinterge-

hen. Im füblichen Europa lebt nur eine Urt. Sonst giebt es noch 24 Arten.

Der europäische Bienenfresser. (Merops apiaster. Linn.)

Genid und Raden fastanienbraun; Die Schultern ftrohgelb; ber gange Unterforper, von der hochgelben mit einem dunkeln Quer: bande begrengten Reble an, hell grunblau. Giner der iconften einheimischen Bogel. Bon ber Stirn bis ans Ende der langen mittlern Schwanzfedern mißt er 94-1043. Flugelbrei= te 16-184 3. Der Schwanz besteht aus 12 giemlich harten, fcmalen Febern. Der febr harte fcmarge Schnabel ift gegen 11 3. lang. Die Fuße haben einige Aehnlichkeit mit Denen unfere Gievogele. Die Farben des Gefieders haben noch einen befondern Glang, und die blaugrunen fpielen bei verfcbiedenem Lichte ins Lafurblaue, ober ins Goldgrune oder Gold= farbige.

Das alte Beibchen ift eben fo groß als bas Mannden, boch find die mittlern Schwangfes bern um ein paar Linien furger. Die Zeichnung ift im Gangen auch Diefelbe. Diefer Bogel bewohnt die marmern und heißen Bonen. In Uffen ift er weit verbreitet, auch in Ufrita. Go findet man ihn auch in ben gunachft dem mit= tellandifchen und ichmargen Meere gelegenen Landern, in Spanien, im fudlicen Frankreich, Sicilien 2c. Ginzelne hat man in Franken, Thuringen, Sachsen und der Mart angetroffen, die mahrscheinlich durch Unfalle verschlagen mas ren. In feinem eigentlichen Baterlande fieht man ihn in großen Schaaren. Als Zugvogel fommt er mit den Schwalben dort an und giebt auch meift um diefe Beit wieder mit diefen fort. Er liebt bergige Gegenden, porzuglich die Rabe ber Gemaffer. Er fliegt beständig, wie die Schwalben, bald hoch bald niedrig. Bum Hus: ruhen mahlt er frei fiehende Baume und Dann meift die oberften Spigen derfelben. Der mun: derschöne Gegler prangt im Connenschein, und gleicht gang in der Gewandtheit den Uferfcmal= ben. Die Diese liebt er Barme und Connenfdein, mogegen ihn Regen und unfreundliche Witterung traurig macht. Geine Stimme, Die er einzeln und in Gefellichaft beständig boren lagt, ift ein belles, laut pfeifendes Gififrui, fast wie die Stimme der Mauerschwalbe.

Ihre Rahrung besteht lediglich in fliegen: den Insekten, besonders in größern Urten, die er fliegend fangt und verzehrt, als: Seuschreschen, Zicaden, Libellen, Phryganeen, Bremen, Schnacken, Hornissen, Bespen, hummeln, hornigbienen, auch allerlei Kafern. Im Sigen fangt er selten ein Insett, alles im Fluge. Die unverdauten Ueberreste der Insetten giebt er in runden Ballen durch den Schnabel wieder

pon fic. Geinen Commerwohnsig ichlägt er gern an fließenden Gemaffern auf, Die hohe Ufer haben oder auch fonft in hugeligen Gegenden. bruten bier in Menge in Erdhohlen oder en: gen Rohren, die fie fich felbft machen, oft 3 ja 6 Suß tief, binten, mo bas Reft ift, badofen= formig erweitert. Dies bient auch hernach noch Der gangen Familie gur gemeinschaftlichen Golaf: ftelle. Bo es viel giebt, findet man oft die Ufer gang burchlochert. In der hinten erweiters ten Soble findet man blos eine fchlichte Unterlage von etwas Doos. Man findet darin im Mai 6-7 Stud, Die mahrscheinlich das Beib: chen allein ausbrutet. Gie find großer ale die Gier Des Gievogels. Ihre Geftalt ift beinahe Jugelformig, Die Schale ungemein glatt, glan= zend und rein weiß. Die Jungen ficht man icon im Juni ben Alten folgen, Die fie bann', wie die Schwalben ihre Jungen, auch im Fluge futtern. Bogellaufe follen fie fehr plagen, Des: gleichen Gingemeidemurmer. Bo fie niften, laffen fie fich leicht ichießen. Bo fie haufig find, fangt man fie mit Ungelhaten, Die man mit Insetten befodert, an Faden und einer langen Stange. Dies geschieht haufig auf Candia. Ihr Fleifch ift febr ichmadhaft. In den Stadten Staliene verfauft man fie auf den Markten in Menge.

Rugen durch Begfangen schablicher Infetten, thun aber einigen Schaden an den Bienenftoden.

Der Bullodische Bienenfresser. (Mer. Bullockii.)

Schnabel, Ruden, Deckfedern der Flügel, Schwungfedern matt grun, ins Dlivengrune übergehend, die mittlern Schwungfedern mit schwarzer Endfpige, wodurch auf dem Flügel ein schwarzer Fleck entsteht; hinterhals rostroth; ein Streif von der Schnabelgegend kommend, Backen und Augengegend schwarz, Rehle feuerzoth; Brust und Bauch rostgelb mit etwas grunzlichem Anflug; Schenkelfedern, Unterbauch und untere Deckfedern des Schwanzes schon azur

blau, die beiden mittlern und die außerste Schwanzseder grun, die übrigen roftfarb mit gruner Spige; alle vollkommen gleichlang. Lanz ge 8½ 3. Baterland: Afrika; am Senegal.

Der Kragen = Bienenfresser. (Mer. amictus.)

Schnabel did, gebogen, mit einer ftark gefurchten Firste; Schwanzsedern gleichlang; die Federn am Salse bilden einen ponceaurothen Salskragen; der Scheitel purpurviolet; die Fezdern um den Schenkel hellgrun; obere Theile gradgrun, untere hellgrun; Schwanz unten gelb, mit schwarzer Spige. Lange 11 3. Batterland: Sumatra.

E i & v v g e l. (Alcedo. Linn.)

Mit noch furzern Fußen, als die Bienenfresser, der Schnabel aber noch viel långer, gerade, winkelig zugespigt. Zunge und Schwanz
fehr kurz. Ihr Brustbein hat 2 Ausschnitte, wie
das der Bienenfresser und Raken. Sie nahren
sich von kleinen Fischen, die sie fangen, indem
sie sich von einem Baumaste ins Waster auf die
Beute herabstürzen. Ihr Magen ist ein häutiger Sack. Sie nisten wie die Arten der Bienenfresser in Uferlöcher. Die Arten finden sich in
der alten und neuen Welt. Es giebt an 40
Arten.

Rafenloder find feitlich, von oben durch eine nadte Saut verfcliegbar. Junge furz, fast triangelformig. Ropf und Schnabel fehr groß in Berhaltniß des übrigen Korpers.

Der gemeine lasurblaue Gisvogel, Uferspecht.

(Alc. ispida. Linn.)

Scheitel und hinterhaupt dunkelgrun, mit hell grunblauen Mondflecken; Schultern und Flügeldeckfedern dunkelgrun, legtere mit hell grunblauen Flecken; ein Streif den ganzen Ruden entlang berillblau, der sehr kurze Schwanz dunkel lasurblau. Der Unterkörper roftsarbig. Die Länge dieses so schon geschwuckten Bogels beträgt ohne Schnabel 6 — 6½ 3. Die Flügelebreite 10¾—12 3. Die Länge des Schwanzes 1½—1½ 3. Sein Schnabel steht in der Bildung zwischen Specht: und Reiherschnabel. Er ist groß, lang, stark und etwas eckig, gerade und

allmählig zugefpißt; er ift 11 - 1 3. 8 Linien lang. Die Fuße find febr flein, gart, fleifchig und weich anzufühlen. Bon ben Beben Die mit= telfte mit ber fast eben fo langen außerften bis gur zweiten, und mit ber viel furgern innen bis zum erften Gelenke vermachfen; Die Gohlen breit und ichwammicht; Die hinterzehe flein und noch etwas furger als Die innere Border= gebe. Die Farbe der Fuße ift ein lebhaftes Mennigroth, Die Krallen fcmarg. Die Federn am hintertopf und Raden find groß, etwas lang und fonnen fo aufgestraubt werden, daß fie eine Urt von Solle bilden. Den Bogel gie; ren 2 Sauptfarben; oben ein toftlich in Grun metallifc foillerndes Blau, am Unterforper ein angenehm feidenartiges Befieder, roftfarbig.

Diefer Bogel lebt mehr in gemäßigten und warmen als in nördlichen Ländern. Man trifft ibn daber in Europa und auch in den angren= genden Erdtheilen. Much bei uns ift er nicht felten. Es ift ein Strichvogel, beffen Strich: geit im Geptember bis November beginnt. Es treibt dann einer den andern und der Gieger halt fic dann mehrere Bochen dafelbft auf. Bei ftrengen Wintern gieht er nach mildern Gegenden, mo das Baffer frei von Gis ift. -Die Ufer Der Strome, Fluffe, Bache, Teiche, Graben find fein Aufenthalt, nur muffen fie mit Gebufchen und Baumen befegt fenn. Rla: res, feichtes Baffer und hohe Ufer liebt er. Im Binter fucht er marme Quellen und andere offene Stellen auf. Es ift ein guter Laucher, fdwimmt auch gut, mobei ihm die breiten Gob-Ien febr gute Dienfte leiften muffen. Die Glugelichlage find turg und zahlreich, um durch die furgen Flügelchen den diden Rumpf fortzubrin: gen, wobei ein Schnurren horbar ift. Ueber 2 bis 300 Schritt geht der Flug felten. Gie ha= ben gemiffe Lieblingefigchen, Die fie immer befuchen. Bom hohen Ufer fieht das Flattern oder Rutteln, im Connenschein bei feinen ichonen Farben, gar artig aus, er bewegt dabei Die Flugel in ichnellen Schlagen. Seine Stimme ift ein gerader, ungemein hoher, hellpfeifender, foneidender Zon, und flingt wie: Tiht oder Tiit. Legtern bort man, wenn er fich fegen will, furger, mo er wie: Tit, tit flingt. Der einfam mohnende Gievogel fcreit felten febr, am meiften aber, wenn fich zweie beigen. Bum Stubenvogel past er nicht, indem er fich den Ropf am Genffer einrennt.

Geine Rahrung besteht hauptfachlich in fleinen Fischen, in Ermangelung derfelben auch in

Bafferinfetten und im Rothfall felbft in Blutegeln. Bei Fifchen macht er wenig Unterfcbied, Utelei, Grundlinge, Forellen, Karpfenbrut 2c. verschlingt er von der Lange eines Fingere. Bie die Rage auf Die Maus, lauert er auf feine Beute und fobald fich ein Tifden feinem Stofe barbietet, fpringt er wie ein Frofch, ben Ropf vorweg, ine Baffer, fommt, ob er gleich tief untergetaucht, beinahe an derfelben Stelle mit dem Fifche im Schnabel herauf, begiebt fich an feinen Sig, fucht ben Fifch im Schnabel zu wenden, damit der Kopf zuerft tomme, und verschlingt ihn nun. Gine über 4 3. lange und wie eine fleine Mannsfingerdice Schmerl, wurgt er den weiten Rachen binab. Er frift auch Bafferinsetten und deren Larven, Die er auch mit jum Auffuttern feiner Jungen braucht. Rifchgraten, Schuppen und andere harte Theile giebt er in langlichen Ballen unverdaut durch den Schnabel wieder von fich. Im Bauer gehalten, muß man ihm lebende oder vor furgem abgestorbene fleine Fifche, Blutegel, und wie einige auch behaupten, Regenwurmer geben. Mit in Streifen geschnittenen Fischen und Fleifc vermengt man etwas in Mild eingeweichte Gem= mel und fo hat man fie nach und nach an fektere gewohnt. Beffer gludt es aber mit ben Sungen, die man fo auffuttert und fie dann an das befannte Stubenfutter der übrigen Bogel gewohnt. Da fie indeffen feine befondern Eigenschaften, ale ihr buntee Rleid haben, lohnt es faum der Muhe fie aufzufuttern.

Sie niften in die hohen Ufer ber Fluffe, fern von menfchlichen Bohnungen. Der Gisvo= gel hadt oder grabt fich mit feinem langen Schnabel eine lange Rohre, nur über 2 3. meit, aber magerecht gegen 3 &. tief, in Das Ufer hinein, hinten aber eine badofenformige Ermeiterung von etwa 6 3. Durchmeffer. Bo er nicht gestort mird, tommt er das funftige Sahr wieder in Die Bohle. Er foll gur Berfer: tigung biefer boble einige Bochen Beit brau: den. Die Unterlage des Reftes befteht aus Rischaraten, die in einem mehrjahrig bezognen Drte aus einer diden Lage beffeben. Die Graten, Die er als unverdaulich ausspeiet. Bor der Mitte bes Maies findet man noch feine Gier. Diefe find verhaltnigmaßig ziemlich groß, febr furg, ja fast tugelformig, indem fie ofters nur & fcmaler ale lang find, und bas bide Ende ift von dem andern Ende manchmal faum ju unterscheiden. Ihre Schale hat ungemein feine Poren und eine fo glanzende Dberflache, Die wie funfilich polirt aussieht. Frisch icheint Der rothgelbe Dotter etwas durch. Ihre Ungahl belauft fich von 5 - 8, auch noch darüber. Das Beiben brutet allein und wird mahrend Diefer Beit, 14-16 Tage lang, nicht nur mit Rifden gur Rahrung durch das Mannden ver: forgt, fondern es tragt auch beilaufig deffen Unrath weit vom Refte meg, mas in der Folge auch beide Gatten mit dem Unrathe ber Jun: gen thun. Die ausgekommenen Jungen find anfänglich gang nadt, mehrere Tage blind und von ungleicher Große, ihr Unterschnabel ift meift 2 Linien langer, als ber Dberfcnabel. Gie feben haflich, find unbehulflich, gittern oftere mit den großen Ropfen, fperren zuweilen Die weiten Rachen auf, wiepern leife, wenn fie bungrig, oder menn fie gefuttert merden und friechen wie Gewurme durcheinander. In Diefer Beit werden fie mit Infettenlarven, vorzuglich mit Libellen, benen guvor Ropfe und Flugel im Innern der Bohle abgeftoßen werden, gefüttert. Spater bekommen fie auch fleine Fifche. Beim Bachsen der Federn erscheinen fie wie mit blau: ichwarzen Stacheln betfeidet, weil die Federn in febr langen Scheiden feden und biefe nicht to bald aufplagen. Es find mahre Resthocker, Deren Ernahrung ben Eltern viel Muhe macht. Sie lieben fie indeffen fehr und vergeffen dabei oft ihre eigene Sicherheit. Wenn fie ausgeflo: gen, verrathen fich die Alten oftere, wenn man aufällig hingutommt, durch ihr angfiliches Din: und herfliegen und durch ihr flagliches Gefdrei, mahrend fich die Jungen gang fill und ruhig verhalten.

Iltisse, Wieseln und Ratten zerstören die Brut. Im Gesieder und im Innern haben auch sie Feinde. Der Eisvogel ist sehr scheu, tann aber, wenn man seine Lieblingspläge kennen lernt, leicht geschossen werden. Wasserdohnen und Sprenkel geschickt auf ihre Lieblingspläge angebracht, bringt sie auch in unfere Gewalt. Das Fleisch ist schmackhaft. Der Schaden, den sie an der Fischerei thun, unbedeutend.

Der dreizehige Eisvogel. (Alc. Ceyx.)

Lange 4 3. Ropf, Ruden und Schwanz roftroth, gang in Lila schillernd, weil jede Fez der am Ende einen blauen Rand hat, alle unz tern Theile sind weiß; der Schnabel schwach karminroth, die rothlichen Fuße dreizehig. Desz halb hat man ihn von ben eigentlichen Gievogeln getrennt. Es giebt indeffen noch 2 mit nur 3 Zehen, mas aber eine eben fo wenige Trennung, als beim 3zehigen Specht veranlaffen kann. Baterland: Indien.

Sågeneisvogel. (Syma.)

Schnabel lang, an der Wurzel breit, an den Seiten zusammengedruckt und dunn; die untere Kinnlade gefielt, und unten conver; Rander beider Kinnladen & ihrer Lange, vorn mit ftarken, zahlreichen, nach hinten und vorn gerichteten Zähnchen, sägeförmig besetz unterer Theil des Augenfreises nacht; die 3 vordern Zehen verbunden; die außern furzer; Flügel kurz, Schwanz mittelmäßig, mit ungleichen Federn, 10 lange und 2 außere sehr kurze.

Der Torotoro. (Syma Torotoro. Alc. ruficeps. Cuv.)

Långe 7 3. Ropf, Schnabel, Füße und Bauch lebhaft gelbroth, oben lebhafter als unsten; an der Seite des Halses 2 schwarze Fleschen; Mantel blauschwarz, Schwanz azurblau; Augenkreis schwarz. Baterland: Neus Guinea. Bohnt an den Ufern des Neeres und den Dünen. Streift über die Meeresfläche kleine Fische zu fangen. Die Papus nennen ihn Lorotoro, wahrscheinlich von seinem Geschrei entlehnt.

Plattschnabeleisvogel. (Todirhamphus.)

Schnabel gerade, untere Kinnlade nur wenig aufgeblasen, der Schnabel sehr niedrig,
breiter als hoch, Schnabelladen gleichlang, am
Ende stumpf und platt; furze abgerundere Flügel. Die hierhergehörigen Bögel leben auf den
Inseln der Subsee und gleichen sich sehr. Sie
bewohnen die Balber, sigen-hier gern auf Cocospalmen, auf Insetten lauernd, von denen
sie leben. Die Bewohner der Freundschaftsinfeln nennen sie o Tataré. Bormals wurden
sie nebst den weißen Reihern von diesen Böltern verehrt und schwere Strafe traf den, der
sie tödtete.

Der heilige Plattschnabeleisvogel. (Todirh. Alce. sacer.)

Lange 81 3., wovon ber Somang 3 3. mißt. Der Schnabel fcmarg, an ber Burgel ber untern Rinntade weiß; Scheitel grunblau: lich; diefe Farbe ift durch einen breiten weißen Streif, Der an Der Stirn entfteht, uber Die Augen weglauft und fich gegen ben Sinterfopf begiebt, eingefaßt; vom Muge geht ein breiter fcmarger Streif ab, wird bann grunlich, end: lich braun, um ben weißen Rreis einen zweis ten bildend; Rehle, Bruft und die obern Theile Des Salfes rein weiß; ein fehr breites halbes, weißlichtes, lichtbraun gewolftes und fcmach faftanienbraun überlaufenes Saleband, nimmt Den obern Theil Des Mantele ein, und ift fcmarg gefaumt; der Ruden, Die Dedfedern ber Glus gel, Der Burgel, Die Dberfeite bes Saffes und Die Flugel find einformig grunblau; Comangfe= Dern braun, an der außern Fahne blau.

Baterland: Dtaheiti und Borabora, hier weilt er auf den Cocospalmen, wo er die nach den Bluthen fommenden Insetten verzehrt.

Jägereisvogel. (Dacelo.)

Schnabel febr bid, fart, an ben Laden foneidend, an ben Geiten ausgedehnt, oben conver, an der Burgel etwas platt, ohne deut: liche Firfte, an der Spige ploglich gufammen: gedrudt und gefrummt, fpigig auslaufend; Laufe furger ale Die Mittelzehe, Die außere bie gum dritten Gelent, Die innere bis gum zweiten verbunden; hinterzehe mit breiter Burgel. Das Beffeder nicht glangend. Die hieher gehörigen Bogel bewohnen Die entfernteften Lander In-Diens und Reuholland. Es find farte Bogel, Die fonft mit ben Gievogeln verbunden maren; Doch machte ihr Schnabelbau und ihre übrige Lebensart eine Trennung nothig. Gie feben im Didict feuchter Balber, mahricheinlich nur von Infetten. Ihr fdmerer Korper erlaubt ihnen, wie den übrigen Gievogeln, einen gwar ichnellen, aber nur furgen Flug. Gie follen in boble Baume niften.

Der großschnablige Jägereisvogel. (Dac. macrorhinus.)

Der Scheitel braun, gelbgrunlich geftreift; 2 breite Binden von brauner Farbe und ultra-

marinfarb gefaumt, tommen von den Augen und befrangen das hinterhaupt; die Bugel find falb; vom Mundwintel geben 2 fcmarge Linien ab; ein weißes Salsband umgiebt ben Sals; Ruden, Burgel und Dedfedern ber Blugel braunlich, jede Feder mit falber, gelb gefaum: ter Spige, fo daß alle obern Theile olivenfarb gefledt erfceinen ; bie Schwungfedern find braun, falb gefaumt; Schwang roftfarb, mit glangen: den Schaften; Bruft und Geiten weißlich, mit fdmugig roftfarbnen Fleden und braunlichen Streifen; ber Unterleib weißlich, und Die un: tern Dedfedern bes Schwanzes rofffarb. Der Schnabel 2 3. lang; an der Bafis im Umfang. 28 Linien. Die Rafenlocher find Bedig und fie: ben nabe an den Stirnfedern, von denen Die porderften borftenartig find und fich an Die Rinnfaden anlegen. Die Läufe find fart und braun. Die gange Lange bes Bogels betragt 91 3. Baterland : Die Balder von Neu : Guinea.

Der große Idgereisvogel. (Dac. gigantea.)

Ropf oben und Ruden braun; Seiten und Borderhals, Brust und Bauch schmußig weiß, mit schwärzlichen undeutlichen Querbandern oder gewellt. Die großen Decksedern der Flügel und der Burzel braun, grun übersaufen. Der Schwanz lang, rothbraun mit schwarzen Querzbandern, gegen das Ende weißlich. Die obere Kinnlade ist braun, die untere gelblich, und die Hüße grau. Länge 16 3. Baterland: Neusuinea und Neusbolland. Im legtern Lande häufig in den Wäldern von Eucalyptus am Ufer der Flüsse. Er ist gemein am Fischslusse. Die Colonisten in Sidney nennen ihn Laughing iataß, die Neuspollander Eucksunda.

Mashornvogel. (Buceros.)

Es sind große afrikanische und ostindische Bogel, deren ungeheurer, mehr oder weniger sichelformig gebogener, oft gezähnter Schnabel, mit Ausmüchsen, oft so groß wie sie selbst verzsehen, oder der doch wenigstens nach oden stark aufgetrieden ist, bemerkbar macht, und mit den Tukans in Berwandtschaft bringt, während sie ihr Wesen und ihr Aeußeres den Raben nahert, und ihre Füße die der Bienenfresser und der Eisvögel sind. Die Gestalt und Weise ihrer Schnabesauswüchse variirt nach dem Alter sehr,

und fie icheinen bei ben gan; jungen Bogeln, noch nicht einmal vorhanden. Das Innere der: felben ift im Allgemeinen zellig. Das Brufibein Diefer Bogel hat nach hinten nur einen ichmaschen einwarts gerichteten Bogen an jeder Seite. Ihre Zunge ift klein und liegt tief in der Rehele. Sie genießen alle Art Rahrung, fressente Früchte, haschen Mause, kleine Bogel,

Umphibien, verzehren auch Mas.

Die Beine furg, fehr mustulos, Die Gohlen breit, Die Seitenzehe gleich, der außere bis jum 2ten Gelent verbunden, ber innere nur an der Bafis vermachfen. Rommen fie aus ben Giern, fo haben fie einen einfachen, furgen, glatten, fast geraden Schnabel, der aber an Der Burgel fehr did ift. Auf der Schnabelfirfte lauft eine Langegrathe, welche durch ihre Lange Die Lange Des Raums anzeigt, welchen ber funftige Auswuchs einnehmen foll. Die Mus: wuchfe enthalten Bellen, die mit Luft gefüllt find, melde burd eine Menge von Canalen eintreten fann, die fich in Die Rafenhohlung öffnen und mit ihr in Berbindung fteben. Der Flug ift fonell, aber geraufdvoll, oft hoch und lange anhaltend. Auf der Erde hupfen fie nach Art Der Raben. Am liebsten figen fie auf Bau: men. Riften und ichlafen in Baumlochern. Un den obern Augenliedern haben fie haare. Ihre febr fleine knorpelige Bunge ift mit dem Grund Des Mundes vermachfen. Gie leben gefellichaft. lich und vereinigen fich in großen Schaaren; leben aus dem Thier : und Pflanzenreiche. In Der Gefangenicaft freffen fie alles, felbft Ge: muse.

Die Balber der Inseln Ravaf und Baidgiu find die Bohnsiße der hornvögel, der großen Muskatnußtauben und der noch größern Kronentauben, der grünen Papageien, der großen Ruffelpapageien und glanzenden Loris. Sie lieben die Frucht des Muskatenbaums, die sie ganz verschlingen und wonach ihr Fleisch einen vortresslichen Geschmack bekommt. In Afrika, wo sie wenig sattige Früchte sinden, fressen sie Aas und andere thierische Nahrung, auf den früchtereichen Molucken besonders Früchte. Ihre Schnäbel werden durch den Gebrauch abstehend und schließen nicht. Es soll indessen ein Nachwuchs statt sinden, was man bei Zahmen bemerkt haben will. Nach Euvier 20 Arten. Der abuffinische Hornvogel.
(Buceros abyssinicus.)

Lange von der Schnabelfpige bis gum Schwanze 2 F. 63.; Breite eben fo groß; Der Somang allein mißt 1 F. Baterland: Abnffi= nien und Nordafrita. - Der Schnabel ift 93. lang und ohne das horn 21 3. hoch; er ift fdmarg, leicht gebogen, an den Geiten abgeplattet, an der Spige flumpf; das Sorn ift 23. hoch und 33. lang, an demfelben findet fich eine langliche, langettformige Deffnung, burd welche man eine fdmarge Saut bemertt, melde das Gindringen eines fremden Rorpers in das horn hindert. Die Sohlung des horns feht mit dem Ropf in Berbindung, und ift in den erften Sahren halbzirkelformig, dann aber spaltet fie fich an der Spige. Un der Burgel Der Dberkinnlade findet fich eine gelbliche Couppe von unregelmäßiger Gestalt, mit ichwarzen Langeffreifen. Die großen Mugen find mit einer nadten violetten Saut umgeben, Die fic bis jum Dberhale erftredt; am Mannchen ift uber-Dies die Gurgel nadt und icon roth. Die Bafie des Schnabele, Ropfee, Balfes und Bauches find mit gerichliffenen Federn befegt, wie beim Cafuar; die Farbe des gangen Bogels ift glangend ichwarg, nur Die 10 großen Schwungfe: dern find weiß. Fuge und Rlauen ichwarz. Der lange Schwang am Ende wie abgefdnitten. Im Magen Dieses Bogels fand man grune Ra: fer, die fich daselbst auf der Poa abyssinica aufhalten, überdem noch Gidechfen. Dannden und Beibchen find meift beifammen. Gie ma: den auf großen und dichten Baumen ein gro= fes aber meift nicht hochstehendes Reft, mas wie die Elfternefter bededt ift, mit gegen Mor: gen gerichtetem Gingang. Die Reger nehmen Diefen Bogel in Sous, und laffen ihn nicht todten, weil dadurch ein groß Unglud entfteben foll. Gie nennen ihn Teir el Raciba ober Schidfalevogel.

Der hornvogel mit gefurchtem Schnabel.

(Buc. sulcatus.)

Der Schnabel dieses hornvogels trägt einen helm, dessen oberer Theil den vierten Theil eines Zirkels bildet, der 23. hoch und 43. lang ist; dieser Abschnitt ist vorne vertikal abgeschnitten und an den Seiten mit 4 — 5 sehr tiefen Furchen und Falten versehen. Die Jungen ha:

ben einen glatten Beim. Das Alter icheint biefe Falten mit fich zu bringen. Die Beibchen be: tommen hochftens 4, alte Mannden 6 Falten. Das alte Mannden hat ein weißes Geficht, an den Seiten des Salfes wird Diefe Farbe roft= rothlich und roffbraun, an den langen Federn, welche Sinterhaupt und Raden bededen; der untere Theil des Salfes ift roftrothlich; Ruden und Flugel fdmarg glangend, ine Graue fdil: lernd, die untern Theile matt fcmarg; ber Schwanz weißlich, an feiner Spige eine breite fdwarze Binde; Schnabel und helm beim le: benden Bogel purpurroth, die nadten Theile um das Muge pomeranzengelb; die Furchen an Der Bafis der untern Rinnlade icon gelb, Die an der obern ichmarglich; die Fuße dunkel graublau; die Regenbogenhaut gelb. Die Jungen baben im erften Jahre einen rothlichen, glatten, wenig hervorragenden belm, ein mattbraunes Befieder und einen weißen mit ichwarger End: binde gezeichneten Comang. Lange des alten Rogels 2 F. 4 3. Sie bewohnen Mindano und einige andere Infeln des Archipele, der Philip: pinen und Mariannen.

Der hornvogel mit glattem horn. (Buc. Hydrocorax. Linn.)

Ganze Lange 2 F. 7 3. Der alte Bogel hat auf dem Schnabel einen Belm mit ebener Gla: de, von dunner, durchfichtiger Sornfubftang, fehr lebhaft pomerangenfarben. Gine breite fdwarze Binde umgiebt die Schnabelmurgel und erstredt fich in die Augengegend, über Rafenlocher und Rinn; Die Gurgel ift gelblich; hinterhaupt, Sals und ein Theil der Bruft rothlich fastanienbraun; der untere Theil der Bruft und des Bauches gang fcmarg; Schenfel und Unterleib etwas roftfarb; Ruden, Schul: tern und Dedfedern ber Flugel graubraun; alle großern Dedfedern weißlich roftfarben gefaumt; Der Gomang, deffen Federn gleichlang, weiß: lich ifabellfarben; die Fuße fcon roth. Bei jungern Bogeln ift der Schnabel mehr purpur: farben, braun oder graulich; der Belm im er: ften Sahre faum burch eine platte Erhabenheit bezeichnet und braun. Baterland: Die philippi= nifden Infeln, wo er von Fruchten, meift von Teigen, lebt.

Der rothhornige Rashornvogel. (Buc. Cassidix.)

Lange 3 F. 6 3., bes Schnabels 9 3. Der große Schnabel febhaft gelb. Un ber Bafis bei: der Kinnladen eine zweite hornartige Erhöhung, welche burch Querfurchen bezeichnet ift. Der Selm ift fast halbfreisformig, an ber Bafis breit, vorn mit einer foneidenden Platte; Die Karbe des helmes ift purpurroth, und der ganze Belm gleich dem Untersag, womit die Selme ber romifden Goldaten geziert maren. Beide Gefdlechter haben Diefe Bierde. Das alte Mann: den hat auf Scheitel und hinterhaupt eine fafanienbraune Farbe; der Sals fehr hell gold: gelb; Rorper, Flugel und Schenfel fdmarg grunglangend, ber Schwang rein weiß, ber Belm dunn, burchicheinend, icon purpurroth; Der Schnabel glangend goldgelb, feine Burgel mit einer diden Saarlage bededt, durchicheinend, fdief gefurcht, durch 3 tiefe fdmarge Furden; die Erhohungen zwischen diefen Furchen find rothlich pomerangenfarben. Der Augenfreis und die ausdehnbare Rehlhaut gelbblaulich; eine fcmargliche Binde geht über Diefe Saut nach Dem Schnabelwinkel bin. Die Gris pomerangen= roth. Er bewohnt die Solzungen von Celebes, wo er unter dem Namen: Alo bekannt ift. Die Fruchte ber gablreichen Feigenarten ernab: ren ihn. Er niftet in boble Baume, und figt immer auf den Gipfeln derfelben. Sein hober Blug ift febr geraufchvoll.

Dritte Ordnung.

Rlettervågel. (Scansores.)

Die dritte Ordnung der Bogel nach Cuvier enthalt diejenigen, deren außerer Finger,
sich wie der Daumen nach hinten richten, woraus fur sie eine festere Stuge entsteht, die sie
geschickt zum Alettern gebrauchen. Sie haben
deshalb obigen Namen erhalten, ob dies gleich
strenge genommen nicht allen zukommt. Die
meisten von ihnen bruten in Baumlochern alter
Baume; ihr Flug ist maßig. Ihre Nahrung ist
meist die der sperlingsartigen Bogel und besteht
in Insekten und Früchten. Das Brustbein der
meisten hat 2 Ausschnitte nach hinten; bei den

Papageien befindet fich aber nur ein Loch da= felbft und oft ift es ganz ausgefüllt.

Jakamar. (Galbula. Briss.)

Diese Bögel stehen, wegen ihres langen, spigen Schnabels, kurzen Füßen, beren vordere Zehen zum größten Theil verwachsen sind, den Eisvögeln sehr, nahe; ihr Gesteder aber weniger glatt und steis von Metallglanz. Sie leben einzam in feuchten Wäldern, von Insekten und nisten auf niedrigen Zweigen. Die amerikanischen Arten haben einen langern, ganz geraden Schnabel. Zuweilen hinten nur eine Zehe. Die Männchen aller Arten haben im Alter eine weiße Rehle. Sie fliegen leicht, aber nicht weit, und sind außer der Begattungszeit sehr still; zur Begattungszeit schresien sie aber viel und laut. Es sind 8 Arten bekannt.

Der langschwänzige Jakamar. (Galb. paradisea.)

Ganze Länge 11 3. Die beiden mittlern Schwanzsedern viel langer als die andern, der Schwanz überhaupt abgestumpft. Der obere Theil des Kopfes erdbraun, ins Blaue spielend; die Backen und alle obern Theile des Körpers sind dunkelgrun, mit blauem, rothem und glanzend grunem Widerscheine, je nach dem Lichte; Brust schön weiß, die untern Theile dunkelgrun, fast schwarz unter gewissem Lichte; Schnabel und Füße schwarz. Das Weibch. ist kleiner, der Schwanz kürzer, die Farbe weniger glanzend. Baterland: Brasilien. Ihre Stimme ist ein fanstes Bischen.

S p e d) t. (Picus.)

Schnabel: mittelmäßig ober etwas lang, meist nach allen Seiten gerade, an der Burzel fast rundlich, aber durch scharfe Rudenkanten und mehrere andere an den Seiten edig oder vielflächig, nach vorn ein wenig zusammenges drudt ober etwas keilförmig, mit einer scharfen und breiten, oder meißelförmigen Spige. Die Zunge wurmförmig, lang ausdehnbar, zum Borschnellen, mit einer pfriemenförmigen, hornartigen, mit Widerhaken versehenen Spige. Die Füße kurz, aber sehr start, mit rauchschuppichzter Bekleidung. Ihre 4 Zehen stehen in Paazren, eins nach vorne, das andere nach hinten

gerichtet, fo daß die eigentliche außere Border gebe, die langfte von allen, jur hinterzehe ge= folagen ift, und nur etwas feitwarts, aber nicht por bewegt merden fann. Die beiden Border: geben find an der Bafis mit einander vermach: fen, Die hintern gang frei. Die eigentliche binterzehe (der Daumen), bier die innere, ift die fleinfte; fie fommt bei manden Arten verfrummt por, bei einigen ift fie nur eine fleine Barge, worauf der Bogel fist, bei andern fieht blos Diefe allein an ihrer Stelle, und bei noch an: dern fehlt fie ganglich; fo daß fie dreizebig erfdeinen. Die Rrallen find febr groß, fart, aufammengedrudt, halbmondformig, fcarf. 12 Schwanzfedern, Die Seitenfedern jederfeits nur gang flein, wie verfummert, fo daß nur 10 voll: tommene Schwanzfedern da find. Diefe neh: men nach der Mitte an Lange gu, fo daß der Schwang feilformig, wegen der zugefpigten mittlern Federn jedoch am Ende etwas gespalten ericeint; fie haben febr ftarte, fifchbeinartige, unten ausgerinnte, nach der (meiftens verftum: melt, ober abgebrochen vorfommenden) Spige ju abmarts gebogene Schafte und ihre Barte find nach der Spige bin ebenfalls fehr hart und fifcbeinartig. Die Flugel mittelmäßig. Das fleine Gefieder etwas furg, nicht fehr derb, am Salfe loder und dunn, am hinterfopf und Raden oft haarartig. Go fieht die Gattung por vielen andern ausgezeichnet durch ihre Geftalt, durch die lebhaften Farben ihres Gefieders und durch ihre Lebensart und Ernahrung giem: lich geschloffen da.

Spechte findet man fast in allen Erdtheilen, wo fie bie Balber und andere baumreiche Ge= genden durchstreifen. In Deutschland find fie Stand: und Strichvogel. Gie find unge: fellige, unruhige, liftige und meift icheue Bogel, Die den gangen Tag mit Auffuchen ihrer Rab: rung hinbringen, Infetten und deren Larven, Die fich vorzuglich auf und in den Baumen auf= halten, nebenbei Rernen grober Gamereien ge= nießen. Ihre Rahrung und bas Berutichen fo verschiedener Baume giebt ihnen einen fpecifi= fchen Geruch, abnlich dem der Beidenbohrraupe (Cossus ligniperda). Bur Paarungszeit laffen Die Mannchen ein gang eigenes fonderbares lautes Schnurren boren, mas fie burch ein außerft ichnelles Saden auf den durren Uft eines hohen Baumgipfele hervorbringen. Gie loden Dadurch Die Beibchen; und niften jahrlich einmal in hoble Baume. Beibe Gatten bruten. - Ja

Deutschland haben mir 8 Arten.

Der Schwarzspecht, Krähenspecht, Füselier.

(Picus martius. Linn.)

Gang fdwarg, mit hodrothem Scheitel ober Genid. Bei une die größte einheimifche Art. Man findet ihn von 16% 3. (ohne Schnabel ge: meffen) bis ju 184 3. Lange und von 291 bis 32 3. Breite. Gewicht 20 bis 23 Loth. Der Schwang 7 3. lang. Der Schnabel ift gerade, groß und flarter ale bei andern einheimischen Spech: ten, 21 3. lang. Starre Borften bedecken die giemlich großen Rafenlocher. Auch an der Burgel des Unterschnabels und am Rinn fiehen vorwarts gerichtete Borftenfeberchen. Die Bunge fann auf 5 3. lang ausgedehnt werden und reicht dann bis 34 3. über bie Schnabelspige hinaus. Sie ift wurmartig, an der hornartigen Spige mit harten Widerhatchen, auch am weichern Theile noch mit feinen Spigen verfeben. Die Gris ift fdmefelgelb . ober weißgelblich. Beim Mannd. ift Stirn, Schei: tel und Genich brennend farmoifinroth. Uebri: gens gang fcmarg, am Unterforper matter, ale am obern. Beim Beibchen nur Das Genid roth.

Der Schwarzspecht findet fic mehr in nord: licen als fudlichen gandern. In Guropa von den Lappmarken an bis Frankreich herab. Eben fo ift er in Mordamerifa. Bei une fommt er nur einzeln vor und ift bann ein Standvogel. Sein liebfter Aufenthalt find große gufammen: bangende Radelmalder, jumal gebirgiger Ges genden. Der Bald, welchen er jum Bohnfis ermablt, muß alter Sochwald fenn, und viel ftarte, mitunter auch morfche oder hohle Baume enthalten, wenn das Solz auch nicht fo gang geschlossen fieht. Jedes einzelne Barchen bewohnt gewohnlich ein abgefondertes Revier, worin es fein anderes leidet. Gin foldes Revier hat ein paar Stunden im Umfange, mas fie taglich Durchftreichen, und felten darüber binaus geben. Deift fieht man ihn an farten Baumen, Deren Shafte er von der Burgel bis jum Gipfel beklettert. Geine Rachtrube halt er in einer en= gen Baumhohle, Die er fich dazu einrichtet oder verfertigt. - Der Schwarzspecht ift übrigens ein fraftiger, munterer, gewandter und fludti: ger Bogel. Geine Unruhe treibt ihn unablaffig pon einem Drte jum andern, benn oft glaubt man ihn gang nahe und in unglaublich furger Beit bort man ihn wieder in weiter Ferne, und bald an verschiedenen Orten fcnell nach einan: der, besonders wenn er fich nicht recht ficher weiß. Er ift unter ben einheimifden Spechten ber liftigfte und ichlaueffe. Much im Riettern ift er Deifter, benn in großen Sprungen hupft er fehr ichnell an einem Baumschafte binauf, mit dem Ropfe bagu nidend. Mit bewunderunge: wurdiger Schnelle ruticht er um ben Baum herum, auch wohl etwas abwarts und etwas rudlinge, boch eben fo wenig, wie die übrigen Specte, mit nach unten gerichtetem Ropfe ber= ab. Er fest fich auch nie wie Die andern Bogel auf Baumafte in Die Quere. Auf Der Erde hupft er schwerfallig und ungeschickt, fliegt ba= ber auch gleich auf Ameisenhaufen, um fie nicht erft hupfend aufzusuchen. Im Locherhauen, in Rinde und Sols, befigt er große Gefchicklichfeit und Rraft, besonders wenn er fich eine Soble ausmeißelt, um darin ju wohnen, es ichallt Dies weit in den Bald hinein; fo daß man meint, es tomme von Menfchen ber. Im Fluge lagt er ein lautes: Rriet, friettrieffriet, oder Rierfierfier, auch Rirrfirrfirr ac. boren. Beniger freischend im Fluge: Glud glud glud zc. Benn er fich eben an einem Baume angehangt hat, hort man Die Gilbe: Rlioh oder Rliah lang gezogen, mas recht flaglich flingt. Die Fruhjahremufit des Mann= dens wird durch das ichnelle Sammern mit dem Schnabel auf einen trodnen Baden hervorge: bracht, ein laut ichnurrender Son, der bald wie: orrrrrr, auch arrrrrr u. f. w. flingt. Bei ftillem Better wird es mohl & Stun= De weit gehort. Im Fruhjahr fangt das Mann= den an ju fonurren und dann meift fo lange, als das Beibchen brutet und das Better fcon ift. Dies thun auch die andern Spechte meift an fconen Fruhlingsmorgen von 6 - 9 Uhr an. Er lebt, wie die übrigen Spechte, von allerlei Infeftenlarven, die unter ber Rinde der Baume oder im morfden Solge wohnen, und von Umeifen. Bei Groffnung eines Schwarzspechtes fand ich 3 fleine und 2 große vollig ermachfene Beidenbohrraupen (Cossus ligniperda). Gr foll aud Bienen freffen.

In hochwaldungen, nicht allein in Radelbaumen, fondern auch in Eichen, Buchen 2c. findet man ihr Rest. Am besten bemerkt man das Rest durch die frisch ausgemeißelten holzspane, die auf 10 bis 12 Fuß weit in großer Menge auf dem Boden um den Stamm des Baumes umherliegen. Dies gilt auch beim Aufsuchen anderer Spechtnester. Beide Gatten arbeiten daran, meist des Bormittags, und in 12 bis 15 Tagen ist es fertig. Nachdem das Eingangssoch vollendet, wird 14 bis 16 3. tief im Baum hinabgearbeitet, und nach unten gu es teffelformig erweitert, fo dag diefer Raum 8 bis 9 Boll im Durchmeffer hat. Das Reft ift oft 40 bis 60 Jug hoch von der Erde auf, angelegt; fo daß es nur mit Lebensgefahr zu erlangen ift. Gewöhnlich beziehen fie jahrlich ein andres, Doch bisweilen auch mobl daffelbe wieder, mas aber gereinigt und erweitert wird, wie die dar= unter liegenden Dinge befunden. Man findet 3 bis 5 Gier in einem Refte. Ihre Schale ift dunn, von feinem Korn, rein weiß und fcon glanzend. Frifch fcheint das Gelbe durch. Beide Gatten bruten die Gier in 16 bis 18 Lagen aus. Deift werden die Jungen mit Umeifenpuppen aufge: futtert. Ihre Brut lieben fie fehr und leiden es, wenn man ihnen 1-2 Gier nimmt, ja fie bruten die übrigen noch aus. Die Jungen ber Spechte feben haglich, auch bei Diefen, megen ihrer großen Ropfe und diden Schnabel. Um Schnabelminkel haben fie einen Dicken knorpel= artigen Anollen, welcher aber mit der Ausbil= dung des Schnabels verschwindet. - Wilde Ragen, Baummarder und Biefeln gerftoren ihre Brut. - Schmarogerinfeften und Bandmurmer wohnen auf und in ihnen. Odwer lagt er fich fchiegen. Mit Schlingen por bas Reft geftellt, lagt er fich noch am leichteften fangen. - Gein Fleifch des eigenthumlichen Geruchs megen, wird nicht leicht gegeffen. Die Jungen follen bagegen beffer fcmeden. Er nugt fehr durch feine Dab: Gein ungewöhnlich baufiges Goreien, bei heiterm himmel, foll baldigen Regen verfun: Den. Dag man hie und da fur feine Fange noch Schieggeld zahlt, beruht auf Unfunde. -

Der Grun = Grasspecht. (Pic. viridis. Linn.)

Sauptfarbe grün; ber ganze Oberkopf bis auf den Rücken, auf aschlauem Grunde, hoch karminroth. Seine Länge beträgt 12½ bis 13½ 3.; Flügelbreite 20½ bis 22½ 3.; der Schwanz 4½ 3. und der Schnadel 1¾ 3. lang. Die Junge kann 7½ 3. ausgestreckt werden, so daß sie 6 3. über die meißelförmige Schnadelspige hinauszeicht, übrigens ist sie wie bei dem vorigen gestaltet. Die mondförmigen Krallen sind sehr groß, zusammengedrückt, unten scharf zweischneizdig, mitsehr scharfer Spige. Das alte Männchen ist vom schwärzlichen Ansang der Stirn an, auf dem Oberkopse, die auf den Racken hoch karminzroth, mit wenig durchschimmernden aschblauem Grunde der Federn; die Zügel und Umgebun-

gen der Alugen sind in einem großen, unten edigen Fleck tief schwarz; hinterhals, Ruden und Schultern schön olivengrun oder fast gelblich grun; Burzel und obere Schwanzdecksebern auf grunem Grunde sehr schön hochgelb, ins Grune spielend. Die halbseiten graugrun, Rehle weißzlich oder braunlich weiß, die übrigen Untertheile licht grunlich grau. Die großen Schwingen und die etwas blassen Fittichfedern matt braunschwarz mit gelblich zoder braunlichweißen Querflecken, auf den äußern Fahnen. Der Schwanz hat abzwechselnd grungraue und schwärzliche Querbinzden. Im Winter ist sein Rleid am schönsten. Beim Beibchen sind alle diese Farben weniger schön.

Der Grunfpecht wird in gang Guropa gefunden. Er ift mehr Strich: als Standvogel. Er liebt große Feldholzer und einzelne Baldun: gen, doch nicht von Radel : fondern von Laub: holze. Im Binter fommt er in die Rabe menfc= licher Wohnungen und fucht im harten Winter in Dbftbaumgarten und felbft an manchen Gebauden feine Rahrung auf. Kopfweiden liebt er fehr. Er begiebt fich auch mehr als die übrigen Arten an Bald : und Aderrander, auf Biefen, auf freie Plage im Balde, bald ganz auf das Freie in das Gras oder Gebufc, um hier feine Rabrung aufzusuchen. Geine Rachtrube halt er in einer Baumhohle, Die er fich dazu eingerichtet hat. Bie der vorige gang fruh und Abends fpat, verläßt und fehrt er in diefe gurud.

Es ift übrigens ein fraftiger Bogel, Der immer munter und frohlich ift, dabei liftig und porfichtig. Er ift ungefellig und leidet feinen fei= nes Gleichen in feinem Begirt, den er taglich durchftreicht. Er flettert rudweise oder in gro= Ben Sprungen, nicht allein an Baumen fondern auch an Mauern, Wanden, Balten und Gauls werf, an Gebauden und Rirchen herum. Seine Stimme ift hell volltonend, fehr weit horbar, ein haftiges: Rjud tjud tjud und ein foma: cheres: Jud jud. Man bort es von Beiden Gatten, das legtere meift nur figend. Der Paa: rungeruf des Mannchens ichallt weit in den Bald hinein und flingt wie: Glub glub glu glud glud te. Fruh in den Morgenftunden vom Marg bis Mai hort man ihn oft. Gefangen macht er ein frahendes Gefreifc, mas die Dh: ren beleidigt. Den fonurrenden Ton an durren Baden lagt er nicht boren.

Seine Nahrung sucht er auf Baumen und an der Erde so wie der folgende. Im Sommer besteht seine Sauptnahrung in Ameisen und deren

Gelbft im Binter fucht er fie auf, Puppen. badt danach die Erde auf und durchsucht des: halb hohle Baume, um die Winterschläfer zu ermifden. Go fcog ich um Beihnachten einen folden, der den gangen Kropf von Ameifen voll hatte. Much andere Infetten und beren Larven fucht er unter dem Moofe auf, um feinen bun: ger ju stillen. Go tiefe Locher wie der vorige macht er nie, ob er gleich auch das Solz durch= " fucht und pocht; mehr halt er fich jedoch an die Insetten die in Rigen und in der Borke leben. Altes Solzwerf und Lehmmande befucht er, um Dort Die verfrochenen Infetten aufzusuchen, mo: bei ihm feine lange Bunge fehr zu Statten fommt. Geine lange fchleimige Bunge thut ihm auch beim Umeisenfang, wo fie daran fleben bleiben, gute Dienfte. Geine Ausdunftung riecht mider: lich fuß fauerlich, mas von feiner Rahrung berruhrt. In Laubholzwaldungen legen fie ihr Reft an. Gie bereiten fich eine Boble dazu, als gang neu, oder ermeitern eine vorgefundene, oder nehmen felbst ihre vorjährige wieder an. Rern= faul find dergleichen Baume, die fie mahlen im: mer, denn da haben fie leichtere Arbeit. Die Gier find meift etwas langlich; ihre Schale vom feinsten Korn, dunn, fo daß frifc der icone rothgelbe Dotter burdiceint, blendend weiß und glatt wie Emaille. Man findet 6-8 in eis nem Refte. In 16-18 Tagen werden fie von beiben Gatten ausgebrutet. Gie lieben fie fo febr, daß fie fich oftere Darauf figend, greifen laffen. Ihre Jungen feben fo hablich, wie Die Des Schwanzspechts. Lange werden die Jungen gefuttert, ehe fie felbft Futter fuchen lernen.

Der Suhnerhabicht und ber Sperber versfolgt die Alten und Marber und Wiefeln die Brut. Uebrigens werden sie auch von Bogellaufen und Eingeweidewurmern geplagt. Sie sind nicht leicht zu schießen; mit Schlingen, an seine Schlasstelle angebracht, erhalt man ihn noch am leichtesten. Sein Fleisch ist genießbar, doch besser ist das Fleisch der Jungen. Er nugt sehr durch seine Nahrung und sollte billig gehegt werden.

Der Grau = Specht. (Pic. canus. Gmel.)

hauptfarbe grun; der ganze Kopf grau; nur am Mannden ein Fled auf dem Borders scheitel roth. Die Lange 11½ bis 12 3. Flügelz breite 18 bis 19½ 3., die Lange des Schwanzes fast 4½ 3. Das alte Mannden ist ebenfalls ein

ansehnlicher, fattlich gefchmudter Bogel. Ropf und Sale find licht afcgrau, erfterer auf bem Sinterfcheitel mit einigen fcmargen Schaftfiris chen, legterer grunlich überlaufen; Der Unfang der Stirn ift grungrau, aber nun fangt gleich eine rothe Ropfplatte an, die in ihrem Umfange faft eiformig ift und bis auf Die Mitte Des Scheitele reicht, von einem practvollen hoben, feurichten Rarminroth. Dberruden und Schultern find icon olivengrun, ine Grasgrun überge: hend, fconer ale beim Grunfpecht; Unterruden und Burgel icon hellgelb, ins Grunliche fpielend; alle untern Theile fehr licht grunlich grau. Die alten Beibchen haben fein Roth am Ropfe. Im Spatherbft hat Das Gefieder ben iconften Glang. Die Jungen find ichon im Reffe, fo= bald fie Federn befommen, nach beiderlei Beschlechtern an der verschiedenen Ropffarbe ju un= terfcheiden, gerade, wie bei ben Alten.

Der Grauspecht bewohnt die nordlichen Theile von Europa, Affen und Amerifa, fo hoch hinauf als nur Baume machfen. Auch bei uns wird er angetroffen. Er ift ein Strichvogel, ber im ffren: gen Winter feinen Aufenthaltsort auf einige Beit verläßt. Im October beginnen feine Streife guge; im Marg fucht er aber feine Brutorter wieder auf. In der Zwischenzeit mablt er fic dann ein Revier, das er täglich und regelmäßig durchftreicht, fo daß man ihn taglich um eine gemiffe Stunde an eben benfelben Baumen immer finden fann. Laubwaldungen gieht er den Radelmaldungen vor, und liebt vorzüglich die Balder in den Auen großer Fluffe, weniger die Gebirgemaldungen. Seine Lieblingenahrung find Ameisen, daber er ba, wo diefe haufig find oft weilt, fo befucht er auch die Baldwiefen baufig. Im Binter fommt er auch in die Garten ber Dorfer und Stadte. Rachtruhen halt er gleichfalle in Sohlen der Baume, Die er fich auch Da= zu gehörig einrichtet.

Es ist übrigens ein lebhafter, munterer, teder Bogel, vorsichtig und listig, ähnelt im Betragen dem Grünspecht, mit dem er oft verwechselt wird, doch nicht so scheu wie jener. It aber eben so zänkisch und futterneidisch und läßt sich nicht durch nachgeahmtes Alopfen anlocken. Defters, wie andere Spechte, sigt er wie die übrigen Bögel in die Quere auf einem Aste, sich sonnend und pugend, wobei er sich durch seinen Auf bemerkbar macht. Seine Stimme klingt fast wie die vom Grünspecht, ist aber doch nicht so schneidend. Die Locktone klingen: kgåck, kguck, kguck. Im Frühjahr vom Marz

bis Juni, hort man von beiben Gatten ben Paa= rungeruf, der aus fehr lauten volltonenden Gil: ben beffeht: flii, flih, flnh, finh. Außerdem fonurrt auch das Mannchen, indem es fich auf einen durren Baden eines hohen Baumes fest und Die befannten Zone: orrrr hervor ham: mert. Dies gefchieht nur in ber Fortpflanzungs: zeit und wenn bas Beibchen bruter. Er lebt, wie die übrigen Spechte, von verschiedenen In: fetten, besonders aber von Ameifen, auch hat man Sollunderbeeren in feinem Magen gefun: Den. Unter den Ameifen liebt er vorzüglich Die gelben (Formica rubra), dann die braunen (F. fusca). Geine Jungen futtert er meift mit Ameisenpuppen auf. Ja felbft den Binter bin= Durch fucht er fie auf und hadt fie aus ihren Saufen.

Sie niften auch in unfern Laubmalbern. Bor ber Mitte bes Maies findet man felten ihre Gier. Gie bereiten fich felbft eine Sohle, und mablen dazu einen Baum, wo die Faulniß fcon Dazu einen Unfang gemacht, oder ein alter mor: fder Aft fcon abgebrochen und der Baum fcon fernfaul ift. Man findet zuerft ein zirtelrundes Gingangeloch und inwendig eine gegen 8 3. weite und 10 bis 12 3. tiefe Soble, inwendig gang glatt gearbeitet. Darin find meift 5-6 Gier, fleiner, aber eben fo gestaltet, wie beim Grun= fpecht. Ihre Schale ift von feinftem Rorn, gart und dunn, glatt, rein weiß. Beide Gatten bru: ten fie gemeinschaftlich aus; fie lieben Die Brut gartlich und ftirbt eine ber Gatten, fo übernimmt Der Andere die Gorge allein. Die Jungen find rechte Resthoder. Ihre Feinde find ber Sabicht und Sperber; Die Brut Berftoren oft Marder und Biefeln. In ihnen haufen Gingeweidemur: mer. Um leichteften lagt er fich gur Begattunge: zeit ichiegen, besondere mer den Paarungeruf gefdidt nachpfeifen fann. Schlingen bei ei: nem Ameifenhaufen, den er oft besucht, auch welche vor feiner Sohle angebracht, bringen ihn in unfere Gewalt. Man fann fie effen; nugen jedoch durch ihre Rahrung.

Der Noth=, große Buntspecht. (Pic. major. Linn.)

Schwarz, weiß und rothbunt. Ruden und Burgel schwarz; das hohe Roth des Ufters geht nicht an den Sciten des Unterforpers herauf; der Schnabel start und etwas furz. Lange 8% dis 9½ 3.; Flügelbreite 17% bis 18½ 3. Der gespaltene feilformige Schwanz 3% 3. Schnabel

1 3. 1 bis 2 Linien lang. Die Zunge faum 2 3. lang. Die Augen nußbraun, bei alten Mannagen braunroth, oder fast blutroth.

Die starken Füße haben große, ziemlich stark gebogene, halbmondförmige Krallen. Beim alzten Mannchen ist zwischen Genick und Nacken ein ½ 3. breites Querband von feurigem prachtvolzien Karminroth, der ganze Rücken bis an den Schwanz tief schwarz, etwas blaulich glanzend. Kehle, Gurgel, Brust und Seiten sind schwunig weiß, mit einem braunlichen Anfluge, der After und die untern Schwanzdeckfedern sind prachtvoll karminroth.

Das Beibchen unterscheidet fich im Neußern nur durch etwas schlechtere Farben und durch ben Mangel des rothen Bandes am hinterfopf.

Die jungen Bogel im Restgesieder weichen weniger im Allgemeinen, als vielmehr an einz zelnen Theilen merkwurdig ab: Mannchen und Beibchen haben namlich einen farmoisinrothen Scheitel, der After nur schmutzig roth.

Der Rothspecht bewohnt ganz Europa, doch mehr das nordliche und mittlere, als das fub- liche. Bei uns trifft man diesen Specht am hausfigsten an. Er ist Stand und Strichvogel. Sie lieben Kieferwalder vorzüglich. Im herbst bezucht er kleinere Feldholzer und die Umgegenden der Dorfer und Stadte. Zur Nachtruhe mahlt er die hohle eines Baumes, die er sich selbst dazu einrichtet.

Er ist ein fraftiger, munterer, gewandter, feder und dabei schoner Bogel, der fast immer in Bewegung ist. Meisen, Goldhahnden, Baumsläufer und Kleber sind oft in feiner Gesellschaft. Er ist übrigens zankisch und wo er einen poden hort, fliegt er schnell hin, um ihm die Beute abzujagen. Man benutt dies, und lockt sie durch Nachahmung des Pochens der andern Spechte, verstedt, an, um sie sodann zu schießen.

Auf der Erde hupft er schwerfallig, defto gewandter ist er beim Besteigen der Baume und
Aeste. Sein harter Flug ift in regelmäßigen Abwechfelungen von einem starken Schnurren und
einem schwachen Saufeln begleitet, wovon man
das erste bei stillem Better, weit hort. Sein
Locton ist ein furzes hartes, Kgick (auch Kir),
zur Paarungszeit schnurren die Mannchen oft,
was sie auf dem Gipfel eines Baumes an einem
durren Zacken hervorbringen, indem sie schnell
und heftig mit dem Schnabel daran hammern,
wodurch ein lautes Poltern oder Schnurren hervorgebracht wird, das wie örrer oder ärrert
klingt und weit hin tont. Zahmen läßt er sich nicht.

Er lebt von allerlei Infetten, deren Giern, Larven und Puppen, auch von Ruffen und ver: fdiedenen Samenkernen und fucht feine Rah: rung nie auf bem Erdboden, fondern an und auf Baumen und Geftrauchen. Er fpaltet foad: hafte Borke auf und vertilgt befondere die Bor: fentafer (Bostrichus) und abnliche Gattungen. Sadt er in icadhafte fomachere Meffe, fo lauft er ploglich auf die andere Geite, um die burch das haden auf derfelben herausgetriebenen In= fetten noch zu ermischen. Die Jungen ziehen fie mit Infetten auf. Gehr gern freffen fie Safel= nuffe, Die fie in felbft gemachte Bertiefungen ber Baume flemmen und fie bann mit einigen far: fen Gonabelhieben fpalten und den Rern ver= gebren. Im Winter nahrt er fich oft allein von Riefernsamen, deren Bapfen er, wie die Safel: nuffe, in einen Baum flemmt und ben Gamen Dann aushadt. - Gern niffen fie in Riefer= waldungen. Im Marg und April begatten fie fich und maden Dabei vorber viel Larm. - In morfches Dol;, fen es Stamm oder Uft, mei: feln fie ein girtelrundes Loch gum Gingang, daß fie eben nur hinein tonnen. Im Innern ift es 1 Fuß weit und gegen 1 Suß tiefe Aushohlung. Sie legen das Mest felten unter 20 F. hoch an. Sahrlich machen fie fich fast immer ein neues Reft. Auf wenig flaren Solgspånen liegen 4 bis 5 garte, reinweiße Gier mit fehr fein fornichter Schale, wie Emaille glanzend. Beide Gatten bruten fie in 14-16 Tagen aus. Die Jungen find anfänglich blind, unformlich und gang nacht und verlieren erft nach und nach den Anollen am Schnabelminfel. Es find Refthoder, melde von den Alten fehr geliebt werden.

Der Suhnerhabicht, Sperber und Merlin find ihre Feinde. Wiefeln und Eichhörnchen zerzstören die Brut und zu ihren Plagen gehören noch Schmarogerinsekten und einige Eingeweidewurzmer. Sie find leicht zu schießen, auch auf Meisfenkloben durchs Pochen herbeigelockt, zu fanzgen. — Ihr Fleisch hat einen widerlichen Geruch und Geschmack, das Fleisch der Jungen schmeckt besser; man follte sie aber der Insektenzvertilgung wegen schonen. Ihr Schaden, den

fie thun, ift unbedeutend.

Der weiße Specht, weißruckiger, Elster=, größter Buntspecht. (Pic. leuconotus. Bechst.)

Schwars und weißbunt, mit etwas Roth. Der Unterruden und Burgel rein weiß; Bauch

und After rofenroth. Rein weißes Feld an ber Schulter. Um Mannchen ber Scheitel hochroth, am Beibchen fcmars.

Diefer Bogel ift erft in neueren Zeiten ent= bedt und von Bechftein benennt worden, es ift ber größte unter ben einheimifchen Buntipech: ten und fieht in Diefer Binficht zwischen Pic. canus und P. major in der Mitte. Die Lange beträgt ohne Schnabel 10 bis 11 3. Die Flugel: breite 18 bis 19 3. Der Schnabel 1 3. 3 bis 5 Linien lang. Die Bunge 3 3. lang hervorftred: bar. Gris braun, bei Alten gelbroth. Das alte Mannchen ist ein prächtiger Vogel. Zügel und Stirn find weiß, fart duntelrofigelb angelaufen; der Scheitel, von der Stirn bis an bas Benid, ein großer, eiformiger Fled, von einem prachtvollen hoben Rarminroth. Augenfreife, Schläfe und Mangen gelblich weiß; Die Schultern fcmarg, nur untermarts mit wenigen mei-Ben Querfleden und Streifen. Die weißen Bander auf den Flugeln find viel breiter als beim Rothspecht; der Ruden weiß. Das Beibchen hat am Ropfe nichts Rothes. Ihr ganger Schei: tel ift bis in den Raden hinab fcmarg; das Roth des Unterleibes weniger fcon.

Das nördliche Europa ist das eigentliche Basterland unsers Spechtes. Bei uns kommt er nur fehr felten vor. Es ist ein Strichs und Standvogel. Liebt Laubholzwaldungen, vorzügslich Eichenwälder. Uebrigens gleicht er den ansbern Buntspechten in Lebensart und Betragen sehr. Im Winter kommt er nahe an die Gesbäude, um Insekten dort aufzusuchen.

Er legt wie voriger in ein felbst ausgehadstes Nest 4—5 reinweiße, schon glanzende Gier. Da er gar nicht scheu ist, last er sich auch leicht schießen. Sein Fleisch schmedt nicht übel. Uebrisgens ist er ein nüglicher Bogel in Vertilgung der schällichen Insekten.

Der Mittel = Specht, mittlere Buntspecht. (Pic. medins. Linn.)

Schwarz, weiß und roth bunt. Der After und ein großer Theil des Unterleibes rofenroth, Ruden und Burzel tief schwarz; im Gesicht kein Schwarz; der Schnabel schwächlich und etwas gestreckt. Dieser Specht ist bedeutend kleiner, schwächlicher und 1½ Loth leichter als der Rothespecht. Seine Länge beträgt 8½ bis 8½ 3. Die Flügelbreite 15½ bis 16½ 3. Der Schnabel 11 bis 12 Linien lang. Die Fris ist braun, bei

Alten lebhaft braunroth oder fast hochroth. Berausgestreckt reicht die Junge 23. über die Schnabelspige hervor. Die Scheitelfedern sind ausgezeichnet lang, an den Enden schmal und haarartig zerschlissen, so daß sie aufgestraubt eine Holle bilden, wie die des Eichelhehers.

Das Mannden ist ein niedlicher Bogel. Die Stirn weißlich gelbbraun; der ganze Scheitel bis an den Naden prächtig farminroth; ein Streif vom letern bis auf den Ruden, wie diesfer, der obere Theil der Schulter, Unterruden und Burzel tief schwarz; Augenfreise, Schläse, Bangen und Dalsseiten weiß, erstere, die Züsgel besonders, mit durchschimmerndem Silberzgrau; die Reble schmuzig weiß; Bauch: und Unterschwanzdecksehern einfardig rosenroth, und diese herrliche Farbe läuft die auf die Mitte der Brust herauf. Die großen weißen Schultersedern mit den hintersten, mittlern und großen Flügelzdecksehen bilden ein großes weißes Feld über

Dem Flügel. Das Beibden ift außerlich faum verfchie: den; feine Ropfzierde ift nicht gang fo icon roth und geht nicht gang fo weit auf die Stirn vor, mie bei dem Mannden; der Unterforper hat beim Bergleich weniger und fcmugiger Rofa. -Mit dem Rothspecht hat er gleiches Baterland. In Deutschland ift er febr gemein. Er ift Stand: und Strichvogel, verlagt jum Theil foon im Mugust oder im September feinen Standort, freicht von einem Geholze gum andern und fehrt im Marg borthin wieder gurud. Er liebt befon: dere Laubholzwaldungen, fireicht aber bann baus fig in Feldholger, Ropfweidenanpflanzungen und in Die Umgebungen von Dorfern und Stadten. Gr übernachtet in Baumhohlen, geht fpat gur Rube und ift auch fruh, wie die andern Spechte, fon wieder ba. Findet er feine paffende Boble, fo bereitet er fich eine oft mit vieler Dube auf der untern Seite eines horizontalen morfchen Aftes, mas bernach oft Staare gu bequemen Brutftellen benugen.

Es ift ein sehr hurtiger und gewandter Bosgel, habert fich oft mit seines Gleichen. Sonz derbar genug ist es doch, daß im Winter in seiner Gesellschaft Meisen, Goldhahnchen, Aleiber und Baumlaufer mit herumstreisen und dem Ungeselligen gern nachziehen. Seine Stimme: tick tick fick, folgt mehrmals hastig auf einander, zuweilen klingt es wie: kjack fjack tiack. Im Frühjahr hort man diese Tone am meisten. Auch sie schnurren auf einem durz ren Zacken, wie die Rothspeckte, und zanken sich

auch heftig um die Beibchen. Gie laffen fich nicht gahmen.

Gie leben meift von Infetten, auch von manderlei Baumsamen, und verschlucken, Die Berdauung zu befordern, Riestorner, Die fie an Baumen an der Erde, wo fie fonft nicht hintom: men, auflefen. Gie berutichen Giden und Dbftbaume von unten bis jum Gipfel hinaus, ihre Mahrung fuchend. Gie meißeln Locher in das faule Solz, um die Larven der Solzwefpen (Sirex), Bodfafer (Cerambyx), Borfentafer (Bostrychus), Zangenkafer (Forficula), und noch viele andere Infekten, ihre Gier, Larven und Puppen ju fuchen. Damit bringt Diefer Bogel ben gangen Tag gu, benn er ift immer geschäftig. Ruffe, Gicheln u. bergl. genießt er auch gern, ja felbft Ririchferne haut er bes Rer: nes wegen auf.

Sie niften in Laubholzwaldungen. Marz oder im April begeben fie fich an die Brutorter. Das Reft legen fie boch an, in einem Uft oder faulem Stamm, mo fie das bolg beraus meifeln. Das Eingangeloch ift girkelrund, vom Gingang fenfrecht 7 bis 10 3. tief. Die Gier liegen auf wenigen feinen Solgspanen, 5 - 7; fie find furz oval, rein weiß, frifch fann man durch die garte Schale den rothgelben Dotter durchsehen. Beide Gatten bruten die wie polirt aussehenden Gier in 15 Tagen aus. Die Sungen gleichen Denen der übrigen Spechtbrut. Gie lieben fie fehr. - Die Feinde haben Die Jun: gen und Alten mit vorigen gemein. Durch nach: geahmtes Rlopfen an einen Baum, wie es die Spechte maden, tann man auch fie leicht anlo: den und ichiegen. Mit Golingen vor das Lod, wo einer feine Rachtrub halt, fo wie auf Bogel: heerden, fann man ihn fangen.

Sein Fleisch schmedt besser, als das vom Rothspecht, doch hat es auch einen widerlichen Geruch. Sein Nugen im Bertilgen der Insesten in Wald und Garten ift sehr groß. Dem Jäger zeigt er oft durch sein hastiges Schreien, Wildpret und Raubthiere an, die er ploglich zu fehen besommt.

Der kleine Buntspecht, Sarlekinspecht.

(Picus minor. Linn.)

Sowarz und weiß bunt. Der Mittelruden schwarz und weiß gebandert; am ganzen Unterstörper fein Roth. Das Mannchen mit rothem, das Weibchen mit weißem Scheitelfled.

Diefer Rleinspecht, wie er auch wohl heißt, ift feiner Rleinheit wegen nicht leicht mit einem der Borigen ju verwechfeln. In Bertheilung ber Farben gleicht er bem Beißfpecht am meiften. In der Lange mißt er nicht leicht über 63. Blu: gelbreite ift 111 bis 12 3. Der Gonabel 7 Li: nien lang. Die Gris ift hellbraun, beim alten Mannchen feuerroth. Die Bunge fann 11 3. worgestredt werden. - Bei bem alten Mannden find Stirn, Bugel und Salfter gelbbraun: lich; von der Stirn bis auf das Genick giert ben Dberfopf ein großer ovaler Bled, von einem prachtigen hellen Rarminroth, welche Farbe nadft ber Stirn gewöhnlich etwas lichter, bin: termarte ftarter ober feurichter, und an ben Seiten mit einem fdmargen Strich begrengt ift, welcher fich mit dem dreiedigen fdmargen Raden: fled vereinigt, deffen untere Spige ichmal ben hinterhals hinab zum ebenfalls ichwarzen Dber: ruden geht; Die untern Theile Des Rorpere meiß, mit einem ftarten lichtbraunen Unflug; Die Glu: gelbedfedern ichwars; Die Schwingen haben weiße Spigchen. - Die Beibchen feben ben Mannden abnlich, entbehren aber des Rothen und von der lichtbraunen Stirne erhebt fich ein großer ovaler, bis faft uber die Mitte Des Schei: tels hinauf reichender weißer Bled; Genid und Dintertheil des Scheitels tief fcmarg.

Diefe Urt bewohnt mehrere Theile des nord: licen Guropas. In Deutschland ift er nicht felten, aber doch nirgends gemein. Er ift mehr Stand: als Strichvogel und liebt ebene Bal: dungen, besonders Laubholzwalder, wenn fie viele alte Giden enthalten, befucht auch Baum: garten und Dbftanpflanzungen, befondere im Berbft und Binter. Un feinem Binteraufent: haltsorte hat er gewöhnlich ein ordentliches Revier, Das er taglich burchftreicht. Geine Golaf= felle ift Die Sohle eines Baumes. Findet er feine bequeme, fo meifelt er fich eine aus. - Es ift ein fehr munterer, gewandter Bogel. Mit gro: Ber Leichtigkeit hupft er Die Baumschafte binan, umfreift fie eben fo, flettert auch fleine Streden rudwarte, boch immer den Ropf nach oben ge: richtet. Er hammert viel an ben Baumen und arbeitet gefdidt Loder binein. Er ift ungefellig und futterneidifc, wie die übrigen Arten. Auch in feiner Gefellichaft find gern Meifen, Baum: laufer 2c. Gegen Menfchen ift er fehr zutraulich. Mit bem Mittelfpecht hat er im Betragen Die meifte Mehnlichkeit, benn felbft fein Blug ift fonurrend. Gegen die Ralte ift et gang gleich: gultig, nur Raureif fcheint ihm unangenehm gu senn. Seine Stimme gleicht der des Mittelsspechts. Wenn er an einen Baum gekommen, läßt er seine Stimme, sehr oft auch in der Besgattungszeit, boren; es ist ein seines und höherres: fiif fiif fiif, als beim Mittelspecht. Außerdem schnurren auch diese Mannchen an durren Zacken, es klingt bei ihnen höher, wie: Errrrr.

Die Nahrung besteht meist aus Insetten, deren Giern und Larven, Ameisen und Spinnen. Er beklettert deshalb gern die Baume, besonders die sowächern, gern Pflaumbaume, hinter deren Rinden er leichter als bei den großen mit starfer Borke die Insetten vorholt, verschiedene Larven, auch Jangenkäfer zc. Auch das morsche holz untersucht er fleißig nach Larven. Seine Ausdunflung ist, wie bei den übrigen Spechten, widrig, sie riecht nach Bisam.

In Laubholzwaldern niften fie am liebsten, wie etwa in den Auenwaldern an den Ufern der Elbe und Mulde. Sie zimmern ihr Reft felbft in bas morfche Solz alter Baume ober 3meige, oft ziemlich boch oben. Der Gingang ift felten über 14 3. im Durchmeffer und die Sohle felbft 6 3. tief. Gie fangen oft mehrere an, ehe fie eins gang vollenden. Die 5-6 Gier liegen auf einigen feinen Solgspanen. Gie find vom fein: ften Rorn, reinweiß icon glangend. Beide Gatten bruten fie binnen 14 Tagen aus. Gie lieben die Jungen fehr und futtern fie mit In: fekten auf. Die Feinde haben fie mit Borigen gemein. Man fann fie mit Blaferohren erlegen. Mit Nachahmung ihres Pochens fann man auch fie anloden.

Ihr Fleisch ift genießbar, doch verbietet dies fen Genuß ihr großer Rugen im Saushalt der Natur, der in Bertilgung so vieler schädlicher Insetten besteht, wovon ihr kleiner Magen stets voll ift.

Der Bojeische Specht. (Pic. Bojoi.)

Lange 15 3. Baterland mahrscheinlich Sude amerifa. — Der keilsormige Schwanz fehr absgestumpft: Die beiden mittlern Federn viel langer als die andern, außerordentlich start und elastisch. Auf dem Kopfe steht ein schöner, von zerschlissenen Federn gehildeter Busch; Kopf und Baden glanzend goldgelb, so wie der Naden, Stirn und Augenbraunen roth; die Kehle lebe haft weiß; vom Schnabelwinkel lauft ein rother Streif, auf der einen Seite die weiße Kehle,

auf der andern den gelben Kopf umfassend, und bedeckt sodann den Sals bis zur Brust und den Oberrucken. Längs den Seiten des Salses läuft ein blendend weißer Längstreif bis zum Flügel herab; Sinterrucken und Deckfedern des Schwanzes blendend weiß. Deckfedern der Flügel, Bauch, mittlere Schwanzsedern und Unterleib schön schwarz; Flügelrand, vordere Schwungsedern und übrige Schwanzsedern rein weiß; Füße schwarz; Schnabel braun.

Picoides.

Unter diesem Namen trennt 'man die von den vorigen Arten, denen der außere Finger fehlt, die folglich vorn 2 und hinten nur einen Finger haben; übrigens aber den gewöhnlichen Spechten gleich sind.

Der Dreizehen=Specht, Goldspecht. (Pic. tridactylus. Linn.)

Sowarz und weiß geschadt; bas Mannden mit gelbem, das Beibchen mit filberweißem Scheitelfled. In der Mitte des Dberrudens ein weißer Langestreif; Die Fuße nur breigehig. Durch legteres ift er von allen vorhergehenden Arten unterfchieden. Er ift faft wie der Mittel: fpecht gestaltet, 94 bis 10 3. lang, Flugelbreite 16 bis 173. Ochnabel 13. 1 bis 2 Linien lang. Die Gris ift perlfarben. Die Bunge fann nur 1 3. über die Schnabelfpige hinausgeftredt mer: den. Rinn, Reble, Gurgel und die Mitte der gangen Bruft, ber Lange nach weiß mit fartem roffgelbbraunlichen Unflug; Die Schulter: und Rudenfedern tief fcmars; Flugel fcmars; alle Schwingfedern mit einem fleinen weißen Gledden an ber Spige; ber Flugelrand ichmars und weiß gefcadt. Das Beibden unterscheidet fich besonders durch ben Mangel der gelben Federn am Ropfe; Stirn und Scheitel find fdmarg. Alte Beibchen haben einen filbergrauweißen Cheitelfled.

Diefer Specht bewohnt die nordlichen Lanz der, 3. B. Rußland, Norwegen, Finnland 2c. Bei und fommt er nur felten vor. Er ist wie die andern Spechte ein Stand und Strichvogel und liebt Fichten: und Tannenwalber. Im Binter freift er in die Eichen:, Buchen: und Birkenwalder, felbst in die Garten und baum: reichen Umgebungen bewohnter Orte.

Es ift ein munterer feder Bogel, der mit großer Gewandtheit die Baumschafte und far: fen Aeste hinanklettert. Er ist nicht fceu, pocht wie jene an den Baumen und laßt sich bei feinem Futterneid auch dadurch anlocken, auch schnurrt er wie seine Geschlechtsverwandten an durren Zaden. Er lebt meist von Insekten, in seinem Magen fand man auch mitunter Beeren vom Weißdorn. In seinem Reste lagen 4 bis 5 weizse Eier. Feinde und Jagd hat er mit Borigen gemein, so wie auch großen Nugen in Bertilzgung der Insekten.

Mendehals. (Yunx. Linn.)

Schnabel: gerade, etwas furz, völlig fegelsförmig, ziemlich spig, an den Seiten wenig zustammengedruckt. Zunge: nadelförmig mit hornartiger Spige ohne Widerhaken, der hintere Theil eine fehr dehnbare wurmförmige Röhre, weshalb sie weit hervorgeschnelt werden kann. Hüße: kurz 4zehig. Schwanz: nicht kurz, breit, weichfedrig, zum Anstemmen beim Rlettern unstauglich. Das ganze Gesieder locker und weich. Es sind kleine Rögel, die von dem sonderbaren Geberdenspiel der europäischen Art den Namen: Wendehals bekommen haben. In Europa giebt es nur solgende Art:

Der gemeine Wendehals, Nachenwindel.

(Yunx torquilla. Linn.)

Bom Raden bis auf ben Dberruden berab ein braunschwarzer Streif; Der Schwang mit 5 zidzadformigen braunfdwarzen Binden. - Das Gefieder hat gang eigenthumliche Farben und Beidnungen, Die man icon nennen fann, Da helles Afchgrau und Roftgelb, mit verschiedenem Braun und Schwarz, auch einigem Beiß, in fcon geformten Fledchen, Wellenlinien und Bidjade, nebft gabilofen feinen Punkten eine Beich= nung bilden, die felbst durch die lockere feiden= weiche Beschaffenheit des Gefieders dem Gangen eine Aehnlichkeit mit jenem der Tagschläfer und mander Gule geben. In der Ferne gefehen, ver= schwinden die fanften Zeichnungen und das Gange icheint dann ein ichmugiges, braunge= mifchtes Grau gu fenn. Lange 7 bis 75 3.; Flu: gelbreite 111 bis 12 3.; der Schwang 25 3. Der Schnabel nicht fart, 6 Linien lang. Gris lebhaft braun. Die Bunge ift, wie bei ben Gpech= ten, hinten eine wurmformige, fehr behnbare Rohre, vorn eine hornartige dunne Spige, aber

ohne Widerhacken. Sie kann über 21 3. über die Schnabelspige hinaus vorgeschnellt werden. An den weichen Theilen ist sie stets mit einem klebrigen Schleim überzogen. Der hinterkopf hat etwas lange Federn, welche, wie bei den Lerchen, hollenartig aufgesträubt werden konnen. Mannchen und Beibchen sind schwer zu untersscheiden.

Er bewohnt gang Europa, und ift in Sachs fen und Anhalt nicht felten. Es ift ein Zugvos gel, der und im August schon verläßt und erft Ende Aprils wiederkehrt. Er macht feine Reisen bes Nachts und die Mannchen erscheinen bei uns

ftete fruher, ale die Beibchen.

Bu feinen Aufenthaltsorten mahlt er: ans muthige Laubholzwalder, die mit Wiesen und Aeckern abwechseln, oder sonst viel Blogen entshalten, Feldhölzer, Baumgarten zc. und im herbst Kohlselder und Gemüsebeete in der Nahe von Baumen und Buschen. Tiesliegende, seuchte Gegenden, zieht er den durren vor. Es ist ein Baldvogel, der stell in der Nahe der Baume und Gebüsche lebt, z. B. auf Kopsweiden, Birn's und Apfelbaumen; er sist meist niedrig und besucht auch oft den Erdboden, und die

Ract bringt er in Baumbohlen gu.

Der Bendehals ift ein filler, trager, harmlo= fer, friedfertiger Bogel. Bor Menfchen hat er me: nig Furcht, fo daß man fich ihm fehr nahern tann. Merkwurdig ift fein Geberdenfpiel. Er breht den Sals oft lang aus, ftraubt die Ropffedern und breitet ben Schwang facherformig aus, alles unter wiederholten langfamen Berbeugungen; oder er dehnt den gangen Rorper und beugt fich, befonders wenn er bofe ift, langfam vorwarts, verdreht die Augen und bewegt die Rehle, wie ein Laubfrofc, aber mit einem fonderbaren Dumpfen Gurgeln. In der Ungft, wenn er ge: fangen und man mit ber hand zugreifen will, macht er noch fonderbarere Grimaffen, fo daß er Unfundige dadurch taufcht und, wie ich felbst Beuge mar, entwischt; mit aufgestraubten Ropf= federn und halbgeschloffenen Augen, Dehnt er den Sale ju einer befondern Lange aus, und brebt ibn wie eine Schlange gang langfam, fo daß der Ropf mahrend dem mehrmals im Rreife umgeht. Auch in ber Sand gehalten, breht und - windet er fich fo. Dies fonderbare Benehmen bat ibm auch die Ramen: Bende:, Dreb: bals, Rattermindel u. f. m. zugezogen. Dies thun indeffen nur die Alten, nicht aber Die Jungen, fo lange fie nehmlich noch nicht ausgemachsen find. Gein Ruf in der Paarunge: zeit ahnelt bem : Gath, gath, gath u.f. m. Des Lerdenfalten, flingt aber ichmader, faft wie weid weid u. f. f. Benn 2 Mannchen mit einander ganten, figen fie einander gegen uber, jedes auf einem besondern Baume, thun fich einander nichts, als: fcneiden Geberden und moduliren ihren Ruf auf manderlei Beife, mobei bas eine laut fein weid meid und bas andere gang beifer: mad mad ruft. Die ein= gelnen Gilben des erftern haben Aehnlichkeit mit dem Borte: Beib, weehalb auch der Land: mann wohl fagt: ber Specht (unfern Bendehals meinend) ruft fein Beib, mird's Commer. Dft ruft er Diefen Ton 12 bis 20 Mal fcnell nach einander. Benn er aber erft ein Beib oder gar Junge hat, hort man diefen Ruf nur felten. Bald mird er gahm, befcmugt fich aber leicht und man wird feiner bald überdruffig. -Er lebt von Infetten, befondere von Umeifen und deren Puppen. Gegen den Berbft verfdludt er zuweilen auch Sollunderbeeren. Geine Rah= rung fucht er meift auf der Erde, wo er am lieb= ften Ameifen frift, indem er Die Saufen der= felben durchftort, dann feine flebrichte Bunge ausstredt, darin herumschlangelt und die daran angeflebten Thierchen damit in den Gonabel gieht. Er frift alle fleinere Arten Ameifen, als: die gelbe (Formica rubra), fcmarge (F. nigra) und braune (F. fusca), noch lieber frift er aber die Puppen derfelben, die er aber mit der Bungenspige aufspießt und verschluckt. Auch an den Schaften, Meften und Zweigen ber Baume fangt er Die Ameisen weg. Geine Bunge ift ihm auch behulflich, Infekten, die in den Rigen feden, damit aufzuspießen. Große In= feften ergreift er aber mit dem Gonabel; auch frift er noch allerlei Insektenlarven, kleine Pup= pen und fleine grune Raupchen. Er trinft of= ters, auch badet er fich gern. Mit Ameifenpup: pen lagt er fich auch in der Gefangenichaft an Das Universalfutter gewohnen.

In Deutschland nistet er in frucktbaren waldigen Gegenden, besonders in Laubhölzern,
Baumanpflanzungen und in Obstgarten der Dorfer und Städte, wie im einsamen Balde. Das
Rest besindet sich stets in einer vorgefundenen Jöhle eines Baumes, wie sie sich eben darbietet,
bald weit, bald enge, flach oder tief, zuweilen
sehr niedrig, ein andermal wieder sehr hochBerlieren sie ihre Brut nicht, so kommen sie das
kunftige Jahr wieder. In der hohle machen sie teine Unterlagen und das Beibchen legt die Eier
meist gerade hinein; sie sind ziemlich kurz oval, ihre Schale ist sehr gart und dunn, rein weiß, ihre glatte Oberfläche hat einigen Glanz, man findet in einem Neste 7 bis 11 Stud und noch darüber. Das Mannchen nimmt taglich nur einige Stunden an dem Bruten Antheil. In 2 Wochen werden sie ausgebrütet. Es sind Rest bocker. Sie lieben ihre Brut sehr, die sie mit Ameisenpuppen und Raupchen auffüttern. Sie

machen nur eine Brut im Jahre.

Ihre Feinde find verschiedene Raubvogel. Der Brut ichaden besonders Ragen, Marder, Biefeln, Maufe, auch Elftern und heher. Die: fer Feinde megen find fie überall nicht häufig. In ben Gingeweiden hauft auch eine Urt Band: wurm. Diefer harmlofe Bogel wird leicht mit Der Flinte, ja felbst mit dem Blaferohre gefcof= fen; beim berausfliegen aus Roblftuden, auch leicht im Fluge. In Sprenkeln mit Sollunder: beeren oder Leimruthen auf Ameisenhaufen, Die er befucht, auch unter aufgestellten Schlaggarn: den wird er gefangen. Gein Fleifch ift gart und mohlichmedend, besonders im Berbft der Jungen, mo fie fehr fett find. In Stalien bringt man fie jum Berfpeifen zu Martte. Ihre Nah: rung macht fie indeffen gu fehr nuglichen Bogeln.

Ruduf.

Schnabel von der Lange des Kopfes, susammengedrudt, sanft gebogen, die scharfen Schneiz den ohne Ausschnitt. Die Junge beinahe lanzetz förmig, an der vordern Salste flach und hornartig. Füße meist kurz, die hinterzehe eine Wenzdehe. Der Schwanz lang, abgerundet oder keilförmig zehnfederig. Das kleine Gesieder ist von geringem Umfang, aber dicht und derb; die

langen Schenkelfedern bilden Sofen.

Die Bögel dieser Gattung sind unruhig, sturmisch, flüchtig und scheu; sie leben einsam, mandern einsam und weit weg. Ihre Ausentschaltsorte sind eigentlich waldige Gegenden, sie durchstreichen aber auch solche, wo Bäume selten sind. Sie leben von Insesten und deren Larzven, vorzüglich von langhaarigen Schmetterslingsraupen, welche andere verschmähen. Es sind gefräßige Bögel. — Sehr merkwürdig ist ihre Fortpslanzungsgeschichte; denn sie bruten nicht selbst, legen ihre Gier einzeln in die Rester kleiner Bögel, die ihre Jungen mit Insesten groß ziehen. Die Farben des Gesteders der Jungen sind denen der Alten mehrentheils sehr unähnzlich. — Die Haare, die man in dem Kuckusse

magen gefunden hat, sind nichts anders, als Saare von den verschlucken Haarraupen, nicht aber Haare, die sich daselbst in den Magenwans den des Kuckuks erzeugt haben sollen.

Der gemeine Ruduf, Gufguf. (Cuculus canorus. Linn.)

Die Fuße nebft Rrallen gelb; die Gomand: febern haben am Schafte weiße Fledchen; Die Schwingfedern auf der Innenfahne weiße Ban: der; der weiße Unterforper ift mit fcmarglichen Bellenftreifen befegt. Bei einem fluchtigen Blid entdeckt man Aehnlichkeit mit einem Raubvogel, namentlich mit bem Sperber und Thurmfalten, mas zu der Kabel, daß er ein Raubvogel merde, Beranlaffung gegeben haben mag; dem aber fein ganger Bau und feine Lebensart widerfpricht. Seine Gestalt ift folant, die Flugwertzeuge find fehr ausgebildet. Pflege und Wartung der Pfle= gealtern hat Ginfluß auf ihre Große und Ausbildung, daher findet man einige, die 61 oder auch die 9 Loth wiegen. Die Lange von der Stirn (wie gewöhnlich bei uns angegeben) bis gur Schwanzspige 123 bis 15 3., wovon auf Den Schwang 74 bis 743. abgehen. Der Schnabel 9 bis 11 Linien lang. Die Flugelbreite be: trägt 25 bis 263. Der Augenstern ift anfänglich grau, wird aber im hohen Alter feuerfarben. Bei alten Bogeln ift die Sauptfarbe afchblau oder blaulich afchgrau; Bruft, Beichen, Schentel und Bauch weiß, mit schmalen graufcmar= gen oder braunichwarglichen Bellenftreifen durch: zogen. Alte Weibchen find fcmer vom Mannchen ju unterscheiben. Die jungen Mannchen, nach überstandenem erften Maufern, betommen bei uns immer das vorher beschriebene Rleid ber Alten.

Das jahrige Beiben unfers Rucuts hat indessen den Naturforschern viel zu schaffen gesmacht, indem es in seinem Gesieder von den vorhin beschriebenen so abweicht, daß man daraus eine eigene Art, den sogenannten rothbraunen Rucut (Cuc. rufus s. hepaticus) gemacht hat, was jest aber vielfältige Untersuchungen und Beobachtungen hinlanglich widerlegt haben. Das Klima scheint auf diese Farbe sehr einflußzreich zu wirken, so daß man in Italien mehr braune als graue hat, ja selbst die jährigen Männchen rothbraun erscheinen. Nach Norden hin nimmt dieses rothbraune Kleid ab und man sieht dort sehr wenig oder gar keine rothbraunen Ruckuke. Unter den ausländischen Ruckuken sin-

det abnliche Beranderung der Farbe des Befies dere Statt.

Wenn unfer junge Rudut Febern befommt, fieht er gang ichieferichmarg und, ber weißen Bederrander megen, weißlich gefduppt aus, fo: bald fich aber die Federn mehr entfalten, zeigen fich an vielen Theilen ber Befiederung roftfarbige Bledden, und folde Junge, an welchen nie et: mas Rothes jum Borfchein fommt, find unge: mein felten. Das Schwarz wird bald gum Schie: fergrau und fpater, wenn ber Bogel icon lange geflogen, noch lichter, ins Braunliche ziehend. Um gemeinften find, ein Sahr in das andere gerechnet, Die rothbraun gefledten jungen Rudu: Te, viel feltner erscheinen Die fchiefergrauen. Daß Witterung und Nahrung dabei einflugreich mitwirken, ift ohne Zweifel; ja felbst auf die Gierschalen Farbung in manchen Sahren eigen einwirken muffe, Darüber fpricht icon Bech= ftein. Genug es herricht bier noch manche Dun: felheit, Die vielleicht erft Die Butunft, Dem forg: famen Forfden wird enthullen laffen. Gin aus: gezeichneter weißer Nadenfled fehlt indeffen hochft felten ben fo verfchieden gefarbten jungen Rudu: ten. Die Jungen maufern in ihrer Abmefenheit in warmern Landern und fommen bann nicht felten mit bem Uebergangegefieder zu uns.

Unfer Rudut hat fich weit verbreitet, denn man findet ihn in Guropa, Affen und in vielen Theilen Afrikas. In Guropa ift er ein Zugvogel, der über das mittellandische Meer zieht und jenfeit beffelben übermintert. Benn die Laubmalder zu grunen beginnen, im April, fommt er, im August verläßt er uns meift icon wieder. Gie gieben des Rachte, Die Mannchen fommen ge= wohnlich einige Tage fruher, ale Die Beibchen und fundigen fich fogleich in ihren Commerftands revieren durch ihren befannten Ruf an. Ihr liebfter Aufenthalt find Baldungen; auch in bufdreichen Umgebungen von Dorfern und Stad= Jedes Rudutsparchen bat fein eignes ten. Standrevier, das es gegen nahe mohnende fand: baft vertheidigt, daber die bestandigen Streitigs feiten, wenn eine, oder bas andere, Diefe Gren: gen überschreitet.

Es ift ein unbandiger, ungefelliger, hamis scher Bogel, der außer seinem Weiben feinen andern feines Gleichen in seinem Bezirk leidet. Biele Bogel haffen und verfolgen ihn. Meift fliegt er in Gesellschaft seines Weibenen, das meift dicht hinter ihm her fliegt, und hausig ses nich auch beide in Eine Baumkrone, doch nicht nahe beisammen. Mein wurdiger Freund,

der berühmte Drnitholog br. Raumann, bat auch über Diefen Bogel fehr ichagbare Bemerfungen mitgetheilt. Co beobachtete er ein Mann: den in feiner Gegend, bas bafelbft icon gum 25sten Mal fein Standquartier aufschlug. fannte es fete wieder an feiner ausgezeichneten Stimme. Den gewohnlichen Ruf des Rudute fann man taufdend auf ber Flote nachahmen, burch die Tone Fis und D in der mittlern Detave. Das von meinem Freunde fo lange beobach: tete Mannchen bat einen auffallend boben Ruf. fo dag es aus G noch ins Gis überschlägt, also: Buidut flingt. Uebrigens bort man den Ruf eines Ruduts, bei fillem Better, & Stunde weit. Ift das Dannden recht higig, fo ruft es hintereinander: Rududud, Dann folgt ber gewöhnliche Ruf: Rudut, mas er am Tage 20 bis 30 Mal hintereinander boren lagt. Gleich nach 12 Uhr bes Rachts ertont fein Ruf oft mehrere hundert Mal nach einander, ohne gu pauffren. Dann ift er wieder ruhig, bis der junge Lag beginnt, den er dann mit abnlich langem Rufe begrußt, ehe er feine Streifzuge beginnt. Gehr oft mird er durch das zu viele Rufen heifer, mas noch manche Modulation fei= ner Stimme veranlagt. Sigend ruft er nicht anders, als mit gefentten Flugeln und etwas gebogenem Schwang. Bevorftebenden Regen fundigt er durch haufigeres Rufen Fruh und Abende an. Gegen Jacobi verftummt fein Ruf gang. Die Stimme Des Beibdens gleicht mehr einem Gelachter oder Geficher und flingt, wie: Rwidwidwidwid 2c., was fehr fcnell auf einander folgt. Bum Stubenvogel pagt er nicht, ist unbändig und alt gefangen nimmt er fein Futter. Jung fann man ihn indeffen einige Sab= re in einem großen Bauer halten, boch macht feine Unreinlichkeit und das Abftogen feiner Redern ihn laftig. -

Seine Nahrung besteht hauptsächlich in Insefeten und deren Larven, die Jungen fressen auch Beeren vom Faulbaum (Rhamnus frangula, Linn.). Er frist Mai: und Brachtafer und auch andere Arten, meist aber doch behaarte Raupen. Sind die lehtern noch nicht so häusig da, so sehen sie sich, wie die Fliegenfänger, auf Pfähle, Stangen, durre Zweige u. dgl. und sehen sich nach Insesten um, auf die sie dann hersabschießen und sie fangen. Später sieht man sie auch auf gemäheten Wiesen auf heu: und Kornhausen, auf Insesten sauernd, auch auf Kohlstüden, Raupen aussuchen, wovon sie sehr sett werden. Der Kuckut ist ein arger Fresser,

der immer einen gefüllten Magen hat; das Un: verdauliche geben fie in Ballen von fic.

Die Jungen lassen sich mit Ameisenpuppen, Fliegen, Raupen u. dgl. auffüttern. Man muß aber, um ihn nach und nach an ein Stubenfutzter, das der Nachtigallen oder Orosseln, zu gewöhnen, es gleich beimischen, oder ihn an in Milch geweichte Semmel, mit gehaatem Fleisch vermengt, gewöhnen. hat dieser Fresser indessen nicht imzmer vollauf, so frist er seinen eigenen Koth.

Dag unfer Rudut das Ausbruten feiner Gier, fo wie das Auffuttern feiner Brut andern überläßt, ift bekannt. Bu Pflegealtern mablt er Arten aus ben Gattungen ber Ganger, Schlüpfer, Steinschmager, Bacftel: gen, Pieper zc., immer nur folche, Die von Infekten leben, oder doch ihre Jungen damit allein auffuttern. Geine eigentliche Begattungs: zeit dauert etwa 6 bis 7 Bochen, von der Mitte Mai bis Anfang Juli. Obgleich viele Vögel ihre Refter unfern Bliden fehr zu entziehen miffen, fo findet das Beibchen des Rudute boch die verstedten Zaun : und Rothfehldennester. Rach Der Anatomie und genauen Beobachtungen ift man berechtigt anzunehmen, daß ein Ruduts: weibchen 4 bis 6 Gier in einem Commer lege. Mit dem Legen umgehend find fie weniger icheu, Daher man auch mehr weibliche, als mannliche Rudufe um Diefe Zeit fchießt. Die langfame Entwidelung ber einzelnen Gier am Gierstode Icheint eine Saupturfache, daß der Ruduf gar feinen Trieb gum Bruten hat, Dies Gefcaft vielmehr andern überlagt, denn die erftern mur= Den unfehlbar verderben, ehe die legtern gelegt werden tonnten. Gie legen in ein gewähltes Reft nur ein Gi, und nur durch Bufall fann hier eine Ausnahme fattfinden. Das Gi wird meift in folde Refter gelegt, die ihre volle Gier: zahl noch nicht enthalten, hier ift es am leichte: ften angutommen, da dergleichen Gier noch nicht fortmahrend von den Bogeln befeffen merden. Gewöhnlich ichiebt er fein Gi ein, ohne einige ju gerbrechen. Ginige glauben indeffen, daß Dies gefchehe und daß er einige herauswerfe, ab= fichtlich oder gufallig? - Wie fie indeffen die Gier in manche Meffer bringen, ift gu bewun: bern. Bo es angeht, fest fich bas Beibden auf das Reft des fleinen Bogels und legt es hinein, wo aber der Eingang jum Refte fo en: ge, daß der Bogel nicht dazu fann, tragt das Beibden das gelegte Gi, im weiten Rachen genommen, binein. Dag bem fo fen, mag Folgendes bekunden. Im Spatherbft, da fcon Eis anseste, sah man ein weißes Backselzenweibchen, Futter suchend, nach einem Baume damit hin fliegen. Bei genauer Untersuchung fand man das Nest dieses Bögelchens mit sehr engem Eingange in einer Baumhöhler, worin ein junger Ruckut eingeschlossen sich befand. Menschenfreundlich erweiterte man die Deffnung und befreite dadurch den Gefangenen. Bäre dies nicht geschehen; so würde unfreitig die Pflegemutter mit dem Pflegling, in kurzem vor

Froft und hunger umgefommen fenn.

Das Rututsei ift fur Die Große Des Bogels außerordentlich flein. Es variirt von 10 bis 12 Linien Lange und einer Breite von 8 bis 9 Li= nien. Go wie fo vieles bei diefem Bogel, bei dem wir uns deshalb fo lange aufhalten, fo merfmurdig ift, fo find es auch die Gier, bald rund, oder doch fehr furz oval, bald acht eifor= mig zc. Ihre Schale ift dunn und gart, glatt, doch ohne merklichen Glanz und dabei noch fehr verschieden gefarbt, als charafteriftisch fann man eine Art gefrigelter Zeichnung betrachten, Die fie meiftens immer fenntlich macht; und mo Diefe ja fehlt, haben fie doch etwas Befonderes in der Form der Flede. Ihre Grundfarbe ift ebenfalls hochft verschieden, blaugrunlichweiß, schmußig = oder grauweiß, gelblichweiß, oder gelbbraunlichweiß. Gie find geflect, gepunftet, geftrichelt mit brauner und grauer Farbe, jene bald mehr oder weniger in Dlivenbraun ziehend, bald hellblau und diefes felbft zuweilen bis gu . einem ichmachen rothlichen Braun gefteigert, Die graue bei manchen bis ins reine Afchgrau über= gebend; bald ift damit MOes nur fein befrigelt, bald find fie auch grober geflect, biemeilen fte: hen die Zeichnungen sehr dicht, bei andern wieder nur fparfam, aber felten haufen fie fich am ffumpfen Ende zu einem frangabnlichen Schat: ten. Die meiften haben überdies noch gerffreute feine Stridelden und Dunfte von fdmargbrauner, oder ichwarzlicher Farbe. Merkwurdig ift es, daß fie fogar nach Sahrgangen variiren; d. h. man findet, von verschiedenen Beibden gelegt, in manchem Jahr 3. B. lauter gelbliche, in einem andern lauter grunliche ze., mas vielleicht in der Berfchiedenheit der Rahrungsmit= tel liegen mag; was bann wohl auch einflußreich auf die Farbung des Gefieders der Jungen einwirft, ba man auch in manchen Sahren fast Tauter rothliche, in einem andern wieder mehr blaue und fehr wenig rothlich geflecte, findet.

Der Rudut fommt fehr flein aus dem Gie, bat einen diden Ropf und große Augapfel. Er

madft fonell und wenn er erft Stoppeln hat, fieht er haflich und von weiten fceint eine Rrote im Defte gu boden. Die Jungen bes fleinen Bogele, wenn fie mit ausgebrutet, merden nur felten mit groß gefuttert, theile meil ber gefras Bige Stiefbruder alles verfdlingt, theile meil er fie durch feine beträchtliche Große aus dem Refte drangt, ob er dies mit Fleiß thue, ift noch nicht erwiesen. Ginige behaupten fogar, da man Die Meinen Bogel aus dem Refte oft gar nicht, oder boch todt unten findet, daß dies des Rudufs Weiben gethan, bamit ihr Rind bas Futter allein befomme. Die fleinen Bogelchen icheinen Diefen Betrug nicht gu fennen, indem fie mit wieler Liebe Diefen Bechfelbalg groß futtern. Wenn Diefes untergeschobene Rind hungert oder gefüttert wird, hort man eine gwitfchernde Stim: me, wie: Big, giffig und giffiffig flin: gend. Er ift unbehulflich und hodt an 2 Bo: chen im Refte. Dann begleiten ihn die Pflege: eltern, wohin er geht, und futtern ihn noch.

Dag von den Rachtommen des Rudufs jährlich viele barauf geben, liegt in vielen Um= ftanden; felbft Buchfe, Ragen, Marder 20., Ra: ben und Seber morden viele, auch die Alten werden bisweilen von Raubvogeln ermifct. In ihrem Gefieder leben auch Schmaroger, im In: nern Gingeweidemurmer. Auch wohl Menfchen verfolgen nuglos diefe Bogel, denen mir doch Die Bertilgung fo vieler ichadlichen Infetten gu verdanken haben. Micht leicht ichieft man die To icheuen Alten. Qurch ben genauen Rachruf ibrer Stimme fann man fie noch am leichteften anloden und ichiegen. In Italien verfpeift man fie haufig, Die Jungen, Die fo fett wie Lerchen werden, fcmeden fehr gut. Ihre Rahrung

burgt fur ihren großen Rugen.

Unmert. Der Rame Diefes merfwurdigen Bogels tommt oft im gemeinen Leben vor, 3. B. Der wird den Ruduf nicht mehr rufen horen. Dich foll der Ruffut holen! Auch die Fragen bei feinem Rufen: "Bie lange werd' ich noch le: ben?" Gern horcht man da auf ein fanges Rufen. Aber auf Die Frage eines Maddens, Das gern freien will: Wie lange, lieber Rudut! foll ich noch marten? wunscht man die Abfur: gung feines Rufe. - Man brannte ihn auch fonft gu Afche, jum Gebrauch gegen Gpilepfie u. f. w.

Der Seher=, Strauß=, große gefleck= te, Andalusische Rudut. (Cucul. glandarius. Linn.)

Auf dem Ropfe ein liegender Federbufch; Die Schwanzfedern mit weißen Enden, der Dberleib auf duntelm Grunde weiß gefledt; der Un: terleib und die untern Flugelbedfedern weiß, oder gelblich. Die Lange eines alten Manndens 161, Die Flügelbreite 251 3. Schwang 91 3 Der Schnabel ift dem des vorigen abnlich, doch viel großer, Die Lange von der Stirn bis gur Spige 1 3. Das Gefieder ift derber und fnapper anlies gend, Die Redern am Ropfe und an den untern Theilen fdmaler oder fleiner, als bei dem gemeit nen Ruduf, die Schenfelfedern bilden nur furge Sofen. Beim Mannden find Stirn, Bugel, Bans gen und Scheitel mit dem Federbusch bis ins Genich hell afchgrau mit fcmargen Federschaften und Duntelgrauen Federspigen; uber dem Raden auf dem Sinterhalfe bin, geht ein fingerbreiter, mattidmarger Streif nach dem Ruden gu, wo er allmählig in das dafelbft herrschende Graubraun übergeht. Bom Rinn bis jum After find alle untern Theile weiß. Das Beibden ift etwas fleiner, der Federbufch furger und der Unterleib nicht fo hell weiß.

Es ift ein fudlicher Bogel, deffen Baterland Afrita und Das marmere Affen ift. Befucht auch zuweilen das fudliche Italien, Spanien und Portugal; ja ein Barden murde in der Laufig, unweit Lubben, im Spreethal in einem fumpfi= gen Bufdholze angetroffen und ein Stud davon gefcoffen. - Es ift übrigens ein wilder icheuer Bogel, der fic durch fein ftartes Spechtgefdrei kenntlich macht. Seine Rahrung find allerlei große Infekten, Raupen und andere große Infek-

ten : Larven.

Der glanzende Ruduf. (Cuc. lucidus. Lath.)

Lange 63. Naterland Reuseeland. Scheitel, Naden, Ruden, Flugel und alle mittlern Schwanzfedern icon grun, brongenfarb glane gend; die Geitenfedern des Comanges find meiß und dunkelgrun geflect, und auf der untern Seite alles geflectt. Geiten des Ropfs und Sale fes und alle untern Theile weiß, mit unregele mäßigen goldgrunen Querftreifen; Die Mitte Des Baudes rein weiß.

Eua. (Coua Vaill. Coccyzns. Vieill.)

Levaillant hat die hierher gehörigen Bögel zuerst von den Kuchufen getrennt. Sie untersicheiden sich besonders durch lange Beine; die Flügel gleichen auch mehr denen der Essern und die Zehen sind stärker als bei den wahren Kuchufs; der Schnabel an der Wurzel dicker, die Nasenlöcher schief abgeschnitten, ohne aufgeworsfenen Rand; die Zahl der Federn, des langen abgestuften Schwanzes 10. Der Körper ist start, der Halb furz, die Stimme fark und angenehm. Nahrung Insetten, in kaltern Landern sind sie Zugvögel. Ihre Gier legen sie in hohse Bäume, dauen sich auch Rester, brüten selbst und füttern ihre Jungen auf.

Der rothäugige Cua. (Coua erythrophthalmos.)

Lange 10 3. Alle obern Theile rothbraun: fic, etwas ins brongefarb fdillernd, Geficht, Reble, Borderhals fcmugig weißgrau roftfarb überlaufen, Aftergegend hell brandgelb, Die übrigen untern Theile weiß. Der lange Schwanz bat Die Farbe Des Rudens, Die beiden mittlern Redern ungefledt, Die ubrigen mit weißer Spige und por berfelben ein ichmarglicher Fled. Er liebt besondere Die bidften Balber an ben Ceiten ber Gumpfe. Im Geptember verlagt er ben Norden und fommt in Penfplvanien im April an. Sie leben paarmeife, ubrigens ungefellig, wie Die eigentlichen Rudute. Ihr Gefdrei flingt wie: Rove, Rove, Rove, Rove fonell bin: ter einander, Deswegen heißt er dort Roov o: gel. Die Sauptnahrung besteht auch bei ihnen aus haarigen Raupen, wodurch auch bei ihnen Die innere Glache Des Magens behaart erfceint. Gie find fehr gefraßig und follen auch Die Gier anderer Bogel, wie unfre Deber und Rraben, verzehren. Gie paaren fich im Mai, wobei Die Mannden heftig mit einander um die Beiben tampfen. Die 3 bis 4 grunblauen Gier liegen auf dem flachen Boden des Reftes. Das Beib: den brutet febr emfig. Der Brut drohende Ge: fahr fucht es badurch abzumenden, bag es plog: lich auf den Boben fliegt, fich lahm fellt, und angfilich umberflattert, um badurd ben Feind vom Refie abzuloden. Die Jungen futtern Die Alten vorzüglich mit Raupen, welche auf Aepfel= baumen leben. Der amerifanische Landmann

nimmt biefe Bogel, die fo viel Raupen todten, in Shug, ba fiebefonders auch gar nicht ichaben.

Spornfuctuf. (Centropus. Vieill.)

Alle hieher gehörigen Arten sind meist Bewohner der alten Belt. In der allgemeinen
Form nahern sie sich den Ruduken; aber der
lange Sporen an der innern Zehe und die mit
Federn bedeckten Nasenlöcher unterscheiden sie
sehr; so auch die Beschaffenheit ihres Gesieders;
die Federn am Kopf, hals, Brust und Rucken
haben ungemein starte steise Schäfte, wodurch
das Gesieder rauh und steif anzufühlen ist. Die
Flügel sind abgerundet. Es sind meist große
und starte Bögel, die in Bäldern leben, in
Baumhöhlen nisten und ihre Jungen selbst ausbrüten und ausziehen. Sie leben von Insekten
und sind vorzügliche Feinde der heuschrecken.

Der Huhu. (Centropus houhon.)

Man findet diefen Bogel fast in gang Afrifa, von Megypten bis jum Cap in den Baldern, von 14 bis 16 3. Lange. Dbigen Ramen hat er fei= nem Gefdrei ju verbanten; mas er vielemal binter einander ausruft und nur bei diefem Go= Schaft lagt er fich fougmagig antommen. Geine vier roftgelben Gier legt Das Beibchen in Baum: boblen auf Solgreiferden, und brutet fie gemein: Schaftlich mit bem Mannchen aus. Beibe Gatten halten fich fete gufammen. - Ropf und Dber: hals find dunkelgrun, mit Stahlglang; der Ruden, Burgel und die obern Dedfedern des Schwanzes braun, grun überlaufen, je nach bem einfallenden Licht. Flügel und Schwang zeigen eine Mifdung von Braun und Grunglangend; Reble, Borderhale und Bruft weißlich rofffarb, mit glangenden Schaften, ber Unterbauch; Die untere Geite bes Schwanges und Schenfel fcmarggrun, mit feinen dunfeln Bellenlinien : Der Schnabel fdmarg, Beine fdmargbraun; Die Mugen lebhaft roth. Das Weibchen ift kleiner als das Mannden, hat auch weniger Metallglang.

Anzeiger. (Indicator.)

Schnabel furz zusammengedrudt, feitlich erweiztert, fast gerade, an der Spige etwas gefrummt und ausgeschweift; Rasengrube tief. Nasenso

der an ber Burgel bes Schnabele etwas roh: rig mit einer Saut umgeben. Beine furg; Glus gel mittelmäßig. Gie freffen Sonig. Die afri= fanifden Coloniften beobachten feinen Flug, und folgen ihm nach. Es find große Schreier, Die bei ihrem Auffinden der Bienenftode ihre Stim: me um fo ftarter erheben und dadurch wider ih: ren Billen, den Menfchen Die Stode verrathen. Sie leben fern von der Rufte in maldigen Gegenden und niften in hohle Baume. Ihr Flug ift fowerfallig, fie find nicht fehr fcheu und leicht ju ichießen. Gie freffen Sonig und Bache, aber feine Bienen. Diefe follen ihnen indeffen fehr gufegen und ob fie fich gleich vertheidigen, follen fie Diefelben doch in die Augen flechen und fie bann ben Stichen unterliegen. Indeffen ift ihre Saut bid und die Fafern find fo feft verbunden, daß man nicht leicht eine Radel einfte: den fann, und fo bildet fie eine Urt Panger ge: gen Diefe Stiche.

Der weißschnablige Anzeiger. (Ind. albirostris.)

Alle obern Theile find graubraun oder erdefart; Gurgel schwarz, mehr oder minder stark weiß eingefaßt, die untern Theile weißgraulich; die Flügel erdfarben, die Deckfedern weiß gestäumt, auf den Schultern ein gelber Fleck. Der Schnabel ist weiß, die Beine braun. Länge 73. 6 Linien. Lebt am Senegal und in Aegypten.

Unmerf. hierher gehort auch der bo= nigfudut (Gucul. Indicator. Linn). Das Mannchen ift obenher olivengrun ins Braune, Die Seitenfedern des Schwanzes weiß mit braunem Bled, am Ende. Reble und Bruft blag: gelb, etwas weiß melirt; ber Bauch weiß. Das Beibchen ift mehr gelblich und an ber Bruft gefledt. Ift von der Große eines Reuntodters. -Gine nach Cuvier hierher gehörige Gattung Barbacou vaill. von Barbu und Coucou hat einen geftrecten, fegelformigen, wenig gufam: mengedrudten, am Ende leicht gebogenen Cona: bel, ber an der Bafis mit geschligten Federn oder fleifen Saaren befest ift, mas ihnen einige Mehn: lichteit mit den Bartvogeln giebt. - Bir fuh: ren bier nur einen, ben C. tranquillus nach Lath. Buco calcaratus, cinereus an: Schwarz ins Blaugraue, ein weißer Streif auf ben Ded: federn; der Schnabel blutroth. Baterland Su: rinam.

Malcoha. Vaill. Phoenicophaens. Vieill.

Der Schnabel långer als der Ropf, stark, dick, abgerundet, sehr platt, von der Burzel an gebogen, gegen die Spige gewöldt. Rasenzlöcher seitlich, gerandet, von der Schnabelwurzel abstehend; Augengegend warzig und nackt. Flügel sehr kurz. Schwanz lang. — Sie führen den Ramen Malfoha in Ceylon von dem Ramen eines Bogels dieser Gattung. Sie sollen sich von Frückten nähren und leben sämmtlich auf den Inseln des indischen Archipels.

Der grüne Malfoha. (Phoenicophaeus viridis.)

Ropf, Dbergegend, Sinterhale und ein Streif vom Unterschnabel nach dem Rucken fcmarggrau; die gange Gegend von den Rafen: lochern an, ringe um die Mugen und Bachen nadt, warzig und roth; Rinn graulich; alle un= tern Theile, Borderhals und Geiten des Salfes lebhaft taftanienbraunroth, Unterbauch duntelbraun; Sinterhals graufdmarglid, Mantel, Schultern und Dedfedern grun, ins Stahlblaue fwillernd. Schwang lang, feilformig, am obern und hintern Theile grun foillernd, an der vordern Geite fastanienbraun. Fuße schwarz. Dberfdnabel fart gewolbt und icon grunlich: gelb; Unterschenkel fcmarg. Schenkelfedern fcmarzbraun. Lange 17 3. Baterland : Java.

Rinnenschnabel. (Scythrops.)

Shnabel lang, ftark, hart, kegelformig gewolbt, an der Spige stark gebogen, hoher als breit, an der Stirn niedrig, an den Seiten erweitert; bei Ulten auf den Seiten gefurcht. Zehen gepaart, kurz, stark; Flügel lang. Schwanz sehr lang, abgerundet.

Der Reu = Hollandische Rinnen= schnabel. (Scyth. novae Hollandiae. Temm.)

Ropf, hals und alle obern Theile hellasch; grau; Ruden, Flügel und Schwanz bleigrau oder blaugraulich, alle Federn mit schwarzen Spigen. Der Schwanz hat am Ende ein schwarzzen Band und weiße Spige; Füße blauschwärzlich;

29 *

Schnabel horngrau. Länge 22 bis 253. Raterland Neu-Solland und auf Celebes. Er heißt Amaaro oder Regenprophet, weil man aus seinem Geschrei und flurmischen Bewegungen sicher auf Regen und Wind schließen kann. Sie erscheinen im October bei Port Jackson, in Gesells schaft von 7-8 Stud.

Es find wilde und fluchtige Bogel, die fich bei iconem Better verborgen halten, aber foms mendes Unwetter mit durchdringendem, doch nicht unangenehmen Gefchrei antundigen. Ihre Rahrung soll in Insetten und Pfeffer bestehen.

Bartvogek (Bucco.)

Schnabel bid, breit, flaff, glaft, wenig gebogen, niedergedrudt; die beiden Kinnfaden an ber Spige gleich lang und hoch. Nasenlöcher an der Wurzel seitlich durch die hornmasse des Schnabels gehend, durch Borstenhaare bededt, die oft über die Schnabelspige vorragen. Füs fe furz, Läufe fürzer als die vordern Zehen, diese mit einander bis zum zweiten Gelenke verzunden. Flügel furz.

Die hierher gehörigen Bogel find fart vom Abrper, der Ropf groß und bid, daher ihr plums pes Anfebn. Gie leben in den marmften Gegens ben von Affen, Afrika, im fublichen Amerika und auf den Antillen. Ihre Gitten icheinen ins Deffen nicht überall Diefelben gu fenn. Sonn es rat fagt von den Bartvogeln Indiens, daß fie Infetten freffen und gleich den Burgern fleine Bogel angreifen. Dagegen find Die amerifanis fcen ruhige dumme Bogel, welche in ben einfamften und bunfelften Baldern leben. Leicht tann man fie fdiegen. Shr Bleifch ift fcmade baft. Nach Baillant follen Die alten fcmaden Bogel bes ichwarzfehlichten Bartvogels Afrifas, von ben jungern ihrer Art gefuttert werden. Er fand namtich in einer Belle, bes gemein. famen Deftes, welche bie Bogel bauen, eis nen Alten, ber weber geben noch fliegen tonne te, gange Saufen Rern und Infetten neben ibm. Die afrifanischen haben mehr dunfle Farben, braun, gelb und roth, die Arten ands rer Gegenden mehr lebhafter, grun, blau und roth. Cuvier macht 3 Unterabtheilungen: 1) Pogonias. 2) Bucco (eigentliche). 3) Tamatia. Langschnauziger Bartvogel. (Bucco mystacophanes. Temm.)

Auf der Stirn ein breiter goldgelber Ffed, von fehr lebhafter Farbe, Die Seitenrander Diefes gegen Die Augen, find gart grun; Stirn, Reble, Dber : und hinterkopf icon carmoifinroth, 2 Flede von gleicher Farbe an ben Geis ten der Bruft, welche ein agurblaues, fcmales halbes Salsband zwifden fich laffen, unter dem Muge ein agurblauer Fled, und zwischen Diesem und bem Rarmin der Rehle ein gelber, ber nach hinten in die hellgrunen Baden verläuft; ber Raden und Sinterhals bunkelgrun, jede Feder mit hellgrunem Rande, daher wie gefouppt; alle übrigen obern Theile fcon duntel= grun oder grasgrun; Schulter blaulich, alle untern Theile dagegen fcon lebhaft hellgrun. Der farke Schnabel fdmarzblau und über ihn heraus ragen ju beiden Seiten wie ein Ramm lange, farte, fcmarge Borftenhaare. Beine fcmarzblau. Die einjahrigen Jungen find faft einformig grun. Baterland Gumatra.

Curucu. (Trogon. Linn.)

Sonabel furger als der Ropf, Did gewolbt convex, Rander gezähnelt; Schnabelmurzel mit Borftenhaaren befest. Rafenloder an der Bure gel des Schnabels, offen, in den Borften die vom Gefict tommen, verborgen. Fuße furg, fcmach, eine Bendezehe. Flugel mittelmaßig. - Der Ropf ift groß; Die Mundoffnung weit; Die ichmachen Beine fast gang befiedert; bas Gefie Der feidenartig, glangend, fehr loder, Die Barte gerschliffen; Saut dunn und gart, Die Federn fallen leicht aus. Das Gefieder ift foon, Die Bogel aber felbft plump. hinter bem Raden ein nadter Gled, ben man nur bemerft, wenn man die Federn wegfdiebt, oder den Sals verlangert. Still und einfam leben fie in dunfeln gro: Ben Baldern, bier figen fie fdweigend auf Infet: ten lauernd, fo daß man fie nicht leicht bemerft.

Nur in der Zeit der Begattung geben Mannden und Beibden wohlklingende, aber melancholische Tone von fich. Der Flug ist kurz und niedrig. Sie nisten in wurmstichige Baumlöcher und machen jährlich 2 Bruten. Temmink giebt 19 Arten an. Sie gehören den wärmsten Elimaten beider Welten an. Ihre herrlichen Farben verblassen in Sammlungen, wenn sie dem Lichte ausgesetzt sind.

Der Duvaucelische Eurucu (Trog. Duvaucelii. Temm.)

Der Kopf und ber obere Theil bes Salfes Tammetfdwarg, Die untern Theile Des Salfes, Die Bruft, alle untern Theile des Rorpers, Burgel und Dedfedern des Schwanzes, icon glan: gend roth; ber obere Theil des Rudens und Soultern zimmethraun, mit ichwarzer Endbin-De; die beiden folgenden auf jeder Geite fcmarg und die ubrigen halb fdmars, halb weiß; Blu: gel fowars mit zahlreichen weißen Bidgadli= nien; die Laufe mit rofenfarbnen fehr breiten Redergurteln, mit einer braunen Linie umges ben, der Schnabel ichon hellblau und oben eine nadte Stelle vom Schnabel gegen Die Baden, und ein Streif uber ben Mugen. Lange 8 3. 6 bis 7 Linien. Baterland Sumatra, von bem verdienstvollen frangofischen Raturforscher Dus vaucel zuerft entdedt.

Curucu Marina. (Trog. Narina.)

Mannden: Ropf, Sals, Mantel, Ruden, Burgel, die kleinen Deckfedern der Flügel und Diejenigen oben am Schwanze, glanzend grun; die großen Deckfedern der Flügel, deren Grund grau ist, sind mit schwarzlichen Ziczachpunktliznien besetz, die großen Schwungsedern sind schwarz mit weißen Schäften; Brust, Bauch und Aftergegend schwach rosenroth; die mittlern Schwanzsedern sind gleich lang, die andern abzgesuft, so daß die äußerste noch nicht die Salfte der mittlern lang ist, die ersten obern goldgrun, und die andern an der außern Fahne weiß, an der innern schwarzlich.

Weiboen: Alle Farben find wemiger glans zend, das Rosenroth viel blaffer und die Stirn braunroth, die Somungfedern braunschwarz. Das Weiboen legt 4 fast runde, weiße, rosens roth überlaufene Gier. Sie bruten 20 Tage. Basterland Sudafrifa.

Der Pfauencurucu. (Trog. pavoninus. Temm.)

Des Manndens Kleid gleich an Glang bem bes Pfaues. Ropf, Sals, Bruft, Ruden, Manstel, Dedfedern der Flügel und des Schwanzes, so wie die beiden viel langern mittlern schwalen Schwanzsedern, find glanzend gelbgrun, besonders glanzen die zerschlissenen Federsaume gol-

den, und fallen auf ben glanzend schwarzen Schwungsedern herrlich auf. Der ganze Bauch und die untern Decksedern des Schwanzes sind schön karminroth; der Schwanz schwarz, die beiden außern Federn mit weißen Spigen. Der Schwanz am lebenden rothlich, die Beine braun. Die Lange ist 1 F. 6 J. Die mittlern schwazlen Schwanzsedern reichen 7 J. über die übrizgen hinaus. Die peruvianischen Damen schwäcken sich nich under Schwanzssedern. Das Beibeben ist noch unbekannt. Baterland Brazisien und Peru.

Mabenfresser. (Crotopliaga.)

Der Schnabel furz, did, viel höher als breit, fehr zusammengedrückt, am obern Theile schneidend. Die Nasenlöcher an der Schnabels wurzel, feitlich, eiformig, offen. Beine lang, start; Flügel furz; Schwanz lang, abgerundet, ans 8 breiten Federn bestehend.

Man fennt 3 Arten, die in allen Theilen Sudamerikas wohnen. Sie leben gesellig und nahren sich von kleinen Eidechsen, Insektenlarzven, Raupen und mehligen Saamen. Sie sind nicht scheu und lassen sich leicht schießen. Sie halten sich an den Randern der Wälder, besonders an den Saumen der grasreichen auf. Sie sollen gemeinsame Rester bauen, in denen mehrere Weibchen, oder doch in abgetheilten Kammern bruten. Die Farbe der 3 Arten ist schwarz, die Federränder bronziren glanzend.

Der große Madenfresser. (Crotoph. major.)

Shlanfer, doch fo groß als ein heher, Schmanz fehr lang, 9½ 3. Ganze Länge 18 3. Er ist feltner und scheuer als die übrigen und liebt fehr dichtes Gebusch. Es ist ein Standwogel, der zu 18 bis 20 Stud beisammen sebt. Sie sißen den Kopf an die Brust gelehnt und lassen die Flügel hängen. Oft sißen sie ganz gedrängt nebeneinander auf Zweigen, und lassen ihre Stimme als eine Art Geschwäß hören, das wie ein Gemurmel tont. In Capenne mennt man sie Bouilleurs (Kocher), weil man den Lon mit dem der kochenden Flüssigkeiten vergleicht. Leicht lassen sie sich zähmen und lernen sprechen wie die Papageien, doch riechen sie übel.

Wie die Dofenhader Afrikas fegen fic auch Die Madenfresser auf den Ruden des weidenden Biebes, um auch die Larven abzulesen. Die großen Ameisen lieben sie sehr. Sie nisten in die dichtesten Zweige der Baume, so daß sie Baumreiser so geschickt ordnen, daß sie mehrere Abtheilungen eines gemeinsamen Restes bilden, deren Scheidewände sie mit durrem Grase durchtechten. Die Unterlage der Eier besteht aus Blättern. Die Mutter soll die Jungen ohne Unterschied der Ihrigen auffüttern. Die grünen Eier sind mit einer weißen Kalkfruste negformig überzogen, wie eine Melone; diese Ralkfruste läßt sich aber leicht mit einem Messer wegnehmen. — Außer diesen giebt es noch den kleinen Madens. (Grotoph. Ani) in Brasilien und der Las Casische (Grotoph. Casasii) in der Gegend von Lima und Peru.

Tufan. (Rhamphastos.)

Schnabel zellig, dunn, durchscheinend, sehr groß, breiter und hoher als die Stirn, mit eizner starken und beutlichen Firste, etwas gerade, an der Spige schwach gebogen; die Kinnsadenzscheide regelmäßig gezähnt. Die Nasenlöcher nicht leicht sichtar, hinter der hornmasse verzborgen, welche die Stirn wie eine Wulst umzgiebt, offen, eiformig, ganz mit einer haut umgeben. Beine start, Lauf so lang, als die größere Zehe, die beiden vordern Zehen bis zum zweiten Gesenk verbunden. Flügel mittelzmäßig, gewölbt.

Die Junge ift fo lang als ber Schnabel, schmal, glatt, hornartig, elastisch, gleich breit, an den Randern federartig zerschlissen. Das Gessicht nacht. Der Schwanz mittelmäßig lang, abgerundet, hat 10 breite Federn.

Ane Arten leben in Sudamerifa. Ginige haben einen weißen, andere einen gelben Bor-Derhale.

Der Tofo. (Rhamph. Toco.)

Seine Lange beträgt 19 3. Der bohe Schnaz bel fehr lang, durchscheinend lebhaft goldgelb, an der Burzel mit einer schwarzen Binde, an der untern Kinnlade mit einem schwarzen Fled; auf beiden Seiten der Stirne ein kleiner dreizectiger Fled, der Borderhals weiß, am Nitztelhals hellgelb gewässert und am untern Rande roth; die Deckfedern des Schwanzes oben weiß, unten hochroth; Plugel, Schwanz und alle übrizgen Theile schwarz, die nackte Stelle um die

Augen lebhaft pommeranzengelb, Augenlieder blau. Das Beibden gleicht dem Mannchen. Baterland Capenne, Brafilien.

Der mehrfarbige Tukan. (Rhamph. discolor.)

Nur 17 3. lang. Baterland des vorigen. Die obern Theile des Ropfes, ein Streif um die Schnabelwurzel, hinterhals, Rucken, Flüsgel, Schwanz und ein breiter Streif unter dem Bauche find schwarz, mit grunem Schimmer; Baden und Gurgel schon schwefelgelb; der unstere Theil des halfes aber schon orangegelb und diese schon Barbe scheidet von dem schönen lebhaftem Roth der Brust und des Oberbauches, auch die Deckfedern des Schwanzes oben und unten schön roth; die Schenkel schwarz, ins Grune schimmernd. Der Schnabel an der Burzel schwarz, und dergleichen Streif sauf über denselben weg, übrigens olivengrun; der Rand aber rothlich gesaumt.

"Araffari, Federzüngler. (Pteroglossus.)

Schnabel auch zellig mit dunnen Banden, langer als der Kopf, so breit und hoch als die Stirn; an der Burzel niedrig gewölbt, ohne Grathe, sichelformig gefrummt, an der Spige sich schnell biegend; die Rander der Kinnlade regelmäßig gezähnelt. Die Rafenlöcher an der Schnabelwurzel am obern Theile der Stirne, in 2 Bertiefungen des Schnabels eindringend, rundlich offen. Beine mittelmäßig, die beiden vordern Zehen bis zum 2ten Gelenke verdunzen. Flügel kurz, ausgebogen. Der fehr abzgestufte Schwanz lang. Die Zunge hart.

Sie leben in Sudamerika von Früchten, Insekten und kleinen Bögeln, die fie aus den Restern holen. Die Regenzeit benugen sie, um die harten Ameisennester, die dann erweicht, zu zerstören. Ihre Nahrungsmittel besser zu verschlucken, werfen sie dieselbe in die Luft und fangen sie wieder. Ihre 2 Gier legen sie in hohle Baume. Ihre Stimme ist rauh und unangenehm. Die Farbe ihres Gesieders ist schwarz, gelb, grun und roth auf verschiedene Weise bei den Arten vertheilt. Ihre Junge ist hornartig hart, sehr platt und dunn, auf beiden Seiten wie eine Feder zerschlissen, dient wohl nicht als Geschmadsorgan.

Der Arafari mit gefurchtem Schnabel. (Pterogl. sulcatus.)

Der Schnabel nicht gewolbt wie bei ben an: bern, fondern gu beiden Geiten mit einer tiefen Furche verseben und zwar an beiden Kinnladen, an der obern ift noch eine zweite fehr furge und zwischen beiben eine Grathe. Die Farbe Des Schnabels ift braun fdwarg marmorirt; Die nadte Augenhaut ift blaulich, mit einem Gaum von lebhaftem Ugurblau; alle obern Theile find lebhaft gradgrun; Die Rehle fehr hell afchgrau und das übrige Gefieder fcon hellgrun. Lange 12 3. 6 Linien. Baterland: Peru,

Papagei. (Psittacus.)

Schnabel furs, Did, gewolbt, fehr fart und bart, jufammengedruckt, oben und unten conver, von der Burgel an gefrummt, an der Spige aber hatenformig umgebogen und Die Spige ahlenformig; die untere Rinnlade furz, ftumpf, an ber Spige eingebogen, und oft abs genugt, fo daß fie fich faft gabelformig zeigt. Die Schnabelmurgel mit einer Bachshaut bes fleidet. Nafenlocher an der Burgel rundlich, in Die Bacohaut eingefentt, offen. Guge furg, Did, fart, Suffohle breit; Lauf furger als Die außere Zehe, die vordere an der Burgel verbun: Den. Flugel etwas lang, fart; Bilbung ber Somange verschieden, man hat fie banach ab: gesondert. Da 220 Arten Davon entdedt, find fie eine ber gablreichften Bogelarten, Die mit Ausnahme einer oder zwei Arten nur die Eros penlander bewohnen und mit den Uffen ungefahr Daffelbe Baterland, Doch noch etwas weiter aus: gedehnt, haben, da fie auch Reuholland und Die nahen Lander bewohnen.

Die Bunge der Papageien ift bei den meiften Did, fleischig und vorn abgerundet und fcheint ein wirkliches Gefdmadeorgan ju fenn. einigen Arten endigt fie jedoch mit einem Bun: Del fnorpeliger Fibern, oder einer hornartigen Somiele, welche an der Spige eines ziemlich Dunnen Stieldens fist. Es find vortreffliche Rlettervogel, Die fich der Fuße fatt einer Sand bedienen, um damit Die Speifen gum Schnabel au bringen. Much des Schnabels bedienen fie fich fehr gefdidt jum Rlettern, tonnen fich auch Damit festhalten. Der Ropf ift bei ben meiften Arten groß, did und rundlich. Die obere Schna: bellade ift an der Stirn febr beweglich. Bei

einigen findet man wie bei ben Gbelfalten ben Sonabel gezahnt; ber Gaumen gewolbt und leicht von hinten nach vorn gebogen. Sonabelladen befteben aus fehr harter Sornmaffe, und die bewegenden Musteln find febr ftart. Die Farbe bes Gonabels verfchieden. Ihre Bunge ift febr beweglich, Die feine fie be-Dedende Saut ift mit Bargden verfeben. Bei den Ruffelpapageien bildet Die Bunge eine Art von Balge, welche ziemlich fest, lang, unbiegfam und fleifchfarb ift, und fich mit einer tlei: nen ichwargen, etwas inorpeligen, porn ausge= hohlten Drufe endigt, Die Die mahre Bunge gu fenn icheint. Der malzenformige Theil ift nur ein Anhang des Bungenbeines, fie tonnen Die Bunge burd einen abnliden Medanismus, wie Die Spechtzunge hervorftreden, und fo icheint fie bei Diefen Arten Drgan des Gefdmads, Des Getaftes und zugleich des Erfaffens ju fenn. Bei einigen neuhollandifden Papageien endigt Die Bunge mit einer Art von Borftentrang, aus Inorpeligen Safern beftehend.

Bei einigen Arten find bie Baden nadt und mit einem weißen mehligen Staube bededt, wie bei den Aras, oder fie find wirklich gefarbt. Bei einigen erheben fich die Ropffedern zu ei= nem foonen Bufde, ben fie aufheben tonnen. Bei einigen ift Die Saut Did, lederartig, bei ben Loris dunn und gart. Die Federn figen aber bei den meiften nicht fehr feft.

Der Korper der Kurzschwänzigen ift meift robust, etwas plump, der andern dagegen folanter.

Biele haben ein prachtiges Gefieder, mo oft das iconfte Roth, Gelb, Grun und Blau, denn das find die vorftechendften Farben, abftechend neben einander fteben. Die grune Farbe vermandelt fich leicht bei einigen in Gelb; bei ofterm Ausreißen Diefer Redern bei Gefangenen, fann man badurd leicht funftlich geflecte erhal= ten. Gie haben einen Kropf, der Darmfanal ift febr lang, und der Blinddarm mangelt.

Brafilien und Gunana haben in Amerita Die meiften Papageien. Die Ruffelpapageie ge-

boren Neuholland an.

Die Papageien find bas unter ben Bogeln, mas die Affen unter den Gaugethieren find; fie find febr intelligent, laffen fich leicht gabmen, find aber Dabei beimtudifd und boshaft. Auf der Erde geben fie langfam und ungeschicht. Mus den Arten, Die geschidt auf der Erde geben, hat man die Gattung: Erdpapagei (Pezoporus) gemacht.

Sie halten fich meift in bichten Gebufden auf, am liebsten in ber Rabe cultivirter Gegen: den, da fie die dort cultivirten Fruchte verzeh: ren und oft große Berheerungen baburch in ben Mflanzungen anrichten. Gie baden fich gern, Daber fuchen fie auch Baffer und Gumpfe auf. Gie leben meift in fleinen und großen Gefell: Schaften und ichreien babei viel und durchdrins gend. Beim Untergang der Conne ichlafen fie ein und erwachen mit ihr wieder. Gie fchlafen leife und man foll mit Rugen in Diefer Zeit ihnen die Borte, Die fie lernen follen, vorfpre: den. Gie leben fehr lange, in der Gefangen: icaft 80 bis 100 Jahre. Beim Fangen betaubt man fie mit bem Gamen vom Baumwollen: baum, oder lahmt fie mit flumpfen Pfeilen, ohne fie ju todten. Aus dem Refte genommene und auch Alte laffen fich gahmen, doch die er= ftern find dazu beffer. Man wendet dabei meh: rere Mittel an, theils als Strafe, theils als Belohnung. 3. B. bei Ungehorsam taucht man fie in taltes Waffer, mas fie fehr furchten, oder blaft ihnen Tabafrauch an. Belohnungen beffes ben in Buder, fußem Bein ac. Man muß aber frenge gegen fie fenn, fie ohne Furcht ergreis fen und hart anreden. Gie lernen Grerciren, gemiffe Pofituren machen, Borte nachfprechen. Die grauen Papageie und die grunen Amazo: nenpapageie find baju am gefchidteften, ba fie foon fur fic die Stimme mehrerer Thiere ge: fdidt nadzuahmen pflegen.

Ihre Nahrung besteht aus Früchten verschiedener Art, vorzüglich weichen, wie Bananen,
Gonaven, Kasee, Palmenfrüchten, Drangen,
auch Mandeln und Kernen der Früchte; weshalb sie oft weiche zersteischen, um den Kern zu
erhalten. Einige neuhollandische Kakadus sollen
von Burzeln leben. Mit Kernfrüchten kann
man sie auch in der Gesangenschaft nahren.
Sie trinken wenig, aber oft. Sie fressen übris
gens Brod, Zuckerwaaren, Reis, Mais, Mandeln und Achnliches. Nach dem Genuß von
Fleisch sollen sie sich selbst die Federn ausziehen.
Bittere Mandeln sind ihnen schällich.

Sie leben paarmeife, niften in hohle Baume und Felfentochern. Sie legen hochstens 4 weiße Gier. Die nachten Jungen haben fehr unformlich große Kopfe und 2 bis 3 Monate vergehen, ehe sie gang mit Federn bedeckt find.

Sie pflanzen fich auch in Europa fort in Der Gefangenschaft, so bruteten in Rom Amazonenpapageien. Selbst ein Paar blaue Aras, welche in 4 Jahren 62 Gier in 19 Bruten brachsten und viele groß futterten.

In ihrem Baterlande speist man fie. Schaben thun fie in ben Pflanzungen. Geschrieben
haben über die Papageien Levaillant und
Kuhl. In der Uebersicht des Legtern find alle Urten beschrieben, welche in den Museen von Leiden, Paris und London vorhanden find.

Cuvier theilt fie ein: 1) in Aras ober Langfomange, mit nadten Baden und febr langen abgestuften Schwanzen; 2) in Ama= gonen, mit furgen abgeschnittenen gleichen Schangen, mit grunem Gefieder, rothen Uchfein und gelben Ropfen; 3) in Kride, ohne Roth auf den Achseln, weniger lebhaft Grun, ohne Gelb am Ropf; 4) Papageien, fleiner afs Die vorigen, ohne Roth auf den Flugeln; 5) Spigfdmange, mit langen Schwangen, aber befiedertem Ropf; 6) Kakadus, mit großen beweglichen Federbufchen auf dem Ropfe; 7) Ruffelpapageien, meift mit Federbus iden, ungeheuer großem Schnabel und die Bunge vorn mit einer Anorpeldrufe verfeben; 8) Erdfittide, mit langern Laufen. - Bir beben von diefer großen Menge nur folgende aus.

Der große rothe Ara. (Psittacus Macao.)

Gin prachtiger Bogel, der an 3 Fuß lang wird. Baterland Brafilien. Ropf, hals und alle untern Theile, Schenkel und die kleinen Deckfedern der Flügel roth, ins Karmoisinrothe übergehend, die mittlern Deckfedern der Flügel grün gefleckt oder ganz grün; die Schulterfwdern, so wie die legten Schwungfedern, blaugrun schillernd, die obern Deckfedern des Schwanzes ultramarinblau die 12 Schwungfsedern blau, oder blau ins Rothe und Dunkelgrüne schillernd; die obere Kinnlade meist schwungig weiß; die nackte Backenhautweiß, worüber einige schwale Saumchen rother Federchen darüber hinlaufen. Die Regenbogenhaut gelb.

Sie schwarmen in ihrem Baterlande ent weder paarweise oder nur in kleinen Truppen an den Granzen der Urwalder umher, besonders da, wo Palmen wachsen, deren Früchte ihre Hauptnahrung find. — Jung lassen ste sich leicht zahmen; alt bleiben sie aber stets wild und bose. Selten lernen sie Worte nachsprechen; ihr Geschrei ist fehr unangenehm. In Brasilien ist man sie. Sie sollen mit der fallenden Sucht

oft befallen werden. In der Gefangenschaft ers balten fie Beißbrot, Zuderbadwerf und Früchte. Sie niften in hohle Baume und legen 2 bis 3 weiße Gier, die Mannchen und Beibchen zusams men ausbruten.

Der ganz blaue Aras. (Psittac. hyacinthinus.)

Lange 2 F. 4 3. Dunkel hyacinthblau, Somung : und Schwanzsedern blau violet, an ber außern Fahne grun, am Schnabeswinkel steht ein runder, gelber Fledt; die haut um die Augen und das Kinn ift nacht und gelb. Baterland: Brasilien.

Der schuppige Spitsschwanz. (Psitt. squamosus.)

Grun, der Unterbauch, der Burgel, die untere Seite des Schwanzes und die Ohrgezgend roth; Bruff, ein Band am Nacken, die außere Seite der Flügelfedern blaulich; die obezre Seite des Schwanzes gelbgrun. Naterland: Brafilien.

Der gelbe Spitsschwanz. (Psitt. Carolinae.)

Sanz goldgelb, nur die Schwungfedern grun. Schnabel weiß, gelb und did, an der Spige ftark gebogen; die Augen roth; die Fuße weißlich. Lange 18. 3. Lebt gesellig in den Balbern in der Rabe der Stadt Para.

Der graue Sittich. (Psittac. mascarinus.)

Lange etwa 19 bis 20 3. Baterland: Madagascar. Der Schwanz fast so lang als der Korper, etwas abgestuft. Die ganze Schnabelgegend und Kehle schwarz; Kopf und hals blaugrau, der ganze übrige Korper braunroth, unten etwas heller; der Schwanz an der Burzel weiß, an der vordern halfte braunroth; Schnabel roth; Flügel schwarzlich.

Der ausgezeichnete Sittich. (Psitt. eximins.)

Saufig in Reu : holland, wo er in fleinen Truppen lebt und icon nach Guropa gebracht worden ift. Un der Schnabelmurzel befindet fich ein weißer Fled'; Ropf, Geficht, Seiten des halfes, Bruft und Burgel hochroth; Ruden fcwarz mit einzelnen grungelb eingefaßten Febern. Bauch gelb; Aftergegend grun; Schwanz abgefluft blau, an der Spige etwas heller; die beiden mittlern Schwanzfedern grun.

Der rothbindige Sittich. (Psitt. concinnus.)

Baterland des vorigen, 8½ 3. lang. Der Sowanz furzer als der Korper. Stirn, Zügel und eine Binde, die hinter das Auge reicht, hochroth; der Kopf oben grunblau; die Schwanzsfedern an der hintern Palste roth; zu beiden Seiten der Brust ein gelber Fleck; hinterhals und Zwischenschultergegend braungrun; alles übrige hellgrun.

Der Kakadu mit schwefelgelbem Federbusch. (Psitt. sulphureus.)

Långe 11 bis 12 3. Baterland: die Moluden. Beif, der Rederbufch fehr lang, jugefpigt, lebhaft fdmefelgelb, mit der Spige nach vorn gebogen; Gomang und Flugel unten fcmefel= gelb, meift auch die Baden. - Rommt oft nach Guropa, halt fich gut und wird fehr gahm, liebt feinen Berrn, ift aber wie die meiften Da: pageien gegen Fremde oft falich. Geine Freude bezeugt er durch Knaden mit dem Schnabel und durch Aufrichten des Federbufdes. Lagt fich gern ichmeicheln und fragen. - Solgwert gerbeißt er oftere. Ungern ift er eingesperrt, migbraucht auch nicht leicht feine Freiheit. Er lagt fich abrichten und ift febr reinlich. Geine Mahrung besteht in Fruchten und mehligen Kornern, liebt Daber den Mais, auch Badwaaren, Gier, Milch 2c.

Der Temmind'sche Kakadu. (Psitt. Temminckii.)

Lange 18 3. Baterland: Neuholland. Ruschen und Flugel schwarz, etwas ins Grune schillernd, hals und die untern Theile braun; der Federbusch klein; der Schwanz lang, die beiden mittlern Federn ganz schwarz, die übrigen in der Mitte hochroth, mit 5 schwarzen schmalen Bandern, am Kinn stehen unter den braunen Federn einige schwefelgelbe, so wie an der Kehle und den Seiten des halfes.

Der rothschwänzige Papagei. (Psitt. erythacus.)

Sein Baterland ift die Bestüsste Afrikas. Farbe blaugraulich, das Gesicht nacht, weiß; der Schwanz blutroth. Zuweilen ift die Farbe schwarzblau, und der Schwanz schwärzlichroth; variirt oft, vielleicht nach Alter und Geschlecht. Er wird am häufigsten nach Europa gebracht. Ift sanft, anhänglich an seinen Wärter, lernt sprechen, Lieder nachpfeifen 20.

Der Amazonen = Papagei. (Psitt. amazonicus.)

Lebt in Sudamerifa und wird am häufigssten nach Europa gebracht, da er wie der vorige sehr gelehrig ist. Er variirt sehr, hat einen dicken Körper und einen kurzen Schwanz. Die Hauptfarbe ist grün, die Federn mit dunkelzgrünem schwarzem Saume, die Achseln am Männchen roth, am Beibhen grün; die Stirne blau, die Baden gelb; Schwanzsedern an der Burzel und bis fast zur Sälfte grün, dann schwarz, an den äußern Fahnen dunkelblau, die mittlern in der Mitte roth; die beiden mittlern Schwanzsedern grün, die übrigen in der Mitte roth, sonst grün.

Der weißköpfige Papagei. (Psitt. leucocephalus.)

St. Domingo und die Antillen find fein Baterland. Farbe grun, Borderfopf, Augenzgegend und Schnabel weiß, Bangen und Borzderhals roth; Schwanzfedern an der innern Jahne schwarz, an der außern blau; Achseln roth; die Seitenschwanzfedern an der Basis hoch purpurroth, die außere Fahne blau.

Der gefrönte Papagei. (Psitt. accipitrinus.)

Långe 11 3., Schwanz 6 3. Flügelbreite 1 F. 2 3. Baterland: Brasilien. Borderkopf blaß braunlich odergelb, Scheitel und Gesicht blaßodergelb, braun gestreift; am Nacken ein Buss langer Federn, die an der Wurzel grausbraun, in der Mitte hochroth, und violetblau gesaumt sind; Rucken und Deckfedern der Flügel schön grun, Schwungsedern schwarzbraun; Brust und Bauch purpursarb, jede Feder mit einem blaulichen Saum; Schwanz oben grun unten braun.

Der schwarzfappige Lorn. (Psitt. Domicella.)

Långe 11 3. Auf ben Moluden gemein. Sochroth, zwischen bem Sals und ber Bruft ein schwefelgelbes Salsband; Flügel grün, Schultern, untere Decksedern der Flügel und Schenkel azurblau, Stirne und Kopfplatte schwarz, hinten azurblau. Die innere Fahne der Schwungsedern gelb; der Schwanz hochzroth. Schnabel roth, Juße schwarzlich. Bariirt mit schweselgelben Flügeln und rostrothem Kopf.

Der Goliath. (Psitt. Goliath.)

Die Lange dieses Bogels ift über 2 F. und fein Korper fo fart, wie der, der großern Ura. Er bildet einen fehr deutlichen Uebergang von den Aras zu den Rakadus. Ift felten, bewohnt Reuguinea. — Der Kopf ift fehr did und fart. Das Geficht bis ju den Dhren nacht und leb= haft fleischfarb; ein langer Federbufch von ger= foliffenen Federn, Die 2 Linien breit, fie en digen fpigig, die größten find 4 Boll lang. Im Leben ift er dunkelgrau, nach dem Tode mird er fdwarz. Rach Temmind follen die Federn nur mit einem grauen Staube bededt fenn, ber fich nach dem Tode verliere. Der ungeheure Schnabel, über 53. lang, ift schwarz, die obere Lade mit einem farten Bahn zu beiden Gei= ten verfeben, feine Spige ift febr fcarf, Die untere furgere erreicht nicht die Balfte der obern, von der fie bedeckt ift. Die Bunge ift im Ber= haltniß des Schnabels flein und bis zur Spige roth, fie gleicht der Bunge bes Chamaleons und endet fich wie oben fcon angegeben, in eis nem hornernen Anopfchen. Er bedient fich der= felben gefdidt beim Speifen.

Turado, Trågvogel. (Corythaix. Illig,)

Der Schnabel furz, stark, breit, immer gebogen, an der Spige ausgeschweift; die Nasenlocher an der Schnabelwurzel, zum Theil mit hornartiger Substanz bedeckt, oft unter den Etirnfedern verborgen; Füße stark; die Seitenzehen gleich lang; die außere verkehrbar, die 3 vordern Zehen durch ein Hautrudiment verbunden. Flügel nicht sehr lang, abgerundet. Die Zunge ist sehr klein, dreieckig, breit im Berhaltniß zu ihrer Lange, zugespigt, ungespalten, mit 2 gegahnelten und giem: lich beutlichen hornern an ber Burgel ver: feben.

Die Arten leben alle in Afrifa; sie haben eine fcone Saltung ihres Korpers; der Schwanz ift lang und schmal, das Gesieder weich und zerzschlissen. Sie tragen einen schönen Federbusch auf dem Kopfe, der aus mehreren Reihen gesfranzter, schräge gegen einander stehender Federn bestehet, und nicht niedergelegt werden kann. Die Augen groß, lebhaft, glanzend, mit einem nachten Raum umgeben, oder mit Fleischwärzigen bedecht, wie bei den huhnern.

Der guineische Turafo. (Coryth. Persa. Licht.)

Der Gonabel flein, furg, dreiedig, oben faft getielt, und Diefer Riel fleigt bis gur Stirn: murgel hinauf, mo er mit gerschliffenen Federn bededt iff, die einander entgegen fiehen und einen grunen Federbufch bilden, derfelbe ift im: mer aufgerichtet und nimmt den gangen Ropf ein, verlangert fich fogar bis jum Anfang bes Salfes; Der Schwans lang, vieredig, abgeftugt. Der Ruden an feinem obern Theil, der Sals, Die Bruft und der großte Theil des Ropfes find glanzend grun mit violettem Schein; Der Burgel dunfelgrun, fo wie Die obern Dedfedern bes Somanges; ber Unterbauch fdmarglich. Der grune Federbufch bei Alten weiß gefaumt, bei Jungen roftfarb; an den Baden laufen 2 weiße Linien von einzeln ftebenden Federchen, Die eine fommt vom innern Augenwinkel, und die ande: re entsteht vor dem Muge und lauft hinter den außern Wintel, zwischen beiden ift ein violetter Streif; Mugen icon roth und mit einem nad: ten, marzigen, rothen Kreife umgeben. großen Schwungfedern find an ihrer innern Fah: ne fcon roth, an der außern braunfdmars; die Schwanzfedern oben dunkelgrun, unten hell: Große einer Laube. Baterland: Die Balber am Borgebirge ber guten hoffnung. Geine Stimme tont wie cor; fein Warnungeruf gleicht dem Ion einer Trompete, und flingt wie curote. Das Betragen ift fanft und ohne Diß:

trauen nahert er sich dem Menschen; wird leicht zahm und nimmt gern Liebkosungen an. Er fliegt schwerfällig, springt indessen mit Leichtigzteit auf den Aesten der Bäume umber. Lebt von weichen Früchten; in der Gefangenschaft giebt man ihm Früchte, Zuckerbackwerf und in Zuckerwasser getauchtes Brod. Früchte verschluckt er ganz. Sie nisten in hohle Bäume, wo beide Gatten brüten und auch gemeinschaftlich die Jungen ausziehen. Die Gier sind weißgraulich und meist 4 an der Zahl. Ihr Fleisch soll vorztrefslich schmecken.

Der rothhaubige Turafo. (Coryth. erythrolophos. Musophaga paulina. Temm.)

Un Große, Gigenschaften, Rahrung und Fortpflanzung Borigen fehr ahnlich. Bater= Der Federbusch land: bas fubliche Ufrifa. ift roth, und einige Federn endigen weiß, er erftredt fich bis jum hinterhalfe, beffen Federn Diefelbe Richtung haben, und eine Art von Solle bilden. Sie haben ein ichon grunglan: gendes Gefieder, Bauch und Unterleib etwas dunkler mit grunlich blaulichem Schimmer; Die Schwungfedern icon roth, an der innern Jah: ne heller; die Augen umgiebt ein breiter meißer Bled, und verbreitet fich auf ber einen Geite bis jum Schnabel, auf der andern bis gur Dhrge= gend; das Auge ift groß, rothlich, und mit ei= nem fcmalen, rothen Rreife umgeben; ber Schnabel gelb.

Anmerk. Das legte Geschlecht dieser Ordenung nach Cuvier ist: Musophaga Isert., was von mehrern zu den Borigen mitgerechnet wird. Die nahern Kennzeichen sind: die Basis ihres Schnabels bildet eine Scheibe, die einen Theil der Stirn bedeckt. Nahrung: die Früchte des Pisangs Die bekannte Gattung ist: Musoph. violacea. Biolettes Gesteder; Augensfreise nacht, roth; hinterkopf nehst großen Flügessebern purpurroth. Ein weißer Strich geht unter der nachten Augenstelle vorbei. Lebt in Guinea und am Senegal.

Vierte Dronung.

5 û h n erartige Bögel. (Gallinae. Linn.)

Bon unfern Saushuhnern ift jener Rame entlehnt. Gie haben einen gewolbten Dberfchna: bel, Rafenlocher in einem weiten hautigen Rau: me, an der Bafte beffelben mit einer Anorpel: fouppe bededt; fie find fcmerfallig, mit furgen Rlugeln verfeben, (dagegen mit fehr ausgebil: Deten Beinen) und Die Große ihres fnochernen Bruftbeines wird durch 2 große und tiefe Aus: fonitte fo vermindert, daß Diefe faft beffen ge: fammte Geiten bilden; auch tritt der abgeflugte Ramm beffelben ichief nach vorn, und die Spige des Gabelfnochens fann fich nur durch ein Liga: ment damit verbinden: mas alles den Flug nur erichwert, und fie gur Lebensart auf der Erd: flache bestimmt. Ihr Schwanz hat mehrentheils 14, bisweilen 18 Febern. Ihr unterer Baring ift febr einfach, daber fehlen unter ihnen die Canger. 216 gute Freffer haben fie einen mei: ten Ropf, und febr traftigen Magen. Mit Aus: nahme ber Soffo's und Tauben, legen und bruten fie ihre Gier auf der platten Erde, in Bertiefungen auf einigen Strobhalmen oder roh hingeftreutem Grafe aus. In der Regel hat ein Mannchen mehrere Beibchen, und bei Bielen tonnen die aus dem Gie gefommenen Jungen gleich laufen und felbft Rahrung nehmen.

Diese Drdnung, aus einer fehr naturliden Familie zusammengesett, liefert uns die meisten unserer hausvögel mit sehr schmadhaftem Fleissche; ihre Bordersinger sind an der Basis durch eine furze haut vereinigt, und langs ihrer Ranz der gezähnelt. Sie werden in Stamme untersicieden. — Die Tauben verbinden hier die huhr nerartigen mit den sperlingsartigen Bogeln, so wie sich auch die hoazin's den Turato's

nåhern.

Die mehresten von ihnen scharren in der Erde und bedecken sich mit Staub, vielleicht um die Schmarogerinsekten, die sie sehr plagen, zu vertreiben, denn beim Ueberhandnehmen derselben bekommen sie die Abzehrung. Sie nähren sich von Körnern, mehligen Samen; einige mit von Knospen und Beeren, auch fresen sie Insekten und Burmer. In ihrem großen Kropfe werzden erst die harten Saamen eingeweicht. Sie vermehren sich start. Die haushühner stehen in

hinfict ihres Rugens und ihrer Bahmbarfeit in einer gemiffen Parallele mit den Biederkauern unter den Caugethieren. Bie Diefe, find Die Bubner über die gange Erde verbreitet, wie fie, find auch einige Gattungen feit den alteffen Beiten icon Sausgenoffen des Menfchen gemefen, und haben ihn allenthalben bin begleitet. Und ob gleich viele aus marmen Rlimaten ftammen, 3. B. Indien, fo hat man fie doch auch in faltern acclimatifirt, doch über den Polarfreis bin= aus hat man weder den Saushahn, noch eine andere gegahmte Urt gebracht. Umerifa fpendete ben Puter und empfing dafur das Saushuhn und den Pfau. Richt alle, ob fie gleich bei uns leben, pflangen fich in der Gefangenichaft fort, namentlich Bald : und Rebhuhner. Man mußte denn tofffpielige Bortehrungen und Anftalten tref= fen. Am meiteffen hierin haben es jedoch Die Sollander gebracht, denen es gelungen, Soffos, Penelopen, Spornpfaue, Rronentauben u.f. m. fortzupflanzen und die Menagerien von Europa damit zu verforgen. Das Saushuhn ift eines ber nußlichsten Diefer Ordnung, denn fo wie Die Rub faft ein ganges Jahr hindurch uns mit Milch verfieht; fo das huhn mit den Giern, die man ihm nimmt, wodurch ber Brutetrieb verfcheucht wird. Gelbft ohne Begattung legt bas gut ge= futterte buhn, faft eben fo viel als das befruchtete.

In hinficht des Fleisches und des angeneh: men Aeußern gemahrt auch die Bahmung bes Pfaues, Puters, Perlhuhns, Fasans und eini= ger fudamerifanischen Dubnerarten, Bortheil und Bergnugen. Bei feiner Thierflaffe zeigt fich Die Geschlechteverschiedenheit machtiger, als bei Diefer, mo die Ratur felbft an Farbenpracht fic fceint überboten zu haben. Denn welcher Bogel übertrifft an Schonheit den Pfau, den Gold- und Argusfafan u. f. w. Auch in der Rorpermaffe über: treffen Die Mannden bei weitem die Beibden bei den meiften. Und wenn man menfchliche Lei= denschaften in ben Thieren wiederfinden wollte; fo tonnte man die folge Mannlichkeit im Saus: habn, im mannlichen Pfau u. f. w. reprafenti= ren, im Beibden großere Bartheit, Untermur= figfeit und Beideidenheit. Dagegen bewacht der Saushahn mit Stolz und den Launen eines orien= talifden Monarden feinen barem von Beib= den, und ericheint ein Rebenbuhler, fo erwacht fogleich die Giferfucht und ein furchtbarer Rampf beginnt. Im Uebermuth und dem Bewußtsenn ber Rraft, ruft ber Sieger feinen Sieg laut aus, mahrend der Befiegte beschämt davon foleicht. Desgleichen außert fich ber Gefchlechte:

trieb bei ihnen fehr machtig, baber bie Mann: den ber Buhnerarten, welche Die Beibchen an Große übertreffen, ftete in Polygamie leben. Da wo Mannchen und Weibchen fich gleich find, findet Monogamie flatt, obicon auch, wie bei jenen, Das Mannchen nicht mitbrutet. Durch fonderbare Weberden, Tone, Sprunge und Stellungen bruden bie Mannchen ihren übermäßigen Gefdlechtstrieb aus. Dies findet fich auch befonbere beim mannlichen Puter auf unfern Sofen, Durch Das Ausbreiten feines Schweifes, Das oftere Rullern, bas Schwellen feiner Rarufeln, dann wird er fuhn und geht felbft auf Menfchen los. Der Arquefafan zeigt zu Diefer Beit befonders oft ploglich feinen Federreichthum, wo die hun: bert Augen fich entwickeln, welche an der innern Sahne der Dedfedern feiner Glugel verborgen maren; er nimmt dann einen Raum von faft 3 Ruß ein, und Ropf und Sals farben fich mit bem iconften Incarnat; feine Saltung ift folg, feine Schritte abgemeffen. Der Auer : und Birf: bahn vergeffen in der Begattungezeit (Balgzeit) fogar Die eigene Sicherheit, denn ihre Geberden und Stellungen granzen an Berrudtheit. Die Perlhuhner und Fafanen, die Penelopen ftrauben die Federbufche, Federfragen und ihre Wleischlappen merden hochroth gefarbt.

Es find Erdvögel und ihr geräuschvoller Flug trägt fie nur furze Streden. Sie find meift Standvögel und nur die Bachteln verlassen und. Mehrere halten ihre Nachtruhe auf Baumen und erhabenen Orten, um dadurch leichter Nachstel-

lungen zu entgeben.

Die Saut ift fehr loder am Rorper befestigt, weich und ichleimig, daher fehr dehnbar; Die Redern nur loder befestigt, und fallen daber, wie bei den Lauben, leicht aus. Die Darme find lang und übertreffen an Lange etwa 5 mal Den Rorper. Bum Bermalmen ber Speifen ver: foluden fie fleine Steinden. Die meiften mau: fern jahrlich einmal, einige zweimal. Das mann: liche Rleid ift fast bei den meiften vom meibli: den verschieden, am wenigsten bei benen, Die in Monogamie leben. Die Mannchen der mei= fen Arten zeichnen fich noch überdies durch flei: ichige Lappen, oder warzige, gefarbte Baute, oder Fleischkaruteln, oder Spornen von dem Beibden aus, welche Unhange und Bierden aber erft gur Begattungezeit fich volltommen ent: mideln oder lebhafter farben.

Saushahne und Suhner haben die verfchies benften Farben angenommen, und ihre Ramme haben fich oft in Federbufche verwandelt. Auch Bastarde hat man von ihnen erzielt, die aber nicht immer fruchtbar find. Die Domesticirung hat auch auf Form und Größe der Gier eingemirkt, und nicht felten sind mißgebildete Gier, wovon meine eigene Sammlung an 8 Stuck besticht, gefunden worden.

Soffo.

Schnabel mittelmäßig lang, zusammengedrudt, an der Burzel höher als breit; obere Kinnlade erhoben und gewölbt; von der Burzel an gekrummt; die Burzel mit einer Bachstaut bekleidet. Nasenlöcher seitlich, länglich, die Bachshaut durchdringend, mit einer Haut, zur Sälfte oben geschlossen, vorn offen. Kopf mit einem aus gekrummten Federn bestehenden Federbusch geziert. Flügel kurz. Schwanz ziemlich lang und etwas hängend, abgerundet. Füße glatt; die 3 vordern Zehen mit einer haut verzeinigt, die hinterzehe mit dem Lauf eingelenkt.

Es find ameritanische Suhnerarten, den Truthühnern ahnlich. Mehrere von ihnen haben einen sonderbaren Bau der Luströhre. Sie leben in Waldern von Knospen und Früchten; sigen auf Baumen und nisten auch auf denselben, sind sehr gesellig und zur Domesticirung geschickt. Gmelin und Latham haben sie in Hotto's und Jaku's, andere unter noch mehr Unterabstheilungen gebracht.

Der große Hoffo. (Crax Alector.)

Das dunkelbraune Auge fieht in einem brei: ten nachten Raume von fcwarzgebler Farbe, der Schnabel hat eine fcone gelbe Wachshaut. Der Federbusch tann von dem Bogel willführlich er= hoben werden, bei dem alten Bogel ift er 2 bis 3 3. lang, und besteht aus fleifen, an ihrer Spige nach vorn gefrummten und frifirten Federn; Ropf, Sals und alle obern Theile find fdmarg, ins Grunliche ziehend; ber Schwang fcmarg, bei einigen haben Die Febern deffelben eine weiße Spige; der Unterleib und die untern Dedfedern des Schwanzes find dagegen immer rein weiß. Die Beiben haben Diefelbe Farbe, nur ift fie matter, der Federbufd ift aber flei: ner, ber Schnabel an ber Spige grau. Lange Des Bogels ift 2 F. 8 3.

Er findet fich in Merito, Brafilien, Gunana, bis Paraguan. In Mexito heißt er Bergvogel, die Spanier nennen ihn Bergtruthahn. Er bewohnt meist die dicksen Balber. Sein Fleisch ist sehr schmackhaft. Er ist nicht schen, läßt sich leicht zahm machen und mit dem Sauszgeflügel halten. In Cavenne halt man sie in zahlreicher Menge, sie schlafen des Nachts auf den höchsten Sauserne höchsten die und bei und einheimisch machen können.

Sie leben aus dem Pflanzenreiche, fressen Mais, Reis ic. Einen in einer Menagerie befindlichen fah ich Papier in Menge verschlucken.

Sie legen jahrlich einmal, 3-6 Gier.

Der Pori mit dem Stein. (Ourax galeata.)

Gine Art Belm erhebt fic an der Schnabel: murgel. Er gleicht einer feinharten Rugel, Die bei Alten gefurcht ift. Inwendig ift fie hohl und zellig, fie kann vom Schnabel aus mit Luft ge: fullt merben. Bei Alten ift fie birnformig, bei Jungen mehr tugelig, 21 3. hoch, von blau: grauer Farbe, der Schnabel ift dagegen blutroth. Ropf: und Salsfedern find furz und fammet: artig; Die Farbe Des Gefieders ift fcmargrun= lich, jede Feber mit mattichwarzem Gaum; Die Schwanzfedern haben eine weiße Endbinde; Un= terleib und untere Dedfedern des Schmanges rein weiß; Die Beine roth, Ragel gelb, Mugen braun; Lange Des Mannchens 2 F. 10 3. Das Baterland ift Mexito. In einigen amerikanifden Colonien hat man ihn gezähmt. Sie leben wie die Soffo's in Baldern, find nicht icheu und leicht zu gahmen, folgen ihrem herrn nach und fdmeicheln ihm. Ihr Gefdrei ift: Pol : bi. Die Luftrobre macht Biegungen wie bei ben bot: fos. Ihre Rahrung besteht in allerlei Fruchten. Bezahmt freffen fie alles, mas unfere Saushuh: ner genießen. Ihre Gier find wie bei dem Softo, fo groß, wie der der Truthuhner. Ihre Jungen fuhren fie, wie unfere buhner. Ihr Bleifch ift febr fcmadhaft.

Der Marial.

Auch diefer Bogel ließe fich wie die Borigen dem Sausgeflügel zugefellen. Das Mannchen trägt einen Feberbufch, die Febern desselben ftesten dicht und find gegen ihre Enden breiter; fie find grun schwarzlich, mit einem feinen weißen Saum; vom Binfel der untern Schnabellade läuft eine breite, grunlich weiß geflecte Binde

bis zu den Dhren; alle obern Theile, Sals und Bruft find fcon duntelgrun glangend; am Ra= den, Dberruden und der Bruft find alle Federn weiß gefaumt; Bauch und untere Dedfedern Des Comanges braun, die nadte Saut und die Bachehaut des Schnabels fcon roth, desglei= den die Fuge; Ragel und Schnabel ichwarz. Das Gefieder des Weibchens ift roftroth und ber Federbusch auch furger. Die Lange beträgt 23 bis 24 3. Baterland : Gudamerita. Die Luft= rohre macht verschiedene Rrummungen, ehe fie in die Brufthöhle aufgenommen wird, und lauft fatt im Ramme bes Bruftbeine, gwifden Mus: feln, die ale Bander Dienen, fort. Die Rah: rung haben fie mit Borigen gemein. Gie bruten 2 mal im Jahre auf Baumen. Die Mutter reicht den Jungen Speife, bis fie gang befiedert find, dann werden fie von ihr auf der Erde wie Die Ruchelden geführt, zur Rahrung angewiefen, und unter den Flugeln geschügt und erwarmt.

Der Parraqua. (Ortalida parraqua.)

Dieser Bogel lebt gesellschaftlich in Canenne, Brafilien und Guiana, in Waldern nahe an den Ruften. Sie schreien heftig: catracas, castracas oder parraqua, woher obiger Rame. Sie lassen sich leicht zahmen. Die Weibchen legen 4—6 Gier. Ihre Jungen führen sie wie es unsere hennen thun.

Die Stirn, Scheitel und oberen Theile des Salfes duntel roftroth; die untern Theile des Salfes, Ruden und Flügel braun; die Deckfezdern der Flügel rostfarb; Borderhals und Bruft grau; Schentel und Unterleib falb. Die Haut um die Augen, welche mit der Bachshaut des Schnabels zusammenhangt, blaulich purpurfarben, beim Jorn schon roth; Füße blaurothlich.

Die Luftrohre ist sehr lang, beim Mannden 15, beim Beibchen 5½ 3. Die mannliche Luftzröhre steigt außer der Brust bis zum-Unterleibe herab und macht dann eine Ruckbiegung; die weibliche geht dagegen ohne Krummung gerade in die Brusthöhle. Die Länge des Mannchens beträgt 20—21 3.

Der gemeine hoazin. (Opisthocomus comatus.)

Ropf und hinterhals dunfel dofolatenbrann, über jede Feder lauft ein weißgelblicher Schaffeftrich, ber gange übrige Dberforper hat Diefelbe

Farbe, aber bie Federn find nur weißlich ge: faumt, ohne den weißen Schaftstrich; Die Ded: febern haben befonders unten breite Caume, wodurch mehrere Querftreifen über Die Flugel gebildet merden. Schwang lang, abgerundet, braun mit breiter weißer Spige. Reble roftroth; Bruft und Dberbauch heller, Unterbauch und Aftergegend kastanienbraun roth. Auf dem Ropfe einen Federbufd von fehr fcmalen Federn, fie reichen nach Sinten bis gur Mitte bes Salfes. Lange des Bogels 22 3. Baterland: Brafilien. Gie leben auf Baumen und Gebufd; geben nur Morgens und Abends auf Nahrung aus; find übrigens nicht fcheu. Ihr ungeniegbares Rleifch riecht nach Bibergeil. Man nugt es, in Studen gefdnitten, jum Fischfang. - Ihre Rahrung besteht aus Blattern und Beeren, der ' Jungen aus Infekten.

Der wilde Pfau. (Pavo cristatus.)

Unterscheidet fich von dem zahmen auch da= burch, daß die Federn, welche die Ropfzierde bilden, nicht nur an der Spige, fondern gang mit Barten verfehen find. Der Sale ift gold: grunblaulicht und nicht fo blau wie beim gahmen, und die fammetgrunen fcuppenartigen Federn Des Rudens find reiner; Die großen Dedfedern find fowarggrun, metallifch glangend, mit einem breiten Saum von iconer Purpurfarbe ins Ru: pferrothe fdimmernd; Bauch, Geiten und Un: terleib fomarglich mit goldgrunem Schimmer, auch die Schenkel find fcmarggraulich grunfdim: mernd, am Rnie mit falbem Saum. Die pracht: vollen Mugen an den Schwanzdedfedern wie bei Dem gahmen Pfau. Die gange Lange des Mann: dens beträgt 4 F. 5 3., fein Federbufd 2 3.

Nuch die Pfauhenne ist von der zahmen sehr verschieden; ihr Federbusch ist grungolden und besteht aus ganz bebarteten Federn; der Hals, wie beim Mannchen, gegen die Brust hin jede Feder mit einem dunkelgrunschwarzen Fleck; Bauch und Unterleib dunkelgrun. Der Schwanz ist ebenfalls lang, seine obern Decksedern grungolden, die Schwanzsedern braungrau. — Ihr Baterland ist Indien, wo sie häusig vorkommen. Schon Salomo's Flotte brachte diese schonen Bögel mit. Den Römern wurden sie spater befannt. Plinius erzählt, der Redner Hortensussien der erste gewesen, der bei seiner Aufnahme unter die Priester, Pfauen auf die Tasel gebracht habe. Ausschas Zurcon erward sich durch Mäs

flung der Pfauen ein jährliches Einkommen von 60,000 Sesterzien. In welcher Menge sie damals gehalten und geschlachtet senn mußten, beweisen die Gastmähler eines Bitellius und heliogabals, wo ungeheure Schüsseln von Pfauenzungen und Pfauengehirn mit auf die Tasel gesest wurden. Bor Alexanders Tode waren sie schon in Griezchenland gemein. Bon da aus kamen sie nach Italien und andern Gegenden Europas bis nach Schweden. Durch die Europäer kamen sie nach Amerika.

Sie lassen sich leicht zähmen, verwildern aber auch leicht wieder. Die Tieger follen ihnen fehr nachstellen; weshalb sie auch ihr Rest in undurchdringliches Dickicht anlegen, worin sich 25 — 30 Gier befinden follen. Diefer Bogel war der Juno geweihet, weshalb man ihn auch oft auf ihren Abbildungen mit erblickt.

Den gahmen Pfau (Pavo crist. domestious) segen wir als einen bekannten Bogel und zum Theil bei Borigem mit beschrieben, als bekannt voraus. Die Lange des Mannchens von der Schnabelspige bis zu Ende der langsten Schwanzseder beträgt 5 F.

Das Beibchen hat zwar den Federbusch des Mannchens, entbehrt aber des übrigen herrli: chen Gefieders. Gehr alte Beibchen sollen zus weilen mannliches Gefieder bekommen.

So wie viele hausthiere Farbenveranderunz gen erlitten haben; so ist es auch diesen erganz gen und wir kennen davon den weißen und bunten Pfau. Die Augen auf den Decksedern des erstern sind weiß, aber mit Perlmutterglanz. Die zweite Barietat an den Backen, den Flügeln und dem Bauche weiß, fast wie der gemeine Pfau, doch sind die Augen der Decksedern meist weniger schon.

Die Pfaue halt man mehr der Schonheit ale bes Rugens megen. Sie find die Zierde eines Bubnerhofes, dabei aber herrifch und gantifch. Mit ben Trutbuhnern leben fie noch am fried: lidften, doch hat man noch feine Baftarde davon erhalten. Gie find reinlich und tragen ben Somang immer magrecht, damit er nicht beschmußt werde, fliegen beshalb auch auf hobe Baume und Dacher, wo fie gern übernachten. Ihr Gefdrei mao oder pao laffen fie in der Begattungezeit und bei Betterveranderungen baufig boren, es hat den Ramen Pavo (Pfau) erzeugt. Gie werden alt. Im August maufern fie fich. Erft im dritten Jahre erhalt das Mann= den fein iconis Gefieder. Bermoge ber farten Schwanzmusteln fann er ein Rad ichlagen und

fo mit dem ausgebreiteten Schwanze umber folz ziren.

Ihre Mahrung ift die der andern Suhner. Baigen freffen fie fehr gern, auch Infetten, Rohl, verschiedene Rrauter, nafchen gern Erd: beeren und verschluden fleine Riefel. Gin Sahn hat 5-6 hennen. Ende Marg und April tritt Die Begattungezeit ein. Die Beibchen suden Dann einen einfamen Drt, wo fie in ein Loch auf der Erde einen Lag um den andern 8 bis 12 Gier legen, Die fie in 28 Tagen ausbruten. Ihre Gier, Die eine erbegelbe Farbe und meift dunkle Bunkte haben, lagt man von Truthen: nen ausbruten, ba bie rechten Mutter fie oft verlaffen, ja wenn fie der Sahn ertappt, merden fie von ben Giern gejagt und Diefe von ihnen gerbrochen. Die garten Jungen werden mit Gruge, Gemmelfrume, gehadten Giern und Rohl gefuttert. Umeisenpuppen und heufdre: den lieben fie befonders. Das Fleisch der wilden Pfauen foll vortrefflich fomeden. Die Federn nußt man zu allerlei Schmuck, webt auch fcone Beuge mit baraus. In Garten thun fie Chaben.

Der gemeine Truthahn. (Meleagris gallopavo.)

Stammt von dem milden ab, der größer ift und 20 bis 60 Pfund ichmer mirb. Gein Gefie: der ift dunkelbraun; jede Teder mit heltern ein: gelnen Wellenlinien bezeichnet; beim Mannchen foillern die Farben in Bronze oder ins Rupfer: rothe, jede Feder hat einen breiten fcmargen Rand und einen mattfalben Gaum. Beim Bahmen find die Farben bekanntlich fehr ver: anderlich. - Ale Muszeichnung bat bas Mann: den einen Bufdelharter, fproder, an der Spige gefraufter, ichwarzblauer Saare, welche im 3ten Sahre bei Bilden und Zahmen eine Lange von 5 bis 6 3. erreicht, und die mit der Burgel auf einer angeschwollenen Fleifdwarze fichen. - Das Beibchen ift fleiner und hat ftatt bes Saarbufchele eine bloge Barge am Unterhalfe; Der fable Ropf und Sale hat weniger und flei= nere Rleifchlappen und ift mehr mit einzelnen Saaren und Federn befegt; der Fleifdgapfen auf ber Stirn ift febr flein und verlangert fich nur unmerklich. Das Baterland ift Rordame: rita, wo fie in gahlreichen Schaaren am Lage uber in Baldern und Gebufch von Gideln le: ben, Abende besuchen fie Die Gumpfe, mo fie Die Racht gubringen. Im Geptember verlaffen

sie die Walber und nahern sich mehr den Bobnungen. Sie sind dann fehr fett, und die Ureinwohner nennen den September den Truts
hahnmonat. Sie tödten dann sehr viele, lassen
sie gefrieren und bringen sie in die vereinigten
Staaten. Außer den Eicheln, wonach sie sehr
fett werden, fressen sie auch andere Waldfruchte, ihr Pleisch gleicht an Geschmack dem der
Kasanen.

Bei mehreren Suhnerarten machen Die Mannchen, befonders jur Begattungezeit, gang eigene Geberden, fo auch unfer Truthahn. Er wirft dabei den Sale gurud, das Blut wird in die aufgeschwollenen Fleischkarunteln des Ropfes und Salfes gepreßt, der Rafenzapfen verlangert fich, Diese Theile werden lebhaft roth und blau; - Die Federn des Rudens und Unter: leibes erheben fich, mit dem Somange ichlagt er ein Rad, die hangenden und fleifen Flugel foleift er auf der Erde. Dies Aufrichten Der Redern icheint er noch dadurch zu vermehren, daß er viel Luft einathmet, und dadurch die Luftzellen erweitert; von Zeit zu Zeit muffen fie damit nachlaffen, und dann geben fie die Luft unter fonderbarem Pfauchen: put, put, von fich; dabei fdreiten fie gravitatifch einber, wenden fich nach allen Geiten und machen einen Rreis um die Beibchen. Das Rullern laffen fie Dabei oftere horen. Bu Diefen Conen fann man fie durch fcarfe Tone oder faute Borte reigen, oder ihnen auch rothe Lappen oder Rleider por= halten, wodurch fie in eine Urt Buth gerathen, fo baß fie auf bergleichen Perfonen losfturgen und fie mit Gonabel und Fugen anfallen. Außerdem laffen Sahn und henne jene Tone: put, put, oft horen, mober ihr Rame Puter entftanden fenn mag. Die Mannden find febr gantifch und beißen fich oft untereinander, mo= bei die Angriffe befonders gegen die Fleischlap= pen gerichtet find; oft vermunden fie fich fo, daß fie baran fterben. Die Beibchen feben Die: fen Streitigfeiten ju und icheinen, wird ber Rampf fehr bigig, Rlagetone auszustoßen.

Als Sausgenossen begeben sie sich zusammen, so daß sie sich in Seerden halten und treiz ben lassen. Sie sigen gern auf Baumen und in Ställen auf Stangen, wo sie schlafend den Kopf in die Federn verbergen. Nässe und Feuchtigkeit ist ihnen schädlich, besonders den Jungen. Sie haben mit den Saushühnern gleiche Nahrung; man giebt ihnen auch Kohl, Erdäpfel, Rüben, türkischen Waigen 2c., auch lieben sie Insekten. — Ein Rännchen hat 10 bis 15 hens

nen. Die henne legt 25 - 28 Gier und macht als fehr gute Brutmutter 2 - 3 Bruten. Die Gier find weiß mit gelbrothlichen Punften. Die 2 erft gelegten Gier pflegt man zu effen, ba fie meift unbefruchtet find. Dehr als 18 Gier legt man ihr nicht unter. Das Meft macht man ihr an einem ruhigen dunkeln Drt. Die Gier, melde man unterlegt, verfuct man in lauem Baf: fer und nimmt dann nur die, welche unterfin: fen. Ale treue Bruthenne lagt man ihr gern Pfauen :, Fafanen :, Saushuhner : und Enten: eier ausbruten. Denn fie bruten fo eifrig, daß man ihnen ihr Sutter dicht neben das Reft fegen, oder fie gar von den Giern abheben muß, damit fie nicht vor hunger umfommen. In 26 - 28 Tagen vollenden fie bie Brut.

Die jungen Truthuhner find fehr gartlich und verlangen eine forgfältige Pflege und War= tung, man muß fie vor Regen, Ralte, rauber Witterung, Thau und ftarfem Connenschein bemabren, da fie fonft leicht frant merden und untommen. Bei iconem Wetter muffen fie ber: aus. Die Rugden mafcht man mit Branntwein, weil fie fonft leicht von dem Reig der Brenneffeln früpplich merden. Rach der Erndte treibt man fie, mo fie haufig gezogen merden, in die Stop: peln, mo fie Getreide, Seufdreden und Gras finden, und wenig Futter zu Saufe bedurfen. Auch alte Truthahne hat man zum Ausbruten gezwungen. Man reißt einem folden die großen Federn am Bauche aus und mafcht diefe' bloffen Stellen mit Branntwein, worin gestoffener Pfeffer gelegen hat, oder man peitscht fie mit jungen Reffeln, dann bringt man ihn in eine dunfle Ram: mer und legt ihm Gier unter. Ginige geben ihm auch etwas Branntwein ein und dreben ibn, um ihn noch mehr gu betauben. Die Gier fuhlen Diefes Brennen und er bleibt darauf figen. Rach 24 Stunden giebt man ihm Futter und erleuch: tet ben Ort ein wenig, macht ihn aber wieder buntel, wenn er gefreffen hat. Go brutet er bann geduldig fort, führt und erwarmt die ausgebruteten Jungen und befdugt fie auch. - Bei Mangel an Beibden treten die Mannchen bub: ner und Enten und man will von erftern Baftar: De gezogen haben.

Sabicte und Falfen jagen die Jungen, fobald fie aber von den hennen gesehen werden, warnen fie die Jungen mit kläglichen Tonen. Diese flüchten sich unter die Flügel, oder die grofern ins hohe Gras oder Gebusch. Ift die Gefahr vorbei, so zeigt fie es durch freundliche Lodtone den versteckten Jungen an. Man nuft ihr Fleifch und Gier, die ente mannten Mannchen geben bas garteffe und , fcmadhafteffe Fleifch. Im Jahre 1530 murbe zuerft ber Puter nach Deutschland gebracht.

Der geängte Truthahn. (Meleagris ocellata.)

Diefer herrliche Bogel hat die Truthahns: form und bas Practgefieder bes Lfaues. Un der Schnabelmurgel hangt ein abnlider Bleifchga= pfen. Der Ropf und Die obern 2 Drittel Des Salfes find nadt; Geficht und Borderfopf roth, Sinterfopf und Sale blau. Ueber jedes Muge lauft eine Reihe von 5 oder 6 fleischigten Sodern und auf der Mitte des Ropfs fist ein anderer Saufen von 5, welche fich nabe fteben ; an jeder Seite bes Salfes fieht eine fehr regelmäßige Reihe von 6 oder Weischwarzen, eine von der andern gleich weit entfernt. Alle Federn an den obern und untern Theilen find wie beim Truthahn gerade abgeschnitten. Die Sauptfarbe ift grun in Bronze ichillernd. Auf dem Ruden und gegen ben Unterruden geht das Grune jeder Reder im: mer mehr ins Blaue über und wird endlich herr: lich fapphirblau, nach dem Lichte auch ins Smaragdgrune ifdillernd; die goldbrongene Saus mung wird immer breiter und glangender, und schillert endlich ins Rupferrothe, bei gewiffem Lichte fast so schon, als an der Reble bei den Colibris. Auf den Dedfedern des Schwanges Doppelaugen. Bahlt man die am Ende des Schwanzes mit, fo find es 4 Reiben. Die flei= nen Dedfedern des Flügels fmaragdgrun mit fcmalem fammetichwarzen Gaume. Die großen Dedfedern der 2ten Ordnung herrlich golden fupferroth. Der abgerundete Schwang besteht aus 14 Federn. Die Laufe find etwas hoher als beim gemeinen Truthahn und mit ftarfern Gporen versehen. An der Sondurasbai murde einer von Schiffern lebend gefangen. Diefen befam ber Leibargt bes Ronigs von England, Gir Balfort. Dies eine Eremplar ertrant aber in der Themfe und fieht jest in der koniglichen Sammlung gu Paris.

Das gemeine Perlhuhn. (Numida meleagris.)

Der Schnabel ift kurz, did, oben fark, aber flumpf zugebogen, an der Wurzel roth; der ganze Kopf ist federlos, mit langen fcwarzen, in die Sohe stehenden haaren besetzt. Auf

dem Kopfe sieht ein schwieliger Delm, in Form eines abgestußten Regels, mit den Spigen nach dem Nacken gedogen; Backen und Seiten des Kopfes sind weiß, desgleichen die Augengegend. Bon jeder Seite des Oberschnabels hangt ein rundlicher Lappen herad. Kehle, hals und Nazden sind von Federn entblößt, und mit schwarzen einzelnen haaren bedeckt, aber schon dunkelzblau. Alle Theile des Körpers, von oben und unsten, sind schwärzlich schieferfarb, mit weißen, oben kleinern, unten größern runden Flecken, wie mit Persen besest. Die Schwungsedern aber sind weiß. Die Federn des hinterhalses, der Schulztern und der Kopfgegend ungesteckt röthlich grau.

Das Weibden ift wie bas Mannden, ber Belm aber fleiner. Die gange Lange beträgt 22 3. Gelten find Die gang weißen, baufiger aber Die Barietaten mit weißlicher Farbe, auch graulich mit weißen Fleden. Barietaten mit mei: fer Bruft find am baufigsten. Ihr urfprungliches Baterland ift Ufrita, besonders der fudliche Theil. Gie leben in großen Gefellicaften gufams men und gieben fich zu bestimmten Lageszeiten nach ben Bluffen, um fich ju fuhlen. Gegen Abend gieben fie nach den Waldungen, mo fie auf Baumen die Racht zubringen. Es find febr unruhige gantifche Bogel, Die befondere durch ihr Gefdrei fic unangenehm maden. Ihr Bleifc fomedt gut. Gie find febr fdmer aufzuziehen. Beim Laufen halten fie ben Sale flete in Die Sobe. Gie haben übrigens ein budliches Unfeben ; tragen bie Flugel unter bem Schmange und laffen ihn hangen. Ihr Tlug ift beschwerlich, megen ber Rurge der Flugel. Ihr Geforei flingt wie Glod acht, mas fie etlichemal wiederhos len. Ihre Luftrobre befteht aus gang fnodernen Ringen, zwifden welchen fich hautige befinden. Sie freffen viel und lieben, wie die Pfaue, orha: bene Drte. Raffe und Ralte tonnen fie nicht ver: tragen. Im Freien fuchen fie Infeften, Gefame und allerlei Pflangen, fonft auf bem Sofe Ger: fte, Beigen zc. Man muß fie taglich 2mal futtern.

Ein Sahn hat 6—12 hennen, in Ermanglung der eigenen hennen begattet er fic mit den haushennen, woraus Bastarde entstehen, die aber nicht fruchtbar sind. Das Weiben legt 16—24 Eier. Diese sind hart und rauhschalig, gelblich oder rostroth, dis zum Ziegestrothen abändernd, mit kleinen undeutlichen Hunkten. Sie werden in 24 Tagen ausgebrutet. Da die Perls hühner in der Regel schlecht bruten, so überläst man es Trut: und haushühnern. Die Jungen find fehr gartlich, verlangen viel Aufficht und Sorgfalt, mehr noch ale Die jungen Truthuhner.

Fleisch und Gier sind vortrefflich. Man fennt noch 2- Arten. Das buschige Perlh. (Num. cristata), lebt im süblichen Afrika; und das gehäubte (Num. mitrata) auf Madazgaskar.

Das Euvierische Dickschnabelhuhn. (Talegalla Cuvieri.)

Der Name von dem starken, fehr diden Schnabel, der ein Drittheil so lang als der Ropf ist. Die obere Schnabellade gewölbt, die untere weniger hoch, aber breiter als die obere, unten fast gerade, an der Spisse abgeschnitten, in Form einer Flotenmundung, mit glattem Rande und ausgebreiteten Schenkeln, zwischen welchen die haut mit Federn bedeckt ist. Die hinterzehe sehr lang, ganz auf dem Boden ausstehend, mit starkem Ragel.

Bei dieser Art ist der Schnabel roth, Gesicht und Seiten des Salses nacht und fleischfarb;
ein Fleck hinter dem Auge gelblich. Scheitel und
Sinterhals mit schmalen und zerschlissenen Federn von schwarzer Farbe bedeckt; Kehle, Borderhals und Unterhals hell braunlich leberfarben;
alle übrigen Theile des Körpers schwarz. Der
ziemlich lange Schwanz ist am Ende abgerundet,
schwarz von Farbe. Die Flügel reichen kaum an
die Schwanzwurzel. Läufe nacht, ohne Sporen
und graulich. Die Größe einer kleinen Saushenne. Baterland Reuguinea.

So a h n. (Gallus.)

Ein unsern Lefern bekanntes Geschlecht. Auf bem Kopfe ein fleischiger Kamm oder Feders busch; am Unterschnabel Fleischlappen, Backen nacht und glatt. Beim Mannchen ein langer gebogener Sporn. Der Schwanz bestehet meist aus einer doppelten Reihe aufgerichteter, mit dem untern Theile gegen einander stehender Kedern, von bedeutender Lange, wovon die mittlern bogenformig nach hinten gerichtet sind. Flugel furz mit abgestuften Federn.

Diese Gattung ift icon seit ben alteffen Beisten zum hausthier gemacht worden. Als fein Baterland wird Indien angegeben. Durch das Domesticiren haben fie viele Beranderungen erstitten, wie fast alle Thiere, die ber Mensch zu

feinen Sclaven gemacht hat. Die Weibchen aller Arten des Sahnes, welche man bis jest wild gefunden hat, sind braun, rostgelb oder grau. Merkwürdig sind die Hahngesechte in England. — Wir merken davon folgende:

Der Makartnepische Hahn. (Gallus Macartneyi.)

Die Lange Des alten Mannchens beträgt 2 F. Das Baterland ift das Innere von Sumatra. Db fie gleich fehr wild find, laffen fie fich doch gabmen. Auf dem Ropfe erhebt fich ein febr iconer Feberbufch aus mehreren nadten Schaf: fen, an beren Spige langere zerschliffene Barte ffeben, Die fich facherformig ausbehnen. Der Schnabel odergelb. Gine Dide, nadte, violette Saut bededt alle Seitentheile des Ropfes und umgiebt Die Mugen, erhebt fich einige Linien über Die Gonabelmurgel und uber den Ropf und lauft gegen bas Sinterhaupt, auch über Den Augen bildet fie einen Borfprung. Feber: bufd, Sals, Ruden, Bruft und Bauch fdmart, violet glangend, die Seitenfedern find an der Spife glangend roftfarb; Dedfedern ber Flugel fdmars, mit einem breiten goldgrunen Gaum; Die Dichtstehenden Burgelfedern feuerfarb, ins Rupferrothe oder auch mit Purpur und Biolet: glang. Die 4 mittlern gebogenen Schwangfe. Dern hellroftroth; Die andern fcmarg. Ragel und Sporn braun. Die Mannchen tragen ben Schwanz meift borizontal, erheben ihn aber oft.

Der Sonnerats=Hahn. (Gallus Sonnerati.)

Connerat entdedte Diefe merfmurdige Urt querft in den Baldern des Gatesgebirges, fie foll aber auch in allen Theilen Dftindiens vortom: men. Da biefe Urt in mander hinficht bem Saushahne ahnlich ift, wollte er ihn als Die Stammrage, doch nicht mit Grund, angeben. Ramm und Rehllappen hat er mit dem Saus: bahne gemein. Doch die Federn an Ropf und Sals verlangern fich um fo mehr, als fie fich dem Rorper nahern, am Ende find fie abgerundet; der Schaft ift fart und fehr platt, uber die Mitte berfelben lauft eine glangend weiße Linie, am Ende ift eine breite weiße Scheibe von fnorplicher Gubftang und gang an Der Gpige eine noch breitere von lebhaft roth: gelber Farbe. Diefe Gubftang fann man mit ber, welche fiegelladroth an den Enden ber

Flügelbedfebern bes Geibenfdmanges fic be= Die Rudenfedern find findet, vergleichen. braunfdwart, lang und ichmal mit helleren Bleden. Baud, Geiten und Odentel fcmarg: lich mit grunem Schiller; Die fleinen und mittlern Dedfedern ber Flugel haben platte Chafs te, feine Barte, alle endigen in einer fnorpel: artigen Scheibe, welche platt und glangend er: fceint, und von febr lebhaft taftanienbraunro: ther Farbe iff. Die Bereinigung Diefer fonder: baren Scheiben giebt ber gangen Flugeldede das Unfeben, ale ob fie mit Firnig überzogen Die Schwungfedern ber zweiten Drbnung find fdmars, grunglangend. Die Comangfes bern, wie bei unferm Sahn geftellt, fcmarg, grun ichimmernd. Die Fuge find graugelblich; Die Augen gelb, und Die Fleischanhange purpur: roth. Die Lange von der Schnabel: bis gur Schwanzspige 2 Fuß 4 3oll, Sohe vom Fuße bis jum Scheitel 14-15 Boll. Die Benne, 1 fleiner, hat weder Ramm noch Rehlappen; Reble und Scheitel mit Federn bededt, nur Der Augenfreis nadt; die Anorpelanhange fehlen; alle obere Theile mehr ober weniger grau: fcmarglich mit fleinen afcgrauen Punften; in der Mitte der Federn ift ein weißer fehr fcma: ler Schaftstrich. Die Flugel find grau, mit bunflerem Grau und Braun gewolft; Das Ge= ficht weiß mit etwas Braun; alle untere Theile braungrau, auf jeder Feder fieht ein breiter weis fer Shaftstrich. Die hennen leiten auch fo, wie die unfrigen, ihre Jungen.

Der kupferfarbne Hahn. (Gallus aeneus.)

Berr Diard ichidte Diefen Sahn querft nach Europa. Er lebt in der Umgegend von Pitat: Lanrago, in den Baldern im Innern von Gu: matra und an den Baldfaumen. Der Ramm ift glattrandig, aber groß, an ber Burgel bes Unterschnabels finden sich 2 fehr kleine Rehlap: pen; Geficht und Rehle vollig nacht und roth. Die Federn am Salfe und Mantel find langlich eiformig, an der Spige abgerundet, metallifc grun, mit Purpurglang und icon fammetgrunem Scheine; der Borderhals glangend fdmars mit violettem und Purpurschimmer, eben fo alle untern Korpertheile. Die langern Federn Des Rudens und Burgels und Die Dedfedern der Flügel glanzend purpurroth mit graurothem Caume. Die andern Ded:, Schwung: und Schwanzfedern ebenfalls glangend purpurroth,

je nach dem Lichte bald ins Grune, bald ins Blaue schillernd. Der Sporn fart; Fuße und Schnabel graulich, die nadten Theile lebhaft roth. — Die henne ift noch unbefannt.

Der hahn von Bankiva.)

herr Leichenault brachte diese Art, die in hinficht der Form unfern haushuhnern gleicht, aus Java, wo sie in den Baldern im Innern der Insel lebt, von den Bewohnern Anam Bankiva genannt. Sie halten sich an den Rändern der großen Waldungen auf, wo sie

fehr fcheu find.

Der Schwanz Diefes Sahns ift erhaben und bildet 2 Reihen vertifalftehender Federn, mos pon die mittlern schwarz, lang und nach hinten gefrummt find. Ropf, Sale und die langen bangenden Federn, welche den untern Theil des Salfes zieren, feuerfarben, mit icon lebhaftem Drangegelb gemischt; ber Dberruden, Die fleis nern und mittlern Dedfedern ber Flugel find febr icon fastanienbraun ins Purpurfarbne übergebend, Die großen Dedfebern Dagegen fdmarggrun fdillernd, Die Schwungfebern an der außern Jahne roftfarben, an der in: nen fdmarg; Bruft, Bauch, Unterleib und Somang ichwarg mit Goldgrun überlaufen. Ramm, Baden, Gurgel und Schnabellappen roth; Fuge grau, Spornen fart und fpigig, Regenbogenhaut gelb.

Das huhn ist viel kleiner, der Ramm fehr klein und die Fleischlappen fehr kurz; Augenstreis und Gurgel nacht oder mit wenigen weit auseinanderstehenden Federchen besetzt, zwischen welchen die rothe haut durchscheint; Brust, Bauch und Unterleib sind isabellfarben. Die Dalsfedern länglich, schwarz mit weißgelblichen Randern oder Saumen; Rucken, Deckfedern der Flügel und des Schwanzes braun, schwarz gesprenkelt. Flügel und Schwanz braunschwarz.

Fasan. (Phasianus.)

Schnabel mittelmäßig, an der Burgel nacht, die obere Lade gewolbt, vorn und gegen die Spige etwas glatt. Die Rasenlocher an der Burgel seitlich jur Salfte durch eine Haut verschloffen, welche eine Wolbung bildet. Die Backen mit kleinen Warzenbartchen bedeckt; Kopf und Kehle befiedert. Die 3 vordern Ze-

hen sind mit einer kurzen haut verbunden; am Laufe ein kurzer konischer Sporn. Der sehr abgestufte, konische Schwanz besteht aus 18 Fezdern. Flügel kurz. — Alle Arten dieser schonen Gattung sind in Asien zu hause, von wo aus aber einige nach Europa verpflanzt wurden. Das Fleisch ist von vortresslichem Geschmack, die Farben des Gesieders der Mannchen schon. Den Schwanz tragen sie gewöhnlich horizontal. Sind meist wild und schückern.

Der gemeine Fasan. (Phas. colchicus.)

Die Ruden = und Schulterfebern haben in der Mitte einen fcmargen Fled und in Diefem ein pfeil= oder hufeisenformiges weißliches Zeis den, und Die flachen Schwanzfedern viele abs

gestugte fcmarge Querbander.

Das Mannchen gleicht an Große einem mittelmäßigen Saushahne, bas Beibden einer kleinen Saushenne. Die Lange des erftern be= tragt 32 - 351 und die Flugelbreite 32 - 343. Die Lange des legtern dagegen nur 25-26 und Die Flügelbreite 28-292 3. Die Federn im Schwanz ze find abgestuft, Die beiden mittelften Die langsten. Der Schnabel ift 14 3. lang. Das Muge umgiebt eine federlose, fatt der Federn aber mit margenahnlichen, feinen, fehr fcmalen Platten befegte Saut. Bei alten Manneben nimmt Diefe Das gange Geficht ein, ift hochroth, im Fruhjahre brennend icarladroth; Die ein= gelnen punttahnlichen Federchen und die Bar= den fablglangend fdmarg. Rur beim Mann= den befindet fich in der Mitte der Sobe des Laufes ein flumpf fegelformiger Gporn. Das alte Mannden ift ein prachtiger Bogel. Alle Sauptfarben des fleinen Gefieders, namentlich Die Rederrander, baben einen außerordentlichen Glang und practvollen Metallichimmer, Die dun= felften wie polirter und angelaufener Stabl, in Goldgrun, Blaugrun, Dunkelblau, Lafurblau. Biolett und Purpur zc. Die Rander der Sale: federn find, als ob fie glatt beschnitten ma= ren, fouppenartig. Die Dhrengegend bat, wie ber hintere Theil des Scheitels, etwas verlan: gerte Federn; über den Dhren an ben Geiten bes hintertopfs fieht noch ein abgeflugter Bufdel beweglicher Federn, gleich furgen bornern oder Federohren, die aber nicht immer aufge: richtet werden. Das Genid und bie bewegli: den Federbuschel goldgrun; der übrige Theil des Ropfes und der Sals bis auf 3 der Lange berab foward; ber übrige Theil bes Salfes, ber Ropf, die Dberbruft und Bruftseiten icon roffroth, in Feuerfarbe fpielend mit prachtigem Goldglange und purpurnem Brongefdimmer. Schultern und Ruden tupferroth mit Purpur: glang. Um iconften fieht bas Mannchen im Berbfte nach der Maufer aus. Die Farben Der Beibden find minder fcon. Der Dbertopf meiflich braun, braun und fcmarg ftarf ge: fledt; Reble braunlich weiß; ber Sale lichtbraun, rothlichbraun und roftbraun gemifcht und gum Theil gefledt und gestreift; Ruden: und Soul: terfedern in der Mitte fcmarg mit weißlichem Schaftstrich; Bruft und Seiten des Unterfor: pers rothlich weißbraunlich, mit schwarzgrauen Punften befprigt. Im hohen Alter befommt bas Beibden bieweilen dem Mannden abnliches Gefieder.

Die aus den Giern fommenden Jungen tra: gen, wie die jungen Buhnerchen, ein Dunen: fleid. - Es fommen auch mehrere Spielarten unter ihnen vor, z. B. weißbunte und weiße, Co hat man auch mit unferm buhn nnd bem Kafan, auch mit dem Gilber : und Goldfasan,

Baftarde erzeugen laffen.

Shon lange ist unfer Fasan in Europa einheimisch gemacht. Die Geschichte berichtet Davon: 218 Die Argonauten auf ihrem Buge nad Coldis, um das goldene Flief von dort zu holen, wieder nach Griechenland gurudfa: men, brachten fie auch Diefe Bogel mit, Die fie bort am Fluffe Phafis oder Fasso (baber Phasianus colchicus) fehr häufig angetroffen batten. Bon Griechenland aus verbreitete er fic auch über andere fudeuropaifche Lander und murde fpater auch in Deutschland einge: führt. In den fudlichen Gegenden Deutsch: lande hat er fich vollig eingeburgert. Affen ift fein eigentliches Baterland.

Er lebt auf der Erde, im hohen Grafe, Rrauterich und Getraide, unter Gebufd, Dor: nen und niedrigem Gestruppe verstedt. Geine Machtrube halt er auf dem Afte eines Baumes. Das Mannchen geht fehr folz einher und tragt Den Schwang (in der Jagersprache das Spiel) über die Borizontallinie erhoben. Mit ihren ftarten fcarfen Rageln fragen fie viel in lot: ferm Boden. Gie laufen mehr, als fie fliegen. Sie find fehr icheu und furchtfam, doch gewoh: nen fie fich an ihren Barter und horen auf Die Lodpfeife. Strenge Winter tonnen fie nicht ertragen. Ungern ertragen fie Befdranfungen ihrer Freiheit, felbst fin Safanerien, wo man

fie in Menge balt und pflegt. Die Stim= me flingt hubnerartig, beim M. wie Rod ober Rud, beim 2B. wie Rad. Beim Muffdwingen auf einen Baum ruft bas M. laut : fudud: fududud.

In der Balggeit (Begattungezeit) hort man von ihm ein einsilbiges Rraben, womit er feine Beibden gur Begattung ruft. In gewöhnlichen Suhnerhofen halt er fich fchlecht und vermehrt fic auch nicht. In Fafanerien ") werden fie bei uns gehalten. Diefe wird in einem Baldchen in einer ebenen fruchtbaren Gegend, Die nicht ohne Baffer fenn darf, angelegt; auch darf fie Der nothigen Gebaude und Butten nicht entbeh= ren für den Barter und die Fafane. Sier fucht man Denn die Gier auf, läßt fie von Truthennen ausbrus ten und unterflügt die Jungen mit Futter, so wie die alten Fasane bei Rahrungsmangel; fångt fie gegen den Winter ein und fest fo viel man braucht zum Fruhjahre wieder aus. Die Dabei vorfallenden Roften lohnen felten dem, der fie daran mendet.

Ihre Nahrung ist fast wie die der Haushühner und besteht aus Rornern, Beeren, grunen Rraus tern, Insetten und Burmern. Borguglich lieben fie Erdbeeren, die Beeren des Rellerhalfes, des Radifdattene, Bachholder:, Sollunderbeeren u. bergl., auch allerlei Dbft. - Gie baden fich nur im trodnen Sande oder Staube. Die Jun= gen toften viel Muhe, fie aufzuziehen, fie muffent gegen Ralte und Raffe gefcugt und bas Futter immer frifd, nie fauer gegeben werden.

Im Marg ift Die Begattungezeit, wo man auf einen Sahn bochftens 9 Bennen rechnet. Die Sahne fampfen fic Dabei oft heftig herum. Die Bennen legen meift erft im Mai, es dauert über 4 Boden. Sie legen ihr Reft an ftillen Plagen zwischen Dichtem Pflanzengestruppe, im Rlee 2c. funftlos an. Es enthalt 8-12 Gier. Rimmt man der Benne die Gier bis auf eins immer meg, fo legt fie mehrere. Die Geftalt der Gier ift furg oval, ihre Farbe ift ein ins Gelbgrunlichgraue giebendes fomuziges Beig, ber Farbe des ge: meinen Rebhuhn:Gies nicht unahnlich. Gie mer= den in 24-26 Tagen ausgebrutet. Die Familie balt fic lange gufammen. Der Jager nennt eine folde eine Rette oder Gefperre. Die Beib= den bleiben bei der Mutter, Die jungen Mann: den trennen fich fruher. Im Geptember find Die Jungen meift flugbar.

[&]quot;) Praftifche Anleitung gur Fafanengucht von A. Schönberger. Prag bei Calve, 1822, fagt darüber das Röthige.

Benn man junge Fasane in gut umschlossenen Garten aufgezogen und recht zahm gemacht hat, so kann man, wenn sie eben fliegen lernen wollen, ein kleines Stucken von der einen Flügesspiese abschneiden und die Bunde, wegen sonst möglicher Berblutung, brennen. Dergleichen kann man dann mit den hennen der huhner oder Truthühnern, die sie als Stiesmutter austrieben, auf benachbartes Feld aus und einztreiben lassen, wie anderes zahme Gestügel. Nachher lassen sie sich in Ställen durchwintern. Solche hören dann auch auf Ruf und Pfeise und werden ganz zahm.

Sie haben ihres schmakhaften Fleisches wegen viel Feinde unter den Saugethieren, so wie
unter den Raubvogeln, als: Fuchse, Marder,
Tgel, Ratten; den huhnerhabicht zc. Go leiden
sie auch von Schmarogerinsetten und Eingewei-

Dewurmern.

Sie gehoren übrigens zur hohen Jagd und Die Anlegung einer Fafanerie ift ein Regale. Man erlegt fie mit Flinten, wobei gute Sunde nothwendig find. Go fangt man fie auch in Fallen, Schlingen und in Regen. Begen bes portrefflichen Wildprets kostet ein Sahn 2-3 und ein Suhn 13-2 Thir. Aus den Fafanen: federn macht man auch eine Urt Rehrwische, um Bemalde damit abzustäuben. Sonft verzehrt der Fasan auch viele und schadliche Insetten, Maitafer und ihre Larven, Beufdreden, Umei= fen, Dhrwurmer, Raupen, auch die graue Uderfcnede. - Schaden thun fie im Garten und auf Medern, wo fie ben Samen ausscharren und freffen, auch Dbft beschädigen und Beinbeeren gern freffen.

Der Silberfasan. (Phas. nycthemerus.)

Die Augen sind mit einem schonen scharlachfarbigen Saume eingefaßt, der nur mit zarten
Daaren beset ist; diese haut verlängert sich
über den Augen und ist dehnbar, so daß sie einen doppelten Kamm bilbet, unten aber in 2
Läppchen, wie beim haushahn, herabhangt. Am
hintersopse hangt ein langer, indigoblauschwarzer Federbusch herab. Nachen und vorderer
Theil des Oberhalses weiß; Ruden-, Schulterund Decksedern der Flügel und die mittlern
Steißsedern weiß, mit schmasen zickzackformigen
schwanzen Querlinien, die nach dem Halfe und
Schwanzezu immer feiner werden und dem Bogel ein vortrefsliches Ansehen geben. Der ganze

Unterleib ift ichwarz, ind Stahlblaue ichimmernd. Die Schwungfedern find weiß, fehr ichmal ichwarz gefaumt und mit parallellaufenden, einer Linie breiten Querftreifen bezeichnet, Die Schwanzfedern find weiß, die mittelften fast ganz rein, die folgenden ichon mehr ichwarz gestreift,

Die außern noch farfer.

Die Benne ift fleiner; ber Schwang furger, eben fo der fdmargliche Tederbufd. Sals, Ropf, Ruden, Bruft, Schenfel und Die mitteln Comange federn roftbraun, febr fein grau gefprentelt; Rehle und Wangen weißgrau; Unterbruft, Bauch und die untern Theile weißlich, roftbraun gefledt und mit schwarzen Querbandern gezeich= net; Die großen Schwungfedern fcmarglid. Das Mannchen ist 2 Fuß 8 Zoll lang. Das Baters land ift der nördlichste Theil von China. Er kann als llebergangsvogel vom Fafan zum Haus: hahn angesehen werden; lagt fich leicht gahmen und fann leicht domesticirt werden. Gie freffen Reis, Sanf, Waizen, Mais, Rohl, Galat, Dbft, Infetten. Ihre Begattung fallt in den April. Man giebt bem Mannden 4-6 hennen. Das Beibchen brutet fleißig über feinen 14-18 rothe gelben Giern und bringt fie in 26 Tagen aus. Das Fleischift eben fo mohlschmedend als vom porigen.

Der bunte Fasan. (Phasianus versicolor.)

Die Lange Des Mannchen 2 Fuß 7-8 Boll. Alle Federn des Mantele, des Salfes und der Bruft haben am Ende einen Ginfdnitt und bil ben alfo 2 Lappen, die fart getheilt find; die nadten Theile Der Baden und die Federbufchel bei den Dhren gleichen ebenfalls denen des ger meinen Fafans. Scheitel, Raden und Sinterhals goldgrun, die Federn des Mantels und der Schultern mit fleinen weißgelblichen Streifen auf dem reichsten grunen Grunde, der nach dem Lichte bald ins Grune, bald ins Purpurrothe fpielt, mit goldgelbem Saume; Ruden und Burs zel graugrunlich, glanzend; Dedfedern der Flus gel und des Schwanzes lila oder grun oder grau. je nach dem Lichte; die Schwanzfedern nicht febr lang und wenig abgeftuft.

Das 16 bis 19 Joll lange Beibden gleicht dem des gemeinen Fasans, an den untern Theiz len mit vielen schwarzen Flecken und etwas grünzlichem, metallischen Schimmer; die Federn der obern Theile goldgelb gesaumt. Baterland Jazpan, wo er in den Balbern lebt und gemein ist. An Sitten ahnelt er dem gemeinen Fasan.

Der Goldfasan. (Phasianns pictus.)

Das Mannden hat einen ichonen bochgel: ben Federbusch, der an der Stirn anfangt und über 2 Boll über Den Raden herabhangt; unter demfelben und von ihm beschattet, entfteht auch am Raden ein Bufd von Federn, welche abs flebend, nach vorn immer breiter werdend, und fich faderformig ausbreitend, einen Man: telfragen bilden, von glanzender Drangenfarbe, mit fammetichmargem Caume; Die Gegend gwis fchen ben Schultern ift mit goldgrunen, fcmarg: gefaumten und Daber fcuppigen Federn gegiert; Die übrigen Theile des Rudens und Die obern Dedfedern bes Comanges hochgelb, etwas bunt: ler und weniger rein ale ber Federbufc am Ropfe; Geficht,, Reble und Seiten des Salfes weißgelblich; Unterhale und Unterleib bochfafranroth oder pomerangroth; Dedfedern der Flügel fastanienbraunroth; die der zweiten Drb: nung und die außere Sahne ber Somangfedern roftroth, fdmarglich gemischt, Die innere Sahne rothgrau; Schenkel roftfarb; Schnabel meiß, gelb. Die gange Lange betragt 2 Juß 6 3on. Das Beibchen ift weit fleiner, Geficht und Reble brandgelb, Mantel, Sale, Bruft und Unterleib hellrofigelb mit fcmargen Querftrei: fen, Ruden und Burgel roftroth mit fomalen ichwarzen Streifen, Flügel rofigelb mit breiten ichwarzen Bandern, Schwang furger und Die langen Federn wie am Mannchen nur etwas Dufterer. Baterland China, wo er Rinfi heißt. Sie laffen fich gut in Fafanerien mit halten; find aber fehr mild und fcheu. Der Sahn fdreiet allemal Abende und Morgene, wenn er abfliegt: gud, gud, gud, worauf bann ein langes Pfeifen folgt. Gie befommen Die Mabrung ber vorigen.

Die Paarung erfolgt im April, sie sind das bei sehr streitsüchtig. Ein Mannchen erhalt 4 bis 6 hennen; sie legen 12—15 Gier, die sie beim Weggeben, wenn sie bruten, mit Laub und Eras, wie viele andere, bedecken. Die Farbe berselben ist hellrostfarben oder schmustig röthlich gelblich. Sie werden in 23 Lagen ausgebrutet. Man läßt sie gern Zwerghühnern ausbruten. Erst im 2ten Jahre, wie bei den vorigen Arten, erhalten die Mannchen ihr schofenes Gefieder. Ihr Fleisch schmedt vortrefslich,

es ift gang gelb.

Der glanzende Buschsafan. (Cophophorus refulgens. Phas. Impeyanus.)

Rleiner als ber gemeine Fafan, an Farben= pracht nabert er fich aber bem Pfau. Auf bem Ropfe tragt er einen Federbufch von goldenen Aehren, 17 bis 18 an der Bahl. Gie fteben auf Dunnen Stielen, fo bag fie fich etwas fenten, modurd ein nach allen Geiten fich ausbreitender herrlich ichimmernder Ropfpug entfteht. Saut um die Mugen und gegen die Schnabelmurgel ift purpurblaulich mit fleinen, fehr fur= gen, grungoldenen glangenden Federchen bededt, Die Redern am Ropfe, Baden und hinterhaupte glangend goldgrun; ber hintere Theil und Die Seiten des Dberhalfes farminroth mit Rubin= glang; Unterhale und Ruden fupferroth mit Purpur; Die Mitte Des Rudens gieht fich mehr ins Biolet mit Goldglang; auf bem Ruden fiebt ein weißer Fled, aber jede Feder Diefes Theils hat an ihrer Spige einen glanzenden Purpur: fled; der Burgel ift fart befiedert und berrlich goldgrun mit Purpur; der Schwang hell roff= farb; Die Schwungfedern fdmarggrun; Die Dedfedern der Flugel goldgrun, ins Purpur: blaue fdimmernd; alle untern Theile fdmars grungolden; der Conabel odergelb; Bufe fomars, ber farte Sporen grau. Gange Lange 2 Rug. Das Beibden ift fleiner nur 20 3. lang; Die herrichende Farbe ift braun, Die Ditte jeder Feder heller und duntelbraun geftreift und gefledt, faft wie bei ber großen Dhreule; der fur= ge Comang reicht wenig über die Flügelfpige por und ift matt braun; fatt bes Sporns nur eine fdwielige Barge. Die Stimme Des Mann: dens gleicht der des Fafans, ift aber angenehmer. Ihr Baterland find Die Gebirge im nordlichen Sindoftan an einfamen Drten. Man bringt ibn als Geltenheit nach Calcutta. Er ift wild, liege fic boch aber ale Sausvogel gahmen.

Der Pfauenargus. (Argus giganteus.)

Die Lange des Manuchens von der Schnabelspiese bis zur Spise der langsten Schwanzsedern 5 Juß 3 J. und die Lange der mittlern Federn allein 3 F. 8 J., die Lange der langen Flügelsedern 2 F. 10 J. Die Größe hat er übrigens von einer Truthenne. Die Kehle und ein Theil des Borderhalses sind nackt und nur mit einzelnen schwarzen Saaren besett. Diese Saut bilbet mehrere unregelmäßige Falten, aber feine Unbange, felbst am Baden nicht; Diefe Theile find icon farmoifinroth. Stirn, Scheitel und Sintertopf find mit fleinen fammetartigen Fe-Dern bededt : fomale, mit wenig Barten verfebene Federn, faft wie Saare, bededen den Sinter: bals; ber untere Theil des Salfes, die Bruft, Der Baud, Die Schenkel find braunrothlich; jede Reder ift unregelmäßig duntel und fcmarg ge: fedt; der Dberruden und die fleinen Dedfedern Der Flügel haben große fcmarge Fleden, mit feinen ochergelben Linien, desgleichen der untere Theil Des Dberrudens mit feinen odergelben Lis nien durchzogen; der untere Theil des Dberrus dens, der Burgel und die Dedfedern bes Coman: ges haben auf hell oderfarbenem Grunde braune Rleden, wie beim Leopard; Die langften Dedfe-Dern des Schwanzes find blafgelb und die braunen Bleden fiehen fich naber, als auf dem Ruden und alle find in der Mitte rothbraun; die lan: gen Schwanzfedern, fo wie die beiden langften mittlern, find duntel fastanienbraun mit fleinen weißen, fowars eingefaßten Puntten; Die Spige Diefer beiden Federn ift fpiralformig gewunden und endigt in fcmugig Grau. Die fonderbar geformten Flugel haben fehr breite Federn, mit einer großen Ungahl Spiegelflede bezeichnet; Die eigentlichen Schwungfedern haben farte icon blaue Schafte. Auf den langsten Federn find 19 Augenflede, auf ben furgern nur 15. Benn nun gleich auch die Farben diefes Bogels im Ganzen matt find, fo bildet bas Bange boch einen un= gemein iconen und fonderbaren Unblid. Erft nach der 2ten Maufer befommen die jungen Mannden das icone Gefieder. Um iconften erscheint es, wenn ber Bogel um fein Beibchen ichmeichelnd herumgeht und die herrlichen Fe-Dern wie einen Facher ausbreitet, wo die Augen fictbar werden. Außerdem liegen die langen Febern an ben Geiten bes Schwanges, beffen furgere Febern fie überragen.

Das Weibchen, fast eben so groß als das Mannchen, ist boch sehr von ihm verschieden. Seine Lange ist nicht über 26 3; die größte Breite der Flügel nicht mehr als 13 3. 4 Linien; die Augenstede feblen gang; die nackten Theile am Halse wie beim Mannchen. Die Sauptsarbe auf den obern Theilen kastanienbraun oder braunzgelb mit schwarzen Zeichnungen oder Zickzacklinien; der Schwanz kastanienbraun mit schwarzen Fleden und Streisen; die Schwungsedern dunkelrothbraun; die der 2ten Ordnung mit uns

gelmäßigen oderfarbigen Binden, wie mit dine-

Baterland Sumatra und das feste Land von Indien. Um Malaka ist er fehr gemein. Coo.ov heißt er in Sumatra, von seinem Geschrei: Coo. 3. 3. 1780 kam er zum erstenmale nach Batavia, durch den hollandischen Prasidenten de Bruin dahin geschieft.

Rach Mareden, der ihn beschrieben, lagt er fich schwer gahmen und bauert als Gefangener nicht lange.

Waldhuhn. (Tetrao.)

Schnabel furz, flark, an der Basis nadt; obere Schnabellade gewolbt, conver, von der Burzel an gebogen. Augenbraunen nadt, warzig, roth. Die drei vordern Zehen sind bis zum ersten Gelenke mit einander verbunden, und, so wie die hinterzehe, an den Rändern lappig. Die Läufe bis zu den Zehen bestedert. Flügel kurz.— Sie leben meist in Bielweiberei und bewohenen große Waldungen, besonders in gebirgigen Gegenden. Mehrere bestehen eine doppelte Maufer und erscheinen in ganz verschiedenen Rleidern. Männchen und Weibchen sehen bei einigen sehr verschieden. — Sie lassen sich zähmen, pflanzen sich aber in der Gesangenschaft nicht fort.

Der Auerhahn, Auer = Waldhuhn. (Tetrao Urogallus.)

Nimmt unter ben vaterlandischen Arten in bieser Gattung die erste Stelle ein. Das Mannschen ift beträchtlich größer; indem es oft 9, das Weibchen höchstens 5 Pfd. schwer wiegt. Die Lange steigt von 36 bis zu 44% 3. die Flügelbreite 50 -57 3. Die Lange des Huhns 27 bis 30½ 3. Flügelbreite 42 bis 45 3.

Die Gestalt des Bogels ist gedrungen, start und fraftig, der Sals etwas lang und start; die Febern am Kinn und an der Rehle sind fehr verlängert und bilden einen etwas straffen Feberbart, vorzüglich am Männchen, der Schnabel gleicht fast dem eines Raubvogels. Die länglicherunden Nafenlöcher liegen in den Stirnfedern versteckt. Die Junge, dem Umfange nach dreieckig, kann durch eine eigene Borrichtung so tief hinabegezogen werden, daß sie dem todten Bogel zu fehlen scheint. Der Augenkreis, bei völlig ausgewachsenen Bögeln, kahl mit kleinen Barzchen besetz.

Das alte Mannden ift ein fconer Bogel. Der Schnabel ift fcmugig gelbweiß; der Augen: ftern dunkel nugbraun; das Auge ficht in einer nadten, marzigen Umgebung von icarladrother Farbe. Diefer Fled ift bei recht alten gegen 2 3. lang und halb fo breit. Un der Reble hangen lange, etwas ichmale, fraffe Federn herab, mor: unter die langsten oft über 25 3. lang find, welche gufammen einen ftattlichen Rinnbart bil: ben. Gie find fdmars, wie auch die Stirn; Der übrige Ropf und ber gange Sale find bun: telblaulicafcgrau oder hellidicferfarben, mit Schaftstrichen, Bidgadlinien und fcmarzen. Puntten, wie gewäffert und fammtliche Federn haben eine etwas verlangerte Gestalt, auch hat Das Schwarz an Diefen Theilen einen ichmachen violetten Glang; ber gange Ruden, bis auf Die Somangbedfedern hinab, ift fdmarg mit außerft feinen, hellaschgrauen Bidgade, Bellenlinien und Punften, fo daß Diefe Theile in einiger Entfernung wie überpunftirt aussehen; Die Soultern, fammtliche Flugeldedfedern roftbraun ober faftanienbraun, übrigens durchaus mit fehr feinen, fcmargen Bellen: und Bidgadlinien und wellenformig geftellten Puntten, Dicht bezeichnet. Die Ropfgegend ift fcmarz, fcon fahlgrun glangend ; Die Bruft fdmarg nach unten mit meißen Feberspigen; Unterbruft und Bauch fcmarg und weiß geffedt, der Schwang ichwarz mit eis ner Art weißer Fledenbinde.

Das Beibden hat einen dunkelrofigelben Scheitel und hintertopf, Dabei braun und fdmarg gefledt, Die Febern mit meißen End: fantchen; Sinter = und Seitenhals dunfler, faft geiblich roftfarben, mit fdmargen Querfleden; Der gange Ruden bis jum Burgel, Die Schulter und Flügeldedfedern dunkelrofigelb, mit brau: nen und ichmargen Banbern, Fleden und Punt: ten, auch mit weißlichen fdmarg befprigten End: fantchen. Die Rehle hat weniger lange Federn, als bei dem Mannchen; Gurgel und Ropf foon gelblich rofffarben, Die Bruft rofffarben. Der Somang ift abgerundet mit ichwarzen Querban: Dern und einem weißen Endfaume verfeben. Im Berbfte find beide Gatten fon befiedert. Die Maufer fallt im August und dauert bis

Ende September.

Das Baterland ift das mittlere und nords liche Europa und das angrenzende Affen. Man zählt fie unter die Standvogel, bedingungsweise auch unter die Strichvogel. Die Nachtruhe halten fie stell auf hohen Baumen an deren Spizen, wohin fie beim Untergang der Sonne gehn,

mit der Morgendammrung aber dieselben verstaffen. — Alle ihre Bewegungen find plump und schwerfallig. Beim Fluge machen fie ein schutrendes Getofe, find ungemein scheu und vorsichtig, wobei fie ihr scharfes Gesicht und Gehör sehr unterstügt.

Die Mannchen sind fehr ungesellig und lesten meist in der Ginsamkeit, denn nur in der Begattungszeit suchen sie hennen auf, welche dagegen weit geselliger leben. Sie gehören zur hohen Jagd und der Jäger hat eigene Ausdrücke dabei, 3. B. der Auerhahn fliegt nicht, sondern stiebt und schwingt auf und ab, für Auegen: Seher, Füse: Ständer, Begattungszeit: Balz-Falzzeit u. s. w.

Die Stimme Des huhns iff ein einfacher Ton, ber wie bad, bad ober bad, dad flingt. Beim Mannden find es gang eigene To: ne, die fich nicht wohl ausbruden laffen und bie bei ber Begattungezeit noch mit einem bochft fonberbaren Betragen verbunden find, mas man gue fammen Balgen, (Palgen) Talgen nennt und mas im Fruhjahr vor der Begattung beobachtet wird. Es ift der Paarungeruf, dem Schnurren der Spechte, dem Mudfen der Tauben und dergl. analog. Gin Sahn hat mehrere Bennen. Die Auernhahnbalge beginnt im Marg und ene bet in der Mitte Uprile. Ge gefchieht meift auf einem boben Baume vom erften Schimmer der Morgendammrung an bis jum Aufgange ber Conne. Benn der Sahn balgen will, ftredt er den ausgedehnten Sals etwas vor, fraubt den Rehlbart und die Ropffedern, folagt mit dem Schwanze ein Rad und lagt Die vom Korper abgehaltenen Flugel etwas hangen. Es erfolgen nun eigene Zone, mobei er am Ende meder ficht noch bort und fo leicht erlegt werden fann.

Ihre Nahrung besteht aus grunen Radein der Schwarzholzarten, aus Blattern, Anofpen und Bluthenkagden verschiedener Laubbaume und Strauder, allerlei grunen Rrautern, aller: lei Balbbeeren, Infekten, zuweilen auch Ge= treibe; gur Berdauung auch aus einer Menge fleiner Riefelden und Schnedenhauschen. Die Sennen freffen gartere Dahrungemittel; Daber auch bas Rleifc des Mannchens grobfaferig ift und wegen des Genuffes der grunen Radeln nach Terpentin; dagegen das Fleisch des Beib: dens faftig und angenehm fcmedt, welches aber auch nur Anofpen vom Radelholge, meift nur Knofpen von Laubbaumen, als von Bu= den, Pappeln, Birten, Erlen, Safeln und Beiben und beren Bluthentagden, Beeren, Die im Winter hangen geblieben, Ebereich, Epheuund Preißelbeeren, daneben Insesten 20. frißt. Die Jungen leben anfänglich fast allein von Insesten, wozu sie die Mutter anführt. — Sie baden sich auch gern im Sande und Staube.

Bo viel Strauchhols, Dichtes Geftruppe, bobes Saidefraut, Ginfter, beerentragende Stau: ben und langes Gras machft, mablen fie gur Unlegung Des Reftes, mas bem Beibden allein überlaffen bleibt, wie bei unfern Suhnern. Das Reft beffeht nur in einer Bertiefung. findet Darin 5 - 12 Stud Gier, welche Die Große unferer buhnereier haben. Ihre Grund: farbe ift ein, mehr ober weniger ine Braunliche giebenbes, Rofigelb, welches mit fleinern ober großern, matten ober beutlichen buntelgelbbrau: nen und dunteltaftanienbraunen Bunttden und Puntten, Die bei manden jum Theil auch ein: geln in großere runde Fledden abmechfeln, bezeichnet find. Es giebt davon mehrere Abmei: dungen, auch fann man mit beißem Baffer Die gange Zeichnung wegmafchen, wo bann nur noch ein blagrofigelber Grund bleibt. Die Shale ift übrigens glatt und ziemlich glanzend. Sie bruten an 4 Bochen und bededen die Gier mit Genift, wenn fie nach Futter ausgehen. Das Beibden führt die Jungen fehr forgfaltig und pertheidigt fie auch.

Der alte Sahn furchtet nur ben Abler und Uhu, andere konnen ihm so leicht nichts anhaben. Die hennen und Jungen haben von mehrern Falfen, Kolfraben zc. Nachstellungen zu befürchten, so machen auch Füchse, wilde Kagen, Marber u. bgl. Jagd auf fie. Es hausen auch

in Federn und Gingeweiden Feinde.

Man jagt fie nur am meisten in ber Balggeit, wo, wie oben bemerkt, der Jager fich mit Borfict am fichersten anschleichen kann. Gein Bilopret wird verschieden zubereitet.

Das Mittel-Waldhuhn. (Tetrao medius.)

Dieser Bogel sieht in hinsicht der Größe awischen dem vorigen und dem folgenden mitten inne. Das Mannchen erreicht kaum die Größe des weiblichen Auerhuhns. Seine Lange beträgt 28 3., seine Flügelbreite 44 — 45 3. Der Schwanz nur wenig gabelformig. Der Schwanz nur wenig gabelformig. Der Schnabel kleiner, schwächer, auch gestreckter, als beim Auerhahn. Das mit sehr dunkelbrauner Iris versehene Auge hat ein kahles hochrothes Augenlied und über ihm befindet sich, in boh-

nenformiger Geffalt, eine fahle icharlach : ober hochrothe Stelle. Die farten Bufe find, wie bei vorigem, bis auf die Beben befiedert. Um Scheitel find Die Febern etwas verlangert, bat auch einen Rehlbart, Doch geringer, ale beim Auerhahn. Ropf und Dberhals tieffdmarg mit blauem Glange, fo das Uebrige des Salfes, bis auf die Bruft herab, aber hier mit noch flarker ins Biolette und Purpurfarbige schillernden und fehr fart glanzenden Federrandern. Der Dbers ruden, Die Schultern und Die Flugeldedfedern find braunschwarz mit unzähligen lichtbraunen Punktchen, wie mit Cande, bestreuet, Die fic hin und wieder in Bidgadlinien reihen; Unter= ruden, Burgel und Dberfdmangdedfedern noch tiefer braunfcmarg, aber mit meniger deutlis den braunen Bunttchen und am Burgel mit violetglangenden Federrandern; Dber :, Unters bruft, Beiden und Baud ichwarg mit etwas fowachem blaulichem Stahlglange. Die Achfel: gegend weiß, wo fich ein breiediges Fledchen bils Det. Die lang und bicht, unterhalb aber befons bers haarartig, befiederten Fuße find über der Berfe meiß, braunlich befprigt; Die großen Schwingen erdbraun, Die Schwanzfedern tief fdwarz.

Das Weibchen fieht dem weiblichen Birkhuhne fehr ahnlich, was auch dort beschrieben werden soll. Es ift indessen größer und von hellern schönern Farben. Seine Lange beträgt

204 und Die Flügelbreite 32 3.

Das Mittel: Waldhuhn findet sich nicht felten in den nördlichen Ländern Europas, da wo viel Auer: und Birkhühner nahe beisammen woh: nen, 3. B. in Schweden, die Lappland, in Liv: und Esthland, in Deutschland kommt est selten vor. Das so nahe Beisammensenn dieser Waldshühnerarten hat Bastarde erzeugt, so daß man Bastarde vom Birkhahne und der Auerhenne hat "). Auerbirkahn (Tetrao urogallides) Racelhahn genannt.

Das Birk = Waldhuhn. (Tetrao tetrix. Linn.)

Das Mannden ift ein ichoner Bogel. Bom Auerwaldhahne unterscheidet er fich durch feine weit geringere Große und den flets tief gabel- formig ausgeschnittenen Schwanz. Die Große

^{*)} Senaue Beschreibung davon siehe Maumanns Naturgeschichte der Lögel Deutschlands nach eige ner Ersahrung entworfen. B. VI. pag. 314. Leipzig bei Ernst Fleischer. 1833.

Des Mannchens ift etwa bie eines fehr ftarten Daushahns oder gemeinen Fafans und fein Ge: wicht beträgt 2-23 Pfund, bes Beibdens nur 1-2 Pfund, woraus man icon auf die gerin: gere Große gegen bas Mannden ichließen fann. Das Mannchen mißt 23-253, Flugelbreite 36 bis 373 3. Des Beibdens Lange Dagegen 17-18; Flügelbreite 28-291 3. Der aus 18 Federn bestehende Somang bildet beim Mannchen lan: ge Gabelginten, (wie Sorner), fart nach außen gebogen, fo bag die Gabelginten 9 3. von ein: ander entfernt find. Beim Beibden ift er furger und ber Ausschnitt in der Mitte ift nur 14 3. tief. Die Rafenlocher find rundlich und lie: gen in ben Stirnfedern verborgen. Ueber bem Muge befindet fich eine fahle, mit fleinen Bargden dicht befegte, mondformige Saut, die beim Mannchen im Alter eine fo große Ausbehnung erhalt, daß fie nicht allein das ganze Auge um: giebt, fondern ihr oberer Rand dann tammartig Dis über Die Blache Des Scheitels emportritt. Gie ift von brennend fcarlachrother Farbe. Die Bufe bicht mit baarichten oder gerfchliffenen Wedern befleidet.

Beim Gefieder bes Manndens ift Die fcmarge Farbe Die herrschende, Durch einen ftarten blauen Metallglanz und Durch mehrere hellweiße Abzeichnungen gehoben. Scheitel und Rehle haben etwas verlängerte Federn. Die weißen Achfelfedern bilden ein dreiediges weißes Fledchen.

Im herbste sehen beide Gatten, gleich nach ber Mauser, am schoffen. Die Farbe des Beibe dens ift braun; Scheitel, Raden und hinters bale dunkelrostgelb; der Oberruden nebst den Oberflügeldedfedern schon hellrostbraun, mit großen schwarzen Quersteden und unordentlichen Wellen dicht bezeichnet, an den meisten Federn lichte oder rostgelbe, schwarz besprifte Spigen; der Unterruden und Burzel schwarz, hellrostfarbig gebändert; die lichten Federn schwarz besprift; Rehle weißlichrostgelb. Der Bauch duntelbraun, rostgelb bestedt und besprift. Der Schwanz schwarz mit rostrothen unordentlichen schwalen Zickzachinden und Querstreisen dicht durchzogen.

Spielarten, ale: weiße, gefledte und, wie vorher gefagt, Bastarde mit Auer: und auch mit Moorschneehennen kommen vor. Europa und Assen ist das Baterland unseres Birkhahns. Rommt auf dem Sarze und auch in anhaltischen Forsten, wiewohl nicht häufig, vor. In einigen Gegenden kann man sie zu den Strich:, in andern zu den Standvögeln rechnen.

Das Birtgeflügel bewohnt eigentlich am liebsten folde Gegenden, welche viel Saidefraut (Erica) haben, ob fie viel oder wenig Baume haben, ift gleich. Besondere lieben fie aber die Gegenden, wo viele Birten machsen.

Diefer Bogel ift febr fcheu und vorsichtig, er hort, sieht und riecht febr gut, ist auch weit gewandter in allen feinen Bewegungen, als das Muergeflügel. Sie find nicht ungesellig und halten, da wo fle haufig sind, sich gern zusammen. Die alten Sahne nur fuhren ein einsames Leben.

Die Stimme gur Begattungezeit ift ein fur; abgebrochenes Pfeifen. Mit einem gartlichen Rafentone, wie: Dad, bad, lout bas Beibden Das Mannden. Ueberdem hat bas Mannden noch eine eigene Stimme in Der Balggeit. Diefe fangt an, wenn die Anofpen der Birten auf: fowellen, gewöhnlich in ber Mitte Marg und dauert bis in ben Mai hinein. Jeder Sahn hat feinen eigenen Balgplag, wobei oft, wenn ein Rebenbubler fich einfindet, hifige Rampfe ent= fleben. Der Rampf ift, wie bei unfern Saus: habnen, bis einer endlich bas Felb raumt. Er ift übrigens fehr bigig und begattet fic, wie fcon gedacht, mit Auer: und Moorfdneehuh: nern. Auch er macht Dabei abentheverliche Stel: lungen , Gebehrben und Sprunge, mobei er fein Balgen boren lagt, mas querft in einigen furg abgebrochenen pfeifenden Tonen beftehr, und nach einer Paufe erfolgt ein fonderbares hohles Bifden und Blafen, von Bechftein mit ben Solben Gruuri und Frau verglichen, und nachher ertont das fogenannte Rollern ober Gurgeln, mas Becflein mit ben Solben Golgolgolroi ju bezeichnen fucht. Sier: bei benimmt er fich wie toll, nust babei fein Gefieder fehr ab, fo daß felbft die fammartigen Babne oder fogenannten Frangen an den Gei: ten der Beben faft ganglich verloren geben. Da: bei find fie indeffen fo vorfichtig, daß fie jede Storung und Unnaherung eines Menfchen fo: gleich merten und entfliehen. Der Gouge muß fich daber in einer bichten Butte fehr fill und verborgen halten, mogu er fich icon vor Tages: anbruch einfinden muß. Gie unterfcheiden die Arbeiteleute fehr mohl von den Gougen und laffen Erftere ziemlich nabe beran tommen.

Thre Nahrung im Binter besteht in Baum: Inospen der Birten, Safeln, Erlen, Beiden, Aspen, Pappeln, Buchen u. a. m. Bo sie es haben tonnen, fressen sie grune und reife Bach: holderbeeren, scharren auch in der Erde nach Nahrung und graben sich danach im Binter Gånge unter den Schnee, um zarfe Knospen und Beeren zu suchen. Im Frühjahre Blätter vieler Pflanzen, von mehreren Aleearten, des Löwenzahns u. a., selbst die Spisen und Zweizge der Wolfsmilch (Euphordia cyparissias). Im Sommer Blätter und Blüthen vieler Pflanzen, selbst Insetten, dann auch Samen vieler Waldpflanzen, reif und halbreif, zum Theil mit Aehren und Kapfeln, auch viele Arten von Beeren, vorzüglich im Herbste, auch Wicken, Linsen, Waisen, hafer. In Ameisenhausen erzhalten die Jungen ihre erste Nahrung nachger wiesen. Zur Verdauung verschlucken sie auch Steine. Baden sich auch gern im Sande und Staube.

In großen Garten laffen fie fich auch gegabmt halten. Die Beibden legen an verfted: ten Orten die Refter an ohne Kunft, worin man 6 bis 12 Gier findet. Die Form haben fie von denen der Saushuhner, doch find fie be-Deutend fleiner, ale Die Der Auerhuhner. Gie find dunnicalig, glatt, auf blagbraungelbem ober zwiebelgelbem Grunde find viele großere und fleine leberbraune Puntte oder Fleden über: all hingestreut, Die fich aber im beißen Baffer, felbft mit einem Theile der Grundfarbe, abmac fchen laffen. Im Monat Mai beginnt bie Brut, Die in 3 Bochen vollendet ift. Beim Futters auffuchen bededt bas Weibchen Die Gier, um Die fich bas Mannden nie fummert. Die Tras milie bleibt bis jum Berbfte treu beifammen.

Die Feinde haben sie mit bem Auerwald, suhn gemein. Ein Mannchen hat 3 bis 4 Beibe den und da von beiden meißt gleichviel ausges brutet werden, so erlegt man besonders die Mannchen, die in einigen Landern zur hohen, in andern zur mittlern, und in noch andern zur niedern Jagd gezählt werden. Man schießt sie meist in der Balzzeit, verstedt in hutten von Daidefraut oder der Befenhaide (spartium) errichtet, auch friecht man auf dem Boden vorssichtig zu ihnen hin. So fangt man sie auch unterm Schnee mit einer Art Deckgarn in Norwegen. — Ihr Fleisch wird unter die Delicas tessen gezählt.

Das europäische Haselhuhn. (Tetrao bonasia. Linn.)

Beichnet fich burch fein buntichediges Gefies ber aus. In Dinficht der Große fieht es zwiichen bem gemeinen Rebhuhne und ber Birthenne in ber Mitte. Die Lange bes Mannchens beträgt gewöhnlich 15½ bis 16 3., Die Flügelbreite 24 bis 27 3.; Die Lange Des fcmachtigern Beibens 14-15, Die Flügelbreite 23-251 3. Die Flügel find, wie bei den vorigen Urten, febr. gewolbt ober mulbenformig. Der Conabel ift flein, von der Stirn gur Spige & 3. Die Augenlieder der alten Mannden tahl und hodroth. - Die Schenkel und Die obere Balfte des Laus fes dicht mit braunlich weißen, haarartigen &= bern betleidet, die untere Balfte, wie die Beben, fabl. Die Krallen find ziemlich lang, flach ge= bogen, unten bohl, icarfichneidig, die innere Schneide besonders groß. Die Scheitelfederne find etwas lang und frauben fich zu einer Solle auf; Die Rehlfedern verlangert, wie aufgedunfen, bei beiden, beim Mannchen nur auffallender, beim Beibchen bagegen erftere nur wenig, lege tere gar nicht langer; Die Ohrenfedern bei beis den Gefchlechtern loder, fast abstehend und et= mas lang, beim Mannchen auffallender. Beim Mannchen ein schwarzer Rebiffect, die Gurgel weiß. Die bunte Zeichnung Des Gefiebere befieht meift aus weiß, schwart, braun, grau in verschiedenen Abftufungen, lichteren und Dunkleren Farben. Alles Weiß ift beim Mannchen rein und bell. Das Beibden bat feine ichwarze Reble, Die Bruft hat weniger und truberes Beif. alle Zeichnungen find mehr in einander geflof= sen und matter und hat auch eine schmalere fdwarze Schwanzbinde und einen viel fleinern rothen Augenfled. - Die einjahrigen Weiben find überall mehr braun, ale roftfarbig.

Dieser Bogel ist weit verbreitet, von Italien bis Norwegen und über einen großen Theil
des europäischen und den westlichen des affatischen Ruhlands. In einigen Strichen häufig,
in andern dagegen selten. In Schlesen, Bohmen, Thuringen und auf dem Harze kommen
se vor. — Es ist ein Standvogel, streicht aber
im herbste samisienweise von einem Nevier ins
andere. Im Frühjahre kommen sie in einzelnen
Paaren zurud.

So wie die Natur überall Thiere jur Belebung an eine Segend zu fesseln weiß, so scheint unfer Saselhuhn in die Sebirgswaldungen vorzugsweise verwiesen zu senn. Felsige steinigte Gegenden, wo Nadelholz und Laudholz, besonbers beerentragendes, wächst, bewohnen sie am liebsten. Im Sommer seben sie meist auf der Erde, wo sie sich zwischen Sestruppe und im Grase verbergen, im Frühjahre meist auf Bäumen. Im Winter graben sie sich in tiesen Schnee ein und maden fich Gange theils gu ihrer Gi=

derheit; theils ihrer Rahrung wegen.

Diese schonen bunten Bogel find außerors bentlich scheu. Im ruhigen Zustande geben fie geduckt, wie ein Rebhuhn. Sie find ausnehe mend schnell und gewandt, konnen auch sprinz gen. Ihr Flug ift, wie bei den vorigen Balds huhnern, mit Anstrengung verbunden und geraufcool.

Ihre Stimme ift ein weit hörbarer heller Pfiff, wie wenn ein Mensch pfeift, oder wie der Lockton der Birkhühner. Auch in der Balzzeit vom März dis in die Mitte April dient sie deiden Gatten zum Lockton. Bon Tagesanbruch bis zu Sonnenaufgang und in der Abenddammerung dis in die Nacht hinein läßt das Männechen eifrig diese Tone hören, Scheitels und Ohrensedern dabei dick aufblasend. Der pfeizsende Ton hat etwas Eigenes, beinahe Traurizges, und klingt wie: Tihi — titit — tih. Diese Tone dienen auch als Locktone, wenn sie in kleinen Schellschaften zusammen leben.

Ihre Rahrung haben sie mit den vorigen Arten gemein, nur zartere Dinge, im Sommer Inselten und späterhin Beeren. Im Frühjahre genießen sie die Blätterknospen und männlichen Blüthenkäschen der hafel, Birken und Erlen, auch Wachholderbeeren zc. Durch das viele Scharren in der Erde stoßen sie sich die Fransen an den Zehen sast ganz ab, die sie erst mit der Mauser im Spätherbst wieder bekommen. Auch sie baden sich gern im Staube und trocknen Sande.

Gezahmte Safelhühner, Die man jung aufs ateben muß, futtert man wie Die Birthubner, perlangen aber, wie Diefe, einen Aufenthalt im Freien. Jedes Paar halt fich gusammen, doch leiftet das Mannchen dem Beibden feine Gulfe ibeim Bruten und Erziehen ber Jungen. Das Beibden fucht fich im Dai ober Juni ein eine fames Plagden unter einem fleinen Safelbufde ober anderm Geftraude, wo es die Gier auf eine geringe Unterlage binlegt. Gie legen 8-10 Gier von der Große der Taubeneier, mit glat: fer und etwas glanzender Schale, Die Farbe ift ein rothliches Braungelb, bebrutet nur blag Lehmgelb, mit rothbraunen oder rothlich bun: felbraunen Punkten und Tupfeln, manchmal aud großeren Fleden, Diefe nur einzeln, jene, befondere die erften, tommen oft vor. Die meis ffen haben nur wenig Zeichnung und etwa dann nur einen einzelnen großen braunen Bled, bei einigen find bagegen die fleinen runden Flede

nur an einem Ende haufig. Das Beiboen brus tet allein in 3 Boden Die Gier aus, und be: bedt fie, wie bie vorigen Arten, wenn fie nach Rahrung ausgeht. Ameifenlarven und fleine Infetten find ber Jungen erfte Mahrung. Die gartlich liebende Rutter ruft Die fleinen Thierden immer ju fich, verbirgt fie bei ubler Bit= terung und ichugt fie bes Rachts unter ihren Flügeln. Benn Die Jungen flugbar find, mas auch bei diefer Duhnerart zeitig gefdieht, findet fic auch der Bater wieder ein und man trifft bann die gange Familie den Berbft und Winter hindurch in der gewählten Baldpartie. Ra= ben, Kraben und Solzheher fellen den Jungen nach, außerdem haben fie mit vorigen gleiche Feinde.

Das Safelwildpret gehort gur niebern Sagd und fie werden besonders im Fruhjahre und Berbfte gefchoffen und gefangen. Beim Beranna= ben des Sougen drudt es fich meift platt nie= ber, felbft auf einem flarken Afte figend, und wird dadurd oftere überfehen. Durch eine treue Nachahmung ihrer Pfeife lodt man fie auch an und ichieft fie dann aus einem Berfted von beit Baumen berab. Man bat Dagu eigene Pfeifchen. Bei tiefem Gonee fangt man fie auch, wie Die Birthuhner, in Rebhuhner : Stednegen und Laufdohnen. Gbrefcbeeren freffen fie gern und tonnen baber auch in einigen farten Dobnen, in dunflen Gangen aufgestellt, gefangen werden. Ihr Bleifc wird unter ben bis jegt befdriebenen Duhnerarten fur das delifateffe gehalten, worauf auch fein Rame bingielt: Bonasia von bona assa, b. i. guter Braten. -Gingefangene laffen fic durch Gbrefden, Safet, Brod u. dgl. erhalten, fie werden auch gabin und gutraulich, im Freien werden fie fich auch mohl, gehörig eingezaunt, halten, im Bimmer aber ferben fie frubzeitiger.

Das doppelflügelige Waldhuhn. (Tetrao cupido.)

Um Raden 2 Feberbusche in Gestalt von kleinen Flügeln, aus 8 Federn bestehend, auf bem Kopfe ein kleiner Federbusch, über die Augen läuft ein breiter, warziger, halbfreissförmiger, vrangegelber Fled, welchen der Bosgel nach seinem Willen anspannen und erschlafsfen lassen kann; unter den Nackenflügelchen liegen zu jeder Seite lose hängende Hautlappen, welche 3 dieses Theils decken und, wenn sie aufgeblasen sind, wie ein Klumpen vorragen, sie

find hell orangefarben. Rehle weißlich; unter den Augen ist ein brauner Streif; der ganze obere Theil des Körpers ist schwarz, rothbraun und weißlich gemischt und in die Quere gestreift, Somanz furz und abgerundet, dunkelbraun. Brust schön rothbraun, weiß und schwarz gezsteckt. Die Unterbrust und der Bauch blaßbraun, mit weißen Querfleden; die Füße bis auf die Zehen mit haarartigen gelblichen Federn bedeckt, die Zehen gefranzt, Augen rothgelb.

Das Weibchen ift fleiner, heller, entbehrt bes warzigen Augenfleds, der Flügelchen am Maden und der nadten haut unter benfelben. Lange bes Mannchens 9 3. Flugelbreite 27 3.

Gewicht 31 Pfund.

Gie leben in verschiedenen von einander entfernten Begenden der vereinigten Staaten, licben große Gbenen, mit wenig furgem Gebufche bewachsene Saiden. Gind bebaute Felder in ber Rabe, fo besuchen fie diefe am Morgen und Abend. Bei ichlechtem Better oder Concegefto: ber nabern fie fich ben nachften Bohnungen oder den Landfragen, mengen fich auch mohl un: ter Die Saushuhner, doch find Die Berfuche fie gu gahmen bis jest noch nicht gegludt. - Gie leben gefellig und mahrend die Beibden bruten, fampfen Die Mannchen mit einander. Gobald Das Lageslicht anbricht, verfammeln fie fich in Gegenden mo furges Unterholz ift ju 30 bis 50 Stud. Dann fangt einer ber Sahne mit brul: Iendem Zon an, ein anderer antwortet und ber Rampf beginnt nach Art der Trut: und Auer: buhner. Die Geitenhaut mird Dabei fo aufge: blafen, daß fie an jeder Seite wie eine Citrone oder Pomerange erscheint. Der Rampf ift bart: nadig; fie fpringen dabei 1-2 Fuß in die bobe mit taderndem unangenehmen Gefdrei. Co: bald aber die Sonne hervorbricht zerstreuen fie fic. Die Jager fuchen folche Plage ju entdeden, um die Streiter, die dabei gang blind find, Teicht zu erlegen. Mußer der Begattungezeit find fie in Truppen von 10-12 und noch mehr bei: fammen. Die Stimmen ber Mannchen laffen fich nicht auf ausdruden. Die Beibchen aber tadern fart und diefe Tone follen dem Gelach: ter eines Menfchen nicht unahnlich fenn.

Ihre Nahrung besteht in allen Arten Same: reien, Beeren, Baumknospen, grunen Pflanzen: theilen und Insesten; besonders lieben sie den Mais. Die Weibchen machen ein funstloses Nest, worin man 12-14 braunweißliche Gier findet, so groß wie Dubnereier. Die hennen bruten allein. Ihr Fleisch wird fehr geschäft.

Das Alpenschneehuhn. (Tetrao lagopus.)

Die Farbe Diefes Bogels andert nach ber Sabreszeit febr ab. Bu allen Jahreszeiten ift beim Mannden ber Baud, Die untern Dedfe: bern bes Schwanzes, Die vorbern Dedfebern Des Schwanzes, die vordern Dedfedern der Flu: gel, Die Schwanzfedern und Die Laufe weiß, Die -Schwungfedern haben ichwargliche Schafte und ber Schwang ift fcmarg. Im Sommer aber find die übrigen Theile fehr verschieden. Die Maufer ift doppelt. Die Fruhlingemaufer be: ginnt im April, bann fommen bin und wieder ichmargliche Federn hervor und ber Bogel er: fceint bunt gefchedt; Anfange Dai ift Ropf, Sale, Ruden, Die obern Dedfedern der Flugel und Die Bruft ichwars, rofffarb und weißbunt, fo baß man nicht 2 gang gleiche Exemplare fine Det. Die Federn bleichen aber nach und nach fo ab, bag mit Ende August ober Ceptember befonders ber Ruden icon hellaschgrau und fdmarglich punktirt erfdeint, Die roftfarbenen Bander am Sale und Ropf find faft gang weiß geworden. Beim Beibden find alle diefe Theile fowars und rofigelb gewellt, Die Bander viel breiter und deutlicher. Im Binter merben alle Theile weiß, nur Die Schwangfebern bleis ben fcmarg mit weißem Endfaume, ben fie im Commer nicht haben; auch bleiben am Manne den die Bugel und ein fleiner gled hinter ben Mugen fcmarg. Die Berbstmaufer fangt im Detober an und im Rovember find fie gang rein weiß. Ueber dem Muge ficht eine rothe, margige, am obern Rande ausgezadte Saut, Die am Mannden aber viel farter ift. Die Lange ift 13-15, Die Flügelbreite 24-27 3.

Das Alpenschnechuhn bewohnt die hohen Gebirge der Schweiz, Tyrols 2c. Im Sommer leben sie immer über der Region des holzwucheses, nahe am Schnee und Eis. Sie scheuen die Sonnenwarme und das blendende Schnees licht und segen sich unter die Alpenrosenstrauscher oder unter Felsenabsäge in den Schatten; im Frühlinge sigen sie unter vorhängendem Schnee und Gis. Bei Wetterveränderung schreizen sie unaushörlich: krögögögöögrö, oder auch önözgöö, önö, göö. Lockt das Weibschen die Jungen oder erscheint ein Raubvogel, so schreien die Alten: gäzgä, gaggää. Jung lassen sie sich zähmen, halten aber in der Rezgion der Thäler nicht lange aus.

Sie fressen Pflanzen und Saamen, Anos: pen ber Alpenrosen, Beeren, Insetten zc. In ber Gefangenschaft hafer, auch Brod.

Sie leben Paarweise. Im Juni legt bas Beibchen 7—15 Gier in ein tunfloses Rest unter niederm Gestrauch, oder einen schügenden Stein. Das Mannden nimmt keinen Theil am Bruten und Führen der Jungen. Die Gier seben blaggelb mit ungleich braunschwarzen Flekten; in 3 Wochen sind sie ausgebrutet. Die Jungen gleichen unsern kleinen Duhnern, nur find sie kleiner.

Falten, Fuchte, Iltife und Wiefeln find nebft den Menschen ihre hauptseinde; auch Schmarogerinsetten und Burmer plagen fie. — Im Winter fangt man fie in Schlingen, sonft werden fie geschoffen ihres schmadhaften Fleizsches wegen, das dunkelroth und gekocht schwarzift, es soll fast wie das vom hasen schmeden.

Unmerf. Das Moorschnechuhn (Tetrao albus. Gmel. saliceti. Temm.) gehort noch mit hierher. Bauch, Flugel und Fuße ju al: Ien Jahreszeiten weiß. Das fehr alte Mann: den ift im Commer fast gang fcmargbraun. Bei Jungern ift Ropf und bals taftanienbraun, an Bruft und Seiten rofffarb gebandert; Man: tel, Ruden, Dedfedern der Flugel und obere Des Schwanzes ichwarg, roftfarb und weiß, Schmal gebandert; jede Feder ift in der Mitte fdmars, an ben Geiten mit halben Bandern, am Ende mit einer roftfarbenen, bann einer fdmargen, und endlich einer fdmalen weißen Binde. Comang fdmarg, Die mittlern Federn weiß gefaumt, nur die außerste gang ichwarg, Die 2te mit einem halben Saum. Das Beib: den hat auf roftrothgelber Sautfarbe fdmarge Bleden, fast wie Die Birthenne. Im Winter werden beide weiß, der Schwang, der fcmarg ift, ausgenommen. Die Fruhlingsmaufer bes ginnt Ende Aprile. Lange 13, Breite 24 3. Der Rorden ber alten Belt, bis nach Ramtichat: fa binauf, ift ihr Vaterland. Gehr haufig find fie in Rorwegen, Schweden und Lappland, fo Dag ein einziger Bildhandler 1815 40000 Stud nad Drontheim brachte. In einer Riederlaffung an der Sudfonebai merden von den Bewohnern in manchem Binter 10 - 90,000 Stud gefan: gen, fo daß man damit die Schweine futtert. Es find Strichbogel und eine Bohlthat fur jene Lander. Im Berbfte gefellen fie fich in großen Flugen zusammen, fonft paarmeife. Das Mann: den brutet nicht mit, macht aber bei Beibden und Jungen, Die wie alle Buhnerarten febr bald flugbar werden. Sie werden zahm und begatten sich in der Gefangenschaft; baden sich im Sande und nahren sich von Knospen der Birten, Beiden, der haide von Beerenarten, selbst Roggen und Insekten. Das Rest ist kunstelos bereitet und enthält 9—15 Gier, die einen hellgelben Grund haben und mit feinen und groben rothbraunen Fleden, die oft schwarz, bezeichnet sind. Balten, Füchse und kleine Raubethiere, selbst Raben rauben Gier und Junge.

Das Schottische Huhn. (Tetrao scoticus.)

Der ganze Körper lebhaft kastanienbrauneroth, Borderhals bis zur Brust rein, an der Brust kleine schwarze Querbinden, so wie an den Seiten des Unterleibs und der Aftergegend; Bauch schwarzbraun mit weißen Federspigen; Dinterhals braunroth, schwarz gesteckt; der Obertörper rothbraun mit schwarzen und rostz gelben Bandern, die Mitte der Federn schwarz, Schwungsedern graubraun, Schwanz schwarzebraun. Beim Beibchen, etwas kleiner als das Männchen, sind alle Theile mehr gewellt und gebandert, die Federspigen hie und da weißz gelb. Läuse bei beiden weißgrau, Rägel lang, hornsarben, Schnabel schwarz und start; Augenzhaut schon roth, mit zakigem Kamm. Länge

Die trodenen, mit haide besetzten Torfgezgenden der Mittelgebirge Schottlands sind sein Baterland. Es mausert nur einmal des Jahrs und wird im Winter nicht weiß. Im Sommer ist es wenig scheu und halt sich unter dem haizdefraut so fest, daß es nur von hunden ausgezstöbert oder vom Menschen fast getreten, aufseigt und bald wieder einfällt; im Winter ist es dagegen sehr scheu. Sie leben von allerlei Knospen, Beeren und Blumen. Leben in Einzweiberei. Das Weibchen legt 10 — 15 Gier, diese sind rostbraungelb, rothbraun der schwärzelich gestecht und punktirt.

Flughuhn. (Pterocles.)

Schnabel mittelmäßig, jusammengebrudt, bei einigen Arten dunn; Fuße mit furzen Zehen, die hinterzehe kaum rudimentartig und hoch, am Laufe eingelenkt; die vorderen Zehen bis jum Gelenke mit einer haut verbunden, und mit hauten gefaumt; der vordere Theil der Läufe

mit kleinen fehr kurzen Febern bededt, hinten nacht. Rägel fehr kurz, der hintere spisig. Der Schwanz bei einigen Arten konisch; bei undern mit. 2 langen fadenförmigen Federn. Flügel lang, spisig. — Sie leben in den warmen Gegenden Artikas und Affens, kommen nur zufällig nach Guropa. Sie find den Wanderern in der Buste eine angenehme Erscheinung, denn sie verkunden ihnen die Rähe des Wassers und die Grenze der Wusse.

Das Spihschwanz-Flughuhn. (Pteroc. setarius.)

Die Reble icon ichward, taffanienbraunroth eingefaßt; Bangen, Geiten Des Ropfe und Bor: Derhalfes graugelblich; am Unterleibe verbreitet fich freibformig ein fomarges fomales Band und unter Diefem noch ein zweites; ber Raum amifden ihnen ift icon roffroth orangefarb; ber Unterleib weiß. Scheitel und hinterhals find mit ichwargen und oderfarbenen Querbanbern und ber Ruden mit unterbrochenen, balbgir: felformigen, ichwargen, rofffarben und gelb: lichen und Die Glugelbedfebern mit fcmargen und gelben Querbandern gegiert, fo bag ber gange Dberkorper gefchedt erfdeint; ber Schwang fdmarg mit weißer Spige. Die beiben mittlern Schwanzfedern find fcmart und geftreift, mer: ben bann fehr ichmal und endigen in eine fdmarge fabenformige Spige.

Das alte Beibchen ift noch mehr gefleckt und bunt, die Kehle rein weiß und unter dieser ein schwarzes, fleckiges Salsband. Die Große 103. ohne die langen Schwanzsedern, die noch 3 3.

langer find.

Man findet Diese Bogel übrigens in Menge in den Buften von Sprien, Arabien, Berfien, an der Grenze der Bufte Zahara, felbst in Sizilien, im sublicen Frankreich und Spanien. Sie leben außer der Brutzeit in Gesellschaften von Hunderten beisammen, find unruhig und wild, laufen und fliegen fehr gut.

Ihre Nahrung besteht aus allerlei Samereien, Pflanzentheilen und mahrscheinlich auch
aus Insetten. Bur Begattungszeit leben sie
paarweise. Das Weibchen legt 8—14 ziemlich
große Gier. Sie haben einen gelbrothlichen
Grund, der mit ziegelrothlichen, braunen und
aschgrauen Fleden bestreut ist.

Das Lichtensteinische Flughuhn. (Pteroc. Lichtensteinii. Temm.)

Die Stirn bes Mannchens gieren 3 Bander, Das mittlere ift fcmars, Die beiden andern weiß. Die Reble nanquinfarben und diese Farbe ift Die herrichenbe am gangen Geffeder; Ropf und Baden find mit fleinen fcmargen Punkten bo: geichnet, die am Raden und Salfe halbmondfor= mige Fleden bilden; Mantel und Flugel haben breite fdmarge Querbander; Unterleib und Geiten weiß, jede Feder am Ende mit einem ichmar= gen Salbmondflede, fo daß die Theile wie gefouppt ericeinen; ber rothlich nanquinfarbene abgerundete Schwang hat ichwarze Querbinden. Die Lange Des Bogels betragt 9-10 3 .- Dem Beiben fehlen Die Stirnbander und der Gled auf ber Bruft, bas Salsband und das Gefieder bat einen fomugig weißen Grund; Die untern Theile find wie beim Mannchen gefduppt. Daterland Mubien.

Feldhuhn. (Perdix.)

Schnabel furz, zusammengedrudt, ftark, an ber Burzel nacht; obere Lade gewolbt, conver, gegen die Spige gekrummt. Die Nasenlöscher an der Burzel seilich durch eine gewoldete nachte haut halb geschlossen. Füße 3 Zehen nach vorn, eine nach hinten; die vordern durch eine haut bis zum ersten Gelenke vereinigt. Läufe nacht. Der kurze, abgerundete, hangende Schwanz besteht aus 14 bis 18 Federn, Plügel kurz, Augengegend nacht. Einige haben einen oder mehrere Sporen an den Füßen, was nebst noch andern Eigenheiten Beranlassung gab, sie unter 4 Abtheilungen zu bringen. Zur erstern Abtheilung gehört

Der Frankolin mit roftfarbigem Halbbande.

(Perdix Francolinus.)

Am Laufe ein Sporen. Scheitel jede Beber in ber Mitte mit einem schwarzbraunen Langefled, roftfarben gesaumt; Stirne, ein Streif
über ben Augen, der den Scheitel einfaßt und
im Genick fich nit dem der andern Seite vereinigt, untere Theile der Bacen und Rehle tief
schwarz; unter und hinter dem Auge ein weißer
Streif, hals fastanienrothbraun, Genick weiße
gesteckt; die untern Theile tief schwarz, an den

Seiten hat jede Feder 2 runde, weiße Fleden; fo auch die untern Theile des hinterhalfes; Schultern und Dedfedern der Flügel schwarz, weiß oder rostfarb gefaumt. Schwanz bis zur Mitte schwarz, mit schmalen weißen Querbantern; Schenkel und untere Dedfedern des Schwanzes rostroth, weiß gemischt; Schnabel

fdmars, Fuge braun.

Das Beibchen ist vom Mannchen sehr versschieden. Eine weißliche Erdfarbe ist bei ihr die herrschende; Die Scheitelsedern sind braun, auf jeder Seite mit einem großen, weißlich rostfarzbenen Fleck, der über die Lugen weggeht; Dals und Brust mit kleinen braunen Flecken, die auf den übrigen untern Theisen noch deutlicher sind, und breite Bander bilden; Rücken und Deckset dern der Flügel sind matt graubraun, die Fezdern weißgelb gesäumt. Bürzel und die beiden mittlern Schweissedern graubraun mit hellern Querstreisen; keine Sporen. Die Länge des Mannchens 1 Fuß. Das Baterland ist das sudzliche Europa, Sicilien, Nordafrika und alle Rüsten Ussens die Bengalen.

Sie leben auf nassen Wiesen und in Gum; pfen, weshalb man sie auch Biesenbuhner nennt. Sie lassen sich auch in Bogelhäusern halten. Der Bersuch am Cap, sie zu hausthieren zu mazchen, ist mit einer Art der Frankoline gelungen, tonnte auch wohl mit mehreren gelingen, da ihr Naturell nicht sehr wild ist. — Ihr Fleisch ist sportresslich, daß man es dem von Fasanen noch

porzieht.

Das gemeine Rebhuhn, Reb=Feld= huhn.

(Perd. cinerea. Linn.)

Gebort zur zweiten Abtheilung: wahre Belbhuhner. Zwischen den Rasenlöchern bestinder sich eine Art Wachshaut. An den Fußen einiger hierher gehörigen Arten statt eines Sporrens eine warzenahnliche Erhöhung, oder sie sind glatt. Sie leben meist auf den Feldern und halten sich nicht lange im Gebusche auf, segen sich auch nicht, wie die der vorigen Abtheilung, auf Baumen. In der Begattungszeit leben sie paarweise, sonst in großen Familien beisammen.

Das Rebhuhn ift ein fehr bekannter Bogel, Die 4 mittelsten Schwanzsedern find rofffarbig, grau und schwarz gewässert; Die untern Fluzgelvedfedern weiß. Die Lange beträgt 12 — 13, Die Flugelbreite aber 20½ bis 22 3. Schwanz

3-31 3. Die Flügel find furg, abgerundet, bobl oder mullenformig gewolbt.

Eine genauere Beschreibung dieses bekannten Bogels übergeben wir und bemerken nur: daß auf der Brust des Mannchens ein großes dunz felrothbraunes oder kastanienbraunes Schild in Gestalt eines Hufeisens (dessen Definung nach unten gekehrt) im weißen Felde sich besindet, der Bauch ist weiß. Es giebt unter ihnen auch manche Spielarten, als: mehr oder weniger

rein meife, auch gefledte.

Die Rebhühner sind weit verbreitet, lieben aber weder zu kalte noch zu warme Gegenden und sind da am häusigsten, wo der Ackerbau besonders blüht, wie in unsern Gegenden. Es ist ein Stand = unter gewissen Beziehungen aber auch ein Strichvogel. Die meisten verslassen das Revier, in welchem sie geboren, selten, nur etwa bei starken Berfolgungen und bei Nahrungsmangel, kehren aber meistens, wenn dieses beseitigt, wieder zurück. — Deshalb komsmen öfters Schaaren von 50—100 Stück durch Witterung und Kalte getrieben zu uns, die Jäger nennen sie Jughühner, sie sind etwas kleiner als die unstigen und sehr wild, bilden

aber keine eigne Art.

Den Ramen Reb : Subn leiten einige von Reben ber, weil fie fich gern in Anpflanzungen von Reben aufhalten, wie in Beinbergen, bez fonders auch die Meder lieben, mo Brombeeren (Rubus caesius) zwischen Getraide fich bin: ranten, oder in den Furchen an den Aderrainen fich hinziehen. Gie lieben ein gefelliges Leben und man trifft fie felten einzeln an, etwa im Fruhjahr die Mannden, deren Beibden bru: ten, fonft halten fie fich meift in Familien gufammen und bilden nach der Jagersprache eine Rette ober ein Bolt. Das Mannchen er= fceint Dabei als Bachter, Befduger und Familienhaupt, die Mutter ale forgfame Gehulfin, Die Rinder als folgsame Untergebene, Die auf den Ruf boren. Ungertrennlich theilt die Familie Leid und Freud mit einander, bis gur Paarungezeit, mo fich die Parchen einigen und zwar auf Lebenezeit beifammen zu leben. 3m Serbft beffeben die fogenannten Bughuhner aus Schaaren, Die aus vielen Familien befiehen. Auf ben Lagerftatten folder Schaaren fann man an den abgefonderten Saufden Unrath immer feben, aus wie vielen Familien ein folder gu= fammengefest ift, ba Diefe fich beim Rachtlager immer zusammenhalten. Much bemerkt man nabe Dabei Die Stellen, mo Die einzelnen Ba: den fagen, indem bei jedem Nachtlager einen ober einige Schritte Davon ein Familienglied Bache balt, eine Obliegenheit, welcher fich, ehe Die Jungen erwachsen find, flets nur das alte Mannden unterzieht.

Im Fluge, wie im Sigen ruft das Rebfeldzbuhn laut und weit tonend: Gurrhick oder Girhick. Das alte Mannchen ruft am meiften und am öftersten im Frühjahr Abends und Morgens sein: Girhat oder Girhäaf! Am angenehmsten klingt dieser Ruf im Anfang des Frühlings, wenn Mannchen und Weibchen damit abwechselnd sich locken und so seine Berstündiger sind. Die Mannchen, wenn sie besonders in Ueberzahl da sind tampfen heftig um die Weibchen. Verfolgt oder sehr geängstigt hört man die Tone: tart — tart — tart. Als Stubenvögel sind sie nicht zu empfehlen, da sie selbst jung aufgezogen, immer sehr wild bleiben.

Ihre Rahrung besteht in Kornern und Ga: mereien, grunen Blattern und Infeften. Legtere freffen fie febr gern, befonders die fleinern Arten; Die garten Jungen porzüglich Ameifen und Deren Brut. Rach Infetteularven fcarren fie auch gern im lodern Boden. Benn bie Glieder einer Familie gebudt und emfig ihr Futter fuchen, fieht eins von ihnen (in der er: ften Zeit ber Familienvater) gang aufgerichtet ale Bache babei, um fo bie Uebrigen auf jede fcon von weitem bemertte Gefahr fogleich auf: mertfam machen ju tonnen, mas mit einem fanften Rur gefchiehet, Damit fich alle gur rech: ten Beit niederbruden und nachher jufammen entflieben tonnen. Gie freffen mit Unterbrechuns gen, liegen gegen Mittag fill, fonnen und ba: den fich im Staube.

Strenge Winter schaden ihnen mehr, durch hohen Schnee und Eisdede, wo es an Nahrung fehlt, als Kälte. Sind in der Nahe Wachholzderbusche, so suchen sie dieselben auf, die ihnen Schuß und durch die Beeren, die sie gern fresen, angenehme Nahrung gewähren. Gezähmte Rebhühner füttert man mit Waizen oder Gerzste, Kohl, Sallat zc. Grober Sand und Trinkwasser, was im Freien der Thau ersest, darf dabei nicht fehlen. Junge, füttert man mit Ameiseneiern auf, mit gehadtem Weisen von hühnereiern, später mischt man in Milch gezquellten hirsen bei, sodann Baizen.

Bei Gintritt der beffern Jahredgeit, bei und meift Ende Februare, paaren fie fich und leben nun nicht mehr in großen Familien beisammen. Da indeffen oftere mehr Mannchen als Beib= den ba find, giebt es oft viele Plagereien, fo daß dadurch es der Jagd nachtheilig werden fann. Gern bleiben fie da, wo fie geboren find, maden ihr Meft in Rapps, Rubfaat, Erbfen, Rlee, feltner im Roggen, hohem Grafe an Buschrändern 2c. Zum Reste felbst mahlen sie eine aufgefundene Bertiefung oder fragen fic eine folde. Das Mannden halt babei meift Bache, und felbft aufgescheucht, fehrt es bald wieder auf feinen Poften jurud. Gein angftli: der Ruf benachrichtigt das Beibden augenbliclich von jeder fich nahenden Gefahr, damit es auf feiner buth fen, und fich, vorerft durch unbemerttes Fortichleichen und nach weitem Weglaus fen, durch Fortfliegen retten tonne. Dadurch fucht das Weibchen dem Feinde die eigentliche Stelle bes Reffes ju verhehlen. Dies machen eben fo Die meiften auf der Erde niftenden Boget. Die alten Beiboen legen zeitige, etwa 20, die jungern an 12 Gier. Gie machen jahrlich nur ein Gehede. Die Gestalt der Gier ift birnformig, Die Schaale fest, glatt, wenig glanzend, Die Farbe ift ein weißlich grunlich Braungrau. Das Weibchen brutet Tag und Racht, Die kurze Beit nach Rahrung fuchend, ausgenommen. Wird Das brutende Beibchen nicht gewarnt, fo bleibt es oft fo fest auf den Giern figen, daß es die Senfe der Maher und felbst Raubthiere ermur= gen. Die Gorge fur Die Jungen theilt Der Ba= ter mit ber Mutter, fucht fie zu fcugen, ja ben Feind auf fich zu lenken und fo Die Jungen, Die fic beim Warnungeruf verfteden, zu erhal: ten. Cobald Alles wieder ruhig, laft bas Mannchen feinen Ruf horen, welches bas Beib: den beantwortet, und fogleich eilt er feiner Familie wieder gu. Go hangen auch Eltern und Kinder immer jufammen und man nennt dies ein Bolk, mas nur besondere Ungludsfälle und die Paarungszeit trennt. Sat bei der Jagd der Jäger fie getrennt (gefprengt), fo liegen Die einzelnen oft fo feft, daß fie der hund beim Berausfliegen nicht felten erfcnappt.

Berträglich leben die Glieder einer Familie unter einander, feindselig aber gegen Fremde, doch nachsichtiger gegen einzelne Alte und vaters und mutterlose Waisen, die sich so gern an Familien anschließen, die noch einen Führer haben.

Biele Feinde, denen nach ihren Fleisch und Giern luftert, finden fich unter Saugethieren und Bogeln. 3. B. Die Fuchse, Marder, Ragen, Jgel, Ratten, Samfter, der Rebhuhnerhabicht

(Falc. palumbarius, Lin.), der Taubenfalte (Falc. peregrinus), der Lerchenfalte (Falc. subbuteo), der Sperber (Falc. Nisus) fügen besonders den halbwüchsigen hühnern viel Leids zu zc., ja selbst Gulen und Krähenarten verfolgen sie. — In ihrem Gesteder wohnen Schmarogerinsetten und im Innern Burmer.

Man erlegt fie mit Schießgewehr und versichiedenen Fangarten ") und mit hulfe eines wohlabgerichteten huhnerhundes. Man baigt auch Rebhuhner mit abgerichteten (abgetrages nen) Falken, wozu fich besonders huhnerhaphichte und Taubenfalken am besten schiefen.

Um die Rebhühner, die ein fo fcones Jagdvergnügen gewähren und ein fo kostbares Bildpret liefern, zu erhalten, ist das sicherste Mittel sie einzusangen und zu durchwintern, wobei freilich viel Borsicht und Muhe anzuwenden ist. Sonst pflegt man sie auch bei ftrengen Wintern zu füttern und ihnen Schus durch Anpflanzung von Strauchholz zu gewähren und dies zahlreich und zwedmäßig vertheilt und, gut zu unterhalten, sogenannte Remisen auf den Revieren anzulegen.

Das Steinfeldhuhn. (Perdix saxatilis. Meyer.)

Bangen, Reble und Gurgel weiß, mit einem beiderseits scharfbegrenzten schwarzen Bande einzgefaßt. Guropa besigt 3 Arten Feldhühner mit rothen Schnabeln, Augenringen und Füßen: Perdix saxatilis, P. rubra und P. petrosa, die unter allgemeinen Benennungen: rothe Rebhühner oder Rothhühn er bekannt, und febrhäusig mit einander verwechselt worden sind.

Das Steinhuhn ist 14—15 3. lang und 23 bis 24 3. breit. Die kurzen Flügel haben die in dieser Gattung gewöhnliche Gestalt, sie reischen in Ruhe liegend bis auf die Wurzel des 3½ 3. langen Schwanzes. Der Schnabel ist gerstaltet wie bei vorigen, von Farbe hochroth; so auch die Augenlieder und ein kahler Ring um dieselben, die Iris hochrothbraun. Die Füße lebhaft hochroth, matter als der Schnabel; an der hintern Seite des Laufs, in der Mitte seiner Höhe, etwas nach innen, sieht eine warzenähnzliche Erhabenheit, die aber nur eine Auszeichzwing des männlichen Geschlechts ist, indem sie den Weibchen und jungen Vögeln sehlen. Die

Rrallen find ziemlich groß, flart, flach gebogen, jufammengedruckt, unten etwas hohl oder zweiz schneidig mit abgerundeter Spige, von Farbe fomarzbraun.

Um Rinn fieht ein fomarges Fledchen, ein anderes fleineres am Mundmintel; eben fo tief fdmarz ift Die Stirn, gunadft der Conabelmurgel, eben fo find Bugel, Schlafe und ein breites Band, meldes von da an hinter ben, mit ete was verlangerten, ichwarzbraunen Febern bebedten Dhren herum, an den Seiten des Salfes bis vor den Ropf herab lauft, fich hier vereinigt und bas Beiß ber Bangen, ber Reble und gangen Borderhalfes umfoließt. Bon der Stirn, bis über bas Muge meg, ift bies fcmarge Band ichmal weiß begrengt, und bas Beife verliert fic allmalig in den bunkelaschblauen Scheitel; Genid, Sinterhale, ber gange Ruden, bis auf die mittlern Schwanzfedern hinab, aschblau, Dberruden und Schultern fomugig purpurroth überlaufen; Die Schwungfedern Dunkelbraun. Der Ropf und ein Theil der Dberbruft afchblau, fcmach purpurrothlich gewolft; Die Bruft in Der Mitte, nebft den Schenkeln und dem Bauche, fehr icon roffgelb; die großen Tragfedern an Den Geiten Der Bruft fcon afcblau, mit rein roffgelben, fcmarg eingefaßten Querbandern und diefen fich anschließenden halbmondformigen, fastanienbraunen Fleden befegt. Diefe Feberpartie giebt bem Steinhuhn eine porzügliche Bierbe.

Mannden und Weibchen unterscheiden fich in Farbe und Zeichnung nur wenig. Die Juns gen im ersten Federkleide sollen den Jungen der Perlhuhner ahnlich feben. Im ersten Dus nenkleide ahneln fie den übrigen jungen Felds

bubnern.

Diefer Bogel lebt im Guden von Guropa, in Affen und Afrita. In jenen gandern trifft er mit dem Roth : und Felfenfeldhuhn gufams men, fo daß es von vielen Begenden noch zweis felhaft bleibt, welche von den 3 Arten, ba man fie oft vermechfelt, eigentlich gemeint fen. Ge ift ein Standvogel, unter gemiffen Umftan: den auch ein Strichvogel, verlagt feinen Aufent: halt zuweilen in Schaaren, um einen andern ju fuchen. In den fudlichen Theilen Guropa's ift es in gahllofer Menge beifammen. Alle von ihm bewohnte Gegenden find gebirgige, beren Soben es im Commer jum Aufenthalt mable, im Berbft in niedrigere Lagen berabfteigt, wo es den Winter gubringt. Es halt fic bort an fleinichten Orten, swifden Pflangengeftrupp und 33 *

Dem Treibzeuge und dem Schilde, den Tiraß, der Schneehaube, Glockengarn, Stecknes, Laufdohnen zc.

niedrigen Solzarten, im Saidekraute und Grafe auf. In der Schweiz sind es wahre Alpenvogel. Auch im sublichen Frankreich bewohnt es die höchsten Gebirge vom Fruhjahr bis im Spatsommer, zieht sich dann herab in Ebenen und sucht Schug in Gestrauchen und hecken.

In feinen torperlichen Berhaltniffen, in Stellung, Anftand und im Gange ahnelt es gang dem gemeinen Rebhuhn. In den heißen Mittagestunden pflegt es der Ruhe und ift dagegen am lebhafteften Abende und Morgens. Sein Rlug ift fcmerer und geraufchvoller als des gemeinen Rebhuhns. Es ift ein harmlofes Gefcopf, wo es nicht gu arg verfolgt wird, Daber leicht zu fciegen und zu fangen und mo es gehegt wird, fann es fogar gutraulich mer: Den ; 3. B. auf Scio und andern griechischen Infeln. Bur Brutzeit leben fie pgarmeife, au-Berdem familienweise und felbft in großen Beer: ben. Dagegen find fie ungefellig gegen andere Bogel und gur Paarungszeit auch gantifch ge= gen ihres Gleichen. - Die gewöhnliche Stimme ift ein leifes Gad, im ftartern Zon Chafabis. Die Mannchen tampfen fehr mit einander; man benugte fe fcon dagu im Alterthume, wie noch jegt gur Beluftigung, Dies that icon ber Raifer Alexander Geverus und Die heutigen Ginwohner der Infel Eppern beluftigen fich noch an ihren Rampfen. Gie laffen fich ubri: gens gut gahmen. Muf ben griechifden In: feln macht man fie fo gahm, daß fie fich taglich austreiben faffen und dem Ruf oder Pfeife ib: res hirten folgen. Man fagt fogar, daß bas Mannden, wenn es gezähmt und mit Saus: bennen zusammengesperrt, sich vermische und fruchtbare Baftarde erzeuge.

Im Commer besteht ihre Rahrung aus Infetten, ale: Rafern, Beufdreden, Fliegen, Spinnen, Ameisen, deren Larven und Puppen, nebenbei auch in manderlei Gamereien, in Bluthen, Anospen, Baigen, Sanf, Sirfen zc. bei Mangel auch Baumknospen, besonders gern der Alpenrosen (Rhododendron), Bachholderbee: ren, Baumfamen ac. Sie baden fich nach Art der andern Suhner im Sand und Staub. In der Gefangenschaft giebt man ihnen Baigen, jumeilen Reiß, Sanf, Sirfen, im Commer of: ters Sallat, im Winter grunen Rohl; lernt auch Brod, gefochte Rartoffeln u. bergl. freffen. Bon einer Benne ausgebrutet, erhalten Die Jungen Ameiseneier und Futter der jungen Fafane. Salt man fie im Freien, fo muß man

auf fie Acht haben, denn fobald die Flugelfes bern machfen, entwischen fie.

Im Fruhjahre lebt Mannchen und Beib= den febr gartlich mit einander. Jedes Parchen behauptet fein eigenes Revier. Gewohnlich begieben fie die Brutplage im Mai, je nachdem es die Witterung auf den Sohen erlaubt. Das Reft febt an ftillen Orten, unter Felfenftuden in Bertiefungen oder Spalten des Gefteins, unter Alpenrofen, Saidefraut zc. Es befindet fich funstlos in einer Bertiefung aus wenigen unordentlich bingelegten durren Blattern und Salmen. Deift erft im Juni findet man darin 12-15 Gier, auch noch druber. Der Form nach gleichen fie den Edelfafaneneiern. Die Schale ift feft, hat viele fichtbare Poren, ift aber Dabei febr glatt und glangend. Die Grundfarbe fehr blaß rofigelb, mit ungahligen dunkelrofigelben oder blagroftfarbigen Bunftchen und fleinen Fleden beffreut, doch nicht fo dicht, daß fie Die Grund= farbe verdunkelten. Das Beibchen brutet fie allein binnen 3 Bochen aus und Die Jungen, faum getrodnet oft mit noch antlebender Schale, begleiten ichon ihre Mutter. Die Mutter liebt fie febr und giebt bei drobenden Gefahren ihnen fogleich ein Zeichen, worauf fie fich verfriechen und nicht cher hervorkommen, bis fie Diefelben wieder ruft. Rach einiger Zeit findet fich auch ber Bater wieder bei der Familie ein, und be= gleitet fie von nun an, bis jum folgenden Fruh= jahre unausgefest.

Zu ihren besiederten Feinden gehören der Huhnerhabicht und der Laubenfalke, zu den beshaarten der Fuchs, Luchs, Kagen und Marders. Arten. In ihren Eingeweiden wohnen Wurmer.

Man erlegt fie mit Flinten, unterftugt durch einen guten bund. Bo es viele giebt, fangt man fie im Treibzeuge, Schlingen, Laufdohnen; ihres vortrefflichen Wildprets megen. Die Be= wohner von Unteritalien und Griechenland treis ben farten Sandel damit; auch mit den Giern derfelben, die außerordentlich wohlschmedend find. Auf den Infeln des Archipels halt man fie ale Sausgeflugel, und arme Leute laffen tampfende Steinhuhner in den Stadten fudlis der Lander fur Geld feben. In marmen Lanbern vertilgen fie viele Infetten, befonders Deufdreden. - Auf der Infel Raufio fol= len fie bes Schadens megen, ben fie am Ges traide anrichten, fur eine Landplage gehalten merden.

Das Roth=Felduhn. (Perdix rubra. Briss. Tetrao rufus. Linn.)

Die Wangen, Reble und Dbergurgel weiß, von einem fcmargen Bande eingefaßt, bas fich auf feiner Außenfeite am Ropfe in fleine ftrei. fenartig gestellte Fledchen febr weit ausbreitet. Es ift 131 Boll lang und 25 Boll breit. Der Schnabel gang wie beim gemeinen Rebhuhn gefaltet, fehr icon hodroth gefarbt. Das Muge hat eine hochgelbrothbraune Gris; das Augen: lied nebft einer gang fleinen Stelle por und hinter dem Auge, ift fahl und hochroth. Das Mannden bat an der hintern Geite des Laufs ein wenig nach innen eine margenabnliche Ers babenheit, welche einen Gporn vorftellt. Die Farbe der Fuße ift ein icones Sochroth. Um Rinn und an der Burgel des Schnabels fieht ein fammetichwarzes Fledchen; ein weißer Streif fangt vor ber Stirn an, zieht fich uber bas Muge bin und lauft über ber Stirn in bas Afchblaue des Bordericheitels; die Bugel tief fcmart; Die Dberbruft hellafcblau; Die Unter: bruft, Der Bauch und die Unterschwanzdedfedern matt roftfarbig oder icon dunkelrofigelb. Die Seiten der Bruft oder Die Tragfedern haben auf hellaschblauem Grunde weiße, fcmarge und rofffarbige ober faftanienbraune Querbander, wie an einander gereihete Mondflede, mas fich febr artig ausnimmt. Der gange Ruden, Bur: gel und Schultern braunlich rothgrau. Gben fo fcone Farben und Zeichnungen wie bas oben befdriebene Mannden, haben auch bie alten Beibden, nur daß fie etwas fleiner find und bag ihnen der fpornartige Auswuchs fehlt.

Dieser Bogel wohnt in verschiedenen fudeuropalischen Landern, so wie in Affen und Afrika.
Er liebt nicht zu kahle Gbenen, die mit Gebusch
abwechseln, auch Beinberge. Uebrigens hat er viel mit unserm Feldrebhuhn gemein und wohnt mit demselben in einigen Landern nicht weit von einander. 1814 da unfre heerschaaren an die Loire zogen, hatten sie das Bergnügen oft in einem Tage beide Arten zu schießen.

Ge ift ein schoner Bogel, ber im Betragen viel Aehnlichkeit mit unserm grauen Rebhuhne bat. Seine Stimme klingt wie die Sylbe kartelik, fie lassen fie besonders im Fruhjahr horren, wenn die Mannchen um die Beibchen kampfen.

In ber Gefangenicaft find Alte gwar gu erhalten, merben aber nicht gabm und bauern

nicht lange. Auch find die Berfuche felbft in Franfreich fie in Fasanerien ausbruten zu lasfen und fie in halbwildem Buftande ju erhal= ten, miggludt. Ihre Rahrung besteht meift aus Infetten allen Rlaffen, auch vielerlei Camereien und Rornern, fleinen Gehausschneden. Baden fic auch wie vorige im Staub und Sand. Im Fruh= jahr trennen fich die Familien um fich zu paaren. Ihr Reft ift funftlos. Die Gier haben eine fefte Chale, find glangend, mit vielen Poren verfeben, ihre Grundfarbe ift ein lichtes Roftgelb, überall mit gabllofen Punkten und Gledchen von einem matten Roftbraun überfaet. 14-18 Stud in einem Refte, Die Das Beibden allein aus: brutet, ohne daß fich das Mannchen darum befummert, gerade wie bei der vorigen Urt. Denn erft wenn die Jungen halb ermachfen find, fin= Det fich das Mannden wieder bei der Familie ein.

Die Feinde haben sie mit den Borigen gemein, so auch Jagd und Fang. Ihr Bildpret, das weiß, zart und außerordentlich wohlschmeckend ist, wird sehr geschäft. Das Fleisch
wird gebraten auch auf andere Beise zugerichtet, oder in Pasteten gegessen, die sogar in den
handel, und bis Magdeburg, Berlin, Leipzig zc.
gelangen. In manchen Gegenden Frankreichs
werden sie jährlich zu vielen Lausenden erlegt,
auf Markten und in Städten werden sie in
großer Menge verfauft und in Paris zu vielen
Tausenden im herbst verspeist. Auch die wohlschmeckenden Gier werden als Leckerbissen genossen.

Das Felsenhuhn. (Perd. petrosa.)

bewohnt die felsigen Gebirge Spaniens, Majors ka, Sardinien, Sicilien. Häusig trifft man es in der Barbarei, auf Tenerissa und an den Ufern der Gambia, des Riegers und des Senegal an.

Stirn und ein Streif, der über die Augen bis in den Nacken lauft, so wie Backen und Rehle aschgrau; Scheitel, Nacken, hinterhale, Seiten des halfes und ein breites Band, welches die graue Rehle und den Borderhals einfaßt, lebhaft kastanienbraunroth, jede Feder des halsbandes hat an der Spige einen dreiedigen weißen Fleck. Oberleib rothlich, einige Deckfedern der Flügel haben in der Mitte einen hellgraublauen Fleck, und sind rostroth eingefaßt; Brust schmußigaschgrau, Bauch rostgelb, Aftergegend und Unterbauch braungelb; die breiten Seitensedern des Bauches an der Burzel blau-

grau, bann folgt eine fcmale fcmarge Quer: linie, bann ein roffgelber, barauf ein weißlicher, auf Diefen wieder ein breiterer fcmarger Streif, der untere Rand aber ift taffanienbraun, der Raum gwischen den beiden fcmargen Querftreis fen ift breiter als beim Steinhuhn. Schnabel und Juge roth, Dhrengegend rofffarb, Mugen: freis roth. Die Burgel Des Comanges grau, an der Spige roffroth; an der außern Sahne ein roftgelber Langefledt, Lange nur 10 Boll.

Diefer Bogel nahrt fich von Samereien und Infetten und lebt in Monogamie. Das Beibden legt 12-15 Gier in ein felbft gefcarrtes Loch mit wenig Unterlage, ein niedriges Ge: ffrauch in oben Gebirgegenden, ober an ben felfigen Ufern des Meeres. Die Gier find fcmugig weißgelb, mit fehr fleinen hellrofifarbenen Bledden, poros mit mattem Glang. Ihr Fleifc wird gefcagt. Man foiegt fie gewohnlich vor dem Sunde.

Machtel. (Coturnix.)

Schnabel an der Burgel nadt, bunn, oben conver, gegen das Ende gebogen; fein nadter Bled um Die Mugen, fein Sporn; Schmang furg, Flugel abgerundet.

Die Schlag=, gemeine Bachtel, Diccur - hic - Bogel.

(Cotur. dactylisonans. Mey.)

Ueber der Mitte des Scheitels, fo wie über jedem Auge ein gelbweißer Langeftreif, der ganze Ruden braun, mit mehreren Langereihen febr großer gelbweißer Schaftflede, und vielen ab: gebrochenen fcmargen und lichtbraunen Quer: bandern.

Die Große verschieden von 7-81 3011, Die Breite 14-151 3. Die Beibchen find meift etwas fleiner. Die ruhenden Flügel reichen bis auf die Mitte des fehr turgen Schwanzes. Die braune Farbe ift in ihrer Befleidung Die herr: fcende. Da die Bachtel zu befannt ift, und in Bauern gehalten mird, halten mir eine gang genaue Befdreibung überfluffig und fuhren nur an: daß die Rehlzeichnung der mannlichen Bach: teln im Fruhlingetleide am iconften ift. Dann treten die Rehlbander am deutlichsten bervor, Die Farben des Theiles, welchen Diefe um= foliegen, nur felten weiß, fondern immer mehr oder weniger mit Roftfarbe, mit Roftbraun ober

Raffanienbraun überlaufen, gefledt ober gang überzogen, im Berbft dagegen find die Rebl= bander ichmaler, weniger icon und oft nicht gefchloffen, die Reble felbft aber nur roffgelblich oder rofibraunlichweiß.

Das alte Beibden unterscheidet fich von feinem Mannden mit Ausnahme des buntlern Rudens, durch feine blaffern Farben und mate tern Zeichnungen leicht, Die Roble ift ftete nur rostgeiblichweiß; ber Ropf auch blaffer gefarbt; Die gange Bruft, der Bauch und After roftgelblichweiß, auch wohl rein weiß ungefledt. Die nie gang buntelroftbraune, faft fcmarge Rehle und Wangen haben, merden von Liebha= bern Mohrenwachteln genannt; einige halten diefe für einjährige, oder mahricheinlicher für fehr alte Mannchen. Un welchen die dunkeln Querbander der Reble auf Beiß oder Rofigelb fiehen, nennt man Kreuzwachteln. Beides find Mannden int hochzeitlichen Rleide. den Beibden noch ahnlicher febenden jungen Mannchen nennt man Gandwachteln. Die Mohrenwachteln vermandeln fich jedoch in der Gefangenschaft gewöhnlich in Kreuzwachteln.

Da fie nun in Große auch fehr variiren, hat man icon vor langer Zeit, die größte für eine ftandige tlimatifche Abweichung, Die Polen und andern öftlichen und nordöftlichen Landern ausschließlich angehoren follte, gehalten und fie die große oder polnische Bachtel (Coturnix major Briss.) genannt. Rach den Erfah: rungen Bechfteins und meines Freundes orn. Raumanns ist dies ungegründet, indem fie Diefelben in allen Uebergangen beobachtet haben. Undere haben dagegen 3 Abarten baraus gemacht. - Ueberdem giebt es noch andere Barietaten, als weiße, bunte zc.

Unfere Bachtel maufert theisweis zweimaf im Jahre. Im August ist die hauptmauser; die zweite Maufer fallt abmefend in marmen Lane bern, mahrscheinlich im Februar. Bon den Befangenen, Die mir bei une halten, mechfeln eini: ge im Januar, andere im Marg und Mai ibr Gefieder.

Die Bachtel ift fehr weit verbreitet in Guropa, Affen und Afrifa. Bur Buggeit wimmelt es von ihnen in allen fudlichern Ruftenlandern unfere Erdtheils, von Spanien, Frankreich, Italien ze. Bei uns ift Die Bachtel ein Bug: vogel, der in großer Menge über bas Meer fest, mobei, wenn midrige Binde eintreten, viele ihr Grab in den Bellen finden, und nicht felten fturgen fich bann gange Schaaren auf zus

fallig vorüber fegelnde Schiffe, um auszuruhen. In Acgopten und Sprien fommen fie zu vielen Laufenden an. Go behauptet man auch, bag, mas im 2. B. Mof. Cap. 10 v. 13 von Beufdre: den gefagt wird, Die Bugwachteln gewesen fenn follen. Bei ber Rudreife geht ce Diefen armen Bogeln nicht beffer, benn fie tommen oft fo er: mattet an, daß fie fich mit Banden greifen laffen und ju Taufenden gefangen merden. In fillen mondhellen Rachten beginnen fie ihre Reife und fammeln fic beim Begguge an ben Ruften bes mittellandifden Meeres, mo fie bann in Schaa: ren ihre große Reife beginnen. Gingelne giehen fcon im August, Der Sauptzug aber ift vom September bis Unfange October. Im Mai tom: men fie meift erft bei und an. Gie mablen gu ihrem Sommeraufenthalt am liebsten Die Gbe: nen, befonders die fruchtbaren, mo viel Baigen gebauet mird, neben Diefem Erbfen, Widen und Linfen, fpaterhin befuchen fie auch das Commer: getreide, vorzüglich Sirfe: und Buchwaizenader, mo fie bem Unblid ihrer Feinde entgehen. Bird auch bas eingeerndtet, fo fuchen fie Soug bei ben auf Schwaden liegenden Sommerfrüchten, namentlich Saferichmaden, worunter fie fich gern verbergen.

Sie fliegen ungern, felbft aufgejagt nie weit, auch nicht hoch. Das Auffliegen gefdieht fonur: rend, meift mit einigen angftlichen Lauten begleitet. Gie find furchtfam und laffen fich oft von hunden jagen, und von Menfchen mit ber Sand fangen. - Am Tage halt fich Die Bach: tel meift ruhig. Die beißen Mittageftunden benugen fie, um fich zu fonnen, im Sande zu ba: ben und ju fchlafen, mas man auch bei ben Gefangenen beobachten fann. Bei der Abende und Morgendammerung und felbft in der Racht find fie am lebhafteften. Die Mannchen ftreifen Dann umher und fampfen mit einander und fu: den ein anderes Beibchen auf. Die Familien halten fich nicht innig gufammen und das Mann:

den lebt meift einfam. Die Bachtelhahne find fehr freitsuchtig und bigige Rampfer. Dies benugte man fcon in urals ten Beiten, indem man gegahmte Bachtelmann: den mit einander fampfen ließ, mas jegt auch noch gur Beluftigung in fudeuropaifchen gandern ju geschehen pflegt. Sie fampfen meiftene bloß mit dem Schnabel. Mit einem Beibchen lebt Das Mannchen verträglich, wenn es gleich mit ibm eingefangent mar, fonft todtet es baffelbe mit

Schnabelhieben.

Aufer bem befannten Bachtelfdlag, baben fie noch verschiedene Zone, Die man meift nur in der Rabe bort. Der Locton beider Gefchlech: ter ift ein liebliches Bubimi, und ein wenig lauteres: Pridit ober Brubrub, brus brub; modurch fie fich gegenfeitig gur Begat= tung einladen. Ungufriedenheit, Merger und Furcht druden fie durch ein leifes: Truli= lil, trulil, und durch ein fdmaches: Gurr, gurr, gurr, dem Conurren einer Rage nicht unahnlich, aus. Im Schred beim Muffliegen: Trulred, red, red, in der hoch: ften Angft: piep, piep wie ein Ruchelden. Der eigenthumliche Gefang ober Paarungeruf Des Mannchens ift der fogenannte Bachtelfclag, nur Diefem Bogel eigen; und ob man ihn ei= gentlich nicht angenehm nennen fann, fo liebt man ihn doch, feiner Conderbarkeit megen. Im Fruhjahr, wenn die Ganger des Lages fdmei: gen, hat er in einer fillen mondhellen Racht ei= nen gang eigenen Reig. Er befieht aus 2 Theilen, einem furgen Borfpiel und dem Saupttheil; ersteres klingt rauh und heifer: Rauau, der legtere hellgellend und weittonend: Pidmer= mid, ober Dudwermud. Das Pidwermid ruft bas Mannchen 5 bis 10 Mal mit aller Unftrengung, man bort es bei ftillem Better & Stunde weit. Das Beibden antwortet Darauf gleichzeitig: brubrub, brubrub. - Cobald Die Bachteln im Fruhjahr antommen, ertont auch ihr Sollag. Fruh und Abende felbft Die Racht bindurd. Im Mai und Juni folagen fie am fleißigften. Im August unterbricht ihn bas Aberndten des Getreibes. Der Bachtelichlag hat für den Landmann, megen der nahen Aussicht gur Erndte, etwas Erfreuliches und gur Ermun: terung ber Faulen , Deutet er Die Tone: Bude Did! Bud den Rud! in fatholifden Landern: Maria, bitte fur uns, bitte fur uns Gin alter Soulmann Deutete feinen Schulern Daraus die Borte: Die eur hie! (Sage, mar: um du hier bift?) Man bemertt indeffen auch mande Abanderungen in ben Tonen, fo borte ein Kenner in einem Schlage deutlich das Wort Sonupftabad.

Alle Ctubenvogel wird fie gefcast, bald wird fie gahm. Gin Flügel muß ihr verfdnitten werben, benn fonft fliegt fie gegen Dede und Fenfter und ichlagt fich fo den Ropf ein. Gern fonnt fie fich, badet fich gern im Sande und wird mit bund und Rage gutraulich. Gie fucht auch in Ctuben, Fliegen, Bangen und Flohe auf. Um besten thut man indeffen fie nur vom Detober bis April, in der Stube herumlaufen gu laffen; fie dann aber in einen Bachtelbauer gu fteden, Diefer besteht aus einem Raften von Brettern, etwa 2 F. lang und 1 F. breit und eben fo hoch, mit einer Dede von Leinwand oder Tud, damit fie fich den Ropf nicht verlege; an den Seiten hat er ein paar langliche Locher, mo fie den Ropf durchfieden und in der Mitte noch ein Borhauschen von Sproffen, worin fie Sonne und frifche Luft genießen tann. In Diefem bun: feln Behalter ichlagen fie ju jeder Tageszeit, vom April bis gegen ben September. Bochentlich muß ihr ein paar Mal der Boden des Rafigs Did mit grobem Sande bestreuet, regelmaßig Futter und frifdes Baffer gereicht werden, mo: bei fie viele Jahre leben bleibt und fleißiger und

beffer ichlagen lernt.

Gie leben von tleinern Gamereien und In: fetten, freffen fast alle Getreidearten, am lieb: ften Baigen, dann hafer, banf, birfe, Mobn, auch Rapps und Rubfaat, Bachtelmaigen (Melampyrum arvense), Augentrost (Euphrasia Odontites) 2c. Infetten aller Urt, auch Larven berfelben, dabei verschluden fie viel Steinchen, gur Beforderung der Berdauung. Gern patteln fie wie die andern Suhnerarten im Sande und Staube, besonders um die Mittagezeit, wenn Die Gonne recht brennt; auch in der Gefangen: icaft muß man ihnen dazu Gelegenheit verschaffen. Ihr Sauptfutter fen Baize, wobei fie fich auch recht gut halten. Junge futtert man mit Amei: feneiern und gerhachtem gefottenem Gimeiß auf. Befigt man icon ein altes eingefangenes Beib: den, fo nimmt fich diefe der eingefangenen Jun: gen an, und vertritt Mutterftelle; nimmt fie unter die Flugel, erwarmt fie 2c.

Das Mannchen ift ein fehr geiler Bogel, ei: ferfüchtig und immer zum Rampf mit Geinesgleis den bereit. Daber behaupten einige: Dag die Bachteln in Polygamie leben, andere leugnen es. Die Erftern icheinen indeg Recht zu haben, und Ausnahmen mag es da nur geben, wo Man: gel an Weibden ift. Dbgleich Anfange Maifcon Der muntere Bachtelfchlag ertont; fo findet man Doch erft nach Johanni, ja oft erft Ende Juli ein Reft, woran ber Begattungetrieb mit fould gu fenn fcheint. - Man trifft es auf Erbfenadern auch im Baigen und findet in dem gang funft: Iofen Refte 8-14 nach Berhaltnig des Bogels, giemlich große Gier. Gie haben eine glatte Schale ohne Glang und find fehr bunt geflect. Die Grundfarbe ift ein lichtes braunliches Gelb, in's Dlivengelbe giebend; die Zeichenfarbe ein febr glangendes, gang bunteles Dlivenbraun, faft Schwarzbraun. Dies findet fich nun auf man: den Diefer Gier in fehr großen unregelmäßigen oder zadichten Fleden und in wenig Puntten; bei andern in vielen fleinen Gleden und gable lofen Punkten; bei noch andern find Flede und Puntte nur fparfam vertheilt. Gie variiren uns gemein in Beidnung, Form und Grofe. Die Farbe dringt nicht in Die Schale ein, erfcheint nur als ein lofer oberflachlicher Unftrich, Der fich mit beißem Baffer leicht und rein abma= fchen lagt, mas felbft icon Luft und Regen bei Den Schalen der ausgebruteten Gier bewirft. Das Weibchen brutet sie allein binnen 18-20 Tagen aus. Es brutet fo eifrig, bag es ofters Die Beute Der Genfe Des Mabers wird. Meift findet man in den icon ausgelaufenen Reffern, noch flare auch wohl faule Gier. - Die Jungen find anfänglich fehr flein, und fobald fie nur abgetrodnet, begleiten fie Die Mutter auf Die Beide, Die dann befonders Ameifenhaufen auf: fcarrt und fie ihr Futter fuchen lehrt. Die Mutter liebt Erbfen : und Bidenader fur ihre Brut, theile fich bafelbft mit ihnen beffer gu verbergen, theils der Infetten und Larven megen, die hier in großer Menge weilen. Gie madfen fonell, benn ichon in ber zweiten Bode ihres Lebens, lernen fie flattern und in 13 Monaten find fie vollig flugbar und vereins geln fich. Gie maden nur eine Brut.

Die Feinde baben fie mit den Rebhuhnern gemein. Die Bachtel gehort gur fleinen ober niedern Jagd. Man ichieft fie mit Bogeldunft por dem vorftebenden bunde. Gefangen mird fie leicht und zwar auf verschiedene Urt: mit dem Tirag oder in Stedgarnen. In einem Regbauer nach Urt der Schneehaube, morin ein Beibden in einem fleinen Behaltnif ges bracht, gestellt wird und wohin dann das Mann= den mit der Bachtelpfeife gelodt mird. Diefe Pfeifen kann man gleich kauflich erhalten auf Deffen, bei den Bildrufdrebern aus Rurn: berg. Mit der Bachtelpfeife, die gut ftimmend fenn muß, und Tirag verfeben, kann man leicht bie folagenden Mannchen fangen. In Naus manne Raturgefdichte der Bogel Deutschl. 6. Thl. 1833 p. 608 findet man dazu eine genaue Anweisung. (Auch Bechftein's gemeine Raturgeschichte III. G. 1418 20.) Benn ber leste Baigen gemaht wird, werden auch viele mit den Sanden gefangen, weil fie fich bei bros hender Gefahr unter Die umberliegenden Gars ben und Saufen fluchten, man giebt genau Acht,

wo fie unterfrochen, geht fonell babin und zieht fie behutsam hervor. In Italien und an den Geefuften fangt man fie in Menge unter dem Tirag, ober mit eigenen Bachtel = Dedines gen, und die ermatteten blog mit den Bans Den. In der Buggeit ift bort Alles mit Diesem Fange beschäftigt. Ihr Fleifd ift fehr mohl: fomedend und leicht verdaulich, im berbft febr fett. In den sudeuropaischen Landern ift Dies Wildpret im Berbft eine gemeine Marktwaare. Auf der Infel Capi, im Meerbufen von Reaz pel gebort Diefer Fang jum porguglichften Ginfommen bes bafigen Bifchoffs, ben man beshalb aud fpottmeife, den Bachtelbifcoff nennt. In der weftlichen Rufte von Reapel, in einem Umfange von 4-5 italienifden Meilen, merden bisweilen an einem Tage 100,000 gefan: gen (mo bas 100, etwa 8 Livres foffet) und nach Rom und andern Stadten verfchidt.

Diefer Fang fallt 2 Mal im Jahre im April und October in den Ruftenlandern. Reifende erzählen von ungeheuern Flugen von Bachteln, lange dem Ufer des arabifden Meerbufene, und aus 2 B. Mof. Rap. 16 v. 13 oder 4 B. Mof. Rap. 11 v. 31 ift befannt, welch' eine Bobl: that folde in die Bufte Arabiens verfchlagene Chaaren damals den dort herumirrenden Sf= raeliten maren. Im Berbft merden eine große Menge Bachteln von Franfreich nach England lebend in große Raften gefperrt, jum Schlach: ten und Berfpeisen geschickt. Man liebt fie als reinliche Stubenvogel die nebenbei auch Fliegen, Mangen und Alobe wegfangen. Man veranftaltete mit Wachtelmannchen öffentliche Rampf: fpiele und der meife Golon empfahl fie, als nachahmungemerthes Beifpiel fur Die Jugend. Auch bei den alten Romern ftanden fie in fo hoher Achtung, daß Raifer Auguftus ben aanptifden Statthalter Erotes am Leben ftra: fen ließ, weil er ein durch feine Giege beruhm: tes Bachtelmannden gefauft und verfpeift hatte. In Italien hat man noch jest, ale offentliche Schaufpiele, Bachtelfampfe. Auf langen Ta: feln mit erhöhtem Rande fieht an jedem Ende ein folder Rampfer und in der Mitte ffreut man als Bankapfel, einige Dirfetorner. Darum tampfen fie fich auf Leben und Tod. Gewöhn: lich läßt man es aber fo weit nicht fommen und bebt fie zu fernern Rampfen auf. Auch in China foll es als Boltsspiel noch üblich fenn und Betten babei angeftellt merben.

Die fleine Bachtel. (Cotur. nana.)

Lebt in Java und hat die Größe eines Sperlings. Der Oberleib, Brust und Seiten des Unterleibes dunkel und schiefergrau, an einigen Orten ins Rothlice spielend; von der Schnabelwurzel läuft gegen die Ohrengegend eine weiße Linie, welche sich umbiegend mit der der andern Seite zusammenstößt und so ein weißes Halsband bildet, das die schwarzliche Kehle einfaßt, wodurch ein dreiediger Rehlsteck gebildet wird. Mitte der Brust und Bauch einige Flede, auf den Decksedern der Flügel kastaniens braunroth.

Laufhuhn. (Hemipodius.)

Schnabel mittelmäßig, dunn, ziemlich lang, gerade zusammengedrückt, die Fürste erhaben, gegen das Ende leicht gebogen, gleicht im Gnnzen dem Schnabel der kleinen Taubenarten. Die Masenlöcher seitlich, bis zur Mitte des Schnabels gespalten, zum Theil durch einerkleine nachte Daut bedeckt. Die ziemlich langen Füße haben nur 3 3chen, nach vorn gekehrt, ganz getrennt. Der Schwanz unter den langen Burzelsedern verborgen; Flügel mittelmäßig.

Das kleine kampfende Laufhuhn. (Hemiop. pugnax. Temm.)

Die Gattung, zu welcher diese Art gehört, wird durch die kleinsten Bögel der Abiheilung der Sühner gebildet. Sie gränzen an die Wachteln, leben meist in trocknen Steppen und im Grase am Rande der Wüsten; laufen mehr als sie fliegen. Sie leben übrigens außer der Paarungszeit einsam, und in der Vielweiberei. Mähren sich von Insekten, selten genießen sie kleine Sämereien, sinden sich und in Neuholland. 2 Arten im südlichen Spanien.

Das Baterland unfers fampfenden Laufhuhns find die Sundinseln. Die Lange 5 3. 5 bis 6 Linien. Die Augengegend, Zügel, Backen und die Gegend hinter den Augen schwarz, weiß gesteckt; alle obern Theile sind dunkelbraun, an der Spige jeder Feder schwarze und rostfarbene Halbmondstede und kleine weiße Langsstecke. Die Flügel sind auf graubraunem Grunde schwarz und weiß gesteckt, und die Schwungsedern haben einen weißen Saum an ber außern Fahne. Go ift es bei jungen Mannden; bei Alten find Reble und Borderhals fon fcmart; Die Bruft ift in Die Quere weiß und fcmars geftreift; Die untern Theile lebhaft rofffarben. Schnabel grau: lid. - Das Beibden hat eine weiße Reble, deren Rander weiß und fcmarg punktirt find : Borberhale und Bruft fdmars und weißlich ge: ftreift; Die Mitte Des Bauches weißlich rofffar: ben ; Das Uebrige mie beim Mannden. Diefe find fo eiferfüchtig und gantifd, daß, wenn fic amei begegnen, fogleich ber Streit beginnt, und fo geben fie in ihrem Baterlande Untag gu Rampffpielen, ale Bolfebeluftigung, Die guerft in Affen und Indien ihren Urfprung genommen baben. In Indien und China merden Saus: babne, einige Bachtelarten und dies fleine Lauf: buhn dazu benugt. Die Liebhaberei ber Thier: fampfe geht nach Barrow bei einigen affatiz iden Bolfern fo weit, daß man 3. B. in Codins dina eine Art von Beufdreden mit einander gu fampfen abrichten foll. Der befdriebene Bogel ift in Java in Diefer Binficht fehr gefcast und es werden hohe Wetten, bis ju 100 Piafter und Darüber, auf den Gieger gefegt, und ein fo ffreitbarer Rampfer mit 20 Piafter bezahlt. Die Malaien nennen fie Buron Gama; felbft Die Beibden follen fich bekampfen.

Tinamus.)

Schnabel mittelmäßig oder lang, dunn, nie: drig, breiter als hoch; Spige abgerundet, stumpf; Grathe deutlich, sie bildet eine lange Nafengrube. Nasenlöcher seitlich, eiformig. Läufe lang, an der hintern Fläche oft rauh; Zohen furz, getrennt, die hinterzehe sehr kurz, hoch: stehend oder den Boden berührend, Nägel kurz, etwas platt. Der Schwanz sehlt oder ist verbor;

gen. Flugel furs.

Es sind amerikanische Bögel, die wie unfre wilden Suhner viele Feinde unter besiederten und behaarten Raubern, großen Reptilien, selbst unter Insekten haben; denn die zahllosen Saufen von Ameisen sind den Jungen dieser Bögel gefährlich. Sie seben in kleinen Familien, die aber nicht sehr zusammenhalten. Sie leben von Insekten und Früchten. Ihr Fleisch soll an Flügeln und Brust dem der Rebhühner gleichen, an den Schenkeln und am Bürzel unangenehm und bitter schmeden, was von dem Samen des Blumenrohres herkommen soll. Denn wenn sie

diesen nicht fressen, ist sammtliches Fleisch mohlichmedend. Die Früchte der wilden Kirschen, des Kaffeebaumes, der gemeinen Palme u. dgl. lefen sie als Nahrungsmittel von der Erde aus. Die Federn, besonders auf dem Ruden und Burzel, sind mit breiten, glatten und gewölbten Kielen versehen, welche unten tiefe Kinnen haben und nur lose in der Saut steden. Gegen das Ende der Federn werden die Kiele ploglich dunner. Bei einigen Arten kommen 2 Kiele aus einer Wurzel.

Der Korper Der Tinamus ift fart, feifchig, der Sals lang und dunne, der Kopf klein

und platt; Die Beine lang und dunne.

Die Arten find oft fower zu unterscheiden, da die Totalform des Korpers und felbst die Duftern Farben fie einander so ahnlich machen. Man theilt sie in 2 Gruppen. Die erste begreift die Linamus ohne, und die Linamus mit einem, aber verborgenen Schwanze.

Der fleine Tinamu. (Tinam. nanus. Temm.)

Lange bis zu Ende der langen Steißfedern 6 3., bei dem Beibchen nur 5 3., da diefe Federn fürzer find. Sein Baterland ist Paraguan und Brasilien. Die Guaranis nennen ihn Onambu carape. Man findet ihn felten, da er fehr verstedt im hohen Grase lebt.

Die Federn, welche den Burgel bededen und einen falfden Gowang bilden, find gabt reich, dicht über einander liegend; fie find mit langem Flaum befleidet, der vorgudt und nur Die Fasern an der Spige der Federn bangen Bufammen. Gie ragen weit über den Steif vor. Der Scheitel roftfarb, fdmarg gefledt; Die Mangen, Bruft, Bauch, Schenfel und Raden ifabellfarben, mit braunen Fleden; Rehle weißlich; Geiten Des Unterleibes und Dedfedern ber Flügel mit braunen, fcmargen und weißen Querbandern; auf Schultern, Mantel und Bur: gel hat jede Feder einen großen ichwarzen, fast vieredigen Bled, unten und oben mit einer schmalen weißlichen Querbinde, mehr ober me: niger gidgadartig gezeichnet, wodurch eine grau, fcmarg und weiße Mifdung Diefer Theile ent: feht; Fuge und untere Kinnlade gelb, obere Lade braun.

Die folgende Art hat einen ftarfern Schnabel ohne Rinne, etwas gebogen und niederges drudt, mit gegen die Basis stehenden Nasen:

löcern.

Der falbe Tinamu. (Tinam. rufescens. Temm. Rhynchotus fasciatus. Spix.)

Långe 15½3. Baterland des Borigen. Sals, Brust und Bauch hellrosstarden, der lette Theil mit etwas duntlern undeutlichen Querstreisen, der Unterleib und die Seiten graulich gewöllt mit falben und gelben Streisen; Kehle weiß; auf dem Schnabel siehen einige schwarze Långstlicke mit rossfardnem Saum; an der Ohrenzöffnung ein schwärzlicher Fleck; die obern Theile, Rücken, Flügel u. s. w. grau, schwach röthlich überlausen, und jeder am Ende mit einem schwarz und weißen Querstreif; die Schwungsfedern, der äußere Kand der Flügel und die Afterstügel rosstroth; desgleichen der Schnabel; Füße blaß rossbraun.

Diefer Bogel lebt auf fetten, mit hohem Grafe bewachsenen Wiesen, wo er fich schwer aufjagen lagt. In der Dammerung besucht er Setreidefelder und neugefaete Maispflanzungen, wo er die Maistorner auffucht. Seine Stimme, ein zitterndes Zischen, hort man weit.

Ihr Reft ift im Grafe verborgen. Man findet darin 6-7 fehr glanzende violette Gier. Die Lange eines Gies beträgt 27, der Durchsmesser 20 Linien. Die Jungen leben in Famislien, doch immer zerftreut. Ihr Fleisch ift wohlschmedend. Mit Bachtelhunden spurt man fie auf und schieft sie.

Tauben. (Columbae.)

Schnabel mittelmäßig, zusammengedrudt, Die Bafis der obern Schnabellade mit einer weichen Saut bededt, in welcher die Nasenlöcher liegen. Schnabelspige mehr oder weniger gebogen. Füße: 3 Zehen nach vorn, welche ganz

getheilt sind, eine Zehe nach hinten.

Die Tauben haben durch ihre leichte Zahmsbarkeit und durch ihre fanften Sitten sehr viel Achnlichkeit mit den hühnerartigen Bogeln. Ihre Nahrung besteht ausschließlich in Körnern und Früchten, welche im Kropfe aufgeweicht und aufgelodert werden, bevor fie in den Mazgen gelangen. Dieser ist, wie bei den hühnern, klein, sehr muskulös und stark. Die Jungen werden aus dem Kropfe ernährt. Die Irten, welche in der kältern Jone leben, sind Jugvözgel. Sie sind zahlreich über alle Erdsheise verzbreitet; die wärmern Gegenden besihen davon die meisten Arten. Ran kennt an 116 Arten.

Bei der eigentlichen Gattung Taube (Golumba) ist der Schnabel mittelmäßig, gerade, zusammengedrudt, gewöldt; Bass der obern Schnabellade mit einer weichen, mehr oder wes niger aufgeblasenen haut bedeckt. Nasenlöcher in der Mitte des Schnabels, als Längssvalte gebildet, welche die weiche haut durchdringt. Die Juße meist roth, mit 3 ganz freien Zehen nach vorn; die hinterzehe ist der mittlern Bors berzehe gleich, eingelenkt.

Die Lauben leben paarweife in frenger Monogamie. Die Gatten trennen fich nicht leicht. Gie maden wenigstens jahrlich 2 Bruten, die Gier find weiß, meift nur 2, welche die Gatten beiderseitig ausbruten und die Jungen, die blind und fehr unausgebildet hervor= tommen, gemeinschaftlich aus bem Rropfe groß futtern. Bei beiden Gatten erzeugt fich im Kropfe eine weißliche tafeartige Materie, welche den Jungen gur erften Rahrung Dient. . Beim Tauber dauert Diefe Absonderung langer als bei Der Taube, bei der fie beim wieder Gierlegen aufhort. Ginige haben Tederzierden am Sals und Ropf. Un Sale, Bruft und auf den Schule tern haben einige Arten metallifch glanzende Farben. Die Große variirt von der einer Bachtel bis gu ber eines Puters. Das Bruftbein ift fehr tief und doppelt ausgeschnitten. Der Rropf ift fehr weit und oft von Luft ausgedehnt; der untere Luftrohrentopf befigt nur einen Mustel, Die Gallenblafe fehlt. Das Fleifc der Tauben ift fomadhaft, gefund und allgemein gefchagt. Bei einigen Arten, Die fic von aromatifchen Fruchten nahren, bat es banach einen eigenen Gefdmad, wenn fie bagegen Beeren gewiffer Baume genießen, erhalt es einen unerträglich bittern Gefdmad.

Die Jungen der Rarunkestauben (Columba carunculata) in Afrika, 6 — 8 Junge an der Zahl, kommen fehr entwidelt aus dem Gie und konnen, wie die huhner, gleich felbst auf Rahrung ausgehen, die meist in Insekten besteht.

Man bat fe unter 3 Familien gebracht.

Columbi - Gallina Vaill.

Rabern fich durch ihre hohen Tarfen und die Reigung, in Truppen zu leben, mehr wie die andern Untergeschlechter, den gewöhnlichen Suhenervögeln, und suchen ihre Nahrung auf ber Erde; ohne fich auf Baumen aufzuhalten. Ihr Schnabel ift dunn und biegsam.

Die Kronentaube. (Columb. coronata. Linn.)

Die Lange von ber Schnabelfpige bis gum Ende Des Schwanzes 2 F. 3 3. 9 Linien; Die Blugel reichen nicht uber den langen Schwang binaus. Das Baterland ift Banda, Reu : Guinea und eine große Bahl ber Infeln, welche ben Ardipel der Molutten bilden. In Sava hat man fie baufig gezahmt, auch nach Solland ge: bracht, fie gewohnen fich aber fdmer an bas Rlima, erfordern viel Gorgfalt; Ralte ift ihnen todtlich. Die Sollander nennen fie Rronvo: gel. Auf dem Ropfe fieht ein Federbufd, der aus einer fehr großen Menge fehr dunner Fe-Dericafte beffeht, welche mit gerichliffenen Bart: Diefer Bufd, den ber fafern verfehen find. Bogel immer aufgerichtet tragt, fieht fehr nied: lich aus. Ropf, Federbufd, Sals und alle Theile find bleigrau; die fleinern und mittlern Dedfedern ber Flugel, fo wie des Dberrudens find alle fastanienbraun gefaumt, auch bie gro: Ben Dedfebern, aber Die Mitte Derfelben ift rein weiß, wodurch eine weiße Flugelbinde uber ben rubenden Flugeln fich bildet. Flügel und Comang bunfelbleigrau; Die Beine find mit rundlichen Schuppen bededt, die fich nicht bes rubren, Die dazwifden liegende Saut ift weiß: lich; die Behen an ihrer Burgel verbunden, und wie bei den andern Tauben, gefduppt.

Diese Taube gleicht übrigens, Schnabel und Füße ausgenommen, den holfos in Sudamerizta. Sie ist der Riese unter ihrer Gattung, denn sie erreicht fast die Größe eines Puterweibchens. Sie ruchset übrigens wie die Tauzben, legt nur 2 Eier; nahrt ihre Jungen aus dem Kropfe; baut auch ihr Rest auf Baume. Oft hort man von ihr einen dumpfen Ton, deraus der Brust zu kommen scheint, wie bei den Bauchrednern oder bei den Putern. In der Gefangenschaft erhalt sie Mais, den sie gern frist, auch Bohnen, Erbsen und ahnliche Dulssenfrüchte, auch mehlige Gräsersamen.

Die nicobarische Taube. (Columb. nicobarica. Linn.)

Auch nicobarifche buhnertaube genannt, ber folgenden an Große gleich, der
Schwanz ift fehr furz, die Flügel reichen bis zu
feinem Ende; die Salsfedern fomal, lang,
hangend und zerfchliffen, wie beim Saushahn.
Die Farbe foon dunkelgrun in Blau und Purpur

fdillernd, oder auch ins Rupferrothe; der Schwanz rein weiß; Die Schwungfedern ichwarz= . blau mit Goldschimmer, Die Gris nugbraun; ein nadter mattbrauner Fled um Die Augen, die Fuße blauschmarzlich. - Diefe icone Taube lebt am Tage auf der Erde. Machtrube halt fe auf Baumen. Leicht lagt fie fich gahmen, ift febr rubig und trage, pflangt fic auch in ihrer Deimath in der Gefangenschaft fort. In Guro: pa ift es damit noch nicht gelungen. Ihre Stim= me ift ein bumpfes Ruchsen. Gie laufen fonell, der Flug ift dagegen fcmer. Bie die Rebhuh= ner niften fie auf der Erde. Ihre Mahrung be fieht in allen Urten mehliger Sulfenfruchte. Baterland: Nicobar im Rorden von Sumatra und mehrere Infeln des weiten Moluttenarchipels.

Die 2te Familie enthalt die eigentlichen Lauben (Columba), deren Fuße furzer als bei den vorhergehenden sind, der Schnabel indessen eben so biegsam und dunn.

Die Ringeltaube, große Holztaube, (Columb. palumb. Linn.)

ift unter unfern einheimifden Arten Die großefte. Thre Lange ift 17 bis 173 3., Die Flugelbreite 31-321 3. Der Gonabel etwa 1 3. lang; bei Alten an der Burgelhalfte, mit der fark wulftigen Rafendedhaut, hochroth, Diefe aber fart weiß bestäubt, die Endhalfte allmalig aus dem Rothen ins hochgelbe, an der Spige ins Somefelgelbe übergebend; bei jungen Bogefn nur fomugig roth; ber innere Gonabel, Bunge und Rachen find gelblich. Bie bei ben andern Lauben liegen auch hier die fehr großen Augapfel in febr weiten Sohlen. Die Gris blag: ober fcmefelgelb. - Die furgen, fammigten, mei= den Fuge find an den Laufen, vom Ferfengelent vorn in einer Spige bis beinahe gur Balfte herab, befiedert, Die Schilder der Fuge blutroth; Die Rrallen fart, wenig gebogen. Die alte Ringeltaube ift im Fruhlingetleide ein fcbo: ner Bogel.

Sleich zu Anfang des Fruhlings find diese Tauben am schönsten. Der ganze Kopf und Oberhals des Mannchens ift schön mohnblau, an der Rehle am lichtesten; die Seiten des Hales und zum Theil der Naden haben schichtweise schuppenartige, fehr glanzende, glatte Federn, welche aus einem gesättigten Meergrun in Purpurfarbe schillern, unter welchen 3-4 Quereschickten von glanzend weißen Federn einen

weißen Salbmond bilden, mas man falfdlich einen Ring genannt bat. Der Dberruden und Der gange Dberflugel, bis auf feinen vorderften Theil, afcblaugrau, bier und ba mit etwas Dunflern Schaften; Unterruden, Burgel und obere Schwanzbedfebern icon mohnblau; ber Schwang ichieferichwarg mit einer großen bellen Die Fittichfedern fdieferfarbenen Querbinde. find fowars, bie nachften fleinen, mittlern und großen Flügeldedfedern, übereinander, in einem breiten Streif, ober einen großen Langefled nahe am Borderrande des Flugels bildend, weiß. Der Ropf hat ein fanftes, mit Blaugrau ge-Dampftes Purpurroth, mas fic auf der Dberbruft allmalig in das ben ganzen übrigen Unterkorper einnehmende mohnblaulice Beig verliert.

Die Weibchen find von den Mannoen wenig unterschieden. Im Lauf des Sommers bis im herbst erscheint das Federkleid abgetragen und unansehnlich in Vergleich des Fruhlingekleides.

Diese Taube bewohnt Aften und Europa. In unsern Gegenden ift fie ein Zugvogel, im sublichen Frankreich und Italien sollen fie gar nicht wandern. Nach der Brutzeit fieht man fie familienweise da, wo fie gute Nahrung finden. Im September aber rotten fich die Familien zussammen und verlassen unfre Gegenden zu 12 bis 100 Stud meist im October. Im herbst geht ihr Zug nach Westen, im Frühling nach Dien.

Ihr Aufenthalt find die Waldungen von allen Arten, am meisten lieben sie den Schwarzswald, weil sie hier ihre Lieblingsnahrung, den Sichtensamen, in Menge finden. In Auengezgenden, wo Aeder, Wiesen und Holzungen oft mit einander abwechseln, ist sie am häufigsten. In der Zugzeit sieht man sie meistens auf den Keldern, in deren Rahe Baume und Gebusche sind.

Sie ift rafd und fluchtig, flug und außerstichen. Auf der Erde geht fie. Gern mahlt fie febr hohe Baume, um von dort aus fich weit umzuseihen und Gefahren auszuweichen. Sie dehnt dabei schnell den hals aus und nahert sich ihr ein Gefahr drohender Gegenstand, so ergreift

ffe fogleich die Flucht.

Mit Tagesanbruch find fie ichon munter, und noch in der Dammerung lagt fich im Fruhjahr das Mannchen ichon horen, und ruchst auf feinem Lieblingsbaume, nicht weit von feinem Weibchen, oder beide Gatten pugen ihr Gefieder in den Strahlen der Morgensonne. Sie haben viel Geregeltes in ihrer Lebensordnung; fo fliez gen sie von 6-9 Uhr nach weit entlegenen Futzteplagen, nach den Salzleden, um 10 Uhr hort

man fle wieder auf ihren Baumen; um 11 Uhr geben fie gewohnlich gur Trante, von 12-3 Uhr Rachmittags ruben fie zc. Dies fegen fie meift fort, wenn nicht jufallige Storungen auf fie einwirfen. Ihre Stimme ift ein Dumpfes: Sub oder Dub, vom Beibchen bort man es feltener. Ge brudt bald Erffaunen oder Unwillen, bald vor der Begattung ein inniges Behagen aus. Der Paarungeruf des Mann= dens tlingt wie: Abub, tu tuba, auch abu, fu fuh. Bom April bis in August beleben fie Dadurch die Baldungen. - Die Jungen piepen, laffen fic leicht aufziehen und werden gahm. Alte Ringeltauben ferben gefangen, den hunger: tod, wenn man ihnen das Futter nicht einstopft und fie nach und nach baran gewohnt. - Radelholzsamen lieben fie vorzüglich, dann die Samen verfciedener Grasarten, womit fie auch meift die Jungen auffuttern; bann Getreide= arten, Maigen, Linfen, Biden, Erbfen zc. Sm Juli und August Beidelbeeren, in Laubwaldern Gigeln und Budadern. Bur Berdauung verfoluden fie fleine Steinden. Un den Trantplagen baden fie fich auch oftere. Gie niffen auf Baumen, mo fie das Neft in einer Sobe von 10 bis 100 Jug anlegen. Sie fangen oft meh= rere Reffer an, ehe fie eins vollenden, mogut fie die geringfte Storung veranlagt. Beide Gatten tragen Materialien herbei, doch ift das Beiboen ber Baumeifter. Gie bauen folecht, fo daß man von unten die Gier liegen feben fann. Die Gier haben eine dunne Schale, deut= liche Poren und wenig Glang. Beim Bruten nehmen fie Die Gier unter Die Bauchfedern, mas bei dem folecten Refibau ihnen fehr zu Stat= ten fommt, fo daß fie doch bei ihrer großen Brutmarme, von beiden Gatten, foon in 17 bis 19 Lagen ausgebrutet werden. Bis gegen den Iten Tag find die Jungen blind. - Im April findet man die erfte, und im Juni meift Die zweite Brut. Leicht verlaffen fie bei gering: ffer Storung das Deft, ja nimmt man nur ein Junges, fo verlaffen fie bas andere. Falten und Sabicte verfolgen fie, auch der Uhu, Die Baummarder und die Ragen. Die Taubenlaus wohnt in ihrem Gefieder. Gie find fcmer gu fciegen, nur aus einem Sinterhalt an ihren Lieblingsplagen, auch mit Golingen bei den Salzleden und Tranfplagen. Ihr Rleifd ift febr moblichmedend, bas ber Jungen ein Lederbiffen.

Dem Getreide und den Nadelanpflangungen thun fie ggroßen Schaden ba, wo fie fehr haufig find. Die kleine Holztaube, Hohltaube. (Columb. oenas. Linn.)

Mit mobnblauer Sauptfarbe, auch am Un: terruden, Burgel und ben untern Flugelbedfe= bern. Diefe Taube ift mit ber folgenden febr oft verwechselt worden, wozu allerdings ihre Mehnlichkeiten viel beigetragen haben. Gie ift indeffen folanter und unterfdeidet fich noch außer den oben angegebenen Rennzeichen burch den rothlichen und gelblichen Schnabel, dunkels braunen Augenstern und durch bie menigen, gar feine ordentliche Binde bilbenden fomargen Rlede auf bem Flugel. Ihre Lange ift 124 bis 131 3. Breite 261 bis 28 3. Inwendig ift der Schnabel gelb, Bunge und Rachen weißlich; Die Rafenhaut in Der Jugend rothlich, im Alter dunkelroth und immer, besonders hinterwarts, fart mit weißem Staube bededt. Die Fuge nicht groß, aber flammicht, die Laufe vorn vom Ger: fengelente, bald gur Salfte berab, befiedert. Schildtafeln und Schildchen blutroth.

Um alten Mannchen find Ropf und Sals mobnblau, der untere hinterhals und die bale: feite taubenhalfig, d. h. im Grunde dunkelfchiefer= farben, mit einem farten blauen Metallglang, welcher ins Purpurroth ichillert, und diefe Federn in Reihen geschichtet und geglattet, wie polirtes Metall ericeinen lagt; Dberruden und Schultern afchblau; der Unterruden, Burgel und Dber= fowangfedern foon mohnblau; Diefe bunkler und jene fehr licht gefarbt. Die Ropfgegend von der Gurgel bis auf die Dberbruft giert eine fcone, mit Grau gedampfte Burpurrothe (Bein: roth.) Der Schwang ift ichieferblau, über der Mitte mit einer etwas lichtern und am Ende mit einer fehr breiten fchieferschwarzen Binde, die über einen Boll breite Endbinde mattichmarz. Das Beiboen ift meift kleiner und bie Farbe matter. Im Frubling find die Farben am icon: ften. Die Maufer fangt ichon im August an und geht fo langfam von Statten, daß fie Dies felbe erft in ihrer Abmefenheit vollenden.

Diese Taube ift fast über ganz Europa versbreitet, ben hohen Norden ausgenommen. Sie ift ein Zugvogel, kommt früher an als die Rinzgeltaube, und zieht auch später weg. Sie kommen in kleinen Gesellschaften an, im herbst aber schlagen sie sich in heerden zusammen. Ihre Reise machen sie am Tage, meist sehr hoch durch die Luft, im herbst nach Abend, im Frühziahr gegen Morgen zu. Sie bewohnt die Walsder der Ebenen und die gebirgigen Gegenden,

nie Felfen und fahle Berge. Felbholzer, die mit Aedern und Wiesen abwechseln, liebt fie vorzügz lich, befonders wo alte Baume mit Lockern fich befinden. Ihre Schlafstelle halten fie meift in Baumhohlen. Nach Sonnenuntergang begeben fie fich an die Schlafstellen, mit Anbruch der Morgendammerung find fie aber wieder wach.

Die Solztaube ift ein fehr fluchtiger, ges wandter Bogel. Much fie hat ihre Lieblingeplas den, mas meift burre Bipfelafte find, mo fte besonders fruh figend ihr Gefieder in Dronung bringt. - Gie follen fich mit den Feldtauben, mit denen fie auch viel Mehnliches haben, begatten. Much in ihrer Lebensart findet man viel Regelmäßiges, wie bei der Ringeltaube. - Ihre Stimme ift ein fehr gedampftes: Sub, mas Unwillen und Erftaunen anzudeuten icheint. Bor ber Begattung lagt fie auch ein Ruchsen: boren. Es flingt wie: Suhtu oder Surtub. - Sie laffen fich ziemlich leicht gahmen und jung aufgezogen gum Mus : und Ginfliegen gewohnen, fich auch mit Feldtauben paaren und erzeugen mit Diefen Baffarde. - Gie nahren fich von Getreide und ben Samen folder Pflanzen, die auf Medern und in Feldern machfen, auch aller= lei Baumfamen, Gicheln und Buchen; felbft Den Samen der Bolfsmild, Beidelbeeten u. f. m. Erdfalz und Salzleden fuchen fie auf, per= foluden auch fleine Steinden und fliegen, um ben Durft gu fillen, an frei liegende Stellen.

Den Ramen Sohltaube führt fie davon, daß fie nur in Baumhohlen niftet, mobei fie dann oft wenig Bahl haben, da fie ju jeder Brut eine andere nehmen, wobei nicht felten Streit entfieht. Die Baumart, die fie mablen. ift verschieden, Laub : auch Radelholz. Gie ba= ben wenig Materialien dazu, die einen gang funftlofen zusammengelegten Klumpen bilben; Reiferden, Burgelden und allerlei Pflangenftengel find die Materialien. Ihre 2 weißen Gier gleichen bem ber Feldtaube, find dunn mit deutlichen Poren verfeben, aus denen die Jungen binnen 17-18 Tagen ausschlupfen. Der Lauber brutet von 9 oder 10 bis 3 oder 4Uhr Radmittage, bulft auch die Jungen mit auffuttern, mas taglich gewohnlich 2 Mal, Bormittags und dann gegen Abend, gefdieht. Deift in der 4ten Doche, vom Ausschlupfen an, fole gen fie den Alten aufs Feld. In wenig Tagen fuden fe ihr Futter felbft, und Die Alten fcbreis ten gur zweiten Brut. Die jungen Barchen vom vorigen Jahre machen nur 2, Alte aber in ber Regel 3 Bruten. Das Reft, wenn fie auch geftort werden, verlaffen fie fo leicht nicht, ja mit Behutsamteit genahert, kann man fie dars auf greifen. Die alten Sohlen besuchen fie meist das kunftige Jahr wieder, wenn fie gleich zu jeder Brut eine neue Sohle beziehen. — Feinde haben fie mit der vorigen Art gemein.

Es sind scheue Bogel und schwer zu schiegen. Wer ihr Auchsen tauschend nachahmen tann, kann auch sie dadurch, wie die Ringels taube, leichter erlegen. Sie gehören wie die vorige zur niedern Jagd. In Schlingen, an den Tranken angebracht, auch mit Leimruthen lassen sie sich fangen. Wo es viel giebt, legt man auch eigene Taubenheerden an (Naum. Naturg. d. Bogel Deutschl. 6. Thl. p. 231). Ihr Fleisch ist wohlschmedend, das der Jungen giebt einen Lederbissen. Manhat deswegen auch eigene Taubengehege angelegt. (Siehe Naum. am anges. Orte.) Wo es viele giebt, thun ste den Aderbessern und den holzsaaten Schaden.

Die Feld=, Felsentaube, Feldfluchter. (Columb. livia. Briss.)

Mit mohnblauer hauptfarbe, weißem Unsterruden und untern Flügeldedfedern; auf dem Oberflügel ein doppeltes schwarzes Querband. Diese Kennzeichen unterscheiden sie hinlanglich von den schon beschriebenen Arten. Sie ist die bekannte Taube, die in Deutschand allenthalben unter dem Namen Feldfluchter so bekannt ist und deshalb einer genauen Beschreibung nicht bedarf. Die Lange ist 13-13½, Flügelbreite 25-273. Der schwarze Schnabel in der Mitte zusammengeschnurt, die Spige daher kolbig; die Iris brennend gelbroth, bei den Jungen rothgrau. Mannchen und Weibchen im Neusgern wenig von einander unterschieden.

Die Gewohnheit, gezahmte Tauben in Saufern, Stallen und Taubenschlägen zu untershalten, ift sehr alt. Die Spielarten und Aussartungen der Saustauben führt Bechstein in seiner Naturg. Deutschl. neue Ausgabe III. S. 1773 an. Weiter unten werden wir davon einis

ges anführen.

In einem natürlichen wilden Justande bewohnt die Feldtaube mehrere Theile des fud,
lichen Guropas in Menge, vorzüglich in felfigen Rüsten des mittellandischen Meeres. Halb verwildert sehen wir in der Mitte von Deutschland unsern bekannten Feldslückter in einem weniger beschränkten Justande als in Taubenhäusern und Taubenschlägen, bloß auf hohen Thurmen,

Rirden, Goloffern und hohen Ruinen, bod nur in ber Rabe menfchlicher Wohnungen. In ihrem freien Buftanbe find es Bugvogel, Die den Binter unter einem warmern himmeleffriche zubringen. Die bei uns auf Thurmen und Schlöffern leben, fdeinen Diefen Trieb zu mandern gang abgelegt zu haben. Auf Gardinien wird fie in Spalten und Sohlen der Felfen in unglaublicher Anzahl angetroffen, ohne ein eigentlicher Gebirgevogel zu fenn. Große Gruppen hober Felfen von angebaueten Landereien Durchschnitten, icheinen ihnen am meiften gugufagen, daber auch: Felfentaube. Gie leben gern auf hohen Orten und lieben eine freie und weite Aussicht, um auf das Feld gu feben, was auch die gahmen Feldtauben gu thun pfles gen. Man hat ihnen deshalb bequeme Taus benhaufer, Laubenfote u. f. w. eingerichtet, mas man in ofonomifden Schriften und in einigen Buchern über Taubengucht, auch in Bedif. Raturg. III. a. a. D. findet.

Sie ift ein aufferst flüchtiger und schneller Bogel, liebt Reinlichfeit und ift fehr verträglich gegen andere Bogel. Sie lieben die Gefellichaft

und halten fich gern gufammen.

Das Ruchsen (Murren) hat einige Aehnlich: feit mit der Sohltaube. Mit einem eigenen possischen Unstande wirbt das Mannchen um fein Weibchen, wie man das bei unsern Saustauben fast taglich sehen kann.

Ihre Nahrung besteht aus allen Arten bes
reifen Getreides. Besonders lieben sie Lein,
Rapps, Rubsamen, Linsen, Widen, Ruchern,
Erbsen, Sirse, Baizen, Gerste zc. Sie fliegen
danach aus, gesellschaftlich, zu allen Jahreszeizten. Den Samen mehrerer Unfrauter, der
Wolfsmildart fressen sie auch gern. Berschlingen Gickeln, Radelholzsamen, Wachholder: und
Deidelbeeren. Sie trinken viel, am liebsten reines Wasser, baden sich auch darin, selbst auch
im Staube, wie die Duhner.

Sie nisten in den Spalten und Sohlungen schroffer Felsen, besonders unter Ueberhangen oder in Grotten, mehrere Paar beisammen. Nachdem die Begattung vollzogen ist, beginnt der Bau. Das Mannchen treibt das Weibchen dahin, bringt Material, und sie macht das funstlose Rest. In der Regel legen sie 2 weiße Eier. Nachdem das erste gelegt, erfolgt das 2te den dritten Tag. Das Mannchen hülft dem Weibchen beim Ausbruten und in 16—18 Tagen kommen die Jungen aus. Des Nachts sist der Tauber am Rande oder in der Rabe des

Mestes, um sie zu schüßen. Sie lieben sich und bleiben zeitlebens mit einander verbunden. Die Jungen sehen häßlich aus, gegen den Ien Tag lernen sie erst sehen. In 4 Wochen (vom Entschlüpfen aus dem Ei) verlassen die Jungen das Rest. Anfänglich werden auch diese mit dem quarkartigen weichen Futterbrei, der sich in dem Kropfe der Alten bildet, gefüttert, dann mit erweichten Sämereien. Jur 2ten Brut machen sie wieder ein neues Rest, und nehmen nachher wohl das alte wieder, legen neue Materialien darauf, weshalb es gut ist, die Nester zu reinizgen, weil sie Reinigkeit lieben. Die wilden Lauben sollen nur jährlich 2 Bruten machen,

Die gahmen bagegen 4 und mehrere. Bu ihren Feinden gehoren mehrere Raub: vogel. Bei Erblidung berfelben, ober ben Bar: nungeruf der Rraben, begeben fie fich fogleich auf die Flucht, und verfolgt fiurgen fie fich oft Durch ein Fenffer, dem Rauber gu entgehen. Unter ben Gaugethieren verfolgen fie und ihre Brut: Marder, Ragen, Ratten und Maufe. Benn der Sausmarder auf den Solag tommt, mordet er, mas nur flattert, und bie ubrig gebliebenen Lauben verlaffen ben Schlag. Comarogerinsetten im Gefieder und Gingewei: Dewurmer plagen auch diefe armen Thiere. Auch eine eigene Art Flohe plagt fie nebft Bettman: gen, auch Specktafer und Mastafer finden fic ein, welche die Jungen annagen. Unter ben Rrantheiten find die Poden die gefährlichften, Die Anfangs des Sommers graffiren und viele Junge hinwegraffen. Auch die Ralte tobtet viele, wenn fie nicht warm figen und gut ab: gewartet werden. - Die wilden werden geichoffen in Italien, auch gefangen. - Gie nugen Durch ihr Fleifd. Ihre Extremente gemahren nach Befcaffenheit des Bodens und der Fruchte, einen guten Dunger, auch zieht man aus Taubenmift eine Lauge, Die man gum Ginmachen Des Semmelteiges nimmt, um dadurch ein recht loderes und angenehm fcmedendes Gebad gu erhalten. - Gie helfen auch viele Unfrauter, Deren Samen fie freffen, vermindern.

Schaben thun sie dem Aderbau, wenn ganze Schmarme auf den Ader fallen, besonders zur Saatzeit. Ruiniren Ziegel= und Strohdacher, indem sie darauf herumlaufen und piden. Man muß also die zu große Anzahl vermindern laffen. Denn sie zur Saat= und Erndtezeit einz zusperren, möchte in vieler hinsicht unthunzlich seyn.

Unmerk. Bon diefer follen unfere gahmen Lauben ber Schlage abstammen, wobei indeffen wohl auch Mifdung mit andern, Klima, Rate rung und Behandlung mit eingewirft haben mos gen. Die bemerkenswertheften Raffen find nach Temmings llebersicht folgende: a) die ges meine Saustaube (C. L. domestica), bunt mit weißem Burgel; b) Die fpanifche ober romische T. (C. L. hispanica), klaftert 17 3., übrigens von allen Farben, auch gehaubt, mit befiederten Jugen u. f. w.; c) die Eromo mellatfataube (C. L. Dasypus), mit befiederten Fugen, bis auf Die Beben; d) Die gehaubte E. (C. L. cristata), mit befiederten Beben und einer Federhaube; e) die normes gifche T. (C. L. norvegica), fcneeweiß, fonft auch gehaubt, an den Zehen befiedert; f) die I. der Barbarei (C. L. barbarica), um Die Augen mit nadten, gepuderten Fleischwarzen und doppeltem fcmargen Fled auf den Flugeln; gehaubt und ungehaubt; g) die Schleiere taube (C. L. cucullata), die Scheitelfedern aufgerichtet, nach vorn flehend, mit fehr furgem Schnabel; Die foonsten find fcmarg, mit weißem Ropf und Schwingen; h) G. L. hispida. mit fleinen aufrecht flebenden Federchen auf bem Ruden und Flugeln; lebt in Indien; i) die Mondstaube (C. L. turbita), mit furgem Sonabel, flachem Scheitel, ein Bufchel Der Brufifedern nach beiden Geiten aufwarts gerichtet; von der Große einer Turteltaube; k) Die Pfauentaube (C. L. laticauda), mit ausgebreitetem, vielfederigem Schwang, ben fie nach Belieben aufrichten fann, wie ber Pfau; fie bat oft 34 Federn im Schwange; 1) Die Purzeltaube (C. L. Gyratrix), audi Tummler genannt, eine der fleinften, übers folagt fich im Bluge in der Luft; fie erhebt fic unter allen am bochften, ihre Flugel find aber auch am langften; m) die Belmtaube (C. L. galeata), Ropf, Schwingen und Schwang von gleicher, aber boch anderer Farbe ale der Rorper; n) bie turtifche Taube (C. L. turcica), mit rother wargiger Bachehaut, die bis: weilen fo fart ift, daß fie den gelben Schna: bel und die Augen verftedt; in Perfien einheimifc; o) die Brieft aube (C. L. tabellaria), wenig von der vorigen verschieden, nur durch weißliche Bachshaut und nadte Augenlieder; man benugt fie gum Brieftransport; p) Die Rropftaube (C. L. gutturosa), blaft ben Rropf oft fo groß, ale den gangen Rorper, auf. - Die Reitertaube (C. L. Eques), ein

Baffard der beiden vorigen, mit aufgefriebenem Kropf und zugleich warziger Nasenhaut; q) die Schlagtaube (C. L. Percussor), fliegt in Kreisen, und schlägt dabei die Flügel laut flatzschend zusammen, so daß sie dieselben bisweisen zerbricht und nicht weiter fliegen kann; x) die Mahnentaube (C. L. Jubata), mit mahrnenartigen, aufgerichteten Nackenfedern.

Die Laubenzucht verliert fich ins tiefe Alter= thum, am alteften ift fie vielleicht im Morgen: lande. Im Tempel ju Jerufalem murden un: gablige Lauben geopfert, (Die fich Die Leviten wohlschmeden liegen). Gine eigene Rlaffe von Leuten trieb damit Sandel, befonders mit Turteltauben, welche Die Priefter befondere liebten. Gelbft im Borhofe bes Tempels, fanden ihre Taubenforbe. Um Delberge fah man ein Tau: benhaus, ber Taubenfels genannt, worin 5000 Stud gehalten murden. Auf Taubenzucht deutet auch icon Jefaias Rap. 60, 8. bin. Go trieben Die alten Griechen und Romer auch die Tauben: jucht. Der Taubenwarter (Pastor columbarius) mußte ben Schlag alle Monat einmal feb: ren, Die franken Tauben pflegen und beilen, Die fluggen absuchen zc. Man achtete Die Tauben fo febr, bag man ihnen erlaubte in die Tempel ju niften und ftrafbar mar der, melder fie florte ober gar tobtete.

Die Turtel = Taube. (Colum. turtur. Linn.)

Mule Comangfedern, die beiden mittelfen ausgenommen, haben jederfeite die 4 außerften eine weiße Spige; die braunlichen ober gelb: rothlichen Schulterfedern dunkelbraune oder fowarze Schaftflede. - In Deutschland ift es Die fleinfte milde Taubenart. Die in China, aber auch bei und in ben Stuben gehaltene Lachtaube (C. risoria) ist ihr fo nahe verwandt, daß fie mit Diefen fruchtbare Baftarde zeugt. Die Lange ift 113-124 3.; Die Flugelbreite 213-224 3. Der Schnabel ift 9 Linien lang, fcmars, an der Burgel und der weißbestäubten Rasendede roth: lich durchschimmernd. Bunge und Rachen fleifch= farbig. Die Rafenlocher bilden fleine Rigen. Die Augenlieder und ein Rreis um Diefelben unbefiedert, feinwarzig und blaß farmoifinroth, bei alten Mannchen am fconften; bei ihm ift auch das Auge Rothgelb oder Feuerfarben, bei Jungen ift der Augenstern braungrau; Die fleis nen Fuße haben blutrothe Schilder und Schild: den. - Im Fruhlingefleide ift bas Mannchen ein niedlicher Bogel. Um Genid bis auf den Maden hinab fehr iconfhellmobnblau; Die Zügel, bas Rinn und Die Sciten Des Ropfes fanft roth= lich grau; an ben Geiten bes Salfes fleben in einer hellmohnblauen Umgebung 3-4 Schichten fammetichwarger, an den Enden glangend filberweißer Federn, fo daß fie eben fo viel gefchlof: fene, mondformig aufwarts gebogene, abmeche felnd fdmarge und weiße Reihen bilden; am fconfien fieht dies, wenn fie ben Sals ausftre: den. Die Febern bes Dberrudens im Grunde afcgrau, fcmarglich gefledt, bies mird aber von den breiten rofibraungrauen Federkannten verdedt; Unterruden und Burgel tief afcblau; Reble, Gurgel, die Ropfgegend und die Dberbruft von einer iconen, fanften purpurrothlichen Beinfarbe, erffere am lichteften, der Kropf am iconften, und auf der Dberbruft fanft in Das Weiß der Unterbruft übergehend, mas bis zum Schwanze bin, Die lichtmohnblauen Tragfedern ausgenommen, den gangen Unterforper ein= nimmt; die großen Schwingfedern fcmarggrau. Das Weibchen ift fleiner, der fahle Augenfreis nicht fo foon roth und alle Farben matter. Um fconften find alle diefe Farben im Fruhling.

Die Maufer fangt bei den Alten im August an, geht wie bei den andern Lauben nur lange fam von Statten und fehren erft vollig gemau: fert gurud. Diefe Taube ift weit verbreitet: in Guropa, Affen und Afrifa. Auch in unfern Gegenden ift fie bekannt, ale ein weichlicher Bugvo= gel der fpat antommt und zeitig wieder weggieht. Im Mai fommen fie und im August fci= den fie fich wieder jum Abzug an. Gie gieben am Tage im Berbft in Gefellichaften; im Fruhighr meift einzeln. Es fceint auch nicht, bag fie wie andere Tauben das gange Jahr gepaart bleiben. - Als Waldvogel findet man fie nur in malbigen Gegenden, Die Buggeit macht eine Ausnahme; in Balbern an Fluffen und Stromen, befondere wenn fie mit Feldern und Diefen abmechfeln; fonst findet man fie in Laub = und Schwarzwaldern. Fichtenwalder ziehen fie por, weil fie den Saamen Diefes Radelholges gern freffen. Im Fruhjahr und gur Fortpflan: jungezeit fieht man fie mehr im Balde und überall an mit Baumen und Gebufch befegten Bachen und Graben; im berbft dagegen haufiger auf dem Felde und in freien Gegenden, Rahrung fucend. Rachtruh halten fie auf fart belaubten Baumen. - Geftalt und Farbe paßt zu der nied: lichen Geftalt fo, daß fie jeden dadurd einnimmt, und fie mar daber icon von Alters ber ein be= liebtes Bild der Sanftmuth, Liebe und Ge-

Sie fliegt ungemein schnell, leicht und gewandt und ist scheu und vorsichtig. — Ihr Ruf,
wird hier das Girren genannt, womit das
Månnchen das Weibchen herbeilockt und unterhålt, ist ein nicht unangenehmes, hohes, monotones Knurren und klingt wie: Turrturr
turrturr turrturr u. f. w. und dies wird,
je zwischen 2 und 2 Sylben mit einer ganz
kleinen Intervalle oft sehr lange in Einem Athem
fortgesest. Wahrscheinlich hat diese Taube den
lateinischen Namen Turtur davon erhalten.
Außerdem wird von gezähmten, aber nicht oft,
noch eine Stimme, dem Deulen anderer Tauben nicht unähnlich, vernommen, was eine Wetterveränderung andeuten soll.

Die Turteltaube ift leicht zu zahmen, und jung aufgezogen ein lieblicher Stubenvogel, der zahm und zutraulich wird. Leicht pflanzen fie sich hier mit ihres Gleichen und felbst mit Lachtauben fort. In der Stube verschneidet man ihnen Anfangs einen Flügel, sonst halten sie fic auch gut in einem großen Bogelbauer.

Ihre Lieblingenahrung im Freien beffeht , aus Gaamen ber Radelholzbaume. Außer Die: fen frift fie auch noch Getraide aller Urt, wie es icon bei vorigen angeführt, auch wie jene, Sandforner und gang fleine Schnedengehaufe, Desgleichen auch Galg. Klares Waffer ift ihnen Bedurfnig. Gewöhnlich in ber Mittageftunde und nach Connenuntergang trifft man fie an folden Trantplagen, mo fie fich auch oftere gu bas Den pflegen. Die Jungen laffen fich leicht mit eins gequellten Saamen von Radelholzarten, Biden, Linfen ac. fopfen, fo lange, bis fie felbft frefs fen lernen. Dann gewohnen fie fich auch an Brod und gefochte Kartoffeln, am besten be: tommt ihnen doch aber das Canarienvogelfut; ter, mogu man noch etwas Baigen und birfe

mengen kann.
Sie nisten in Balbern da wo sie reines klares Basser haben konnen. Nach der Begatztung mablen sie einen Ort zum Restbau, gern auf die Sipfelzweige einer jungen Siche legen sie das Nest an, auch wohl auf andre Baume doch stets so, daß man es nicht gut bemerken kann. Meist 10—20 Fuß über der Erde. Es ist ein kunstloses Gebilde aus kaum einer kleiznen handvoll übereinander gelegter seiner durzer Reiserchen, in der Mitte wenig vertieft und so dunn, daß man von unten die Gier liegen sehen kann. Beide Gatten tragen dazu Mates

rialien herbei, doch bauet es das Beibchen als lein. Im Mai legt bas Beibden binnen 3 Za: gen feine 2 fleinen furzovalen meißen Gier; Die von beiden Gatten binnen 16-17 Tagen ausgebrutet merden. Im Refte figen Die beiden, wie die Jungen ber Ringeltaube bicht neben einander, bas eine mit dem Ropfe nach ber entgegengesesten Geite, mo bas andere ben Schwang hat. Rachdem Die Jungen ausfliegen und felbft freffen fonnen, machen fie eine 2te Brut. Storungen beim Reftbau und felbft wenn fie fcon Gier gelegt, swingt fie Reft und Gier zu verlassen. Die Feinde bat fie mit den übrigen Baldtauben gemein. Man erlegt fie mit der Flinte und fangt fie auf Trantplagen mit Solingen und Leimruthen. Ihr Fleisch ift moble fcmedend, befondere das ber Jungen. Ihr Chabe in unfern Gegenden nicht von Bedeu tung. - In den muhamedanifden gandern" ficht Diefe Taubenart in hoher Achtung; nie: mand barf ihnen etwas thun. In ber Buggeit follen in Constantinopel febr viele anzutreffen fenn, und fie haben vollige Freiheit fich zu nah: ren, mo es ihnen beliebt. Man ffreuet ihnen Futter und fie fehren in Muhlen und Getraide: magazinen icaarenweise ein, und die Regierung bewilligt fogar auf Rechnung Diefer Bogel, jahr= lich gemiffe Procente an Getraide. Gie mer= den dadurch fo gabm, daß fie fich auf die Schiffe, ja auf die Schultern der Matrofen fegen.

Die Lachtaube. (Colum. risoria. Linn.)

Das Gefieder fehr hell ifabellfarben, an einigen Theilen fich bem gang Beifen, an an= bern dem Perlgrauem nabernd; Die Gowung: federn fdmarglich, falb gefaumt, Die Gomang= federn oben grau, am Ende weiß, die beiden mittlern ausgenommen; ein fcmarzes halsband auf dem Raden. Die Gris hoch orangenroth, Die Ruge rofenroth. Ihr urfprungliches Bater: land foll Ufrita fenn. Gine außerordentliche Bahmbarfeit und ein artiges Betragen macht fie zu einem angenehmen Stubenvogel, mas auch ihr Sauptnugen ift, benn bas Bleifch foll troden und nicht mohlfchmedend fenn. Beide Gatten find ungemein gartlich gegen einander, verlaffen fich nie und figen des Rachts dicht neben einander. Ihr Girren fpricht fic durch die Sylben: Rufurufu, fehr deutlich aus, Dabei bläßt der Tauber den Kropf auf und macht häu: fige Complimente, auch Die Laube ruchfet, aber

weniger stark. Ein ganz eigener Ton ist das fogenannte Lacen: huhuhuhu, was ihr auch den Namen gegeben hat. Es wird besonders ausgestoßen; wenn das Mannchen dem Beibechen seine Zartlichkeit bezeigen will, wobei es einige Springe thut. Sie sind öfters krank, dasher der Wahn: daß sie den Krankheitsstoff der Menschen anziehen sollen, nach welchem Glauben sie einige auch halten. Gern haben sie Warsme, weshalb sie auch an oder unter dem Ifen ihr Quartier erhalten. Sie lassen sich auch zum Ausstiegen gewöhnen; leben an 10 Jahre, sind reinlich und pugen sich oft. Sie fressen Baizen, Haideforn, Lein, Hirfe, hanf, Mohn, Kubzsamen und Brod.

In Afrika niften fie auf Baumen. In der Stude legt man ihnen dazu ein Stud Pelz, Tuch ober ein geflochtenes Nest dazu hin. Die 2 weiz fen Gier werden in 16 Tagen ausgebrütet. Gehr oft legen sie unbefruchtete Gier, und ob sie gleich 3mal bruten, bringen sie doch felten

mehr als 4 auf.

Die Porphyrtaube. (Colum. porphyrea. Temm.)

Die Lange 10 - 11 3. Das Baterland: Die Sundinseln und die Moluden. Ropf, Sals und Bruft lebhaft purpurroth, am Ropfe mehr rofenroth, an der Bruft und Unterhalfe mehr ladroth; unter bem Rothen ein breites weißes Saleband, unter Diefem ein fcmarglich grunes, Baud foon afdgrau; Unterbaud grun, in der Mitte hell; Die untern Dedfedern bes Coman: ges in der Mitte grun, dann gelb gefaumt; Mantel, Ruden, Flugel und Die zwei mittlern Somangfedern dunkelgrun, Die Geitenfedern Des Schmanges noch dunkeler grun, an Der Spige graugrunlich; Schnabelfpige gelblich, Behen roth. - Den Jungen fehlt Das weiße Daleband; an Dbertheilen find fie grun, auf dem Ruden find Die Federn gelb gerandet und der Unterleib ift hellgrun.

Die pråchtige Taube (Colum. magnifica. Temm.)

ift 15-16 3. lang. Baterland: Die Offfuste von Reuholland im Bezirf von Red Point, wo sie von den Beeren des Cabbagebaumes lebt und sehr weiches und fomachaftes Fleisch bat.

Der Ropf, Baden und Raden icon rein bellgrun, am Ropfe fast weiß; alle andern obern

Theile find glanzend grun; auf ben Dedfedern der Flügel fehr lebhafte gelbe Flede; die Schwungfedern grunviolet; so auch der Schwanz; an der Rehle beginnt erst schmal, dann immer breiter werdend, ein Streif, von purpurvioleteten Federn, welche unter gemissem Lichte ins Sapphirblaue spielen; diese Farben bededen den größten Theil der Brust und des Bauchedz die Seiten der Brust schön grun; Unterbauch, Schenkel und die untern Decksehen des Schwanzes dunkelgelb; die Unterdecksehen der Flügel goldgelb; der Schwanz unten graulich; Füßte blaulich; Iris und ein nachter Fled am Auge, roth.

Die Bandertaube. (Colum. migratoria.)

Lange 10 3. Flugelbreite 24 3. Der Ropf afcgrau ine Blauliche ziehend; Sinterhals grun, golden ichimmernd, Borderhals und Bruft weine rothlich, Geiten Des Salfes ins Purpurrothe foillernd; Unterleib meifrothlich überlaufen; hinterruden und Dedfedern des Comanges und der Flügel icon afdgrau blaulich, die beiden mittlern Somangfebern langer als bie übrigen und ichwart, der Schwant abgefluft, fo daß Die außerfte Somangfeder mohl 4.3. furger ift, ale die mittelften, Die außern Gomangfedern find an der innern Sahne meiß, an der au-Bern hellafdgrau; Fuge roth, weiß geringeft, Der Conabel blaulich, der Augenstern hochorans Die Augenbraunrander fleifcfarb, Somungfedern fdmarg, an der außern Fahne grau, roftfarben überlaufen. Das Beibden um 1 3. fleiner und die Farben meniger febhaft und glangend als am Mannchen.

Unmert. Diese Taube ift eine ber mertwür= digfren. - Sie bewohnt ausgedehnte Streden von Nordamerifa, dieffeite der Stonngebirge. Gehr haus fig ift fie an der gangen Sudsonsban, mo fie bis jum December bleibt, mo ber Schnee fallt. Sie nahrt fid bann noch von Wacholberbeeren. Eritt aber auch hier Mangel ein, fo mandern fie in fo ungeheuren Schaaren aus, daß es ans Unglaubliche grangt, wenn nicht viele taufend Menfchen bavon noch jährlich Beuge maren und biefe Buge ju ihrem Bortheil benuften. (Bilfon und Audubon ha= ben davon die neueften und juverläffigften Rach= richten gegeben. Und da es für Raturforfder fo wie für Richtnaturforfcher viel Mertwürdiges hat, fiehen wir auch nicht an, mehreres aus jenen Berichten mit= jutheilen.) Sie ichweifen bann burch bas gange Gebiet ber vereinigten Staaten, nach allen Simmelsgegenben bin, von Nahrungsmangel getrieben. Gie fonnen bie Ralte gut ertragen und ihre Wanderungen geschehen in allen Jahreszeiten und zuweilen bleiben fie Jahre lang an einem Orte, wenn fie nur hinlanglich Nahrung haben. Ihre große Flugfraft fest in Erftaunen. Man hat j. B. in der Nahe von Neu: Dorf Tau: ben gefchoffen, in deren Kröpfen man noch Reis fand, nun aber wachft ber Meis erft in Georgien und Ca: roling, und da fie diefes Futter in 12 Stunden voll: fommen verdauen, fo muffen fie binnen 6 Stunden 3 bis 400 englische Meilen oder über 100 Stunden geflogen fenn, mas auf die Minute ohngefahr 1 Stunde giebt. Go fonnten fie, wie die Schwalben, in ein paar Tagen in Europa fenn. Man hat auch wirklich im Jahre 1826 eine Wandertaube in Schott: Iand geschoffen. Bei biefer großen Flugfraft hat fie noch ein fehr icharfes Geficht, fo daß fie im ichnell= ften Fluge ihr Futter leicht entdeden fann. Heber table Landstriche fliegen die Tauben hoch und deh: nen ihre Reise so weit aus, baß sie einen weiten Landstrich übersehen können. Eine einzelne Taube ift bei ihrem fluge bem Auge mit Bligesichnelle entschwunden.

Audubon ergahlt, im Berbft 1831 habe er eine Meife vom Ufer des Dhio nach Louisville gemacht, auf diefer fen er in eine Steppe auf fo ungeheuere Rliige von Tauben gestoßen, die von Rordoft nach Gudweft flogen. Er jahlte in 21 Minuten 163 Buge. Je weiter er reifte, besto mehr traf er Tauben. Die Sonne wurde davon verdunkelt, und der Taubenmift fiel in folder Menge herab, daß man ihn mit Schnee: floden vergleichen konnte und das beständige Geräusch ber Flügelschläge wirkte fast einschläfernd. Ließ sich ein Sabicht bliden, fo formirten fie ploglich, gleich einem Strome dahinfahrend, eine fast folide Maffe, fich fämmtlich nach der Mitte drängend. Man fahe ne bann bald im Bidjad vor ben Falten flieben, bald dicht an der Erde mit Bligesschnelle hinfahren, bald fenkrecht in die Sohe steigen und oben Schlan: genlinien beschreiben. 3 Tage bauerte biefer Bug. -Unterdeffen ftand gleichfam die gange Bevölferung unter dem Gemehr, und ichof von allen Geiten auf Die porüberfliegenden Schwarme. Gine Woche lang af und fprach man von nichts, als von Tauben. Auch war die ganze Luft mit dem Geruche dieser Tauben angefüllt. - Mudubon berechnet Die Bahl ber in einem jener mächtigen Schwarme enthaltenen Bogel und die Quantität Futter, welche diese täglich vergehren. Er nimmt an, eine folche Colonne habe eine engl. Meile in ber Breite (Bilfon, ein treffli: der Ornithologe, bringt weit mehr heraus) und der Bug bauere 3 Stunden lang ununterbrochen mit ei=

ner Geschwindigkeit einer englischen Meile in der Minute fort, so gäbe dies ein Parallelogramm von 180 Meilen Länge und 1 Meile Breite, nur auf 4 Fuß 2 Tauben angenommen, kommen auf diesen Schwarm 1,115,136,000 Tauben, und da jede tägelich ½ Pinte Futter nimmt, so braucht ein solcher Jug täglich 557,568,000 Pfund Kutter.

Cobald die Tauben hinlänglich viel Futter er= bliden, fliegen fie im Rreise umber, wobei ihr Gefieder bald herrlich agurblau, bei einer plöglichen Schwenkung aber tief purpurroth schillert. Die hinterften Schwärme fliegen fortwährend auf und über ben andern meg. Go wird ein ungeheurer Maum in der Geschwindigkeit ausgefressen; wobei man fie zwar in ungeheurer Bahl tödtet, doch ohne alle mert: bare Berminderung. Nach gehaltener Mahlzeit ruhen fie auf Bäumen aus; allein gegen Abend ziehen fie abermals in Maffe nach dem Orte, wo fie übernach= ten, oft 100 Meilen weit, mas von Personen ausges mittelt worden, welche fie bei ihrer Anfunft und Ab= reise in und vor biesen Nachtquartieren regelmäßig beobachtet haben. - Einen folden nächtlichen Cams melplaß, nicht weit von den Ufern des grünen fluf= fes in Kentuty, besuchte Mudubon öftere. Die Tauben hatten ihn schon 14 Tage lang zum Nachtaufent: halt ermählt. Es mar etwa 2 Stunden vor Sonnenuntergang und man fah noch wenig Tauben; allein eine große Menschenmasse mit Pferden und Wagen, mit Gewehren und Munition, hatten an ben Grangen des Diffrifte mehrere Lager aufgeschla= Man hatte fogar eine heerde Schweine von 300 Stud mitgebracht, um fie mit Taubenfleifch gu maften. Sier fagen Leute mit Hupfen und Ginfalgen der Tauben beschäftigt. Der Mift lag ichon auf dem gangen Diffrift einige Boll hoch auf der Erde, die wie beschneit aussah. Bon der Laft diefer Tau= benmaffen maren Baume und 3meige gebrochen, als hatte dafelbft ein wuthender Sturmwind gehauft.

Mittlerweile machte sich jeder zur Jagd bereit, einige thaten Schwefel in eiserne Töpfe, oder versahen sich mit Kienfackeln; viele mit Stangen und die übrigen mit Schiefgewehren. Nach Sonnenuntergange hörte man ein Seräusch, einem scharfen Seewinde nicht unähnlich, und von allen Seiten erscholl es: "Sie kommen!" Alls sie über die Leute wegstogen, fühlte man eine deutliche Strömung der Luft. Die Leute mit den Stangen hatten bald Taussende niedergeschlagen. Die millionenweise ankommenden Tauben hingen wie zusammengeballte Massen an Baumästen, die krachend abbrachen und im Fallen Hunderte von tiefsischen Tauben tödteten. Das Ganze war ein Tumult und Berwirrung, niemand konnte sich den andern verständlich machen.

Selbft ber Rnall ber Gewehre wurde faum vernom: men. - Diemand magte, fich an ben Ort felbft gu gehen, wo die gräuliche Berwirrung fatt fand, felbft Die Schweine maren bei Beiten eingepfercht worben. Das Muffefen ber getöbteten verfparte man bis am Morgen. Nach Mitternacht bemerfte man erft die Abnahme der antommenden Schwärme. Bor Gin: tritt der Morgendammerung fingen die Tauben an nach einer gang andern Geite als nach ber, wo fie angefommen, abzugiehen. Die nächtlichen Raubthies re: Wölfe, Buchfe, Luchfe zc., die auch Theil an ber Beute genommen hatten, verbargen fich, mahrend Maubvögel aller Art, die Früchte diefer Nacht mit genoffen. Alle Unwefende aber beschäftigten fich nur mit bem Auflesen der todten und verwundeten Caus ben, bis jeder fo viel hatte, als er nur wollte. Dann wurden die Sunde und Schweine losgelaffen, um Die Nachlese zu halten. Audubon fannte in Pensyl= vanien einen Mann, der an einem Tage 500 Du= Bend, und manchmal 20 Dugend auf einem Buge fieng. -

Ihre Stimme gleicht fehr bem Ruchsen un: ferer Saustaube. Ihre Mahrung besteht aus Baumfruchten und mehligen Gaamen, am lieb: ffen Buchnuffe. Die Brutplage find eben fo wichtig fur Die Rachbarn, ale Die nachtlichen Rubeplage, und die Indianer betrachten fie als eine Quelle des Nationalreichthums. Diefe Plage Dehnen fich oft mehrere Meilen in Die Breite und bis 40 Meilen in die Lange. Sier niften Myriaden von Tauben beifammen, auf einem Baume 50 - 100 Refter. Ihre Refter find wie bei unfern wilden Lauben funftlos gemacht. Gie haben viele Feinde. Die Menfchen fom: men auch in großer Angahl mit Wagen aller Art. Gange Familien fiedeln fich dort gu Die= fer Beit ein, und junge Lauben machen ihre Roft aus. Um die Jungen zu erhalten, haut man den Baum um, der die meiften Refter hat, und richtet es fo ein, bas fie noch ein paar andere nahe ftebende erschuttern, oder mit nie: Derreißen, wenigstens Die Jungen aus dem Refte werfen. In den nordlichen Gegenden mablen fie aud Schwarzwalder zu Brutplagen. Gingefal= gen Dienen fie eine lange Zeit den Menfchen Die Dort wohnen, gur Rahrung. In Giden : und Buchwaldern thun fie großen Schaden, nugen Dafür aber auch durch ihr fehr faftiges Fleifch.

Die 3te und legte Familie (vinago. Cuv.) enthalt Tauben mit diceren Schnabeln von foz liberer Substanz, an den Seiten zusammenges druckt. Ihre Tarfen sind furz, die Füße breit und gut eingefaßt. Sie nahren sich sammtlich

von Früchten und leben in Sochwalbern, in der heißen Zone der alten Welt einheimisch.

Die Gewürztaube. (Colum. aromatica.)

Lange 91 3. Naterland Java, von den Bewohnern Bur on juane oder grune Laus be genannt. Sie lebt am Rande der Balber von den Früchten des Feigenbaumes (Ficus religiosa.)

Der Scheitel afchgrau, gegen ben Ruden zu graugrunlich; hals, Brust, Bauch, Schenkel und Unterleib schmußig grun; die kleinen Dedsfedern der Flügel, die Schultersedern, der Oberruden braun ins Purpurfarbne scheinend, die mittlern und großen Dedsedern dunkelgrun mit breiten schweselgelben Saumen und Spissen, die mittlern Schwungsedern ebenfalls gelb gesaumt, und die großen ganz schwarz, der Burzel und die mittlern Schwanzsedern, so wie die innere Fahne der übrigen olivengrun, die außere Fahne grau; der Schwanz unten schwarz an der Wurzel, grau an der Spise; Iris roth, desgleichen die Juße.

Fünfte Ordnung.

Stelzvögel. (Grallae. Linn.)

Sonft Ufer = oder Sumpfvogel genannt.

Ihre Lebensart und ber Bau ihrer Fuge gab Gelegenheit gu Diefer Benennung. Die nadten Unterschenkel, Die hohen Tarfen und felbft die langen balfe geftatten das Baden in Gumpfen und Waffer, um ihre Rahrung, Die meift aus Wasserbewohnern besteht, fich leicht zu verschaffen. Die mit farten Schna: beln verfebenen leben von Gifden und Repti= lien, die mit fowachen bagegen von Infeften und Burmern; nur wenige von ihnen begnu: gen fich mit Rornern und Pflangen und leben Dann vom Baffer entfernt. - Deift ift ber außere Finger an feiner Bafis durch eine furge Saut mit bem mittlern verbunden; bieweilen find 2 folder Saute vorhanden, biemeilen feb: fen fie aber auch ganglich, fo daß die Beben vollig frei find. In fehr einzelnen Fallen find fie ihrer Lange nach gefaumt, auch wohl vollige

Schwimmfuße; endlich fehlt auch noch mehrezen Geschlechtern ber Daumen, sammtlich Umpftande, die mehr oder minder auf ihr volltommenes Bafferleben Ginfluß haben. Fast alle, mit Ausnahme der Strauße und Casuare, haben lange Schwingen und fliegen gut. Im Fluge streden sie ihre Fuße nach hinten aus, wodurch sie von andern Bogeln, die sie an den Bauch anziehen, abweichen.

Man hat Diese Drdnung in 5 Sauptfami: lien und einige isolirte Geschlechter aufgestellt.

- Die erfte Familie enthalt:

Miesen vogel. (Brevipennes.)

Schnabel und Lebensart gefellt fle ben buh: nerartigen Bogeln bei; im Uebrigen gleichen fie indeffen den Stelglaufern, weichen aber in Sinfict der furgen Flugel von ihnen ab. Ihr Bruftbein bildet daber nur ein einfaches Schild, benn der vorftebende Ramm fehlt, ben man fonft beim Bruftbein aller andern Bogel bes merft. Ihre Bruftmusteln find auch fehr bunn; aber die hintern Extremitaten haben bafur an Rraft gewonnen. Die Unterfchenkelmuskeln find von ungeheurer Dide. Reiner Diefer Bogel hat einen Daumen. Durch die ungemein farfen und ausgebildeten Bedenknochen nabern fie fic Den Caugethieren. Un der Bruft fehlen Die Zwischenrippenfortfage, welche bei andern Bo: geln die Rippen mit einander verbinden. Auch der Gabelfnochen fehlt, der bei andern Bogeln gur Befestigung und Auseinanderhaltung Der Flugel Dient. Die Flugelfnochen find fehr furs und flein. Die Federn zeigen offenbar ben Uebergang von den Federn gu den Saaren, da fie durchaus zerschliffen und ihre Barte ohne allen Busammenhang find. Gie find folaff. hangend, weich, und haben bas Gigene, bag meift 2 Riele aus einer Burgel entftegen.

Sonabel mittelmäßig, flumpf, vorn abge: rundet, gerade, an der Spige platt, und diefe

mit einem fogenannten Ragel.

Der afrikanische Strauß. (Struthio camelus.)

Der Ropf und obere Theil des Salfes ift nact, nur mit wenigen dunnstehenden Flau: menfederchen oder Saaren besett; der untere Theil des Salfes, der Rucken, der Burgel, die Bruft und ber Bauch find mit fowarzen Bedern bedeckt, hin und wieder mit einigen weis fen oder grauen gemischt; die großen Federn des Schwanzes und die Schwungsedern schön weiß; die Füße rothgrau. Das Mannchen ist mehr schwarz, weiß gemischt; zur Begattungszeit ist die haut des halses und der Schenkel roth; das Weibchen ist allenthalben, wo das Mannchen schwarz ist, mehr braun, und nur an den Flügeln und am Schwanze sind schwarze Federn. Im ersten Jahre ist die Farbe der Jungen grau. Der Strauß erreicht eine hohe von 7-8 Zuß, und ein Gewicht von 80-90 Pfund.

Die Ohren unbedeckt, offen, die innere Deffnung mit haaren befest; die Augen groß, glanzend und lebhaft, das obere Augenlied bezweglich mit Wimpern versehen. Die Flügel klein, mit 2 Stacheln oder Sporen bemaffnet. Rur 2 Zehen mit einer haut verbunden. Die Zunge furz hufeisensormig. An der Brust eine ftarke, harte, rauhe Schwiele zum Ausliegen dies

nend. Gine Barnblafe.

Sein Baterland ift Afrita, wo er die odes ften und durreften Gegenden an den Granzen der Buften, und die weiten Sandebenen bewohnt. Nach dem Baffer ziehen fie oft in gro-

Ben Deerden.

Der Strauß ift nach den neuesten Beobach. tungen ein fluges Thier, bem man im offnen Felde fo leicht nicht ankommen fann. Sein Lauf ift foneller, ale der des schnellften Pfers des, doch von geringerer Ausdauer. Ungereigt thut er feinem etwas zu Leide; fonft vertheis bigt er fich aber mit bem Schnabel, bem Stas deln feiner Flugel und den Fugen. Furchtfant feit und Canftmuth find Sauptzuge feines Charaftere. Geine Schnelligfeit ift fo groß, dag wenn Menfchen auf ihm reiten, ihnen faft der Athem vergeht, denn er lagt fich leicht gabmen. - Geine Rahrung find Begetabilien; um feinen großen Magen aber auszufullen, verschlingt'er bolg, Steine, Glas, Metalle 2. Die nahrenden Gubffangen werden fonell ver-Daut. Cuvier fand im Magen eines frepirten Straufes faft 1 Pfund Steine, abgeriebene Stude Mungen, Rupfer und Gifen. Um lieb= ffen frag Diefer Gerfte, taglich 4 Pfund, 1 Pfund Brod und 10 Galatstauden. Die Straufe in Paris tranten täglich 4 Pinten Baffer im Coms mer, im Winter, wenn fie eingesperrt maren, mehr als 6. Der Strauß badet fich auch gern, macht fich febr naß und malt fic auf ber Erde. -

Gin Sahn hat mehrere Bennen, Dieje les gen ihre Gier in ein und baffelbe Reft, bas in einer Bertiefung besteht; und rund umber icarren fie mit den Sugen eine Art von Ball, gegen welchen fie Die Gier im außerften Rreife anle: gen, und jedes Gi fieht auf der Spige, Damit Die größtmöglichfte Bahl Plag habe. 10-12 Gier im Refte find, fangen fle an gu bruten und zwar abmechfelnd, indem am Tage Die Bennen fich einander ablofen, bei Racht aber brutet bas Mannchen allein, um Die Un: griffe ber Jatals und milden Ragen, Die nach Den Giern luftern, ju verjagen, ja fie mit feinen plumpen Fußen ju todten, benn oftere fand man am Refte erfchlagene. Babrend bee Brutens legen die Beibden immer fort, nicht blos bis das Reft voll ift, welches gewohnlich 30 Gier enthalt, fondern auch noch nachher. Diefe fpat gelegten liegen unordentlich um bas Reft ber= um und icheinen befondere bogu gu dienen, ben ausgebruteten Jungen, Die gleich fo groß als ein Saushuhn find, Die erfte Rahrung gu ge: ben, mogu fie von den Alten gertreten merden. - Corgfaltig fuchen Die Straufe ben Drt, mo fie das Reft haben, ju verbergen. Go laus fen fie gu benfelben nur in weiten Bogen. Die Beibden lofen fich im Bruten nicht un: mittelbar ab, bamit daffelbe weniger bemerft werde, oder fie medfeln fo fcnell, daß ber Spaber nie beide jugleich fieht. Um Tage ver: laffen fie bei farter Sige Das Reft gang, und überlaffen das Ausbruten der Conne. Cobald fie bemerken, bag bas Reft entbedt ift, gerfto: ren fie es fogleich felbft. Wenn baber Die Ufri: faner ein foldes Reft entdeden, fo nehmen fie nur Die umberliegenden Gier meg und vermi: foen mit einem Strauch die Fußtapfen, und fo ift ihnen ein foldes Reft eine reiche Bor: rathefammer, aus ber fie alle 2-3 Tage fo viel holen, als eine Saushaltung bedarf. Gin Ei wiegt an 3 Pfund und wird 24 Suhnereiern gleichgefcagt. Dier hungrige Perfonen haben an einem Gi genug. Gie halten fich lange frifd und werden oft nach der Rapfladt ges bracht, wo das Stud gu 1 Thafer verfauft wird. Die Mannden find fehr higig und be: gatten fich felbft in Menagerien, nach Urt Der Subner. In den Bintermonaten von Gud: afrita, Juli, Muguft und Geptember, findet man Die Straußenneffer am haufigften, bann taugen die Febern nichts, ba fie beim Bruten abgeftogen werden. Die Brutgeit eines Gies foll 36-40 Tage bauern. Richt felten foll

man in Straußeneiern kleine Steine finden, welche mahrscheinlich beim Sigen auf der Erde durch die Alooke in den Körper eingedrungen und mit der Eierschale umschlossen murden. — Die Hottentotten braten die schon bebrüteten Gier in den Schalen mit hammelsett, und selbst Lichtenstein fand dies wohlschmedend.

Die Gier find fcmugig weiß, hellgelblich marmorirt, Die Schaale bid glangend und poros. Die Jungen feben im erften Jahre afch= grau und haben allenthalben Federn, melde aber bald ausfallen und auf den Stellen, Die bei den Alten entblogt find, nadt bleiben. Durch Fallstride, auch burch offene Jagd auf Pferben, felbft durch Jagdhunde fucht man fich ihrer zu bemachtigen. Buweilen befommt man fie auch febend. Gie laffen fich gahmen und in heerben treiben. Jung, mit Galatblattern und Brod aufgefüttert, werden fie gahm und folgsam. Das Fleisch ber Alten ift hart und unidmadhaft, Das der Jungen wohlfdmedend. Die Romer afen auch Straufe und der Raifer Beliogabalus ließ einft bei einem Gaftmal Die Bebirne von 600 Straugen auf Die Tafel brin= gen. Den Juden hatte Mofes das Straugen: fleisch zu effen verboten. Um Rap macht man aus den Giern auch allerlei Badwert und Ruden. Auf Geereifen halten fie fich lange frifc. Mus den Schaalen macht man Becher, Die hart wie Elfenbein werden. Die alten Libier mach= ten aus Den Straufenhauten eine Urt von Ruraß; Dies thun noch Die Araber, Die fic haufig mit ihrer Jagd beschäftigen. Die lan= gen Flugel und Schmangfedern murden gu al= Ten Beiten, bis auf Die unfrige ale Bug ges fcagt. Romer und Griechen trugen fie auf Belmen. Der Sandel mit Diefen Federn ift fur Ufrita febr wichtig, und aus dem Innern Diefes Welttheils werden viele taufende aus: geführt. -

Der amerikanische Strauß. (Struthio Rhea.)

Die Federn am Unterleibe weiß, auf dem Ruden bleifarben; Ropf und hals befiedert, Scheitel und hintere Theil des Ropfs ichwarz-lich. Am Naden fangt eine ichwarze Binde an, und zieht fich über den hintern Theil des hal ses weg, wird dann breiter und umzieht den hals unten, wo er am Korper einlenft, ganz; die übrigen Theile des Ropfes und halfes-weißlich; desgleichen die Schulterse dern, an der

Murgel weiß, in der Mitte fowarglich. Uebris gens ift bas Gefieder fast fo wie am Strauf. Der Schwang fehlt, aber Die Burgelfedern han: gen über ben Steiß herunter; auf dem Ropfe find es mahre, Dichtstehende und fleife Saare. Der Sporn am Flugel 1 3. lang. Die Zunge in did, furg und halbeiformig. Das Muge fieht unter einem vorragenden Knochen. Die Lange Des Randu, wie er auch noch heißt, beträgt 5 Fuß. Er bewohnt die Gbene und freien Fel: Der von Brafilien, vorzüglich in den Pampas oder Chenen von Buenos: Apres bis zur Da: gellansftrage.

Diefer Bogel ift weniger icheu als ber Strauß, ja zutraulich da, wo er nicht verfolgt wird. Man jagt ibn ju Pferde und bemächtigt fich feiner durch Schlingen, Lasen ober Laffo genannt. Sie bestehen aus 3 ziemlich großen Steinen, Die durch Riemen an einen gemeinfa: men Mittelpunkt jusammengebunden find. Im ichnellften Jagen werden fie von dem Reiter mit großer Geschidlichfeit dem Bogel um ben Sals geworfen. Der Bogel bedient fich gur Bertheidigung feiner farten Laufe und Suge, womit er leicht bem Jager ein Glied gerschmet: tert ober ihn fonft vermundet. - Jung einge: fangen, merden fie fehr gahm, geben auf bas Feld und tommen wieder nach Saufe.

Sie nahren fich von verschiedenen Krautern, haben guten Appetit, aber mie ber Strauß ei: nen flumpfen Gefdmadefinn, indem fie Stei: ne, Metalle u. f. w. wie jener verschlingen. In Der Gefangenschaft erhalten fie Brod, Getrai: De, Salat ze. Ihre Gier findet man im Muguft, die Jungen im Rovember. Die weißgel: ben Gier haben eine glatte Schaale und find 51 2. lang. Man fammelt fie zu abnlichem Ge= brauch, wie die der Straufe. Gie follen, wie Die Strauße, in Bielweiberei leben, auch Gier um das Reft wie jene legen.

Das Fleisch der Jungen ift mohlschmedend, Das der Alten nicht. Leicht konnte man fie gu Sausthieren machen, wenn nicht ihre Gefräßig: feit ben Bortheil fomalerte. Die Guarranis gieben die Saut des Salfes bis gur Bruft ab, trodnen fie, naben das eine Ende gufam: men, und maden bavon Geldgurte. Die Febern braucht man auch jum Pug, auch ju Befen. -

C a fuar. (Casuarius.)

Sonabel gerade, mit einer erhabenen Firffe, die obere Kinnlade gewolbt, am Rande platt und gegen bas Ende etwas eingeschnitten, Rafengrube faft fo lang, ale ber Schnabel, auf bem Ropfe ein Belm; Borderhals nadt, mit 2 hangenden Rehllappen; 3 Behen mit Rageln verfeben; Die Flügel bestehen nur aus 5 runden und fpigigen Stackeln, woran Die Barte fehlen. Federn am gangen Rorper haars artig und zerfdliffen; fein Ochwang, aber ber Burgel mit langen hangenden Federn bededt.

Der gehelmte, indische Casuar, Emeu.

(Cas. indicus.)

Der fnocherne Belm an ber Schnabelmur: gel ift 3 3. hoch und an der Bafis 1 3. breit. Er entsteht aus einer Auftreibung des Stirns Inochens und ift mit concentrifchen Schichten einer hornartigen Gubftang bededt, die Farbe ift vorn braun, hinten und an den Seiten gelb. Der übrige Ropf ift nacht, himmelblau und nur um Die weite Dhrenoffnung herum feben eie nige Saare. Die nadte Saut reicht bis gur Mitte des Salfes, und ift mit Furchen und Bodern bededt; nach vorn auf jeder Seite hangt eine rothe dunne Caruntel oder Fleischlappe herunter, Die nach unten breiter wird. Die Mugen flein, und das Augenlied mit fcmargen Saaren in Form von Augenwimpern umgeben, Die Gris topasgelb. Der untere Theil-des Salfes ift mit furgen gerschliffenen Federn bedect, welche fich immer mehr verlangern, bis fie uber ben Burgel lang herabhangen. Die Schenfel find befiedert. Die meiften Diefer Federn find Doppelt, indem aus einer Burgel immer 2 Riele hervorbrechen, welche platt, ichlaff und glangend find. Die Barte find haarformig gerichliffen, und da eine Feder die andere bededt, erfcheint ber Bogel wie behaart. Auf dem Burgel find Die haarformigen Barte auf 14 3. lang. Die 5 Flugelfedern find Did, fleif, ohne Barte, gleis den den Stacheln der Stachelthiere, find inwendig hohl, mit einer Art Mark angefullt. Die mittelste die langste, fast 1 F. lang. Das Thier bedient fich Diefer Stacheln als Baffe. Das gange Gefieder beider Gefdlechter fcmarg, mo die blaue Saut hie und da durchscheint. Bei den Jungen fehlt der Belm und Das Ge-

fieder ift bellroftfarb mit Grau gemifcht. -Die Dobe eines ausgemachfenen Cafuars ift ffe: bend, vom Ropf bis ju den Fugen noch nicht gang 6 Fuß. - Im öfflichen Theile Affens ift er zu Saufe, auf ben Moluden, auf Java, be: fonders in ben bichten Baldungen ber Infel Ceram. Rach Amboina hat man ihn gebracht und gegabmt. - In feinem fonellen Lauf, mo er dem Strauß fast gleicht, icheint er halb gu tangen und halb ju fliegen. Er vertheidigt fic mit dem Schnabel und ichlagt mit den Bugen aus. Die Alten jagt man mit hunden. Die eingefangenen Jungen werden fehr gabm. -Sein Gefdmad fdeint febr flumpf zu fenn, wie beim Strauß, indem er verschlingt, mas ihm porfommt und ichnell verdaut. Go verfchlingt er gange Acpfel und Gier. In der Freiheit frift er nur Begetabilien und Getraidearten, auch Burgeln, Die er ausscharrt, oder mit ben Sonabel ausreißt. Der in Der Menagerie gu Paris gehaltene, erhalt taglich 31 Pfund Brot, 6-7 Mepfel, einen fleinen Rorb voll Ruben, im Commer 4 Pinten Baffer, im Binter et: mas mehr. In Suhnerhofen verfdlingen fie oft junge Buhner und Enten. Ihre Excremente find faft fluffig, ba der barn nicht allein ab: geht. - Die Gier find fehr porde von hellgrus ner Farbe, oftere legen fie auch in Menagerien. Das Fleifc ber Alten ift fdmarg, hart und faum egbar, nur bas ber Jungen mird gegef: fen. Sm Jahre 1597 brachten Die Sollander Diefen Bogel zuerft nach Guropa.

Der neuhollandische Emn. (Casuarius novae Hollandiae. Dromiceius nov. Holland.)

Macht bei einigen Naturforschern eine eigne Gattung aus. Lange vom Schnabel bis zum Ende der Fuße 6½ &. Gewicht 70—80 Pfund. Rach der ganzen Bildung konnte man ihn eher

au Rhea ale ju Casuarius gablen.

Ropf und Sals befiedert, mit haarartigen Federn, die auf dem Scheitel etwas gefraust sind, der Borderhals oben fast nackt. Die Flügel zeigen sich nur durch einen Busch gleich langer, wie abgeschnittener, zerschlissener Federn. Der Flügelknochen 6 3. lang, am Ende mit einem stumpfen Nagel versehen, einer krummen Rlaue nicht unahnlich. Die Federn zerschlissen hängend, die am Burzel ausgenommen, die steifhaarig, schwarz und borstenartig sind. Dinzten an der Nitte des Halses bilden die Federn

eine Art von Mahne von schwarzen und schmuchigweisen Federn. Die Brust steht tropfartig vor; der untere Theil der Brust und Bauch hat braungelbe, schwarz geendete Federn. Ruftfensedern lang, schwal, weich, bellbraunlich mit schwarzer Spige, überall hangend und wie lange Haare über einander liegend. Aus jeder Spule am Rucken und Bauche, kommen immer 2 Fesdern heraus; der eigentliche, Schwanz sehlt.

In der Bruft auf dem Sattel Des Bruff: beine fist eine große, eiformige, raube, barte Schwiele. Sinter dem After eine große runde, fast wie ein kleiner Apfel gestaltete, knorplige Drufe. Der platte Schnabel fast breiedig, am Ende mit einem Ragel. Die Bunge flein, breis edig, gezähnelt. - Baterland : Reu : Solland in Balbern. Er ift fcheu und babei fchnell, fo daß ibn faum die ichnellften Sunde einholen fonnen. Er vertheidiget fic mit ben Guffen. In fleinen Beerben trifft man fie beifammen. Rahrung mit bem vorigen gemein. - Die Gier find fehr poros, fmaragdgrun, von der Große der Gier des Cafuars. Das Fleifc der Jun= gen, Die braun und weiß geftreift find, fomede angenehm, von Alten, wie Rindfleifd.

Die zweite Familie:

Pressirostres

überschrieben, enthalt meist hochbeinige Gefchlechter ohne Daumen, ober er ist doch zu furz, um die Erde zu berühren. Mit den mäßig langen Schnabeln haden sie die Erde auf, um Raherung darin zu suchen; die mit stärkern Schnabeln fressen zugleich Saamen und Kräuter; die mit schwächern durchstreichen Wiesen und frisch gepflügtes Erdreich, daselbst Rahrung zu suchen.

Der träge Dudu. (Didus ineptus. Linn.)

Diesen Bogel fennt man nur durch die ersften hollandischen Seefahrer, die davon eine Beschreibung gemacht, welche Elusius aufbewahrt hat und durch ein Delgemalde aus derselben Zeit, was Edwards copirt hat. Die ganze Sattung schelnt verschwunden zu senn. Aur ein Fuß im brittischen Museum, beweist, daß diese Art da war, und noch ein Ropf in ziemzlich losen Zustande, im Ashmolean Museum zu Orford. Der Schnabel hat einige Nehnlichteit mit dem der Papageitaucher (Alca) und der Fuß wurde dem der Mamhot's (Apteno-

dytes) gleichen, wenn er ein Schwimmfuß mare. Hebrigens vermeifen mir unfere Lefer auf Die Abbildung.

Trappe. (Otis:)

Diefe Sattung verbindet mit bem plumpen Rorper ber Suhnervogel einen ziemlich fangen Sals und Fuge. Schnabel von magiger Lange, Die Dberfinnlade leicht gebogen und gewolbt; auch fie erinnern noch, wie Die fleinen Baute swifden der Bafis der Beben an die Gallina: ceen; aber Die Radtheit ihrer Unterfchentel, ihre gange Unatomie, und felbft ber Gefdmad bes Bleifches, ftellen fie unter Die Stelzvogel und beim Mangel Des Daumens nahren fich ihre fleinften Gattungen ben Regenpfeifern. Ihr Zarfus ift negartig, ihre Flugel furg; fie fliegen wenig, und bedienen fich haufiger, wie die Strauße, ber Flugel nur gur Befdleunigung Des Laufes. Gie leben von Samen, Rrautern, Bur: mern und Infeften.

Der große Trappe. (Otis Tarda.)

Um Binfel der untern Rinnlade des Mann: dens feht ein Schnurrbart, von langen fleifen Redern, welche auseinander fiehen und nur me: nige zerfoliffene Bartfafern haben. Die großen Dhren, Ropf und Sale, hellaschgrau. Auf den Seiten des Salfes, von den Rinnladen bis an Die Mitte deffelben, befindet fich ein tabler un: befiederter Streif, deffen Saut fdmarggrau aus: fieht. Die Bruft weiß, bei den Alten mit etwas grau überlaufen, Bauch, After und Schenfel weiß. Dur 3 Beben, welche furg und plump find. Die Rrallen find nagelformig. Die Grund: farbe ift auf dem Ruden, Schultern und Steiß fon rothbraun, übrigens aber allenthalben mit ichwarzen wellenformigen Querlinien durchgo: gen, welche auf bem Ruden und Soultern et: mas weiß gefanntet find. Die großen Schwingen fdmart, nach dem Riele gu meiß. Somangfedern braunroth mit fcmargen Quer: fleden und weißen Spigen. Die 4 außern Gei: tenfebern weiß. Das Suhn ift weit fleiner, bat feinen Federbart und ift auf dem Ruden nicht fo fcon rothbraun, fondern mehr fcmarg ge: freift. - Die Lange Des Mannchens beträgt 32 F. Flugelbreite 8 F., wird 24 - 30 Pfd. fcmer, bagegen wiegt bas fomachtigere Beibchen nur 11 - 12 Pid.

In unfern Gegenden mit ber größte einhe mifche milde Bogel. Die Trappen find Strich: vogel, die besonders da meilen, mo Raps und Rubfaat gebauet wird, mas fie gern freffen; außerdem freffen fie grune Roggen: und Bai: genfaat, Rlee und andere grune Rrauter und

Roblarten, im Commer Getraide.

Es ift ein ichlauer vorfichtiger Bogel, ber den Jager und den Arbeitemann wohl unter: fcheiden fann, baber man verfleidet und nur durch Lift fich feiner bemachtigt. In einigen Landern gehören fie gur Sobenjagd. - Rachtrube halten fie in den weit entlegenen Feldern, mobei fich gemeiniglich die Alten in einiger Ent: fernung vom Trupp herumfegen und Schildmache halten. Wenn fie auffliegen, thun fie erft 2-3 Sprunge, fonst geben fie fdrittmeife. Rach eis nigen follen fie paarmeife, nach andern in Do: Ingamie leben. Wir ftimmen fur bas Erftere. Schon im Februar fangen Die Mannchen an fich um die Beibchen zu tampfen. Im Marg und April findet man fie paarmeife. Das Weibchen fcarrt ein funftlofes Reft in dem man gewohn: lich 2 den Ganfeeiern gleich große Gier findet; von Farbe fdmugig grunlich, bleichbraun geflect; Die binnen 30 Tagen ausgebrutet werden. Die Mutter führt die mit dunkelbraunen Dunen be: fleideten Jungen ins lange Getraide, mo fie Infetten und junge Krauter verzehren. Im Berbft leben fie in großen Familien beifammen und gieben den Winter Nahrung fuchend um: her, wo fie in Gaatfeldern Schaden thun. Das Fleisch der Jungen ift fehr fcmadhaft, das der Alten hart. Mit den Schwungfedern fann man fdreiben.

Der fleine Trappe, Unmerf. 3mergtrappe (Ot. Tetrax.) ift um Die Balfte fleiner ale ber Borige, und weniger weit verbreitet. Er ift braun, obenher ichmars getupfelt, untenher weißlich. Das Mannchen hat einen ichwarzen bals mit 2 weißen Sale: bandern. Er lebt in Gubeuropa und fommt aus der Turkei und Ungarn, wiewohl fehr felten, auch in unfere Begenden, wo man ibn auch gefcoffen hat.

Der Kragentrappe (Ot. Hubara)

hat die vollfommene Trappengeffalt, doch nur die Große des Saushuhns. Lange 26 und Mu: gelbreite 52 3. Schmang 72 3., Schnabel 12 3. Die Mugen groß, Die Gris gelb. Die Reble,

ein Theil ber Wangen und Bugel fomugig weiß; Das übrige Des Ropfes roftgefblich mit bunteln Punften, in Geftalt abgebrochener Querlinien. Auf bem Scheitel ein Bufch fomaler an und über 123. langer Febern, Die theils weiß, theils fdward find. Un ben Geiten Des Salfes fieht ein fcmaler Bufchel 3 - 32 3. langer fcmaler fomantender Federn, welcher fich gur Salfte des Salfes berabzieht und im Affect emporge: richtet', eine Urt von Rragen oder Rraufe auf jeder Seite bildet. Die obere Balfte Diefer Febern fcmars, mit einigen weißen untermengt, Die untern weiß mit ichwarzen Spigen. Der untere Theil des Borderhalfes hellaschgrau, Bauch und Schenkel weiß. Das übrige Gefie-Der dunkelrofigelb mit ichwarzen Fleden und wellenformigen, abgebrochenen Querlinien. Diefe Befdreibung ift von einem Mannden. Gein Baterland ift Arabien. Rur felten hat man in Deutschland bier und ba einen gefchoffen.

Regenpfeifer. (Charadrius.)

Ge fehlt auch Diefem der Daumen, ber Schnabel mittelmäßig lang, jufammengedrudt und am Ende aufgetrieben. Man hat fie in 2 Abtheilungen gebracht: Didfuß (Oedienemus. Temm.) und eigentliche Regen: pfeifer (Charadrius.) Bir merten Davon folgende:

Der große Brachvogel, Gulentopf. (Char. Oedicnemus. Linn.)

Sat Die Farbe einer Lerche, einen fcmalen und einen breiten weißen Querffreifen in ben Blugeln. Geine Lange betragt 15 und feine Flügelbreite 324 3. Der ziemlich große Ropf bat auf dem Scheitel hellroftbraune Federn. Die großen bleichgelben Augen umgiebt ein bunfelbrauner Kreis und über benfelben geht ein fomugig weißer Streif, ein breiterer weißer geht von der gelben Schnabelmurgel unter bem Mugenfreife burch, unter Diefem auf dem Rinn= baden befindet fich wieder ein breiter duntel: brauner. Die Spigen der After : oder Unter: Dedfedern des Schwanzes icon bleichroftroth.

Das Beibden fieht auf dem Dberleibe mehr braungrau und die weißen Streifen auf ben Blugeln find bleicher und fomugiger; auch ift,

ber Unterleib mehr gefledt,

Man findet fie nur auf großen trodinen Relbern, muften Leben, fandigen, unfrucht: baren fahlen Gegenden, an den Fluffen. Er frift Frofde und Maufe, Die er verfdlingt, Infetten und beren Larven, weehalb er Steine ummalgt und baber auch Steinmalger ge: nannt wird.

Im April fommen fie an. Das Beibchen fcarrt jum Refte eine fleine Bertiefung, worin man 2 grungraue, mit fcmargbraunen und Dunkelgrauen Fleden bezeichnete Gier findet. In 2 Bochen brutet fie Die Gier aus. Mannchen und Beibden nahren fie mit Erdmaden, Regenwurmern, Infetten : und Raferlarven, mel: de fie ihnen in den erften Tagen vorlegen. In 2 Tagen laufen fie fcon den Alten nach und Druden fich bei Gefahren auf ein gegebenes Bei: den auf Die Erde nieder. Im Geptember gie: hen fie meift des Rachts fort bei Mondenfchein in fleinen Truppen. Ihre Stimme ift ein bell= pfeifendes: frarliith und fraiith. Auf ber Erde figend, bort man ein fanftes: bitt -Ditt und ein ftarferes: Dillit.

Er ift ein fehr icheuer Bogel, ber ichmer jum Couf tommen lagt, nur menn ein Raub: vogel in der Ferne erfcheint, mo er fich bann drudt, oder Abende, wenn er ans Baffer gu baden fommt. - Gein Bilbpret, wenn er nicht zu alt ift, fomedt fehr gut. Gefangen ernahrt man ihn mit Gemmel in Milch gequellt, bann und mann etwas Fleifd, Frofden, Deu:

fdreden 2c.

Der Goldregenpfeifer, Saatvogel, Brachvogel. (Charad. pluvialis. Linn.)

Lange' 10 - 103, Flugelbreite 24 - 25 3. Die Gris dunkelbraun und die Federn um die Mugen herum weiß. Stirn grauweiß mit eini: gen verlofdenen bleichschwarzen Gledden. Die Scheitelfedern find fcmarg gegrundet mit etwas mehr gelbgrun geflect, ber Dberhals mehr gelb: grun mit fleinen bleichschwarzen Fledchen. Die Schwanzfedern find bleichschwarz und haben gelbgrune und weiße ichieflaufende Querftreifen, Die fcmargen Schwingen haben weiße Schafte. Die Federn vor der Bruft find weiß mit fdmarg: grauen Querfleden und braunlicen Ranten.

Die Beibden feben viel bleicher aus und Die fconen gelbe oder vielmehr goldgrunen Flede: auf dem Ruden des Mannchens find bier u fcmugig grun. Mle Zugvogel fommt er ju Mus-

36 *

gang Ceptembere gu und und lagt fic am lieb: fen in hohen und magern Brachfeldern nieder, weit von Gebufd und Dorfern entfernt. Man trifft fie in gablreichen Gefellichaften, bis end: lich der Binter mit Froft und Schnee fie ver: jagt. Gie gieben gen Weffen meift in 2 fchiefen Linien in Form eines fpigen Bintels. Regenmurmer, Infettenlarven und Rafer machen ihre Rabrung aus. Im Marg und April fommen fie wieder bier durch und wenden fich gegen Offen. Sie baden fich gern und befuden deshalb Abends Das Baffer. Die Stimme ift ein hellpfeifendes tlui. Man fann fie bamit anloden, muß fich Dabei aber verftedt halten; fann fie auch auf Brachvogelheerden in Menge fangen. Im Dos vember und December find fie am fetteften.

Der Mornell, fleine Brachvogel, Dutchen.

(Charad. Morinellus. Linn.)

Sat etwa Die Große einer Bachtel. Lange Blugelbreite 19 - 20 3. Der Scheitel fdmargbraun; uber ben Mugen meiße Streifen, welche im Raden gufammenfaufen. Baden und Reble weiß, mit bleichbraunen Schmigden; Un: terhals und Schlafe afchgrau, wo fic erfferer mit einem fcmalen fdmargbraunen Ringe, melchen ein breiterer meißer begrangt, endigt. Bruft Des Mannchen fcon rothbraun bis gur Balfte, Unterbruft und Dbertheil der Schenfel fcmars, Bauch und After weiß. Der Dberhals afcgrau, nach bem Ruden ju immer bunfler mit roffrothen und gelben Ranten. Der 3 3. lange zugerundete Schwang hat afcgraue Fe-Dern, nach ber Spige ju fomarglich, am Ende weiße Spigen.

Das Beibchen hat auf dem Scheitel braun: lich schwarze mit Beiß kantirte Federn, welche denselben ein gestedtes Unsehen geben, über den Augen weiß, mit etwas Rostbraun überlaufene breite Streifen, welche im Naden verloschen zusfammenlaufen. Die Steißfedern bleichaschgrau gekantet, wie die obern Deckfedern des Schwanzes. Bauch und Afterfedern weiß, an den Seiz

ten roftbraunlich überlaufen.

Dieser Brachvogel ift bei und ber gemeinste, nistet aber mahrscheinlich in den nordlichsten Gegenden. Im September und October ist sein Bug am ftarften. Er halt sich truppweise zusfammen und zieht am Tage gesellschaftlich. Seizne Stimme ift ein fletenartiges schnarrendes: dru, und bei Gefahren ein dumpfes: dut

dut, beim Auffliegen: dru dut but but! Gie find leicht gu ichiegen.

Seine Rahrung besteht in Regenwurmern, allerlei Erdmaden, Insektenlarven und Rafern, daher lieben sie Brachader, alte Sturzader und begraste Leden, um diese aufzusuchen. Abends fliegen sie auch bisweilen an das Basser, um sich zu baden. — Ihr Fleisch ist fehr wohlschmedend, weshalb sie auch von vielen Raub: vögeln verfolgt werden. Am besten werden sie auf Brachvogelheerden gefangen. (Diese finder man beschrieben in Raumanns Land: und Basser: Bogel. 1ste Ausg. Bd. 2. hft. 2. p. 89.)

Der große Halsbanbregenpfeifer. (Char. hiaticula.)

Der Schnabel hinten gelblich, vorn fcmart, Beine orangegelb. Stirne, Gegend zwifden Auge und Schnabel, ein breites über den Scheitel laufendes Kronband, das durch die Mugen geht und am Sinterfopfe endigt, ein breites Bruftband, deffen Enden am Unterhalfe fic verbinden, icon ichwarg; Stirne, ein Rled hinter den Mugen, Rehle und ein breites Sale= band über bem fdwarzen, Unterbruft und gans ger Unterleib rein weiß, hinterfopf, Raden, Mantel und alle obern Theile rothlich graubraun: lich, Schwungfedern ichmarglich, an der innern Fahne mit einem weißlichen Fled. Die außerfte Schwanzfeder rein weiß. Der Mugenring orange= gelb. Lange 7 3. Bei jungen Bogeln find alle Theile, welche im Alter fcmarg werden, fcmarggrau. Baterland: Guropa und Mordamerifa. Er liebt die fandigen Ufer der Fluffe und Geen, ift ein Bugvogel, ber in Deutschland Ende Marg erscheint. Im August ift er im Durchzuge von Rorden ber. Es ift ein unruhiger foneller Bogel, Der mit ber größten Geschwindigfeit an ben Ufern herumlauft, wo man meift 3-4 Stud beisammen antrifft. Gie fdreien fart und pfeifend: fuh, fuh, tull, tull. - Der fleine Salsbandregenpfeifer (Charad. minor), dem großen fehr abnlich, ift weit haufiger und wird leicht mit Diefem verwechfelt.

Seine Rahrung besteht in Wasserinsekten und ihren Larven, kleinen Kafern, Würmern, kleinen Schnecken u. f. w. Er nistet im Rorden von Europa, nahe am Ufer in einer Bertiefung; ihr Rest hat zur Unterlage etwas Geetang. Die 3—4 Eier sind verhältnismäßig sehr groß, 19 Linien lang und 14 Linien breit. Die Erundfarbe ist graugelb oder hellgelbgraulich,

mit braunen und schwarzbraunen Punkten, Strichen und Fleden, besonders am flumpfen Ende, dicht bestreut. Inwendig sehen alle graugrun aus. Sie lieben ihre Jungen sehr, die bald laufen und bei Gefahr sich schnell unter Steine verbergen. Nur an Brutortern, sonst sind sie schwarzen, kaben, Moven, Seeschwalben, Füchse und Marder schaden den Giern und Jungen.

Das Bleifc ift vortrefflich, auch die Gier

fcagt man.

Riebit. (Vanellus, Bechst. Tringa, Linn.)

Schnabel furz, dunne, gerade, zusammens gedrudt, beide Kinnladen an der Spige verzbickt; drei Zehen nach vorn, die mittlere an die außere durch eine haut, doch nur an der Wurzel verbunden; die hinterzehe sehr klein, rudimentarisch, doch mit einem Nagel, auf dem Laufe eingelenft, den Boden nicht berührend; Flügel breit, spigig. Einige ausländische Arten haben am Flügel einen Sporn von bedeutender Länge und Schärfe.

Die Riebige sind, wie alle insektenfressenbe Bogel der kaltern Alimate, Zugvögel und reis sen samilienweise, oder vereinigen sich in gros sen Schaaren. Sie leben am Wasser oder an nassen Wiesen. Cuvier hat sie unter 2 Ubs

theilungen gebracht.

Der schwarzbauchige Kiebis. (Vanellus melanogaster.)

Im Binterfleide find Stirn, Rehle, Mitte Des Bauches, Schenkel, Unterleib und obere Deckfedern des Schwanzes rein weiß; Bordershals, Seiten der Brust und des Unterleibes weiß mit grauen und braunen Flecken; obere Theile braunschwärzlich, mit gelbgrünlichen Flecken; die untern Deckfedern des Schwanzes an der außern Jahne mit kleinen Diagonallinien; der Schwanz weiß, an der Spige rostrothlich, mit braunen Binden; Schnabel schwarz.

Im Sommer: Raum zwischen Auge und Schnabel, Rehle, Borderhals, Mitte der Brust, Bauch und Seiten tief schwarz; Stirn und eine breite Binde über die Augen, Seiten des Salzes und der Brust, Schenkel und Unterbauch rein weiß; Nacken braun, schwarz und weiß gemischt; hinterhaupt, Rucken, Schultern und Deckfedern der Flügel tiefschwarz, jede Feder endet mit

breiter meifer Spige; auf ben großen Dedfedern ber Flügel und Schultern große weiße Flede; Die untern Dedfedern des Schwanzes haben schwarze Querbander. Die Lange des Bogels besträgt 6 3. 6—7 Linien.

Baterland: Guropa, Affen und Amerita an Seetuften vorzüglich an Mundungen ber Fluffe in ben nordlichen Theilen. In Deutsch= land ericeint er nur auf dem Buge im Gep= tember und Detober auf Leden, Brachen, an Teichen und Geeufern einzeln, auch in fleinen Gefellschaften. Er ift fehr fcheu. Geine Dabrung besteht aus Infeften und Burmern. Im Berbft ift er febr fett, fein Fleifc vortreff= lic. Er niftet einzeln auf den nordlichen Infeln Dollands, haufiger aber im Norden. Die Gier gleichen den der Riebige, Doch fleiner. Die Fars be bell olivengrunlich oder gelblich mit fcmargen und braunen auch bellaschgrauen Fleden, Die oft in einander laufen. Die Schale ift bid, glatt, mit deutlichen Poren und ziemlichem Glan= ge. In dem funftlofen Refte, auf naffen Diefen, findet man meiftes 4 Gier.

Der gehaubte, gemeine Kiebis. (Vanel. cristatus.)

Ift ein befannter Bogel, die Febern am Sintertopf bilden einen bunnen, langen, auf= flehenden und etwas mit der Spige nach oben ungefrummten Federbufd, der wie der Scheitel, Borderhale, Reble und Bruft fcmarz, glanzend, Seiten bes Salfes und ber gange Unterleib rein weiß; Die untern Dedfebern des Comanges roff= farben, Raden fdmugig grau, Sinterhals, Mantel und Dedfedern der Flugel bunfelgrun ins brongefarbne glangend, einige Dedfedern ber Blugel mit weißlichem Endfaum. Geine Lange beträgt 124, Flügelbreite 301 3. Diefer Bogel ift weit verbreitet bewohnt Perfien, China, Egyp= ten und gang Guropa. Liebt fumpfige und mora= flige Ufer der Geen, Teiche und Fluffe, feuchte Biefen, Gumpfe, Triften und Brachfelber. Gehr haufig ift er in Solland. Kommt zu uns Ende Februar. Im August und September verfdmin: ben fie.

Es ift ein munterer, unruhiger, icheuer, ichneller und listiger Rogel; der Tag und Nacht fast immer in Bewegung ift. Er läuft ichnell Sein Flug ift leicht, icon, macht besondere Schwenfungen und macht mit seinen stumpfen Flugeln: wuch, wuch, wobei das nicht weit vom Neste Wache stehende Mannchen bei Annaherung einer Gefahr schreit: fah quert-

hrit fibit fibit fibit fiuihf. Das Beibden schreit bei diesen Beranlassungen: fraid! Besiederten Feinden widersegen sie sich mit Geschrei und Schnabelhieben, ja hunde suchen sie auf gleiche Beise zu verjagen. Sie fliegen nicht vom Neste gleich ab, sondern laufen erst eine Strecke in gebückter Stellung, um so den Feind zu täuschen.

Gefangen wird er leicht gahm, und lagt fic mit Brod, Fleisch, Regenwurmern, Cemmel in Mild geweicht, gut erhalten. Garten hal: ten fie von fleinen Coneden, Raupen und Re: genwurmern rein. Leben in der Freiheit auch von diefen, daber fie auch frifch gepflugte Fel: der im Berbst und Fruhjahre, in großen Flu: gen befuchen. - Unfange April findet man icon ihre funftlofen Refter auf Biefen, oder in Gum: pfen. Die 4 Gier find verhaltnigmaßig groß, birnformig, heller oder dunkeler, olivenfarb oder erdfarb, mit großen und fleinen ichmargbraunen Bleden, zwischen welchen undeutlich afcgraue ger: freut find. In 16 Lagen werden fie vom Beib: den allein ausgebrutet. Berben Die Gier genommen, fo macht fie eine 2te, ja eine 3te Brut. Die Jungen laufen fehr bald und werden nur furge Beit von den Eltern gefüttert und lernen bald allein ihre Nahrung suchen. Raben, Raub: moven und fleine vierfußige Raubthiere ftellen Giern und Jungen nach. Falkenarten jagen Die Alten. Das Fleisch der Jungen ift wohlschmedend, Die Gier gehoren unter Die Lederbiffen. Auf Brachvogelheerden werden fie gur Buggeit ge: fangen, auch in Laufdohnen, auch schießt man fie.

Unmerf. Bemerkenswerth ist noch Vanel. cayennensis bessen Flügel mit einem weißen Sporen bewassnet ist. Dbenber ist er aschgrau, mit grunschillerndem Mantel; ein Schopf herabhangender schwarzer steifer Federn ziert den Kopf; die Stirn ein Streif den hals herab, Brust, Dberbauch und Schwingen schwarz, Bauch und andere Schwanzbecksern weiß.

Austerdieb.

(Haematopus. Linn.)

Schnabel langer als bei den beiden vorigen Sattungen, gerade zugespigt und keilformig zustammengedruckt und ftark genug, daß sie zweisschalige Muscheln mit Gewalt öffnen konnen um die Bewohner derselben zu verzehren, indessen wühlen sie auch in der Erde nach Würmern. Die Nasenrinne sehr tief gefurcht, die Salfte der Schnabellange einnehmend, die Nasenlöcher stes hen in der Mitte, eine kleine Spalte bildend.

Die Fuße von mittelmäßiger Sohe, Tarfen nege artig und die Fuße nur in 3 Finger gespalten.

Der Austernfischer, Auster dieb, Meerelster.

(Haemat. Ostralegus. Linn.)

Ropf, Raden, Bruft, Ruden, Flugel und Schwangfpige fcmarg; im Binter am Dberhal= fe ein fehr bezeichnetes, weißes Salsband am pordern Theil des Dberhalfes, gleich unter der Reble; im Sommer ift Die Farbe tiefer fcmarg. Burgel, Schwanzwurzel, ein Querftreif über die Flugel, und alle untern Theile rein weiß; Schnabel und nadter Augenfreis lebhaft orange: roth, Gris farmoifinroth; Beine blutroth. Lan= ge 15 3. 6 Linien. Gie bewohnen befonders Die nordlichen Geefuften Guropas bis Gibirien auch in Nordamerifa. Un der Offfee fommen fie fcon im April an, und giehen gleich nach der Brut im August wieder weg. Geines plumpen Anfehens ungeachtet ift es doch ein munterer, ge= mandter und icheuer Bogel. Ift meift am Stran-De, in feichtem Baffer, oder auf Steinen ; lauft auch am fandigen Ufer und auf Biefen fonell herum. Auf fumpfigen Boden bohrt er mit fei= nem harten Schnabel zolltiefe Locher, um Infetten und garte Grasmurgeln hervorzuholen. Jager und hirten weiß er mohl zu unterschei= ben. Gein Lockton ift: gip, gip. Um Tage giebt er in Gefellichaften von 20 bis 30 Stud, in ber Ordnung wie die Saatganfe. Ungeschoffen fucht er fic burch Schwimmen zu retten. In der Gefangenichaft mird er bald gabm, balt aber nicht lange aus. Geine vorzügliche Rab: rung besteht aus Infekten und Burmern, mobl auch fleinen Rrebfen. Auftern frift er nicht, hebt fie aber auf um feine Rahrung barunter gu fuden, weshalb man ihn Mufternfifder nennt. Much Wurzelfafern findet man in feinem Magen.

Das kunftlose Rest sindet man auf Biehz weiden, selten im Sande, so daß die Anschwelz lung des Meeres der Brut nicht nachtheilig werz den kann. Das Rest enthält 2—3 große Gier, wovon eins 2 3. 4 Linien sang und 1 3. 10 Linien breit ist. Die Farbe ist gesbgrau, mit schwarzbraunen, undeutlichen Fleden und Strizchen, zwischen welchen aschblauliche oder schwachzviolette, verwaschen, stehen. Die Beibchen brüten allein, kommen sie aber um, so vertreten die Mannchen ihre Stelle und brüten sie treuzlich aus. Beide Estern lieben die Jungen sehr. Die Jungen laufen sehr bald und wissen sie

bei Gefahren gut zu versteden, laufen auch wohl bei Unnaherung eines hundes ins Wasser, tauchen geschickt unter oder laufen so schnell im Wasser bavon, daß der hund bald die Spur verliert. — Die Alten lassen sich schwer schießen. Das Fleisch ift schmadhaft und gesund.

Cursorius. Lac. Tachydromus. Ill.)

Schnabel furger als der Ropf, an der Burgel niedrig, an der Spige etwas gewolbt, schwach gebogen, spigig. Nafenlocher eiformig, über ihnen ein fleiner hoder. Beine lang, dunne, 3 fehr furge Zehen. Rägel fehr flein; die großen Decfedern der Flügel fo lang als die Schwungfedern. Leben in Uffen und Ufrika in durren sandigen Gegenden.

Der isabellfarbige Laufer. (Cursor. isabellinus.)

Stirne, untern Theile, Sale, Ruden, Schwans und Dedfedern der Flügel rothlich ifabellfarbig, Die legtern graulich gefaumt; Reh= le weißlich; binter ben Augen ein doppelter fcmarger Streif, uber Diefem ein weißer, ber mit ber andern Seite gufammenfließt und einen fcmarzen, dreiedigen Fled im Raden einschließt; Sintertopf fon afdgrau; Schwungfebern fcmars, an der Spige fcmugigweiß gefaumt. Somang, Die beiden mittlern Federn ifabell: farben, die folgenden eben fo mit einem drei: edigen fomargen Gled und meißer Spige, Die außerften fast gur Balfte weiß; untere Dedfes dern der Flugel fdmart; Steifgegend und un: tere Dedfedern des Schwanzes weiß. Beine weit über dem Rnie nadt und hornfarben. Gona: bel ichmarglich. Die Lange Des Bogele 9 3. Baterland Ufrita, befonders Abnffinien, mo fie baufig find. Rach Guropa fommen fie fehr fel: ten und find bann hier und ba gefchoffen mor: Den.

© a r i a m a. (Dicholophus. Ill. Microdactylus. Geoffe.)

Schnabel langer als der Ropf, did, ftart, gewolbt, Mundoffnung bis hinter die Augen gefpalten; Schnabelmurzel platt, Spige zufammengedruckt und etwas gebogen, Nafengrube groß, Nafenlöcher flein. Beine lang, dunne;

Beben febr furg, bid, Die vordern an ber Burgel mit einer haut verbunden; eine fleine hinterzehe artifulirt mit dem Lauf, berührt aber ben Boden nicht. Ragel furg, ftart. Fluzgel mittelmäßig.

Der geschopfte Sariama. (Dicholop. cristatus.)

Die Sauptfarbe Diefes Bogels ift an den obern Theilen erdbraun; Die untern Theile meiß: lich. Alle Salsfedern find mit dunkelbraunen Bidgadlinien bezeichnet. Die beiden mittlern Comangfedern braun; die übrigen größtentheils ichmars, an der Spige weiß; Die Flugelfedern mit weißen, ichwarzgetupfelten sowarzlich. Querbandern. Die nadten Theile Des Gona: bele, Lauf und Guge orangeroth; beim Alten ber Schnabel icon corallenroth; Die Gris gelb. Der Leib flein und ichlant; der Sale geflect, mit langen lodern Febern befegt; ber Schwang maßig lang, Die Flugel furg, abgerundet und fcmach. In Diefer Sinficht und durch Schna-bel und Korper einem buhnerartigen Bogel, Durch die Bildung der Fuße einem Badvogel abulich, der aber wie die Straufe, trodine Gbenen liebt. Die Federn am Salfe find fo loder. wie bei der Rohrdommel, befonders in der Rabe des Ropfes, erhebt fie auch auf ahnliche Urt. Sie find am hintertopfe. und Dberhale über 4 3. lang und ftehen im Uffett horizontal vom Salfe ab. Beim Mannchen find fie langer. Die Lange Des mannlichen Bogels beträgt 30% 3. Flugelbreite 41. 3. 7 Linien.

Der Sariama lebt in ben großen offenen Triften bes innern Brafiliens, mo fanfte mit Gras bewachsene Dohen ober Ebenen mit einz gelnen Gestrauchen abwechfeln, ift aber über einen großen Theil von Sudamerika verbreitet.

Man findet fie meift gepaart, nach der Paarzeit familienweise zu 3 bis 4 umbergehend oder auch ichnell laufend. Ihre laute Stimme foll man eine Meile weit boren konnen.

Sie fressen meist Insetten, wohl auch Amphibien. Der Pring von Wied fand im Magen eines solchen Bogels nichts als heuschreden. Die Paarungszeit fallt im Februar, wo die Mannchen heftig um die Weibchen kampfen. Sie nisten auf Baumen. Die Unterlage von burren Reisern bedeckt der Bogel mit einer Schicht von Letten oder Auhmist. Die 2 Gier sind weißelich. Das Fleisch gleicht dem unfrer huhner an Weiße und Geschmad. Sie lassen sich als seene

Bogel fower fdiegen. Man verfolgt fie gu Pfer: De und fucht fie bom Gebuich abzuschneiden, mo fie bann ermudet von einem Baume gefchof: fen oder auf der Erde mit der Sand, lebend ergriffen werben.

Die dritte Familie. (Cultrirostres)

erkennt man an ihrem diden, langen und farfen Schnabel, der oft ichneidend und zugespigt ift. Diefe Familie ift meift von Bogeln gufam: mengefest, Die nach Linne unter Ardea geftellt find. Gine große Bahl der Gattungen hat beim mannlichen Gefdlecht die Luftrohre verfdiedents lich gebogen. Ihre Blinddarme find furg, und felbft die eigentlichen Reiher befigen nur einen einzigen.

Rranich. (Grus.)

Schnabel gerade, wenig gefpalten; Die baus tige Rafenrinne, welche weit und concav ift, nimmt fast Die gange Balfte feiner Lange ein. Die Fuße find gefdildert, die Beben mittelma: Big, Die außere mit wenig Saut verbunden; Der Daumen berührt faum den Boden. Gie haben fast fammtlich einen mehr oder minder bedeutenden Theil ihres Ropfes und Salfes nadt. Ihre Lebensweise ift mehr terreftrifd und ihre Rahrung mehr vegetabilifc, als die ber folgen: Den Gefchlechter. Ihr unterer Laring hat nur einen Mustel ju jeder Seite. Dben an fieht Die Gattung:

g a m i. (Psophia)

beren Schnabel furger ale bei ben anderen Gattungen ift, ber Ropf und Sale blos mit Flaum befegt, und der Mugenfreis nadt. Gie leben in Balbern von Fruchten und Gamen.

Der Trompetervogel, capennische Trompeter.

(Psoph. crepitans. Linn.)

Die Lange Diefes Bogels beträgt 20 3. Der Conabel grunlich gelb, Die Augen mit einer rothen Saut umgeben. Der Ropf oben und der obere Theil des Salfes furg geffedert mit mei: den flaumartigen Federn. Auf der Bruft ein großer rundlicher Fled von iriffrenden, in Grun, Goldgrun, Blau und Biolet foillernden Bes

Dern, beren Farben fich nach bem Lichte andern. Die Mitte des Rudens und die fleinen Dedfe= bern ber Flugel find roftfarben, Die großen Dedfedern und der Schwanz, der furg ift, hell: afcgrau, Ropf, Sale, Unterleib und alle ubris gen Theile fdmarg, etwas matt. Die Laufe bis

über die Anice nadt und grunlich.

Das Baterland: Canenne, und auch andere Lander in Gudamerita in gebirgigen Balbern. Die an Gumpfen und an den Ufern der Fluffe. Gie geben, laufen und machen auch oft poffirliche Sprunge. Bei der Rurge der Flugel und des Schwanzes ift ihr Flug fcmer, daher zieben fie das Laufen vor. Den obigen Ramen erhielten fie der fonderbaren Tone megen, Die fie 6-7mal wiederholen: Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Diefe Zone fcheinen aus bem Ufter gu fommen, fie merden aber burch ben eigenen Bau der Luftrohre und der Lungen gebildet und find dem Rollern bas bieweilen in den Gedarmen eines Menfchen entfteht, nicht unahnlich. Der Gonabel wird dabei nicht geoff= net, mas die Taufdung vermehrt, als ob es aus dem After fame. Genau beobachtet, bemerft man jedoch, daß fie die Tone im untern Lufte robrentopfe bilden. -

Diefer Bogel wird fehr leicht gahm, fernt die Personen, die ihn futtern und gum Saufe gehoren, fennen, und folgt ihnen nach wie ein Sund. Go gehorcht er auch der Stimme feines Berrn, geht vor oder binter ibm, liebtoft ibn. zeigt, wie der treue bund, feine Freude, menn er wieder beim tommt; ift fogar eiferfüchtig auf andere Thiere, welche Die Liebe des Berrn mit ihm theilen; bewacht Subnerhofe und verjagt fremde Thiere, ba er weder Ragen noch Sunde fürchtet und ihren Ungriffen leicht ausweichen fann; er erhebt fich dabei in die Luft, und flogt nach ihnen mit fraftigen Schnabelhieben. Gern lagt er fich an Ropf und Sals fragen, und zeigt feine Begierde nach Diefer Liebtofung burch Geberden und Ungeduld. Den Freunden des Saus fes geht er entgegen; boch fann er oft gemiffe Personen nicht leiden, und verfolgt fie mit Schnabelhieben. Er geht frei herum in ben Strafen von Canenne und begleitet Die Borübergehenden weit. Gie follen fogar Schafheers Den auf der Beide bemachen, und des Abende nach Saufe treiben. Um baufigften nugt man fie aber als Bachter der Suhnerhofe. Bald bemade tigen fie fic der Berrichaft, treiben fie Abends in den Stall, und ruben dann felbst auf einem Dade oder benachbarten Baume. Dies Thier

hat große intellectuelle Fahigleiten und gleicht Darin fehr Dem Kranich. — Man follte fie Dess halb auch bei uns einheimisch zu machen fuchen.

Sie leben von Insekten, die Jungen meist von kleinen Burmern und Insekten. Die Alten fressen Getraide aller Art und Brodt. Gie nissken wie die Hühnerarten, auf der Erde, an einem Baume in einer gescharrten Bertiefung, wo man 10—16 hellgrune Gier sindet von fast sphärischen Formen, größer noch als die Gier unserer Duhner. Die Jungen können gleich lausfen, behalten aber lange den Nestslaum. Ihr Fleisch schmedt angenehm; das der Alten aber ist schwarz und troden.

Anmerk. Noch bemerken wir nach Eur. benkonig svogel (Grus. — Ardea pavonia. Linn.) 4 Fuß hoch, aschfarb, mit schwarzem Bauch, gelbbraunem Burzel und weißen Flügeln. Seine nackten Wangen weiß und schon rosenroth gefarbt, der hintersopf mit einem (kugelformigen) Bulchel schmaler gelber Federn geziert, den er aufrichten kann. Die Stimme dieses schonen Bogels gleicht dem schmetternden Zon einer Trompete. Bon den Rusten des westalichen Afrikas murde er im Kafig zu uns ges bracht und mit Kornern ernahrt. In der Bildenis soll man ihn an überschwemmten Stellen finden, wo er kleine Fische fangt.

Das Mabden von Reuindien. (Gr. Virgo.) Dem Borigen in der Gestalt und fast auch an Größe ähnlich, aschgrau, mit schwarzem halb (und den herabhängenden Federn); zwei schöne weißliche Federbusche, aus der Berzlängerung zugeschlieter Dhrfedern (in der Rähe der Augen) entwickelt, zieren diesen Bogel. Die in der Gesangenschaft zu und gebracht wurden, machten sich durch auffallende Gesten und närzrische gezirte Bewegungen bemerkbar.

Rranid). (Crus.)

Schnabel so lang oder langer als der Kopf, fark, gerade, zusammengedruckt, etwas gebozgen und flumpf; die Burzel der Oberkinnlade gefurcht; Schnabelfieste erhaben; Nasengrube sehr groß, eine tiese Furche bilbend; Augengezgend und Schnabelwurzel oft nacht, oder nur sehr dunn besiedert. Beine lang, stark, die Stelle weit über dem Knie nacht; von den vordern 3 Zehen ist die mittlere mit der außern durch eine kurze haut verbunden, die innere frei, die hintere lenkt mit dem Laufe ein, und

berührt ben Boben nur mit dem Nagel. Flüsgel mittelmäßig; die Schwungfedern der 2ten Ordnung, in der Rabe des Korpers flebend, immer langer als die andern, meist zerschliffen, und bogenformig aufstehend.

Bei einigen ift auch ber Ramm bes Bruftbeins fehr entwidelt, indem es feine Bestimmung ift Die Luftrohre aufzunehmen, welche in bem=

felben mehrere Bindungen macht.

Der gemeine Kranich. (Gr. cinerea. Bechst.)

Geine Lange ift 4 F. Flugelbreite 7 F. 6 3., ber Ochnabel 5 3. lang, gerade, und von unten und oben feilformig jugefpigt, von Farbe gelblich mit fcmarg überlaufen, an ber Spige hell hornfarben. Stirn, Scheitel, Raden, Reble und der halbe Sale herab bleichschwars, Die Solafe zwifden ber fdmargen Reble und Schei: tel weiß, mas fic an ber Reble herunter gieht und am Ende berfelben fich verliert. Alle anbern Theile find fon graublau. Schwung: und Somangfedern fdmarg, Dedfedern Der Blugel grau; zum Theil an ber innern Fahne fomare; Die hintern, den Rorper in Der Ruhe bededenden, Dedfedern der Flugel lang, gers foliffen und braunlich, fo daß fie eine Urt von Bufd über dem Schwanze bilben; auf bem Scheitel fieht ein fahler, marzig, rother Bled, nur mit einigen fomargen Saaren bededt. Der Augenstern rothbraun. Den Jungen fehlt Die fable Ropfftelle, indem fie mit fcmargen Saarfedern bededt ift. - Ge ift einer unferer groß: fen einheimischen Bogel. Lebt in Guropa und Uffen. In Rorddeutschland finden wir ihn in Pommern, im Brandenburgifden, in ber Laufig, in Polen. Es ift ein Bugvogel. Geine Berbftmanderungen gefchehen im October und November offlich über Griechenland. Die Biederfunft fallt im Marg und April. Bo fie in Menge fich niederlaffen, thun fie ber grunen Saat viel Schaben.

Sochst merkwurdig ist ber Bau ihrer Luftsrohre. Diese tritt namlich in den Kamm des Brusteins, der sehr ftark vorragt auf beiden Seiten aber platt ift, dann macht sie in demsselben schlangenformige Biegungen, tritt nun erst wieder aufwarts und in die Brust. Die Bande des Brustammes sind sehr dunn und inwendig neben den Biegungen liegt ein lodertes Gewebe von Knochenzellen. Dieser so abzweichende und merkwurdige Bau scheint einfluß-

reich auf ihre flarke Stimme zu fenn, die man bei ihren Zügen in 2 schiefen Linien, hoch aus der Luft herab erschallen hort, es klingt wie: kirr; kurr — kruu. Oft hort man sie ohne sie in dieser hohe schen zu konnen. An ihrer Spige fliegt immer einer der größten und starksten. Bor dem Abmarsch bemerkt man, wie bei andern Zugvögeln, eine gewisse Unruhe, wobei sie viel schreien. Sie sind sehr vorsichtig und stellen Wachen aus, welche drohende Gefahr anzeigen. Zur Begattungszeit trennen sie sich und jedes Paar hat seinen eignen Standort. Erst im herbst werden sie gesellig und friedlich.

Der Kranich wird in der Gefangenschaft febr gabm. Mur zur Zeit des Zuges muß man ihn innehalten. Gin merkwurdiges Beispiel von den intellectuellen Fabigkeiten dieses Bogels wollen wir am Ende seiner Beschreibung mit: theilen.

Der Kranich febt aus bem Thier: und Pflauzenreiche. Fische, Frosche, Insetten, Wur: mer, Wasserpflanzen, Getraide, sowohl grunes als reifes, besonders Waizen und Erbsen, auch einige Obstarten; selbst Maufe und fleine Bozgel verschmahet er nicht und verschludt sie ganz, auch Schneden und Muscheln verzehren sie. In der Gefangenschaft fressen sie gern Brodt und Reisch.

Im Mai niffen fie in großen unzuganglis den Sumpfen und Bruden. Das Reft fieht auf einer Ginhung in Binfen, Shilf, Gras, Gra len : und Beidengebufden und beffeht aus einer unordentlichen Unterlage von durrem Gras, Soilf, Benife und Dergl. Es enthalt gewohn: lich 2 Gier, Die den Trappeneiern gleichen. Gie find meift icon eiformig an beiden Enden faft gleich bid. Die Schale rauf mit deutlichen Poren. Lange 31 3. Die Farbe fcmugig grun: lichgrau, mit vermaschenen braunen und ole grunen Fleden. (G. Naumann und Buble Die Gier ber Bogel Deutschlands Beft I. Tafl. I. Fig. 1.) Die Reffer find fcmer ju finden. Das Beibchen verläßt bas Reft nur bei naber Gefahr, friecht burch bas Gebufch und fucht Den Berfolger ju taufchen. Ift aber das Reft entdedt, fo vertheidigt fie daffelbe gegen Thiere und Menfchen. Der Abler verfolgt die Jungen, fonft mohnen auf ihnen auch Schmarogerinfet: ten. Gie find fehr fdmer zu fchießen. Das Bleifch ift egbar, bas der Jungen wohlschme: dend. Die Romer hielten viel Darauf. Die Schwungfedern Dienen jum Schreiben. Bo fie haufig find thun fie Schaden, besonders in Erbfenfeldern.

Unmett. Br. Brehm ein forgfältiger Beob: achter führt in feiner Drnis ein merfwürdiges Bei: spiel an, mas wir unsern lieben Lesern nicht vor= enthalten wollen. "Ein Paar junge Kraniche Mann: den und Weibchen murden im Unfange mit Fro: fchen dann aber mit Brodt ernährt. Dies Parchen wurde bald außerordentlich jutraulich, jahm und gutartig; lernten alle Sausgenoffen fennen und fa= men auf die ihnen gegebenen Ramen. Brodt und Fleisch war ihre Nahrung, letteres zerschnitten. Rlei: nen vorgeworfenen Bögeln gerhadten fie den Ropf und verschluckten fie gang. Waffer mußten fie frets frifch haben. Beide liebten fich fo, daß wenn eins das an= dere nicht gleich fah, es fchrie, und beim Biederfinden . freuten fie fich. Unfänglich fürchtete fich bas Saus= geflügel vor ihnen, nach und nach gewöhnten fie fich aber an diefelben. Gie fuchten gern die Gefellichaft der Menschen und im Dorfe, wo fie frei herumlies fen , kannten fie genau die Baufer , wo man ihnen etwas gegeben. In die Stube ihres herrn famen fie und fragen mit einem hunde aus einer Schuffel. Sie fannten genau die Gutterungszeit und fiellten fich baju puntilich ein. Auf Spaziergangen beglei: teten fie ihren Berrn, wie ein Bund, flogen zuwei= Ien auf und famen wieder. Waren auch wohl halbe Tage abmefend, ftellten fich aber immer wieder ein. Bei ber Buggeit zeigten fie wenig Reigung meggu= giehen, bei falten Tagen aber besuchten fie die marmen Bimmer. Das Mannchen brach einft den Flü: gel, ba machte bas Weibchen ein großes Wefchrei und fuchte Sulfe. - hernach bewachte es ben Bugang jum Mannchen und ließ feinen Fremden gu. Alls aber das Weibchen erfrantte, bewies das Mannchen gleiche Treue und war bei deffen Todte gang außer fich. Es fuchte bie Tode aufzurichten und da man fie fortgeschafft, suchte er fie überall und blieb den gangen Winter über traurig. Im Frühjahr fuchte er das Bedürfniß einer Gefährtin badurch ju erfeben, bag er den Buchtochfen des Gutes baju erfor. Täglich jog er mit bem gehörnten Freund auf die Weide und befuchte ihn oft im Stalle. Da frand er bann ehrerbietig und gang aufgerichtet neben ihm, als, wenn er feine Befehle erwarten mußte, wehrte ihm die Fliegen ab, antwortete wenn er brullte. War der Ochfe unter dem andern Bieb, fo ging er einige Schritte binter ihm ber, tangte um ihn herum, und machte ihm Berbeugungen, fo daß jedermann lachen mußte. Go begleitete er ihn mit auf die Weide ic. Ueber alle andern Thiere bes Gutes maßte er fich die Dberherrichaft an, verfah bei der heerde die Stelle des hirtenhundes und hielt

fie in Ordnung. Die von ber heerde fich verirrenben trieb er mit Schnabelhieben und Gefchrei wieder jur Beerde. Ginft holte er das junge Dieh gang al= lein von ber Beibe und trieb es mit Schnabelhieben in den Stall. Bei ben angespannten Pferden fand er ebenfalls Bache, ichrie, wenn fie unruhig wur: den und gab den Ungehorfamen Schnabelhiebe. Un: ordnung, Bant und Streit unter bem hofgeflügel bulbete er burchaus nicht. Sunger gab er burch ein vertrauliches: Rur, tur, tur ju erfennen. Das hartefte Brod weichte er fich in Baffer ein. Leute Die ihn vor langer, Beit genedt hatten , fannte er ge= nau wieder und verfolgte fie. Er fürchtete feinen Menschen, als den Schornfteinfeger, vor welchem er immer fioh. Alls die Buggeit der wilden fam, wurde er fehr unruhig, begrüßte alle vorüberziehen: ben mit feiner farten Stimme und erhielt Antwort, fam nicht felten mit ihnen in der Rahe jufammen, wobei nur einmal Streit entftand, als ber jahme gegen 3 wilde fich mehren follte, wo er bann ju den Men= fchen floh. Des Dachts ging er in die nahen Gum= pfe und brachte dort diefelben bei den milben gu, fam aber jeden Morgen wieder und machte feine Anfunft befannt. Man gab ihm ein junges Beib= den jur Gefellichaft, er vereinigte fich mit bemfel: ben und nahm es in die Lehre, indem es feine Sprünge und Gang nachahmen mußte, wozu er es, wenn es nicht folgen wollte, mit Schnabelhieben zwang. Bauern, Bettlern und fchlecht gefleideten Leuten, verweigerte er oft ben Gingang jum Saufe und fuchte fie mit feiner ftarten Stimme in Furcht ju fegen. Die Abmefenheit feiner Fütterer bemert: te er bald, suchte fie allenthalben auf, tannte fie an Sang und Stimme, und bezeugte bei ihrem Bie= bererscheinen feine große Freude. Burde ihm fein Futter lange vorenthalten, murbe er fehr unwillig und gab dies auch burch Federftrauben und feine ftarte Stimme ju verfiehen. War fein Baffer nicht frifch genug, fo marf er fein Gefag um, und verlangte burch Gefchrei anderes.

Diese mitgetheilten Beobachtungen von einem forgfältigen Forscher, zeigen unbestritten, baß ber Kranich ju den gelehrichsten und merkwürdigsten Bözgeln gehört und daß man sie gut abrichten könnte.

Der weiße amerikanische Kranich. (Gr. americana.)

Funf Jug lang, rein weiß, mit Ausnahme ber erften Schwungfedern, welche fcwarz und eines Fledes im Naden, welcher schwarzlich ift; Scheitel und ein Theil des hintertopfs nebst einem Streif hinter dem Mundwinkel, nadt,

roth, schwarz behaart. Die Schwungsedern zunächst am Rucken verlängert und zerschissen,
hängend und weich, wie beim Strauß gebildet;
die solgenden zugespist. Der Schnabel gelbbraun,
die Augen schön gelb, die Füße schwarz. Baterland: Nordamerika, wo er in niedrigen Gegenden vorzüglich in Reisseldern von Reis, Wasserpslanzen, Mäusen und Insetten sebt. Er ift
eben so schwu und furchtsam, läßt sich deshalb
auch schwer schießen, wie unser Kranich. Er
fliegt kreisend hoch und schön, hat auch eine
durchdringende Stimme. Sein Fleisch wird zuweilen gegessen.

Das Mest findet man in Gumpfen auf fleinen Erdhügeln, es besteht aus Schlamm mit trodenem Gras überlegt. Die 2 Gier find blaßgrun, an beiden Enden braun geflect.

Sonnenreiher. (Eurypyga.)

Schnabel lang, gerade, stark, hart, zusammengedrudt, spigig, etwas aufgeschwollen. Rassengrube sehr tief; Seite der Unterschnabellade gefurcht, Schnabelspige ausgeschweift, Rasenslöcher an der Schnabelwurzel liniensörmig, lang. Beine lang, dunn; Lauf langer als die Rittelzzehe, die außere mit der mittlern durch eine Saut verbunden; die innere getrennt; alle mit einem Hautrande; Hinterzehe auf der gleichen Bobe mit den andern Zehen. Flügel breit. Schwanz sehr lang, die Federn desselben von gleicher Länge.

Der Sonnenreiher. (Eurypyga helias.)

Ropf und Raden Des 16 Boll langen Bo: gele fcmars, eine weiße Linie lauft über Die Mugen vom Schnabel an bis jum hinterhaupt, eine zweite unter ben Mugen meg bis in ben Raden; Rinn und Reble weiß, Ruden, Souls tern und die bem Ruden gunachft liegenden Schwungfedern fcmarg, jede Feder mit 3-4 weit von einander abftebenden roftrothlichen Streifen; Burgel und obere Dedfedern Des Somanges fcmarg, weiß gebandert; Schwung: federn hellgrau, weiß und fcmarg marmorirt. Die Flügel und ihre Dedfedern bat man mit Schmetterlingeflugeln verglichen, auf welchen braune, rofffarbene, belle und weißgraue Bidjadlinien laufen. Es ift fcmer, bas Gefieder Diefes außerft bunten und iconen Bogels ge-. 37 *

nau ju befdreiben. Die obere Schnabellade fcmargbraun, Die untere wie die Beine gelblich.

Sein Baterland ist Brasilien, Gujana, wo er an den Ufern der Flusse und Sumpfe einsam lebt, wahrscheinlich von Insekten und Burmern. Ginige Aehnlichkeit hat er mit den Rallen und Schnepfen.

Rahnfchnabel. (Cancroma.)

Schnabel langer als der Ropf, sehr niedrig und platt, viel breiter als hoch, schneidend, in der Mitte seiner Länge am breitesten; mit vorstehender Grathe, auf jeder Seite derselben eine Längsfurche; die obere Kinnlade hat die Form eines umgekehrten Lössels oder Kahns, an der Spige ein Nagel; die untere läuft in eine scharfe Spige aus. Nasenlöcher auf der Oberfläche des Schnabels, in der Furche liegend, schief, länglich, mit einer Saut vereinigt; die Sinterzehe inwendig eingelenkt, mit den übrigen in gleicher Sohe. Flügel mittelmäßig.

Der Rahnschnabel. (Cancroma cochlearia.)

Långe 21 3. Stirne, Wangen und Bors derhals weiß; am hinterhaupt bei alten Bözgeln ein sehr langer Federbusch aus zahlreichen breiten dichtstehenden Federn, welche bis zum Rucken reichen und schon schwarz sind; das obere Gefieder einfardig schon grau; Schwung: und Schwanzsedern weißlich; Weichgegenden schwarz; über den Oberrucken lauft eine schwarzlich karstanienbraune Binde; Brust, Bauch, Unterleib und Aftergegend rosiffarben; die untern Decksedern der Flügel weiß, mit einer schwarzen Binde. Die Kehlhaut blau, Beine schwarz, Ausgen braun.

Das Baterland Gujana, Capenne, an überfcmemmten Orten ober am Ufer ber Flusse.
Gefangen ober bose gemacht knackt er mit dem
Sefangen ober bose gemacht knackt er mit dem
Schnabel, der Federbusch erhebt sich wie eine
Kapuge, und er sturzt mit Buth auf den Gegenstand, der ihn zum Jorn gereizt hat. Meisstenkeils sist er auf Baumen, deren Lesse über das Wasser ragen und sturzt sich auf die Fische, welche an der Oberstäche des Wassers vorüberfreichen, mit großer Schnelligkeit, erhebt sich aber sogleich wieder, wenn er den Fisch gefangen hat, und fliegt an den vorigen Plas. Fische scheit überhaupt seine einzige Rahrung zu seyn.

Reiher. (Ardea. Cuv.)

Schnabel stark, gerade oder sehr wenig gebogen, tief gespalten; sehr spigig auslausend,
bei den meisten Arten fein gezähnelt, zusammengedrudt; Seiten der Laden scharf, obere
Lade gesurcht, gegen die Spige meist etwas ausgeschweift; die Schenkel halb nackt, oder bis
an die Läuse besiedert. Zehen, die mittlere sehr
lang, an der innern Seite kammförmig gezähnelt; die äußere an der Wurzel durch eine
Daut mit ihr verbunden, die hinterzehe gleichfalls mit der innern. Läuse sehr lang und dunn.

Sie halten sich an den Ufern der Meere, Geen und Flussen auf. Ihre Nahrung besteht meist aus Fischen, deren Laich, Froschen, Muscheln, Schnecken, Insekten und Wurmern. Oft nisten sie gesellschaftlich auf Baumen und Felssen. Bei den bekannten Arten bemerkt man auf der haut vier wollige Flecken, welche mit seinem Flaum bedeckt sind. Die alten Bogel einiger Arten, sind auf dem Rücken mit langen zerschlissenen Federn geziert; so tragen auch einige Federbusche.

Biele Reiher weichen in ihrem Jugendkleide von dem Kleide ihrer Eltern so ab, daß dadurch bedeutende Irrungen in Bestimmung der Arten entstanden sind. Die Geschlechter sind im Gestieder wenig zu unterscheiden.

Der graue Reiher. (Ard. cinerea. Ard. major.)

Die Sauptfarbe bes Gefieders ift ein blauliches Grau, Stirn und Scheitel find bei 21: ten weiß, am Sinterfopfe aber hangt ein Fe-Derbuich von langen zerichliffenen ichmargen Febern, welche mit einem ichwarzen Streif in Berbindung fieben, der auf beiden Geiten über Den Augen anfangt und durchgeht, und fo eine dreiedige Ginfaffung des weißen Scheitels bil= bet. Baden, Reble und ein Streif, der mitten über den Borderhals lauft, rein weiß, fcmarg geffedt; Die untern Geitenfebern bes Salfes laufen in 7 bis 8 3. langen fehr fcmalen und febr fpigigen gewundenen Febern aus, melde wie Stacheln über die Bruft herunter hangen, Schultern fdmarg; Schwungfedern dunkelichieferfarben. Dberhalb den fammetichwarzen Soulterfedern fieht ein weißer Fled. Um jungen Bo= gel ift der gange Dberfopf und ber Sinterhale grau. Lange bes ausgewachsenen Bogels über

3 F. Man findet fie in Guropa, Affen und Mordafrica.

Es ift ein icheuer, fluchtiger und milber Bogel, ber fich gefangen febr vertheidigt und gefährlich verwundet. Lebt an Fluffen und Geen. Stundenlang fiehen fie oft trage mit eingezo: genem Salfe im Baffer, bis an Die Anice. Be: merten fie etwas, fo verlangern fie fonell ihren Dunnen Sals und bleiben feif mit gerade auf: gerichtetem Schnabel fo fieben, bag man fie fur einen dunnen Pfahl anseben fonnte. Im Berbft ziehen die meiften fort. Die rauhe, weit tonende Stimme, flingt wie: fraid, fraid, Fruith. Jung aufgezogen lagt er fich gab: men, ift aber nicht fo intelligent, wie der Storch, ja gegen Unbefannte heftig und bofe. In fei: nem Salfe hat er eine außerordentliche Schnells Kraft, welche ihm Thiere zu haschen, fehr zu Statten fommt. Sonft ift er trage. Man jagte fie fonft, ale bobes Jagdvergnugen, mit abge: richteten Falken (Jagdfalke Falc. candicans. Siehe p. 16.) Die Reiherbaige murde durch einige Falfenier betrieben. Dem Gefangenen murbe ein Ring mit Datum, Sahrzahl und Rame des Landesherrn, ber fie hatte baigen laffen, an einen guß befestigt und bann wieder in Freis beit gefegt. Auch fegte man zuweilen fein ubelriechendes Fleifd, als Schaugericht, mit auf Die Zafeln der Großen.

Seine Sauptnahrung besteht in Fifden, Die wie einige behaupten burch feine Beine, mo er im Baffer fieht, angelodt merden follen. Bon 8-12 Uhr Bormittage fcheint er Diefe Fang regelmäßig zu betreiben. Im Commer hat er an Fifden Ueberfluß, Die aber den Binter uber bier bleiben, leiden oft große Roth. Rebenbei verzehren fie auch Frofche, Maufe, Maulmurfe, fogar Bogel, mas fie alles erft mit Schnabel: hieben todten, es Dann verfclingen, alle mit bem Ropf voran, wie- Die Fifche. Er niftet auf Gel: fenabfagen oder Baumen, in der Rabe von Gemaffern. Das Reft ift groß und platt, befteht aus farten und dunnen Reifern mit weichen Stoffen bededt. Ende Aprile findet man darin 3-4, 21 3. lange dunnschalige mit deutlichen Poren verfebene einfarbige blaggrune Gier. Die con den Eltern gartlich geliebten Jungen, werben anfanglich mit Rahrung aus dem Schlunde verforgt. Es find Refthoder. - Man ichieft fie auf dem Unffande. - Schaden Der

Rist Brut.

Der Purpurreibe. (Ard. purpurea. Linn.)

Ift fleiner ale ber worige, 34 3. lang, wo= von der Sals allein 19 3. Flügelbreite 61 3. Schwang 45 3. Der goldgelbe, oben braun: liche Schnabel mißt vom Mundwinkel bis zur Spige 6½ 3. Die Fris gelb. Beim alten Manns den ift Der Scheitel blaufdwarg, am Raden geschopft und mit 2 iconen ichmalen 643. langen fdmargen berabhangenden Federn geziert. Bom Federbufde geht ein fcmaler fcmarger Strich lange bem hinterhalfe berab bis zur Mitte bes Salfes; Die Rehle weiß, ein Strich vorn am Salfe herab roftrothlich weiß mit einer doppelten Reibe fleiner langlich fcmargen Bleden; ber untere Theil Des Dalfes junadft der Schultern fcon afchblau mit garten, fehr lang und fpig auslaufenden Kedern, und vorn mit langen fehr fomalen und fpiffigen Federn, melde uber Die Bruft icon herabhangen. Die Bruft dunkelpur= purbraun, in der Mitte mit großen fcmargen Fleden; Flugeldedfedern grau, roftfarben gemifcht, Steiß und Schwanz afcgrau. Das alte Beib: den fieht dem Mannden abnlid, der Federbufd ift furger. Der junge Bogel, wie er mit abgebildet, hat feinen Federbufch, fondern dafelbft nur rofibraunliche ftruppige Federn. Rofibraun ift bei ihm Die herrichende Farbe des Gefieders. Er lebt im fudlichen Guropa und Affen. Rommt auch an die Ufer der Donau, des Rhein, Main 2c. In Lebensart, Stimme und Betragen gleicht er den vorhergebenden febr, felbft in der Rah= rung.

Der kleine Reiher, Zwergrohr= dommel. (Ard. minuta.)

Diefer, Der fleinfte einheimifche Reiber, mißt 13 Boll in der Lange und 22 3. in der Breite, tommt eben nicht oft vor. Gein fpigis ger, 23. 2 Linien langer Schnabel ift nebft ben nadten Bugeln grungelblich, an ber Spige fcmars, Die Beben lang. Der Dberfopf bis gum Naden grunglangend fcmarg; Die Baden und Reble, vorzüglich aber ber Sals mit fehr biden offer : oder braunlichgelben Federn befegt, Die am Ropfe am langften und dichteften fteben, auf dem hintertheil des Salfes aber ftrauchig vont Salfe abstehen und ins violetaschgraue fallen. Der gange Ruden nebft dem Schwanze febr fcon grunglanzend fowarz. Auf den Seiten der Bruft

befinden fich mulftige braune mit fcmarg ge= fledten Federn, welche gewohnlich den gelblich meißen Flugelbogen deden, der Flugelruden blaß odergelb, das Uebrige der Flugeldedfedern nebft den Schwingen fcmarg. Bruft und Bauch oder: gelb mit braunen unordentlich zerftreuten ein: gelnen Langofleden; Die Schentel: und langen Uf= terfedern fehr blag odergelb. Bei naher Gefahr bildet Diefer artige Bogel, durch Ungiehen der Febern und Aufrichten bes Rorpers gerabe in Die Dobe gerichtet, eine fpigige Figur, wodurch er wie der große Rohrdommel feine Berfolger taufcht. Man findet ihn meift im fumpfigen Ge= bufch, in den finftern mit Beiden : und Erlen: gebufd vermachfenen Teichen, Graben und Quel: Ien. Leicht fleigt er an dem dunnften Geftrauche den Rohr = und Schilfstengeln hinauf und ber= unter. Geine Rahrung besteht in Frofden, flei: nen Fifden, Fifd : und Frofdlaich 2c. vorzug: lich aber in Bafferinfetten und deren Larven und Puppen. Mit eingezogenem Salfe fucht er wie der Reiher, feine Rahrung und ichieft dann bligfonell auf daffelbe ju, todtet es mit einigen Schnabelstichen und verschlingt es. Im Mai kommt er bei uns an und im October verläßt er uns wieder. Gein funftlos gemachtes Reft findet man im bidften Rohre, entweder auf um: gefnickten Rohrstengeln, auf einem hervorragen: den Erdhügel oder schwimmt auf dem offnen Baffer; wo es dann an Schilf angefesselt ift. Im Refte findet man 3-4 grunliche Gier, die Jungen die das Rest bald verlassen, merden mit Bafferinfekten aufgefuttert. Gefcoffen aber noch lebend wehren fie fich wie alle Reiher mit farken Schnabelhieben gegen Sunde und Menfchen, benen fie nach den Augen haden und oft fcmer vermunden. Suhnerhunde find icon guf Diefe Art geblendet worden. Ihr Fleifc lagt fich effen.

Onoré.

Unter Diefer Abtheilung begreift man Reis her, die mit dem Benehmen der vorigen, Die Gestalt der mahren und das Gefieder der Rohrdommeln vereinigen. Es gehört dabin:

Der getiegerte Reiher. (Ard. tigrina.)

Schwans und untere Dedfedern der Flugel ichwarzlich ichieferfarben, weiß gestreift; Sale, Ruden, Schulterfedern, obere und untere Dedzfebern der Flugel mit zahlreichen fowarzen und

rostgelben Bandern, welche am halse zickackartig, auf dem Ruden und den Flügeln aus Flecken gebildet werden; Unterruden, Burzel,
obere Decksedern des Schwanzes und Schenkel
schwarz, weiß gebandert; der untere Körper
weiß, mit schwarzen, gelblich eingefaßten Flekken; Schwungsedern schieferfarb; die Federn
am halse etwas lang, schmal und gewölbt.
Der Schnabel dunkelgelb. Die Lange des Bogels 9 Jost. Baterland: Paraguan, Brasilien,
Surinam 2c., wo man ihn einzeln, auch paarweise, nach Art der Rohrdommeln, in Sumpfen sindet.

Federbuschreiher

find folde, deren Febern des Unterrudens zu gewissen Zeiten lang und geschligt find. Bu den schönften Arten, von denen man diese Bezbern besonders benugt und wovon obiger Nasme, geboren:

Der kleine Silberreiher, Strauß= reiher.

(Ard. Garzetta. Linn.)

Ift 2213. lang und 43 3. breit. Schwang 4 3. Der Schnabel von der Spige bis in den Mundwinkel 43 3. lang. Die nadten Bugel schmugig dunkelgrun, die Augenringe gelb. Das Gefieder ichneemeiß; Die Federn des Unterhalfes lang, fomal, nadelformig zugefpigt, fie ban= gen fcon uber Die Dberbruft herab; Die bine tern Schulterfedern, die Zierde des Bogele, 74 Boll, auch mohl noch bruber, lang; von eigener Bildung; der Schaft wird namlich nach bem Ende ju haarformig dunn, und ift ju beiden Seiten mit einem lofen Bart geziert, deffen erstaunend feine, elastifche, bis 31 3. lange Fafern unzusammenhangend find und weitlaufig am Schaft figen, haarahnlich über die Enden Der jufammengelegten Flugel binbangen und bei der Bewegung der Luft anmuthig fpielen.

Das Mannden unterscheidet sich wenig vom Beiben, die schmalen Federn am Kopfe und am hinterfopfe find langer und unter den legtern zeichnen sich befonders 2 aus, die bei recht alten Bogeln eine Lange von 6 3. erreiz den sollen. Die Schulterfedern sind auch viel langer. Nur bisweilen ist er in Deutschland gesehen und geschossen worden. Defterer kommt er in Ungarn, an der Donau, im turkischen Gebiete, am adriatischen, schwarzen und casvie

fchen Meere vor. Als Zugvogel überwintert er in warmen kandern. An Lebensart und Sitzten gleicht er den andern dunnhalfigen Reibern. Am Eisleber Salzsee wurde einer vor mehreren Jahren von den dortigen Tischern beobachtet. Die schonen Schulterfedern dieses und des folgenden stehen in sehr hohem Werth, besonders bei den Turken, die sie tragen.

Der große Silberreiher, turki= fcher, indischer Reiher, Egrette. (Ard. alba. Linn.)

Seine Lange beträgt 43 Boll. Flugelbreite 72 3. Somang 71 3. Schnabel an 6 3. lang, fehr fpigig, wie beim vorigen; die fahlen Bu: gel und Augenfreise dunkelgrun; Die Gris gold: gelb; der Rachen bis hinter das Auge gefpal: Der Scheitel hat nach dem Raden bin etwas lange Federn, Die einen fleinen Bufc von etwa 1 Boll Lange bilden; Die Federn am Unterhalfe und an den obern Geiten der Bruft find groß, loder und bufdig und die legten Soulterfedern wie bei porigen eigen gebildet. Die Riele ber langsten find 16 3. lang mit eis nem lofen, dunnen Federbart, beffen Fafern 5 3. lang, fehr dunn und gart find, und weits laufig und unzusammenhangend an beiben Geis ten Des bunnen Rieles fieben, über ben Gomang weit hinaus ragend. Das gange Gefieder ift foneemeiß. Er ift in Deutschland febr felten und nur einigemal gefcoffen morden. Gud: amerita fcheint fein eigentliches Baterland gu fenn. Gitten und Lebenbart hat er mit vorigen gemein. Geine Schulterfedern ale Federbufche fteben im hochften Werthe unter allen Reiher: febern, ba eine einzige oft mit mehreren Du-. Katen bezahlt wird. Gin voller Federbufch wird mit 100 Carolin bezahlt. Bei ben Turfen merben fie in Gold gefaßt, mit Edelfteinen befegt, und ale hochfte Bierde von den Bornehmften, auf den Turbans getragen.

Rohrdommeln

haben ichlaffe und auseinanderstehende Salsfe: bern, wodurch ber Sals viel bider ericheint.

Der große Rohrdommel, Waffer= ochfe, Moodreiher. (Ard. stellaris, Linn.)

Der obere Theil des Schnabels dunkels braun, der untere fo wie die nachten Bugel

gelbgrunlich, Die Gris rothgelb. Der Scheitel glatt und blaufdmarg, Die Radenfedern giemlich lang, bufchig, fcmarg mit hellbraunen Spifen. Der Schnabel 3 und der Sals 12 3. Legterer theilt fich in 3 Rnien, in 3 gleiche Theile, modurch er ihn breifach gufam= men legen fann, mas indeffen megen ben lan= gen biden Febern, worin ber Sals eingehullt ift, nicht fo fichtbar wie beim gemeinen Reiher ift. Das fcmugig roftgelbe Gefieder hat un= regelmäßige Fleden und gidgadformige Quer= bander von fcmarger und brauner Farbe ge= bildet; Die Reble weißlich. Der Bogel mißt von der Schnabel : bis jur Schwangfpige 26% 300; Die Flugelbreite 452 3. Das gange Ge= fieder ift wie bei den Gulen weich. Lebhaftere Karbe und langere Salefedern zeichnen bas Mannden vor dem Beibden aus. Im Mars fommen fie gu und und verlaffen uns wieder im Geptember und October. Gie leben am Lage verftedt in großen Leichen, Geen und Bruden, Die feichtes Baffer haben, mo bichtes Rohr und Schilf madft, und mo er auch niffet auf einem Rohrhorft, mo er bas Reft von trodnem Rohr, Soilf und Reifig erbauet. Bo er Das Steigen Des Baffere befurchtet, an= fert er es mit einem hafigten Baden an. Man findet barin 3-4 fcmugig grunliche Gier, Die fie in 3 Wochen ausbruten. Die Jungen mer: Den bald aus dem Refte geführt, wo fie bann gefdidt an den Stengeln herum flettern, wie Die Blaufpechte, und dabei allerlei poffirliche Stellungen machen, wobei Jungen und 21: ten Die icharfen Rrallen fehr zu flatten tommen.

Die Nahrung besteht aus Fischen, Froschen, Mufcheln, Wasserinsetten und Mausen, die fie nach Art der Reiher fangen und verschlucken. Wird er von Menschen überrascht, zieht er den Sals zu einer erstaunlichen Kurze ein, richtet den Schnabel und den ganzen Körper senkrecht in die Sohe und macht sich so außerordentlich klein, daß man ihn für einen alten Pfahl, Stamm oder durren spisigen Schischusch halzten sollte. hierdurch entgeht er oft seinen Verzfolgern.

Den Rohrdommel findet man in ganz Europa und in Affen. Er ist trage, plump, gefangen vertheidigt er sich fehr mit ftarken Schnabelhieben. Zur Paarungszeit läßt er befonders feine Stimme horen, die man mit den Tonen: Uisprump ausdruckt, er foll dabei den Schnabel ins Wasser steden. Besonz ders ertont dieses Gebrull bei stillen Rachten,

wo man es & Meile weit horen fann. Bur Brutzeit hort man es befonders, es gilt als Gefang, dem brutenden Beibchen. Sein Bleifc fann gegeffen werden.

Machtraben (Nycticorax.)

haben die Form der Rohrdommeln, doch einen größern Schnabel, und die ausgewachsenen Mannchen haben einige schmale Federn am Hinterkopfe.

Der Nachtrabe, Nachtreiher. (Ard. Nycticorax.)

Die Lange beträgt 211 3., Die Flugelbreite 441 3., ber ausgeftredte bals 8 3. und hat 2 Rni: en, die unter den diden Salefedern verborgen find. Schnabel 34 3. lang. Die Gris bei bem Alten hodroth, Die Bugel ichmarg. Der Dberkapf bis ins Genid mit langen fahlblau und grunglangen: Den ichwarzen Federn bededt, welche fich im Affett fehr aufftreuben; über jedem Muge ein blaggelber Streif, Der fich vor der Stirn vereinigt. Um bin: tertopf beim Mannchen figen 3 fcneeweiße Nacken: federn, die langste 73. schließt die andern beiden in fic. Er tragt fie meift in einander gelegt. In der Ruhe feben fie fast wie ein bartlofer weis Ber Federfiel aus. Im Born richtet er aber Die fdmarzen bufdigten Ropffedern in Die Sohe und theilt die legtern auseinander, wo man fie alle drei deutlich fieht. Der Sale ift mit langen mul: Rigen Redern betleidet, welche auf dem Dbers halfe hellaschgrau etwas ine Biolette fallend, aussehen, an der Reble, Gurgel und Unterhalfe aber blaggelb. Ruden und Schulterfedern find fcmart, fahiblau und grunglangend, der Uns terruden, Steiß, und der abgerundete Schwanz afcgrau. Flugel rein afcgrau. Bruft, Bauch, Seiten, Schenfel und After ichmefelgelb, Die Seiten etwas afchgrau überlaufen. Die Farbe Der Fuge fleifdroth. Ausgestopft verliert bas Gefieder an Schonheit und die Fuße erfcheinen dann gelb. Die Rrallen find gefrummter als bei ben Borigen.

Das Beibden fieht weniger fcon, als das eben befdriebene Mannden, ift auch kleiner und die drei Radenfedern merklich furzer als beim Mannden. — Sie figen lieber auf Baumen, als die Reiher, doch nicht auf freiem Gipfel, fondern lieber auf dichtbelaubten Zweigen, um fich besser verbergen zu konnen. Bei Ueberrasch

ung macht er es wie der Rohrdommel, zieht fich zusammen und drudt fich dicht an den Baums schaft an.

In sumpfigem Gebusch, im Rohre und Beidengestrauche halt er sich am liebsten auf. Die Nahrung hat er mit den Borigen gemein. Um Tage halt er sich verstedt und geht meist in der Nacht seiner Nahrung nach. Er sommt im April und zieht im September und October wies der, beides geschieht zur Nachtzeit. Dabei erstont seine Stimme, die wie: frau oder koau, ka, ka, kraklingt, der Raben Stimme nicht unähnlich, daher obiger Name.

Riftet im fublichen Guropa in fumpfigem Gebuich. Sat 3 - 4 Gier von Farbe buftergrau. Sein Rleifc tann man effen.

S t o r ch (Ciconia.)

Schnabel lang, gerade, ftark, Laden aufeinanderliegend walzenförmig, spisig. Die Ras
fenlocher in die Lange, die hornmasse des Schnas
bels durchdringend, nahe an der Schnabelfirste
ein nachter Augentreis. Beine lang; drei Zehen nach vorn und diese mit einer haut bis zum
zweiten Gelenf verbunden, die hintere Zehe
lenkt auf der Flache der andern ein. Rägel turz,
platt, ohne Zahne. Sie bilden 2 Familien.

a) Mit befiedertem Salse. Der weiße Storch. (Ciconia alba.)

Das gange Gefieder rein weiß, Die Flugel fdwarz, Schnabel und Fuße zinnoberroth; Gris nugbraun. Seine Lange beträgt 3 g. 11 3. Flus gelbreite 7 F. Schnabel 8 3. Die Diffe Deffel: ben 11 3. Die Bunge furg, fcmal und fpigig, der Racen orangeroth, an der Reble ein fabler fdmarger ausdehnbarer Gad. Diefer Bugvogel findet fich in gang Guropa wo Gumpfe oder naffe Biefen find, in Dorfern und Stadten, auf Saufern, Rirden und abgeftorbenen Bau: men macht er fein Reft. In holland ift er in großer Menge. In Ufrita übermintern unfere Storde und fehren da, wo fie einmal geniftet, wieder. Im Marg fommen fie an und im Mus guft ziehen fie mieder ab, mogu fie fich vorber fcon in großer Menge verfammeln. Chemals wurde ihre Unfunft, ale Borboten bes naben Frühlings in einigen Stadten, durch die Stadt trompeter befannt gemacht. - Gie leben in

Monogamie, haben intellektuelle Fahigkeiten und etwas Ernftes und Gravitätisches in ihrem Benehmen. Zahme Storche werden im herbst von ihren abziehenden Rameraden zum Zuge aufgefordert, und wenn ste nicht folgen konnen, von den andern angefallen. Ihr Flug leicht, schon, schwebend, halb und Kuße gerade aus:

geftredt. Soon im hohen Alterthume murden Die Storde gleichsam beilig gehalten, Die Turfen betrachten ihn ale Freund und Lieblingethier Des Propheten. Much bei une wird er gern ge= feben, ja einige halten ihn fur einen Glude: bringer. - Ja man glaubte: bag gang alte Storche von ben Jungen gefüttert murben, mas aber falfc ift. - Der Stord hat ein fehr gut Gedachtniß; er lernt bald die Sandlungen und fogar Die Borte ber Menfchen verfteben, fernt gezahmt, wie ber bund, Die Sausbewohner fennen und zeigt bem einen Abneigung, bem an: bern Unhanglichfeit. Durch Rlappern mit Dem Sonabel drudt er alle feine Bedurfniffe und Leis benichaften aus. Jung fann man ihn an ben Ruf eines beftimmten Ramen gewöhnen. Ginem sahmen wurden von feinem Berrn Maitafer gefüts tert, Die er gern frag, man grub in ber Erbe nad Burmern und Infeften fur ihn, angelte Gifde in feinem Beifenn. Gobald nun jemand einen Baum fouttelte, (mas bei dem Maifafergeben gefdeben) oderInftrumente hatte, wodurch man ihm Rahrung vericafft, begleitete er Diefe Perfonen und gab deutlich fein Berlangen Dabei gu er: fennen. Diefer gabme Storch jog mit ben an: bern fort, fam aber bas folgende Jahr wieder. Da man ihm aber bas Sahr barauf ben Flugel gelabmt, um fo bie große Reife nicht machen au tonnen, murbe er eine Beitlang fehr unruhig, mas fich bann aber wieder legte. Bahriceinlich die Zeit hindurch, die jene gum Reifen gebraucht.

Die Storch: Eltern halten gute Zucht. Durch Rlappern suchen fie den Jungen ihren Willen mitzutheilen. Sie lehren sie fliegen, indem sie es ihnen vormachen. Die Ungehorsamen bestrasfen sie mit Schnabelhieben. Bisweilen wird aber ihr häusliches Glud gestört. So erzählen mehrere Beobachter, daß fremde Störche gestommen, über die Jungen hergefallen und selbst bei tapferm Widerstand der Alten, sie doch gestödtet håtten. Diese haben darauf Rest und Gesgend verlassen, ohne wiederzutehren. Daß sie bisweilen, wenn sie in großer Menge beim Juge sind, hier und da einen getödtet haben, auch

fo bie gelahmten Gefangenen, hat Erfahrung gelehrt.

Die Nahrung ber Storche besteht in Froichen, Cidechsen, Schlangen, Fischen, Mausen, Maulwurfen, Gewurmen und Insesten. In Der Gefangenschaft nehmen sie mit Abgangen aus der Ruche vorlieb.

Das Rest besteht aus Reisern und Aesten, inwendig ist Stroh, Grashalme und Moos, dann noch andere weiche Sachen, Lumpen, Garn 2c. Sie bessern das Rest jährlich aus, wodurch es oft so groß wird, daß Sperlinge an der Seite desselben nisten. Ja man legt ihm Räder auf die Dacher oben auf, worauf sie gern nisten. Im Neste sindet man 4—5 weiße Gier, welche abwechselnd vom Männchen und Beibschen binnen 28 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen lieben sie sehr und füttern sie über 2 Monat. Ansänglich holt nur eins der Gatten Futter, indem das andere Wache halt.

Der schwarze Storch. (Cic. nigra.)

Sft bie zweite einheimifche Urt. Lange 392 3.; Flugelbreite 7 F. 52 3., ber Schnabel 6 3. lang. Beim Alten Sonabel, Fuge und Augenfreis lebhaft roth; der Mantel nebft Somine gen fcmarg mit blau und grunem Stabiglange; Bruft, Bauch, After und untere Dedfedern der Mlugel, rein weiß. Gelten ift er in unfern Ge genden und nur etwa in der Buggeit, im April und September berührt er fie. Er lebt in ab: gelegenen und bufdreichen Gumpfen, flappent wie ber vorige mit bem Schnabel, und hat Rahrung und Lebensart mit ihm gemein, if aber icheuer. Rur in abgelegenen Gegenden auf hoben Baumen niftet er. Das Beibden legt 2-3 fomutigweiße Gier, etwas fleiner und rundlicher ale Die Gier Des meißen Storche. Sie leiden fein anderes Parden in ihrer Rabe.

b) Storde mit nadtem Salfe, Rropf:

Der Schnabel langer und dider als bei ben andern, aber von fehr leichter Maffe. Am halfe ift bei einigen ein Anhangfel, wie ein langer Rropf.

Der Marabu=Storch. (Cic. Marabu.)

Ropf nadt, rothlich mit fcmarzen Fleden; ber nadte Sale, fo wie der lange Sautfad, unten am Salfe blagroth, wenn der Bogel rubig ift, buntler, wenn er gornig ift; ber Schnabel grungelb. Alle obern Theile beim alten Bogel find Dunfel graublau; der Ochwang fcmarg: blau; Die großen Dedfedern ber Flugel und Die Schwungfedern ber 2ten Ordnung bleigrau; Der Unterleib weiß, und die Feberbufdel, melde unter dem Ramen der Marabus befannt find, glangend weiß; zuweilen auch ichiefergrau; Die Beine beim lebenden Bogel grau oder meiß: lid, weil die Ercremente und ein weißer Staub, ber an bem Gefieder des Bogele figt, fie bepu: bern; Die nadten Theile Des Salfes find nur bunn mit haaren bededt. Die Gris rein weiß. Die Sohe bes ftehenden Bogels beträgt 6 bis 7 R. Die Englander nennen ihn den Adjutant, Die Bewohner der malaifden Infeln aber Bane gu Gula. Er findet fich in gang Indien, in Java und Sumatra.

In Indien wird dieser Bogel so verehrt als die Ibise von den alten Egyptern. Daher spazieren sie auch in den Straßen von Calcutta ungehindert umher, werden von der Polizei gestäut und 10 Guineen zahlt der, wer einen Marabu tödet. Sie sind ungemein gefräßig, suchen die Abgänge aus den Kuchen auf und fressen Aas, wo sie andere Gäste davon zurücziagen; ja sie segen sich gegen Menschen zur Wehre. Ist es sehr heiß, so steigen sie in hohe Lustregionen, die sich die hise etwas gelegt hat, dann kommen sie wieder auf die Erde.

Die Bereitung der Federbufche, welche man Marabu beißt, beschäftigen Die Bewohner mehrerer Dorfer, wo man gange Beerden Dies fer Bogel, wie bei uns Die Ganfe halt. Diefe Redern find theuer, befonders wenn fie lang und rein weiß find; fie fteben auf dem Burgel und bilden die untern Dedfedern des Schwan: ges; es giebt auch graublauliche. Auch bie Fe: bern bes Argalafforches vom Genegal und bes Saarfopfffordes im indifden Archipel tonnen fubftituirt merden, find aber nicht fo fon. Die aber unter bem Ramen ber falfchen Da= rabufedern vortommenden Gederbufche find meift von ben untern Schwanzbedfebern bes Pfaues, bes Stordes und einiger andern frem: ben Bogeln.

Dieser gefräßige Bogel genießt alle Abgange aus dem Thierreiche. Da nun in Indien weder Thiere noch arme Menschen begraben werden, fo giebt es dort für ihn reichliche Nahrung.

Richt felten fieht man bort hunde, Marabus und Geier fich um einen menschlichen Leichnam ftreiten.

Jabiru. (Mycteria. Linn.)

Schnabel lang, fegelformig, platt, ffart, zusammengedrudt, spigig; obere Schnabellade breiedig, gerade, die untere dide aufwartslaufend; halb und Ropf mehr oder weniger an einzelnen Theilen nadt; vordere Zehen an der Burzel mit einer haut verbunden.

Der amerifanische Jabiru. (Myct. americana.)

Der Schnabel fdwarg; ber Ropf nur binten mit weißlichen, haarartigen Federn, fonft, fo wie ber bale nadt und glangend fcmarg; am Salfe ein breiter Ring mit Saaren dunn befest, und am hinterhaupt ein roth glangenber Fled; Die Saut am Salfe fclaff, Der Dber: forper weiß ohne Glang. Die Jungen und Das Beibden haben feinen rothen Radenfled. Die Lange Des Bogels betragt 4 F. 51 3. Saufig in Brafilien, mo er einfam ober pvarmeife auf überichmemmten Diefen, in Gumpfen und an fichenden Gemaffern lebt. Es ift ein fcheuer Bogel, Der Die Racht auf Baumen gubringt. Er flappert mit bem Schnabel wie ber Storch und lebt von Reptilien, Fifden und Infeften. Gein Fleisch foll man effen. In der Regenzeit ift er am fetteften.

Schattenvogel. (Scopus.)

Unterfcheidet fich von ben Storden nur durch einen zusammengedrudten Schnabel, des fen schneibende Firste nach der Based bin ausgetrieben ift, und durch die Nasenlocher, die fich in eine Rinne verlaufen, welche parallel mit der Firste bis an die Spige lauft, die etwas hakensformig ift. Nur eine Art.

Der umbrabraune Schattenvogel. (Scop. Umbretta.)

Den Namen von feiner Farbe, Geficht und untere Theile bes Korpers etwas heller; ber Schwanz am Ende mit einem breiten purpurbraunen Bande, und von der Wurzel bis gu Diefer Binde mit zahlreichen Heinern, abnlie chen, unregelmäßigen Binden; die Schwungfes bern duntler als der Ruden, mit Burpurglanz. Um Mannchen ein breiter, nach hinten flehender Federbusch, den Raden bededend, von der Fars be des Korpers; dem jungen Bogel fehlt diese Bierde. Im Lande der Kaffern und am Genegal lebt er; gehort aber zu den seltenen Bogeln.

Rlafffd) nabel. (Anastomus.)

Schnabel bid, sehr zusammengedrudt; die Laden in der Mitte von einander abstehend, aber an der Spige fich wieder vereinigend; die Rander gezähnelt; die untere Kinnlade zusammenz gedrudt, gegen die Mitte unten convex, die Spige gezähnelt. Die Nasenlöcher seitlich, in der Länge gespalten. Beine lang, dunn; die 3 vordern Zehen durch eine furze haut verbunden; die hinterzehe wie bei den Störchen eingelenkt; Rägel gekrummt und spigig. Schwanz kurz.

Der blättchentragende Klaff= schnabel. (Anast. lamelligerus.)

Solanter, aber doch fo groß als der weiße Stord. Der Schnabel groß und breit, gegen Das Ende flaffend. Die obere Lade am flaffens Den Theil mit feinen, fehr nahestehenden Quers blattden, mahricheinlich dazu Dienend, eine folupfrige Beute, wie Fifde, beffer halten gu tonnen. Diefer Schnabel ift febr fart, an feis ner Burgel etwas gewolbt und eine flumpfe Birffe bildend mit hornschichten bededt, Die fart in die Lange gefurcht find. Die Reble und ber Raum zwischen den Mugen und Schnabel nadt. Auszeichnend find an diefem Bogel die knorpeli: gen, breiten, ichwarzen, glangenden Blattden, melde Die Shafte aller Federn Des Salfes, Des Bauches und ber Schenfel verlangern. Gie find von berfelben Materie, wie beim fonneratifden Dabn, und gleichen fehr ben rothen Unhangfeln an ben Dedfebern ber Flugel bes Geitenschwan: ges. Alle Schafte ber Rudenfedern find eben: falls febr glangend mit metallifdem Glange, doch obne jene Blattden. Das gange Gefieder murde fcmarg ericeinen, wenn es nicht burch ben grus nen und purpurnen Schimmer und durch bie metallglangenden Schafte ber Febern erhoben murde. Die Beine find fowarg, ber 7 3. lange Schnabel borngrau.

Laufreiher. (Dromas.)

Schnabel langer als der Ropf, zusammengedrudt, gerade, sehr flark, etwas platt; die Burgel der Unterschnabellade mit flark von einanderstehenden Schenkeln. Die Rafenlöcher in einer tiefen Grube von der Geite und oben mit einer haut bedeckt, Rasenöffnung durchgehend. Beine lang, dunn, Laufe zusammengedrudt; die drei vordern Zehen bis zum legten Gelenk mit einer haut verbunden; Rägel platt, die hinterzehe frei. Flügel mittelmäßig groß, zugespigt. Rur eine Art.

Das Reiherchen. (Drom. ardeola.)

14—15 3. lang. Beim alten Bogel ift das Gefeber rein weiß; im Leben soll es einen roffenrothen Ueberflug haben, bei den Jungen mehr oder minder grau; vom Raden an geht ein schwarzer Streif, auf dem Ruden einen schwarzen glanzenden Fled bildend; beim Beibeden ift dieser mattschwarz. Einige Schwungses dern der 2ten Ordnung an der außern Fahne schwarz oder schwarzlich, so auch die größern Schwungsedern, so ist auch der Afterflügel weiß mit schwarzer Spige; der flarke Schnabel schwarz mit weißer Spige. Die Beine bleifarben.

Diefen Bogel trifft man in Rubien, Abufien nien, an den Ruffen des rothen und indifden Meeres.

Nimmerfatt. (Tantalus.)

Füße, Rafenlocher und Schnabel ben Storzen ahnlich, ber Ruden des Schnabels ift in beffen zugerundet und seine Spige nach unten gerichtet und zu jeder Seite leicht ausgeschnitten; ein Theil ihres Ropfes, bisweilen auch ihr hafs, find nacht. Die Seitenzehen find durch breite Baute verbunden, die hinterzehe fieht ganz auf dem Boden auf.

Der afrikanische Rimmerfatt. (Tant. Ibis.)

Geficht und Stirn nadt und roth, der Schnabel gelb, die Beine roth; Flügel und Schwanz schwarz, alle übrigen Federn weiß, rofenroth überlaufen. Die Schwungfedern schillern ins Goldgrune. Bei jungen Bogeln tift das

38 *

Gesieder weiß rostfarb überlaufen; der gelbe Schnabel hat eine schwarze Spige und die Beine sind grau. Die Länge des Bogels beträgt 3 F. 2 3. Man sindet ihn häusig in Senegambien, Egypten und Nubien. Die Egypter schäßen ihn sehr und nennen ihn Solleitel. Man hält ihn indessen mit vieler Wahrscheinlichkeit nicht sin indessen mit vieler Bahrscheinlichkeit nicht für den Ibis der alten Egypter. Es ist ein stiller träger Bogel, der nicht sche ist und leicht gefangen werden kann. Doch seines Rugens wezgen schont man ihn, indem er nach Ueberzschwemmungen Frösche, Schlangen und andere Reptilien verzehrt.

Löffler. (Platalea. Linn.)

Sie gleichen auch ben Storchen, allein ihr Schnabel von dem fie den Namen haben, ift lang, durch weg breit, erweitert und verplattet fich, besonders nach der Spise hin, in eine runde Scheibe, wie ein Spatel gestaltet. Die Masenlocher sind eisormig. Die tleine Zunge, ihre negartigen Beine, die ansehnliche Fingershaut, ihre zwei kleinen Blinddarme und noch mehreres stellt sie nabe an die Storche; indeffen benimmt ihnen die Erweiterung ihres Schnabels alle Araft, so daß sie nichts als im Schlams me nach Wasserinsekten muhlen und kleine Fische erhaschen können.

Der weiße Löffler, Löffelreiher. (Platal. Leucorodia. Linn.)

Farbe weiß; Lange bes Bogele 34 und Flus gelbreite 60% Boll; ber Schnabel 9% 3. lang. Die Form beffelben giebt Die Abbildung. In: wendig ift er ichwars, bat eine Menge feiner erhabener Linien, mit ber Linie feines Umfanges parallel und bicht neben einander hinlaufend, Dem einfachen Siebe einer englifchen Feile glei: dend. Die nadten Bugel, Augenfreise und Die Debnbare fable Reblhaut ift orangegelb, legtere lauft am Salfe 33 3. berab, Die Gris gelb. Die Beben haben Spannhaute. Die Rrallen fcmars, furg, rundlich, maßig gebogen und ftumpf zugefpigt. Im Genid und auf dem obern Theile des Sinterhalfes fteht ein fconer, foma: ler, berabhangender Bufch von fomalen, an Der Rante gerichliffenen, jugefpigten, weißlich roftgelben Federn, Die langften 62 3. Ropf und Sale find weiß, nach hinten gelblich angeflogen; nie breites, dunkelrofigelbes, an den Geiten ver-

waschenes Band umgiebt die Burzel des Salfes, ist aber vorn und hinten blasser als an den
Seiten, alles übrige Gesteder ist weiß, nur die
Kanten der Federn hin und wieder gelblich angestogen, der Schwanz zugerundet. Die Jungen
feben nicht so schon aus. Die Spigen ihrer
Schwungfedern sind schwarz, sie find kleiner, auch
feblen die Nackensedern.

Die Luftrohre des Manndens macht, nach: dem fie zwifchen den Gabelfnochen getreten ift, eine Biegung rudwarts, aufwarts, biegt fich dann wieder abwarts und tritt nun erft fich theilend in die Augen. Beim Beibchen findet

fich Diefe Biegung nicht.

Dieser Bogel lebt in Europa an den Mundungen der Flusse, am häusigsten ist er in Solland. Es ist ein Jugvogel, der sich auch in Afrika
sindet. Dieser Bogel ist nicht scheu, wird auch
leicht zahm. Das Fleisch der Jungen soll gut
schmecken. Sie fliegen sehr gut, eine Bellenlinie bildend, gehen im Schritt, den Sals dabei Sformig tragend. Rahrung: Fische, Frosche
und Conchylien. Gern halten sie sich an den
Rusten der Seen auf, in deren Nahe sie auch
nisten, meist auf Baumen, wo man 2—3 weiße
Eier, oft auch noch mit sehr verwaschenen, rostgelben Fleden findet.

Die Familie der Langschnäbler (Longirostres)

wird durch eine Menge Ufervögel, deren größere Anzahl das Geschlecht Scolopax bei Linne ift und noch durch andere gebildet. Alle diese Bögel haben fast die nämliche Gestalt. Sitten und selbst Farbenvertheilung, was ihre Unterscheidung erschwert. Sie charakteristren sich im Ganzen durch ihren dunnen, langen und schwachen Schnabel, der ihnen nur gestattet, im Schlamme zu wühlen, und darin ihre Nahrung, aus Würmern, Insekten ze. bestehend, zu suchen. Die verschiedenen Abweichungen in der Gestalt dieser Schnäbel dient zur weitern Eintheilung in Gattungen und Untergeschlechter.

Scolopax)

war bei Linne der große Stamm, den man nun auf nachfolgende Beife eingetheilt hat. 3bis. (Ibis. Cuv.)

Der Schnabel ziemlich did, an der Basis vierkantig; am Ropf oder selbst am halse ist immer irgend ein nackter Theil. Die außern Finger haben eine bedeutende haut an der Bassis, und der Daumen ift lang genug, um das mit auftreten zu können.

Der geheiligte Ibis, der Mumien= Ibis.

(Ibis religiosa.)

Ropf und Sale gang nadt und mit einer fcmargen haut bededt; bas Gefieder weiß, nur Die Spigen der Schwungfedern und Die ger: foliffenen Endigungen ber langen Schulter: federn find dinten ichwarg; Desgleichen Schnabel und Fuge. Beim jungen Bogel ift nur ber Raum zwifden Mugen und Schnabel nadt; Baden, Unterhals und Rehle find mit einigen fleinen weißen Federn bededt, fo daß die Saut noch Durchicheint. Auf bem Scheitel und am Maden fleben fie bichter und find langer, fo Dag, maren fie aufrichtbar, fie felbft einen Fes berbufc bilden murden. Man hat felbft eine Ibisfigur in Bronze gefunden, Die mit einem Feberbufch bargeftellt, einen jungen Bogel an= Deutet. Die Lange Des Mumien : Ibis ift 1 Fuß 93. Diefer Ibis ift haufig in Unteregypten, Rubien, Aethiopien und Genegambien. Man findet ihn einzeln oder in fleinen Gefellicaften, wo fie fic dann gang nahe an einander hal: ten. Um liebsten halten fie fich an Drten auf, welche neu überschwemmt worden, und mo es von fleinen Schneden wimmelt, die ihre vor= gugliche Rahrung ausmachen. In Egypten blei: ben fie nur mahrend der Heberschwemmungen Des Dils; find Diefe vorüber, etwa in der Mitte Suni, fo mandern fie nach Methiopien. Bruce bat querft gezeigt, Daß es Diefe Urt fen, melde Die alten Egyptier verehrten und nach dem Tode einbalfamirten. Die Araber nennen ihn Abu Sannes (Bafer Johann), auch Abu Men: gel. Biele Gelehrte, auch Cuvier, welche Sbis: mumien unterfucht haben, bestätigen Bruces Behauptung. Savigny hat Die Naturgeschichte und Die Mythologie Diefes This gefdrieben, fo Daß Das Dunfel bieruber aufgehellt ift. Mur Die Urfache, warum fie ihn gottlich verehrten, wird noch bestritten. Cuvier fand bei der Un: terfudung einer Sbiemumie Golangenfduppen

in ihrem Magen und Savigny fand nie Schlanzgenreste in bem Magen frisch erlegter Ibisse, Die Egyptier hielten ihn in ihren Tempeln, und es traf Lodesstrafe den, der einen Ibis tödtete. Der Ibis fam indessen jährlich zur Zeit der Ueberschwemmung nach Egypten und zeigte diese für das Land so wohlthätige Erscheinung an. Es war also ein freundlicher Bote der Segnung des himmels, der seine fruchtbarmachenzden Gewässer den Egyptern fandte, und nur als solch er wurde er verehrt.

Der Jbis fliegt hoch und schon, wobei er Sals und Fuße horizontal ausstreckt und dabei ein heiseres Geschrei horen laßt. Sie lassen sich nahe beisammen nieder, und muhlen oft stundenlang mit dem Schnabel im Schlamme, Schritt vor Schritt vorwärts schreitend, Rahrung suchend, die aus kleinen Conchylien, Wasserinssetten ze. besteht. Sie nisten in Aethiopien. Der Zeitpunkt, wenn die Gemässer des Riss zurücktreten, ist für die Jäger am gunstigten. Weinige werden indessen geschossen, meist in Schlinzgen gefangen.

Der braune Ibis ober Sichelschnabler. (Ibis falcinellus.)

201 3. lang. Flugelbreite 42 3. Der 54 3. lange Schnabel ift graugrun, vom langlichen Rafenloche an bis zur Spige, mit einer vertief: ten Rinne verfeben; Bugel und Augenlieder fahl, graugrunlich und blau eingefaßt, Gris duntel= braun. Ropf, Sale, Schultern, Bruft und Schentel duntel rothbraun; ersterer am duntel: ften mit purpurnem Glange; ber gange Man: tel nebft Steiß, abgerundeten Schwanzfedern und dem Bauche dunfel fahlgrun, prachtig purpur: und goldgrunglangend; fo auch die Un= terflugel. Das gange Gefieder ericeint in eini= aer Entfernung febr duntel, fast fcmarg. 3mi= fden der außern und Mittelzehe befindet fic eine betrachtliche Spannhaut, zwischen ber in= nern und mittlern eine fehr fleine. In der Jugend fieht der Bogel faft gang duntelbraun, unten belle, am Ropf und Reble fein weißge-Bei Gisleben, am Galgfee, hat man fledt. einzelne beobachtet in der Buggeit; auch in Polen, Ungarn, der Turfei, Italien, in der Comeis und am faspifden Mcere. Er murbe von den Egyptern verehrt und fommt auch als Mumie vor. Ariftoteles nennt ihn Icheras und Die Araber Sareig. Er ift fceu und flüchtig, sieht in Gefellschaften von 10 bie 40 Stud. Er babet oft bis an den Leib im feich= ten Baffer, um feine Nahrung, die in Insetten, zwei : und einschaligen Conchilien u. dgl. be-

fleht, ju fuchen.

Anmerk. Es gehört hierher auch noch ber rothe Ibis (Ib. rubra.) Der alte Bogel ift schalachroth, und nur die Schwungfedern haben eiz ne schwarze Spike. Er wird 24 3. lang. Baters land Brasilien. Er läßt sich leicht zähmen, und mit Brod, Eingeweiden der Fische und Fleisch erhalten; lebt mit auf dem Hühnerhofe, fliegt aus und kommt wieder, und soll sogar in der Gefangenschaft brüten. Er ließe sich also leicht zum hausthier mas chen. Seine Eier sind grün.

Brachvogel. (Numenius.)

Der Schnabel ift gebogen, wie bei dem Ibis, aber ift bunner, und feiner gangen Lange nach rund; bas Ende des Dberfchnabels über, ragt bas untere, und fpringt etwas barüber bervor nach unten. Die Zehen haben furze Membranen zwischen fic.

Der große Brachvogel, Sichelschnepfe, Reilhaken.

(Num. arcuatus.)

Die Lange beträgt 181, Flugelbreite 44 3. Der Schnabel 41 bis 51 3. bei gang Alten. Die Form bes an der Spige rundlichen Schnabels zeigt Die Abbildung. Die Gris Dunkelbraun; Ropf und Sale bleid gelbbraun, mit fdmargbrau: nen langlichten Fleden befchmigt, melde fic bis por die Bruft berumgieben, mo fie fleiner mers ben und fich verlieren, in den Geiten aber fic vergrößern. Ruden und Flugel braunlich fcmars, mit hellgelbbraunen gadichten Ginfaffungen. Die 3 großen Schwingen fcmar; mit weißen Schafe ten, auf der Fahnenkante weißlich; Bauch und Unterruden weiß. Der zugerundete 5 Boll lange Somang ift mit fdmargbraunen, meißen, gelb: braun überlaufenen Querftreifen burchzogen; Die Beine graublau. In unfern Gegenden er: fdeint er nur auf feinem Buge im Bradmonat, wo er fic durch fein fart und hellpfeifendes: flauit oder frauit bemertbar macht.

Seiner Natur nach ift er eine Bafferfcnepfe, fallt aber doch gern auf das Brachfeld, Leden und Grasanger, fehrt aber dann wieder jum Baffer gurud. Er liebt frei liegende Fluffe, Tei-

de und Feldlachen, Die feichtes Ufer haben. Un Diefen lauft und madet er nach Bafferinfetten und Goneden herum, befucht bann wieder abwechselnd die Felder, um auch hier feine Rabs rung: Regenwurmer, Infettenlarven ac. ju fus den. Dft ziehen fie in Beerden mit einanden, baden fie fich, und ichwimmen wie eine Ense über tiefe Stellen. Im August und September ift ihr ftartfter Bug, im April fehren fie gurud. Schwer find fie ju fdiegen. Regenwetter und Go witter, mobei fie fehr luftig find, verfundigen fie durd ihre Unruhe und durch ihr Schreien. 2Ber ib= re Stimme gut nachahmen fann, und fic dabei verftedt halt, tann fie leicht anlocken, und dann fchies fen. Gie werden auch auf dem Bafferichnepfenhem De gefangen. Mit Semmel, Gruge und Mild laffen fie fich erhalten. Ihr Fleifch ift wohlschmedend.

Gigentliche Schnepfen. (Scolopax. Cuv.)

Mit geradem Schnabel, die Nasenrinne fast bis zur Spige des Schnabels gehend, die etwas nach außen angeschwollen ift, um die Unterkinm lade zu überreichen, und in deren Mitte sich eine einsache Furche befindet. Dieses Ende ist weich und sehr empfindlich. Beim Eintrodnen nach dem Tode bekommt ihre Oberstäche ein punktirztes Ansehen. Die Füße haben keine Zwischenhaut. Ein eigenthümlicher Character dieser hierzher gehörigen Bögel ist ihr zusammengedrückter Ropf und die großen nach hinten gestellten Augen, was ihnen ein eigenes dummes Ansezhen giebt.

Die große Walbschnepfe. (Scol. rusticula.)

Dat ziemlich die Große des Rebhuhns, 12 3. lang und die Flügelbreite 25 3., der Schnabel 31 3. lang. hinterhaupt in Die Quere ge: freift; untere Theile mit gidgadartigen Querftreis fen. Alle oberen Theile roftfarben, gelblich ober grunlich, mit großen fcmargen Gleden; untere Theile roftgelb mit braunen Bidgadquerlinien; Somungfedern an der außern Fahne fomars und rollfarb gefdedt; Somanzende oben grau, unten weiß. Das Beibden ift etwas großer als das Mannden. Man trifft fie im Norden von Europa und Affen. Im Fruhjahr gieben fie nord: lid, im Berbft fudlich. Ihr Aufenthalt find feuchte Baldungen, nahe an Biehmeiden und Sumpfen, auf dem Buge vorzüglich in jungen Soldgen, die naffen und fumpfigen Boden ba-

ben, wo man fich auch befondere im Darg und October anftellt; in ber Abend : und Morgen: Dammrung machen fie fich ins Freie, Rahrung fuchend. Beim Aufjagen fcreien fie: fatid, tatid, im fanften beifern Tone. Der Begat tungeruf ift: Bu i p. Gobald die Abenddammrung anbricht fliegen fie auf Biefenplage, Biehmeiben, Gumpfe und tiefe naffe Meder, wo fie bei fin: ftern Racten einschlafen und fo nicht felten mit ben Lerchen : Rachtnegen gefangen merben. Dft Biegen fie in großer Menge und laffen fic in einem Bolge nieber, mo bann eine gute Sagb gemacht werden fann. Den andern Tag fieht man aber oft feine mehr. 3m marmern Guropa übermintern fie. Im Commer fuchen fie meift bobe, gebirgige Baldungen in ber Rabe von feuchten Biefen, Gumpfen oder Moraften. Gie gieben mit dem Binde, find fcheu und fonell im Bluge, laufen fcnell und feben fich Dabei nach allen Seiten um. - Ihre Rahrung beffeht in nadten Schneden, Regenwurmern, fleinen Infetten und beren Larven, auch mobl Sumpf: frautern.

Gie niften in Baldungen mit naffem feuche tem Boden und das Beibchen legt in eine mit etwas Geniffe ausgelegte Bertiefung meift 4birn= formige, fart bauchige, ziemlich große Gier, Die auf weißlichem Grunde mit großern und tleinern olgrunen und braunen, aber auch graus lichen vermaschenen Bleden, befonders am flum: pfen Ende, bestreut find. Zuweilen findet man fie foon im Marg. Die Mannden foreien gur Brutzeit: go, go, pidi, pidi, cri, cri, melde Zone zuweilen febr fcarf find. Bantend um Die Beibchen ichreien fie oft: fru, fru, fru. Die Brutzeit dauert 14 bis 16 Tage. Die Jungen laufen fogleich mit den Alten fort und werden mit fleinen Infetten, Burmern und Maden groß gefüttert.

Als belifates Wildpret fiellt man ihnen fehr nach und schieft fie auf dem Anstande, vor dem Hunde, fangt fie auch in gestellten Regen und Loufdohnen. Ihr Koth (Schnepfendreckt) giebt einen vorzüglichen Lederbissen.

Die Heerschnepfe, himmelsziege, Becassine. (Sc. Gallinago. Linn.)

Die Schafte der Schwungfedern alle braun. Die obern Theile schwarz und hellrostfarbbunt. Der Schnabel 3 3. lang, gerade, dunne, an

ber Spige breit. Scheitel fcmarg und roffgelb lid. Bon ber Stirne geht ein weißlicher Streif bis gur Mitte Des Ropfs, und ein anderer vom Conabel bis ju den Mugen. Reble weißlich; Sals und Bruft roffgelb, mit fleinen fomarg: braunen Langefleden. Geiten Des Unterleibes weiß mit fdwargen Querbandern. Ruden und obere Dedfebern ber Flugel fcmarg, rothbraun und weißgelb bunt, indem die Federn ichmarg und rothbraune Quer : und Bidgadbander tra: gen, Die Schulterfebern und größern Dedfebern Der Flugel aber an ber außeren Sahne weißgelb: lich; hinterruden roftgelb mit schwarzen Bidgadbandern, fo auch die obern Dedfedern Des aus 14 Federn beftehenden Comanges. Beine grunlid. Diefe Gonepfe hat Bachtelgroße, wird 8-9 3. lang und hat 18 3. Flügelbreite.

Die Sumpfe und naffen Wiefen Guropas und Nordasiens find ihr Aufenthalt. Es ift ein Zugwogel, der im Fruhjahr zu uns kommt und den herbst uns wieder verläßt. Einzelne Paare bruten auch bei uns. Am Tage liegen sie still, befuchen aber Abends und Nachts die offenen Pfugen, Moraste und Teiche. In morastigen, sumpfigen Gegenden sind sie gemein.

Sie find icheu und liftig und halten sich so lange als möglich verstedt. Kommt man ihnen aber zu nahe, fliegen sie blissichnell auf, hoch in die Luft und sturzen sich dann, wie die Waldsichnepfe, schnell und gerade auf die Erde. Wose bruten, schwingen sie sich oft bei schönen Frühlings: und Sommertagen himmelhoch in die Luft, und lassen im schnellen herabsliegen Tone hören, den medernden Ziegen nicht unahnlich, woher der Name himmelsziege. Bei ihrem nachtlichen herumziehen hort man die Tone: Rreckfeckfrah und zuweilen ein heiseres: Zipp.

Regenwurmer, fleine Concholien, Insetten und deren Carven sind ihre hauptnahrung. Das Rest sinder man in einem Erdloche unter Buschen oder auch auf Binsen und Seggenhügelchen. Ihre 4 Gier liegen auf trockenen Grashalmen; beren Gestalt birnformig, grungelblich, mittgroßen braunen Flecken. Jur Brutzeit schreit das Mannchen: Dick a, Dick a. Man schießt und fangt sie auf verschiedene Art ihres belikaten Bildvreis wegen.

Anmert. Noch gehören zu unsern einheimisschen Schnepfen: Die große Sumpfschnepfe (Scolp. major), die Moorschnepfe (Scolp. Callinula) :c.

Bogenschnepfe. (Rhynchaea.)

Schnabel langer als der Kopf, gegen das Ende etwas aufgetrieben; fehr zusammenges drudt, gerade, am Ende gebogen; beide Laden an der Spige gleich lang, leicht nach unten gebogen; die Rasengrube verlängert fich bis in die Mitte des Schnabels, die spige Zunge so lang als der Schnabel. Rasenlöcher feitlich. Beine von mittelmäßiger Länge. Die vordern Zehen ganz getheilt, die hinterzehe lenkt höher mit dem Lause ein, als die andern. Flügel breit.

Die madagascarische Bogen= schnepfe.

(Rhynch. madagascariensis.)

Sals und Kopf ichon roftroth, mit Ausnahme einer ichwarzen und weißen Binde, welche Die Augen umgeben und fich bann gegen ben Sals nach hinten wenden. Die Rudenfedern schwarzlich, grau gefaumt; die Flügelbedfedern haben auf graugrunlichem Grunde braune dichtstehende Augenfleden; Flügel und Schwanzsedern in die Quere rostroth gebandert, und diese Bander sind auf grauem Grunde schwarz eingefaßt. Die untern Theile sind weiß, an der Brust mit einer schwarzen Binde. Der Schnabel gelblich, die Füße hellgrau. Die Lange des Bogels beträgt 10 3. Sein Baterland ist: Madagascar.

Sumpflaufer, Sumpfwader. (Limosa.)

Schnabel sehr lang, mehr ober weniger aufwarts gebogen und der ganzen Länge nach biegs
sam, etwas niedrig und gegen die Spise abgeplattet; die beiden Laden der ganzen Länge nach
gefurcht, Spise breit, stumpf. Nasenlöcher seitlich, in die Länge gespalten, in der Furche eingefenst, durchgehend. Beine lang, dunn, weit über
die Anie nach; 3 Zehen nach vorne, 1 nach hinten; die mittlere Zehe durch eine Saut an die
äußere gebunden, welche hin bis zum ersten Gelent geht; die hinterzehe ist auf dem
Lauf eingelentt. Flügel mittelmäßig. — Sie haben eine doppelte Mauser, wobei sie ihr Gesieder
fehr verändern.

Der rostrothe Sumpfläufer. (Lim. (leucophaea Lath.) rufa. B.)

Der Schnabel etwas aufwärts gebogen, alle Schwanzsedern auf beiden Fahnen in die Quere gestreift, mit 8-9 Bandern; Ragel der Mittel: Bebe furz. Das Gefieder Dieses Bogels ift febr verschieden, indem es beim jungen Bogel, im Binter: und Dochzeitsleide fehr abweicht.

Beim jungen Bogel ift Kopf, Naden, Ruden, Schultern und Flügeldedfedern nahe am Körper dunkelbraun, mit einem isabellfarbnem Saum; Dedfedern der Flügel mit weißem Saum; Sals und Bruft und Seiten graurothlich mit tlebenen braunen Langeflrichen; die breiten Augenzbraunen, Rehle und Bauch weiß, und eben so der Burzel und die untern Dedfedern des Schwanzees, allein diese mit großen, lanzetsormigen, sowarzlichen Fleden; Schwanz mit breiten brausnen Zickzachbandern auf rothlichem Grunde mit weißer Spice, Beine grauschwarzlich; Schnabele

wurzel blaugraulich.

Bintervogel: Scheitel, Raum gwifden Muge und Schnabel, Baden und alle Theile Des Salfes hellgrau mit gahlreichen duntelbraunen Chaftstrichen; Die breiten Augenbraunen, Reble und Bruft rein weiß, obere Theile des Rudens, Schulterfebern und die bem Rorper gunachft lie: genden Theile ber Flugel afcgrau mit braum fomargliden Schaften und Schaftfleden; ber übrige Theil bes Rudens, Burgel und untere Dedfedern des Somanges weiß; Dedfedern der Blugel fdmars, weiß gefaumt; Schwang an ber innern Fahne mit ichmarglichen und weißen Bine ben, an ber außern fast einfarbig; alle aber weiß gefaumt; Schnabelmurgel purpurfarbig, blaulid, Spige fcmars, Augen braun, Beine fdmars.

Dochseitkleib. Scheitel und Naden hell rostroth mit braunen Langostreifen; Augenbrausnen, Rehle, Seite des Balfes und alle untern Theile ledhaft dunkelrostroth, an den Seiten der Brust und auf den untern Deckfedern des Schwanzes mit schwarzen Langosteden; Ruden, Schultern und die langen Deckfedern der Flügel schwarz, alle am Rande mit eiformigen rostsatzbenen Fleden; Deckfedern der Flügel graulich, weiß gefäumt; Bürzel weiß mit einzelnen großen braunen Fleden; Schwanzsedern schwarz, inwenzdig weiß marmorirt; alle Schwungsedern mit braunen und weißen Querbandern. Beim Beibzehen sind die Farben nie so lebhaft und wenizger bestimmt. Länge des Bogels 12½ 3.

Der Norden von Europa und Afien ift fein Baterland. In Danemark fieht man im August ungeheure Flüge Diefer Bogel. — Es ist ein gewandter, vorsichtiger und icheuer Bogel. Beim Geben trägt er den Kopf wagerecht, beim An-

nahern der Gefahr hoch aufgerichtet. Er lauft und schwimmt sehr gut. Angeschossen fluchtet er fich ins Wasser. Sein Schnabel dient ihm zum Tastorgan um Insekten, deren Larven, Burmer, Fischlaich nebst Conchylien aus Wasser und Schlamm zu suchen. Sein Fleisch schmedt vorztrefflich und ist im herbst am fettesten.

Sonberling. (Calidris. Cuv. Tringa. Temm.)

Schnabel am Ende niedergedrudt, die Nasenrinne sehr lang, der Schnabel meist nur so lang, als der Ropf. Die schwach gesaumten Zehen haben keine Haut zwischen ihrer Basis, und ihr Daumen berührt kaum die Erde. Ihre mäßig hohen Fuße und ihr verkurzter Buchs geben ihnen ein plumperes Ansehen, als die Sumpswader haben. Sie sind auch viel kleiner.

Der Zwergstrandläufer. (Calid. minuta.)

7 3. lang und Flugelbreite 151 3. Der fomache Schnabel 13 3., nach ber Spige etwas unterwarts gebogen, und die folbige Spige etwas übergefrummt. Dben auf dem Ropfe bellbraun mit fowarzen Gledchen, Dberhals und Baden bellrothbraun mit fcmargen Fled: den. Der Dberhals und Baden hellrothbraun mit afcgrau burdmifct und dunkelbraun ver= lofdenen Gledden burdftridelt. Reble weiß, über den dunkelbraunen Augen ein weißlicher Streif. Auf Ruden und Flugeln befinden fic fdwarze Federn, mit hellbraunen und weißen Ran= bern, auf dem Ruden braun und fdmarg meifige= randerte Federn mit untermengt. Bauch und Ufter: febern weiß. Die großenSchwingen braunfdmarg; bie Bruft meiß dunkelbraun geflecht; Beine fomarg. Die Alten find an Ropf und Sals mehr afdgrau, wie ausgebleicht, und die auf dem Ruden mit rofibraun gefanteten fcmarg: braunen Federn find ichmarger, und glangen ins Grune; Die Steiffedern Dunkelgrau mit bellafdgrauen Ranten; Dedfedern des Soman: ges gang weiß. Die Bruft nicht gefledt, Der Ropf nur ein wenig bleichrofibraun überlaufen, Der Sals unmerklich bleichbraun geftrichelt.

Die Zunge Dieser Bogel ift bis in die Mitte bohl, aledann rund zugespiet wie eine Madel, und so lang bis an die Schnabelsspie. Ihr hauptzug ift bei uns im Septemsber. Defters ziehen sie auch am Tage in großen

Seerden. Ihre Nahrung sind Wasserinsekten, die sie an freiliegenden Feldteichen, flachufrigen Klussen und Seen suchen.

Ihr Flug ist schnell, ihre Stimme: Tlui, ihr Angstgeschrei aber: drrriiter. Sie sind nicht scheu, und lassen sich leicht schießen, auch auf dem Wasserschnepfenheerde zu 15 — 30 Stud auf einen Ruck fangen. Ihr Wildpret schmedt sehr gut. Man kann sie als Studenvögel hakten, indem man sie an Nisch und Semmel gewöhnt, worunter man anfänglich Regenwürzmer mengt.

Unmert. Wir führen der Bollftaudigfeit me: gen, nach Guy. an: Arenaria, vorigen ähulich, nur fehlt ihnen ganglich ber Daumen. Die eine Urt ift Aren. Galidris, im Binter obenher graulich, untenher nud an der Stirn weiß, mit fchmarge lichen, weiß gescheckten Flügeln. Im Sommer ift der Körper braungelb und schwarz gefleckt und fei= ne Bruft schwärzlich punktirt. - Pelidna Cuv. Es find fleine Strandläufer, mit einem etwas lan: gern Schnabel als der Ropf. Die Ginfaffung ihrer Beben unmerflich. Der trillerude Strand: läufer (Pelid. cinclus.) Dbenher afchgrau, un= ten weiß, die Bruft grau gewellt. Im Sommer ift das Gefieder oben braungelb, fcmarg gefleckt. Rleine Schwarze Flede auf Borderhals und Bruft und ein ichwarzes Schild auf dem Bauche und ist aledann: Tringa alpina Gm.

Die Cocorli

untericeiden fich von vorigen nur burch einen etwas gebogenen Schnabel.

Der frummschnablige Strandlaufer.

(Triuga subarcuata)

ist im Binter obenher schwarzlich, graulich gewellt und untenher weißlich. Im Sommer hat er einen schwarz und gelbbraun gefleckten Ruden, graue Flugel und roftrothen Sals und Unterleib. Er fommt auch bei uns, boch felten por.

Falcinellus.

Der Schnabel der hierher gehörigen, ist ein wenig ftarter gebogen als der Gocorki. Es gehört hier ber:

Der Zwergstrandläufer. (Scolopax pygmaea. Linn.)

Die Lange beträgt 6 3. Flügelbreite 13% 3. Schnabel 1% 3., ift fehr weich und biegsam, an der Wurzel did, runzlicht, wird dann dunner, diegt sich etwas in die Sohe, nahe am Ende biegt er sich aber plöglich etwas unterwärts. Der Oberschnabel 3 Linien breit, hat auf jeder Seite eine tiefe Rinne, die sich am eirunden Nafenloche anfängt, und dis an die stumpfe Spige erstredt.

Diese einzige bekannte Art soll in Afrika zu Sause senn, ist aber auch bei uns geschossen worden. Jung ist dieser Bogel obenher grausbraun, weißlich gescheckt, am Kopfe heller; Untersite weiß, Hals und Brust braun gestrichelt, zwischen Schnabel und Auge ein weißer Streif. Alt: die Oberseite sieht warzbraun, die Untersite rein weiß; der Schwanz grau, die 2

mittlern Federn fcmarg.

Rampfhahn. (Machetes. Cuv.)

Es find mahre Strandlaufer im Betragen, Anfehen und Schnabel; bloß die Zehenhaut zwischen den außern Fingern ift ansehnlich wie bei den Sumpfwadern.

Der Streithahn, Rampfftrand laufer, Renomist, Hausteufel. (Tringa pugnax. Linn.)

Die Lange beträgt 11½ 3. Flügelbreite 24 3. Der Schnabel 1½ 3. lang, etwas mehr untermarts gebogen, als gerabe und kolbig zugespist. Schwanz abgerundet, die beiden mittlern Schwanzfedern in die Quere gestreift, die 3 aus fern immer einfarbig; das hochzeitliche Kleid der Mannden so vielfältig, daß man nicht 2 Individuen findet, die sich vollfommen gleich waren.

Das Winterfleid ift ziemlich bestimmt; das Sesicht besiedert; hinterhaupt und hals mit turzen Febern besetht; Rehle, Worderhals, Bauch und untere Theile rein weiß; Brust rostgelb mit braunen Fleden. Die obern Theile meistens braun mit schwarzen Fleden in der Mitte jeder Feber, welche rostgelb gesaumt ist; die längsten Decksebern der Flügel und die mittlern Schwanzsfedern braun, schwarz und rostgelblich gestreift. Das Weichen & kleiner; sein Gesieder mehr

graulich, der Borderhals felten rein weiß; Sona: bel fcmarz.

Das Gesicht des Mannchens wird zur Begattungszeit nacht, und mit gelben und gelbrothen Warzen bedeckt; am hinterhaupte entstehen lange Federn und an der Kehle ein schoner breiter Federkragen. Die Kragen sind gescheckt oder gestreift. Die hauptfarbe derselben
in unendlicher Mischung, sind: rostroth, grau,
schwarz, violet, braun, weiß oder gelb. Der
Schnabel orangegelb. Worin der Grund dieser
Farbenverschiedenheit liegt, ist unbekannt und
der Kampshahn ist einer von den wenigen Bogeln, welche im freien Zustande von einander
so abweichen.

Der Morden von Europa und Affen im Commer, im Binter Die marmern Gegenden Diefer Erdtheile, find fein Baterland. Auf feuch= ten Wiefen, in der Rabe großer Teiche, Geen und Gumpfe oder des Meeres fucht er feine Rahrung. In Solland ift er am haufigsten. Im Fruhjahre, wenn fie an ihre Standorter antom: men, zeigen fie ihre Zanksucht auf eine ausge= zeichnete Art. Bei einem Trupp findet man meift weit mehr Beibden als Maunden. Saben fie Die Brutplage gleich nach ihrer Unfunft bego: gen : fo fuchen fie auch einen trodnen Grasplag jum Streit, meift jahrlich benfelben. Auf Die: fem Plage, der etma 4-5 Quadratfuß groß ift, laffen fich 4-10 Mannchen nieder und be= fuchen ibn taglich. Un dem niedergetretenen und fothigen Grafe erkennt man ihn, fo wie an ben vielen ausgerupften Federn. Rampfend ftrauben fie ihre Federn, fellen ihre Rragen in die Sohe, richten fich gang gerade auf und fallen wie Techter auf einander aus, immer zwei gegen einander, und beißen fich berum, doch ohne blutige Bunden, ba die vorgehaltenen Fe= dern, wie ein Schild jeden Stoß bes weichen Schnabels abhalten. Rach bem Unrennen fehrt jeder wieder an feinen Plag gurud, fieht feinen Gegner unverwandt an, und fammelt feine Rrafte zu neuem Rampfe. Dies geht fast ben gangen Lag fort, bis fie ermudet find, und hungrig wegfliegen, Rahrung fuchen und wie: Derfommen. Allein felbft mahrend des Streites bemerfen fie drohende Gefahr, entfliehen fonell, fommen aber, ift fie befeitigt, wieder. Die pom Rampfplage abfliegenden Sahne begeben fic nun ju den Beibchen, die den higigen Ram: pfen zugefehen haben und geben nach ber Begattung wieder auf den Rampfplag. Rabert man fich dem Mefte ober den Jungen, fo lagt bas Beibden ein taderndes Angfigefdrei boren; Des Rachts und beim Buge fdreit ber Sahn nur und lagt gang beifer bie Tone: fact, tadt, fidt, tad boren. Gie laffen fich feicht gahmen und find artige Ctubenvogel, Tampfen auch in Der Stube. Anfange mirft man in ein flaches Gefaß mit Baffer fleine Rafer, Bafferinfeften und Regenwurmer, fobald fie biefe heraussuchen, fest man ein Gefoirr daneben voll eingeweichter Gemmelfrume, mit fleingehadtem frifden Bleifde und leben: Den Regenwurmern untermengt, und balb gewohnen fie fich gang an Gemmel; ja fie lernen eingequellten Baigen freffen. Bis gur Maufer: zeit ftreiten fie bestandig, und man muß, hat man mehrere, ihnen verschiedene Fregnapfe hin: fegen, fonft vertragen fie fich gar nicht. Gie fteden fic bann felbft eine Grenglinie ab, und fobald fie einer überfdreitet, beginnt ber Rampf. Die Beibden find Dagegen fehr fried: fertig. Mit Gintritt Der Mauferzeit boren Die Rampfe auf, Das Bluthenleben ift vorbei, Die Drufen am Ropfe trodnen ein und verschwin: Den, und ihre Stelle erfegen Federn und Die Salefrause macht furgen Federn Plag. In Der Gefangenicaft betommen fie feine Diefer Bierden wieder. - Rafer, Bafferinfetten, fleine Schneden und Regenwurmer machen ihre Saupt: nahrung aus. - Bahricheinlich leben fie in Bielweiberei, Die Mannden bruten nicht. -Das Reft findet man meift auf Biefen, worin 3-4 birnformige Gier von fast 2 3. Lange, gefunden werden, beren Grund graugrun oder gelbgrau ift, mit vielen braunen, bald dunt: Iern, bald hellern, bald mehr rothbraunen und olfarbigen Bleden und Comigen ungleich überfaet, welche am ftumpfen Ende ftarfer find. Das Beibchen brutet treu. - Ihre Feinde find Reiher, und andere Raubvogel, Raben, Mopen zc. Gie find fcmer gu fchiegen. Muf den Rampfplagen fangt man fie in Schlingen. Ihr Rleifd ift besonders im Berbft vortrefflic.

Anmerk. Wir führen aus obigem Grunde noch folgende Gattungen an: Hemipalama, beren Zehen vorn halbe Schwimmhäute haben. Tring. semipalmata. Obenher weiß, schwarz und rostgelb gestedt: Bauch, Steiß und ein Streif über dem Auge weiß; Rüden und Oberseite des Schwanzes, so wie auch Schnabel und Küße schwarz. Schwingen schwarzweiß gebändert. Baterstand Amerika. — Eurinorh ynchus. Wilson. Unterscheidet sich durch einen plattgedrücken,

am Ende verbreiterten Schnabel, faft wie der des Löffelreihers. Rur eine Urt. Eurin. gryseus, eis ner ber feltenften Bogel, indem man bis jest nur ein einziges Individuum tennt; obenher gran, un= tenher meiß. - Phalaropus. Briss. Rleine Bogel mit etwas platterm Schnabel als ber Strand: läufer, ber übrigens Diefelbe Proportion und Rins nen hat. Die Behen mit fehr breiten Membranen, wie bei ben Wafferhühnern eingefaßt. Die eine befannte Art: Phal. fulicaria, hat einen für Diefe Familie fehr breiten Schnabel. Im Winter obenher afchgrau, am Ropfe und untenher weißlich, ein schwarzer Streif im naden. Dann ift es Phal. gryseus. Im Sommer Schwarz, obenher braungelb, untenher roftroth geflammt; in allen Stleidern mit einer weißen Binde auf dem schwärzlichen Glus gel. Dann ift es Phal. rufus. Bechst. 3ft in Europa felten. - Steinmalger (Strepsiles.) mit etwas niedrigen Beinen, furgem Schnabel und gang freien Beben, wie die achten Strandlaufer. Die Nafengrube geht nicht bis jur Balfte bes fagelformigen jugespitten Schnabels. Der Daumen erreicht taum den Boden. Sie bedienen fich ihres Schnabels, Steine umgutehren um Burmer barun: ter ju fuchen. Gine Art: Str. interpres mit fcmarg und roftfarbigem Mantel, weißem Ropf und Bauch, ichwarzer Bruft und Baden. In ber alten und neuen Belt, an Geefüffen und fandigen Ufern ber Fluffe.

Bafferläufer. (Totanus.)

Mit einem dunnen, runden zugespigten, festen Schnabel, bessen Nasenrinne nicht über die Salfte der Lange geht und dessen Oberkinnslade sich nach der Spige hin ein wenig frummt. Sie haben hohe Beine; ihr Daumen berührtnur sehr wenig den Boden; zwischen den au gern Zehen eine deutliche Saut. Die Arten has ben ein weites Baterland.

Der grunfußige Bafferlaufer. (Totan. glottis.)

12½ 3. lang, Schnabel ftark, an der Burzel ftark zusammengebrudt, boher als breit; die untern Dedfedern der Flügel gestreift; Füße grünlich. Raum zwischen Augen und Schnabel, Reble, Mitte der Brust, Bauch, alle untern Theile und die Mitte des Küdens rein weiß; Ropf, Baden, Seiten des Halfes, Borderhals und die Seiten der Brust mit braungrauen 39 *

Langeffreifen auf weißem Grunde; Federn bes Dberrudens, Schultern und Dedfedern ber Rlugel braunfdmarglich, jebe Feder mit breitem roftgelbem Saum; Spige ber Schwungfedern weißlich, Conabel braungraulich, Beine gelb: grun. - 3m hochzeitlichen Rleide, Scheitel und Raden ber Lange nach fdmarg und weiß geftreift; um bie Mugen lauft ein weißer Rreis; Geficht, Reble, Borderhale, Bruft, Dberbauch und Geiten rein weiß mit fcmarglichen einfor: migen Fleden befaet, welche in der Mitte bes Commers febr gablreich find; ber ubrige Theil bes Unterleibes rein meiß; Dberruden und Coultern tief fdmars, die Rudenfedern weiß gefaumt; auf den Soultern fiehen am Rande Der Federn 3 oder 4 weißrothliche Flede; Die beiden mittlern Somangfedern graulich mit braunen Zidzacquerlinien. Baterland Guropa und Rordaffen an Geen und vom Baffer über: fomemmten Stellen. In Deutschland im Mu: guft und September an den Ufern der Fluffe, Geen und Teiche. Es ift ein foneller, gewand: ter und icheuer Bogel. Die Stimme ift hell, fart, pfeifend : tgia, tgia, fid. Rahrung: fleine Fifche, Die er nach Art ber Reiher fangt, Rifd: und Froidlaid, fleine Condylien und Infetten. Er ift fdmer ju fdiegen. Gein fdmade haftes Fleisch ift im Berbft am fetteften.

Anmerk. Lobipes. Guv. haben die Füfe mit dem Phalaropus gemein aber den Schnabel der Totanus. hierzu gehört Lob. hyperboreus, dieser kleine Bogel ift oben grau, untenher
weiß, an den Schulterfedern röthlich angestogen,
und hat zu den Seiten seiner weißen Kehle eine

breite roftrothe Ginfaffung.

Strandreiter, Stelzenläufer. (Himantopus.)

Schnabel lang, dunn, walzig auslaufend, an der Burzel platt, an der Spige zusammenz gedrückt; Schnabelladen bis zur Salfte ihrer Lange seitlich gefurcht. Nasenlöcher feitlich, liznienförmig, lang. Beine fehr lang, dunn, biegfam; 3 Zehen nach vorn, die mitstere an die äußern durch eine breite Saut verbunden, an die innere nur durch ein hautrudiment. Nazgel sehr klein und platt. Flügel fehr lang.

Der schwarzflügelige Stelzen= läufer.

(Himant. melanopterus.)

Geficht, Bruft, Sals und alle untern Theile rein weiß, an Bruft und Bauch rofenroth über: flogen, Sinterhaupt und Raden fcmarg ober ichmarglich, mit einigen weißen Fleden. Bom Raden gieht fich ein fcmarger Streif am binterhalfe herunter bis auf Die Schultern, mo ein weißer Querstreif als Halsband diesen Streif vom Tieffdmargen bes Mantels trennt. Beim jungen Bogel fehlt dieser schwarze Streif; Mantel und Flugel an Alten tieffdmarg mit grunem Schimmer, Schwang grunlich; Schnabel fcmarg; Mugen farminroth. Beine roth. Lange von der Schnabelspige bis zum Schwanze 14 3. Softe des flebenden Bogels vom Fuß bis jum Gdeis tel 18 3., Die Beine allein meffen 94 3. Ba= terland : Die marmern Theile von Guropa, Affien und Rordamerifa. Er ift fcheu, lauft fcnell aber madlig und madet tief im Baffer herum. Beim Fliegen ftredt er die Beine lang binten Rahrung: Gewurme, Bafferinfetten' Raulquappen zc. Gein Fleisch foll gut ichmeden.

Sábelích nabel. (Recurvirostra.)

Schnabel fehr lang, dunn, fcmach, feiner ganzen Lange nach platt; die Spige fehr dunn, spigig, biegfam, nach oben sich biegend; die obere Lade an der Oberfläche gefurcht, die untere ist es an den Seiten. Nasenlöcher auf der Oberfläche des Schnabels, linienförmig, lang. Beine dunn, lang; die vordern Zehen durch eine ausgeschnittene haut verbunden, die hinterzehe nur rudimentar hoch am Laufe eine gelenkt. Flügel spigig.

Bie die Abbildung zeigt, haben fie eineganz eigenthumliche Bildung. Der schlanke Korperzbau und die hohen Fuße gesellen fie den Sumpfvogeln bei, die Schwimmfuße aber machen fie zu Schwimmvögeln. Die eigenthumliche Schnabelbildung erlaubt ihnen, nur kleine kaum sichtbare Insekten zu kassen, die sie mit ihrem Schnabel, der als Tastorgan erscheint, im Schlamme, wie ihre andern Nahrungsmittel geschickt zu fühlen und zu kassen im Stande sind. Um Ufer des Meeres oder falziger Gewässer, bei den Ebben sindet man sie besonders da, wo viel Schlamm ist. Auch besuchen sie die Sumpfel des süßern Bassers. Sie wandern

paarweife. Ihr Flug ift fcnell und anhaltend. Man fennt vier Arten.

Der blaufüßige Sabelschnabler. (Recury. avocetta.)

Långe 17½ 3. Die Kopfplatte, der hintere Theil des Halses, die kleinsten und größten Schultersedern, Decksedern der Flügel und Schwanzssedern nebst dem Schnabel schwarz, das andere Gesieder rein weiß. Iris rothbraun; Beine graublau. Man trifft sie in holland, an den Ufern der Nord: und Ostsee, häusig in Ungarn, Italien 2c. Es sind Zugvögel. Sie sind schwer zu schieben. In dem kunstlosen Reste sindet man etwas birnformig gestaltete Eier 2—3 an der Zahl, von schmußig graugelber Grundfarbe mit verschiedenen schwarzen Flecken über die ganze Schaale verbreitet. Das Fleisch wohlschmeckend.

Die fünfte Familie Macrodactyli

bat sehr lange Zehen und Füße, zwedmäßig auf Sumpfgräser zu gehen und selbst zu schwimmen. Der an den Seiten mehr oder weniger zusammengedrückte Schnabel, verlängert oder verfürzt sich je nach den Geschlechtern, ohne jedoch zu der Dunne und Schwäche der vorhergehenzden Familien zu kommen. Ihr Körper ist sonderdar zusammengedrückt, durch das schmase Brustbein bestimmt. Ihre Flügel sind mäßig lang oder auch kurz, daher der schwache Flug. Mie haben einen sehr langen Daumen. Man theilt sie in 2 Stämme, in solche mit bewasseneten Flügeln und in solche mit unbewassneten Flügeln.

Jakana. Spornflügel. (Parra.)

Schnabel von der Lange des Ropfs, gerade, dunn, zusammengedrudt, gegen die Spige ets was aufgetrieben, an der Wurzel platt, in die Stirne eingreifend, wo fie eine nachte Schuppe oder aufstehenden Kamm bildet. Nasengrube lang, die Nasenlöcher feitlich gegen die Mitte bes Schnabels vorgerudt, offen, durchgehend. Beine lang, dunn, Zehen ganz getrennt, oft übermäßig lang; Nägel gerade, der Nagel der Dinterzehe länger als die Zehe selbst. An den Flügeln haben sie einen Sporen.

Der braune Sporenflügel. (Parra jacana.)

Lange 10 3. Ropf, Reble, Sals und alle untern Theile fcmarg violet; Die obern Theile faftanienbraun; die großen Ochwungfedern grungelb. Un der Burgel des gelben Schnabels fieben 2 Kleischlappen, und an ber Stirn ift die Saut in 3 Lappen getheilt. Fuße graugrunlich. Der Sporen am Flugel gelb. Baterland: Brafilien. - Gie laufen mit großer Schnelle über Die breitblattrigen Bafferpflanzen meg. Gie halten fich paarweife gusammen und durch Bufall getrennt, rufen fie fich gleich mieder. Rach ber Regenzeit fieht man fie in den Gumpfen und am Ufer ber Teiche. Gie fampfen fich oft mit einander besonders zur Paarungszeit, mobei fie fich der Flugelfpornen bedienen. Gie find fdeu und fdmer ju fchießen. Ihr Gefdrei bort man weit. Nahrung: Infeften und Burmer. Die Gier follen fie auf Die Blatter einer Baffer= pflange legen; Die 4 Gier find ftrohgelb, mit fdmargen Strichen und Fleden oder marmorirt.

Der Jakana mit großem Ramm. (Parr. gallinacea.)

Etwas größer als voriger. Die hautigen Anhänge des Schnabels sind fehr entwidelt, wie die Abbildung zeigt. Diese Kämme und die Haut in der Rasengrube und 3 des Schnabels sind schön rothgelb; die Schnabelspige schwarz. Der Scheitel und eine lange Binde, welche über den Nachen herunterläuft, der Oberrücken, die Brust und die Seiten des Unterleibes schwärzlich purpursarben; Rücken und Flügel olivenbraum mit Bronzeglanz; Baden, Seiten des Halses und der Borderhals goldgelb; Unterleib, Bauch, Schenkel und untere Decksehrn des Schwanzes weißgelblich; Beine gelbgrünbläulich. Bater; land: Eelebes, Amboina.

Ramifdhi. (Palamedea.)

Schnabel furz, konisch, conver, gerade, aber an der Spige ftark gebogen, der ganzen Lange nach zusammengedrückt; obere Schnabel lade gewölbt, die untere kurzer, stumpf; Rasfengrube groß. Kopf klein, nur mit Flaum bez deckt. Naseniocher von der Schnabelwurzel entsfernt, seitlich, eiformig, offen; Nasengrube mit einer nackten haut bedeckt. Füße kurz, dick; Zehen sehr lang; die hinterzehe nicht vorstehend

und den Boden berührend; Die innere Behe mit einem furgen hautrudiment, Die außere Dage: gen burch eine breitere Saut mit ber mittlern verbunden. Ragel fpigig, an der hinterzebe lang, faft gerade. Flugel groß; am Rande ber Flügel 2 Spornen.

Der gehörnte Ramifchi, Anhima. (Palam. cornuta.)

Gleicht in der außern Form dem Truthahn, ift aber noch dider und fleischiger. Sale, Ruden, Bruft, Flugel und Schwang find bei alten Bo: geln fcmarglich ichieferblau, mit einigen grau: licen Gleden, Der Bauch weiß, Die untern Ded: federn der Flugel graurothlich; der Ropf mit Hleinen, weichen Flaumen bededt, weiß und fomarglich gemifcht. Auf dem Ropfe fieht ein ge= rades dunnes born; an feiner Burgel ift es mit einer Scheide, wie mit einem Federfiel, umgeben. Die Dunne Spige frummt fich etwas nach vorn um. Die beiden Spornen an ben Rlugeln find dreiedig, wie Rofendornen, feit: lich platt und ichneidend, fart und fpigig, der untere ift furger und weniger bid. Gie fieben am Flügelrande. Die Saut der Fuße negformig und ichwarg, Der Schnabel ichmarglich, Die Augen groß, ichwars vorspringend. Lange Des Nogels 3 Fuß.

Baterland: Die überfcwemmten Biefen von Gudamerita. Ift fast immer auf der Erde, geht nicht in dichte Baldungen und figt nur fur Augenblide auf Baumen. - Er ift fcheu und vorfichtig, und lagt fich fdwer antommen. Jung eingefangen lagt er fich gut gahmen, lernt feinen Berrn fennen und fann mit den Buhnern ergo: gen merden. Außer der Paarungezeit leben fie Ihre Nahrung foll in in fleinen Truppen. Rrautern und Rornern bestehen, mahrscheinlich auch in Infekten. Ginmal gepaart verlaffen fic beide Gatten nicht mehr, und fommt einer um, fo trauert der andere lange, und halt fich noch lange in Der Gegend auf. Pifo fagt, daß fie ein badofenformiges Deft am Fuße eines Bau: mes bauen follen. Das Beibden legt 2 Gier pon ber Große der Ganfeeier im Januar und Sebruar. Die Jungen folgen ber Mutter bald nach. Das Fleisch der Jungen ift fowart, foll aber gut ichmeden, das der Alten hart und un:

schmackhaft.

Chaja. (Channa, Illg.)

Schnabel furger, ale der Ropf, fonifc, conver, etwas gewolbt an ber Spige gebogen; an ber Schnabelmurgel fleine Federn; Bugel nadt. Rafenlocher oblong, offen, durchdringend. Fuße bunn, doch fart; Beben lang, burch Saute verbunden; hinterzehe furg mit fast geradem Ragel. Un den Flugeln 2 bornenartige, fcarfe Spornen.

Der graue Chaja, Birtenvogel. (Channa chavaria.)

Die Lange 2 F. 6-8 3. Gin Bufchel fan: ger und zerschliffener Federn bilden am hinter: baupt einen fpigigen unbeweglichen Federbufch; der Scheitel und Federbusch grau; Baden und Sals mit furgen daunenartigen Federn bededt, Die Baden hellaschgrau, der Borderhals weiß: lich, der hinterhals afcgrau. Unter Diefer Stelle lauft ringe um den Sale ein nadter ro: ther Ring und unter Diefem ein vollfommen rundes Saleband von weichen, fomarglich ichies ferblauen Federn. Der gange Unterhals vorn und hinten, Bruft und Bauch hellaschgrau, oder bleigrau. Mantel, Ruden, Dedfedern der Flu: gel und Schwang fdmarggrau; an der Achfel und am Rande ber Flugel fteben weißliche Fe-Dern; Die Beine find rofenroth ins Grauliche giebend; Schnabel fdmarg, der nadte Augen: freis und die Bachshaut an der Schnabelmur: gel roth; Gris braun. Die Spornen an den Blugelrandern find fart, feitlich platt, dreiedig, an ben Seiten fast ichneidend, fpigig und hart, ber obere großer als Der untere. Der Unterbaud heller.

Man findet fie einzeln, paarmeife, auch in gablreichen Truppen an beiden Ufern des Pla: taffromes und einigen von den Bohnungen ent: fernten Theilen von Brafilien und Paraguan, in offnen, trodnen, auch überfdwemmten Ge: genben. Ihr Gang ift gravitatifc. Gie geben oft ine Baffer, fomimmen aber nicht. Jung aufgezogen, werden fie fehr gahm, wie die Saus: bubner, lernen die Sausgenoffen fennen und laf: fen fich von ihnen gern fcmeicheln. Ihre Stimme, Die fie bei Tag und Racht ertonen laffen, ift laut, fdarf und helle. Das Mannden fdreit: daja, bas Beiboen: chajali. Gie antworten fic Damit gegenseitig. Dicht felten figen fie auf

dem Gipfel der hochsten Baume. Sie steigen wie die Geier hoch in die Luft, entschwinden kreisend dem folgenden Auge. Es sind friedferstige Bogel. Die haut sitt fehr loder am Korper, so daß sie aufgeblasen werden kann. Dies thut auch der Bogel bisweilen, was ihm dann ein plumpes Ansehen giebt.

Seine Rahrung besteht aus Arautern und Samereien, baber frift er auch in ber Gefanzgenschaft mit den Suhnern. Sie leben in Ginzweiberei. Man halt sie bei Suhnern und Ganzfebeerden, die sie muthig selbst gegen Geier vers

theidigen follen.

Unmert. Megapodius, ift ein erft neuer: lich auf Reuguinea entdedtes Geschlecht, mit ge= wölbtem, etwas jufammengedrüdtem Schnabel, wo: von die häutigen Rafenlocher fast die Salfte ein: nehmen, mit farten, ziemlich hohen, gefchilderten Füfen , langen Fingern und Daumen in große etwas platte Ragel endigend. Ihr Schwang ift furg, Die Augenfreise nadt, und ihr Flügelgelent zeigt einen fleinen Soder, als eine Spur bes Spornes der Ra: mifchis. Gie haben eine furze Bebenhaut zwifchen den außern, und eine etwas größere gwifden ben innern. Gie legen verhältnigmäßig fehr große Gier. Die folgende Art von der Große eines Rebhuhns legt ein Gi, fo groß wie das von einer Gans. Meg. Duperreii, gehaubt, mas wie der hirtenvogel, afchgran, mit braunen Glügeln und nach hinten fpis ausgehender Federhaube und weißen Fugen und Schnabel versehen ift.

Rallus.)

Schnabel etwas langer als ber Ropf, bunn, gerade, ober nur wenig gebogen, an der Burzel platt, an der Spige walzenformig; obere Schnabellade gefurcht. Nafenlocher feitlich, in die Lange gespalten, in der Nafengrube liez gend, durchgehend, zur Salfte mit einer Saut bedeckt. Beine lang, start; 3 Zehen nach vorn, ganz getrennt, die hinterzehe kurz, auf dem Lauf eingelenkt. Flügel mittelmäßig, abgerundet.

Die Wasserralle, schwarzer Basfertreter. (Ral. aguaticus.)

Lange 8½ 3. Flügelbreite 15½ 3. Der Schnabel 1½ 3., wenig unterwarts gebogen, von Farbe orangeroth, an der Spige fcmarge braun, Fris orangeroth. Kehle weißlich; Seis

ten des Ropfes, Sale, Bruft und Baud blei: grau, alle Febern ber obern Theile rothbraun, in ber Mitte mit einem fcmargen Gled; Geiten fdmarg mit weißen Querftreifen. Bor ber er= ften Maufer ift Die Mitte Des Bauches braun: roth; ber Unterleib graufdmars, Die Geiten ohne weiße Binde. - 3m nordlichen Uffen und in gang Guropa nirgende felten, mo nur naffe Biefen, binfenreiche Teiche find und hohe Geg= gengrafer machfen. Gie ziehen im Berbft, Doch bleiben einzelne ba, wo marme Quellen find. - Um Tage fieht man fie felten, Da fie fic verftedt halten und mit Ochnelle durch das bidfle Grad laufen. Gegen Abend und bei hellen Rach = ten find fie fehr thatig. Ihr Gefdrei, tont wie : hau, womit fich die Gatten rufen. Sochfigend rufen fie hell: frriep. Gefangen werden fie febr gabm, und find in der Stube poffirliche Bogel. - Gie nahren fic von fleinen Baffer: infeften, Larven von Ephemeren und Regflie= gen, fleinen Raferden und Condylien, auch ver: fdiebenen Arten von Gamereien. In dem mus: fulofen Magen findet man daber auch Sand und fleine Riestorner, bas Genoffene beffer gu germalmen. In ber Stube giebt man ihnen in Mild eingeweichtes Brod, Gemmel, Fleifc und Mehlmurmer. Ihr Reft ift aus Schilfblat: tern, bunnen Rohrstengeln u. bergl. ordentlich gebaut, und ift febr verftedt. Die 4-6 Gier find etwas langlich, die Goale bunn und glatt, glangend, gelb : ober grunlichgrau mit verlofche= nen blagrothen, afchfarbenen und rothbraunen Rleden und Puntten, alle ziemlich flein, gleich= formig bestreut. Die Jungen laufen, fobalb fie ausgekommen, mit der Mutter davon. Man Schieft fie im Bluge. Das Fleifch ift fehr gut.

S d) n a r r e r. (Crex. Bechst.)

Sonabel furz, an den Seiten zusammens gedrudt; der Oberschnabel vorn etwas gefrummt, der Unterschnabel vor der Spipe etwas erhoht. Rasenlocher seitlich, lanzettsormig, in einer vers tiesten haut liegend. Zehen mittelmäßig lang, ganz getrennt, die hinterzehe kurz.

Der Wiesenknarrer, Schnarz, Wachtelkonig. (Crex pratensis.)

Der Schnabel oben rothlich braun, unten und vorn weißlich; ber Augenstern hellbraun; der Augenliederrand fleischfarbig; die Beine hellrothbraun; Ruden, Schultern und obere Schwanzdeckfedern schwarzbraun, an den Seiten der Federn graue, an der Spige olizvenbraune Einfassung; der Bauch in der Mitte weiß, an den Seiten mit braunrothen und weis fen Querstreifen. Der Bogel ift 104 3. lang

und 18 3. breit.

Er kommt als Zugvogel im Mai an, und verläßt une im Ottober; lebt in Guropa auf feuchten Biefen und trodenen Strohriedtern. Rach dem Abmahen des Grafes geben fie ins Getraide. Diefer Bogel hat mit dem Rallen viel gemein, macht fich, wie Diefer, befondere Gange, in welchen er mit der größten Leichtig= feit, ohne daß fich ein Grashalm ruhrt, hin und her lauft. Schmale Graben nugt er befonders zu diefen Gangen, in welchen er vor Raubvogeln ficher ift. Er lauft und fliegt fonell. Um Lage ift er meift ruhig, erft gegen Abend erhebt er fein Gefdrei bis gegen 11 Uhr, nach 1 Uhr hebt er icon wieder an, bis die Conne aufgeht. Geine Stimme ift fonarrend und befieht aus zwei Tonen: Urp fonarp. Man fann fie mit einem Ramme, wo man mit bem Ragel darauf bin und herfahrt, nachmachen. Gefangen wird er bald gahm. Er badet fic gern und trinft viel, das Baffer muß aber frifc fenn. Man giebt ihm Brod, Fleifc und Samereien in der Gefangenschaft. In der Freibeit frift er Infetten, Regenwurmer, Condolien, Gamereien und Grasmurgeln. Er ni: ftet im Grafe, mo nicht felten beim Maben bas Reft zerftort mird. Die 4-6 Gier find dunn, glattichalig, mit iconem Glanze, an 18 Li: nien lang, graugelb oder gelblich weiß mit brauns rothen, blagrothen und afcgrauen Fleden und Puntten überftreuet, welche am ftumpfen Ende bismeilen einen Krang bilden. Die Mutter liebt bie Jungen fehr und fucht fie zu vertheidigen. Ihr Fleisch ift wohlschmedend.

Das punktirte Rohrhuhn. (Cr. Rallus porzanus.)

Stirne, Augenbraunen und Rehle blaus grau; Seiten des Ropfs graulich, schwarz gemischt; alle obern Theile olivenbraun; aber alle Federn in der Mitte schwärzlich und mit fleinen, rein weißen Punkten und Strichelchen; Brust und untere Theile olivenfarbig ins Graue spielend und weißgesteckt; auf der Brust sind die Flecken rundlich, an den Seiten aber bils

ben fie Querlinien; Die mittlern Schwanzfedern find weiß gefaumt; Schnabel grungelb, an ber Wurzel roth; Beine gelbgrunlich; Gris braun. - Lange 9 3. Flugelbreite 162 3. Schnabel 3. lang. - Die Ufer der Fluffe, Geen und Teide, Die fart mit Binfen und Schilf oder Geggengras bewachsen, find in warmern und fudlichen Theilen Guropas, ihre Aufenthalte: plage. In nordlichern Landern gieben fie meg. Bei und fommen fie im April an, und verlaften uns im Geptember wieder. Mit dem Raften haben fie viel gemein, laufen fcnell, fliegen ungern, verbergen fich in Grafern ac. Gie find eigents lich Sumpfvogel, Die fo weit ine Baffer geben, als ihre Beine fahl find. Im Rothfall fomine men fie auch, und laufen geschidt über fdmims mende Pflanzenblatter hinmeg. Gefangen merden fie febr gabm und gutraulich, und lernen dann allein freffen, wie vorige. Die Rahrung ber porigen. Das Reft fieht verborgen an trodnen Drten, aus Grasblattern und ahnlichen Stofe fen gefertigt, eine Salbfugel bildend. Die 6-10 Gier find verhaltnismäßig groß 18-19 Linien lang und 12-13 breit, glattschalig und glans gend. Die Grundfarbe blaggelb oder graugelb mit fleinen oder großern, rothbraunen und verwaschenen blutrothlichen oder aschgrauen Flex den und Punften, entweder gleich, oder am flumpfen Ende etwas Dichter überfaet. Die Mutter brutet fehr treu, und beide Alten fuhren ihre Jungen an, marnen und beschüßen fie. Mit einem Bachtelhunde laßt man fie aufjagen, und ichieft fie ihres ichmadhaften Bleifdes megen.

Dafferhuhn. (Fulica.)

Die hierher gehörigen Arten werden nach Gestalt des Schnabels und dem Befag der Fus fe in folgende Abtheilungen gebracht.

Rohrhuhn. (Gallinula.)

Der Schnabel ift fast wie beim Bachteltonig, unterscheibet fich aber durch die Stirnplatte und durch die fehr langen mit einem schmalen Saum eingefaßten Zehen. Das grünfüßige Rohrhuhn, Roth= blagden.

(Gallin. chloropus. Linn.)

Lange 12 3. Flugelbreite 22 3. Der 1 3. lange Gonabel ift von unten und oben juge: fpigt, von beiden Geiten etwas zusammenge: brudt. Die Borderhalfte bes Schnabels ift im Brubling (beim Mannchen fconer, ale beim Beibchen) lebhaft gelb, die Burgel beffelben aber glangend hochroth. Die legtere des Dberfiefere lauft vor der Stirne hinauf, und bil: Det ba eine table, fcmulige, ovale Blaffe von glangend hochrother Farbe, die in der Brutgeit besonders aufschwillt. Die Gris rothbraun. Das gange Gefieder Diefes Bogels fieht duntel. Ropf, Reble, Sals und alle untern Theile fdieferblau, Die obern Theile dunkelolivenbraun; ber außere Rlugelrand große Fleden an ben Geiten und untere Dedfedern Des Schwanzes rein weiß, Die mittlern fcmarg; Beine grungelb, am Schenfel ein hodrothes Band. - Die Jungen bis gur zweiten Maufer: Dbertopf, Raden, Ruden und Burgel olivenbraun; Flugel dunkelbraun, bellbraun gefaumt; Reble, Borderhals und ein Rled über bem Muge weißlich, alle übrigen vor= Dern Theile hellgrau, an den Geiten olivenfarb überlaufen ; Schnabel olivengrun, Burgel braun, Die gang Jungen find uber und über mit pech: fcmargen, furgen, aber dichten Dunen betleibet.

Diefer Bogel ift weit verbreitet und findet fich fast in allen Erdtheilen, mo Gemaffer mit Shilf bededt find. Immer leben fie paarmeife beisammen und leiden fein anderes Paar in ih= rer Rabe. Im April fommen fie an und Ende Detober verlaffen fie uns wieder. - 2Bo fie nicht verfolgt werden, find fie jahm, und gewohnen fich in den Leichen bald an die Menfchen, por welchen fie gang ungefcheut bin : und berlaufen und fomimmen. Legteres tonnen fie recht gut, und tauchen bei Gefahren unter. Gie laufen ges foidt an Rohrstengeln in die Dobe, und fegen fic auch auf Beidenzweige. Im Gigen pugen fie fic unaufhörlich, mahricheinlich um die Federn einzublen und fie fo gegen das Ragmerden gu fougen. - Un der Burgel der Afterfdwingen befindet fich unter den Federn verftedt ein ! 3. lan: ger, fpig zulaufender Stachel, den fie zu ihrer Bertheidigung bei Banfereien gut gebrauchen. - Wenn die Jungen der erften Bede Die Große einer Bachtel erreicht haben, muffen fie fich felbft Rahrung fuchen, und plagen fie Die Alten, fo betommen fie Chlage, fo daß fie fcreien. Die

Alten geben bann meift gur zweiten Brut. Uns geachtet Diefer ftrengen Erziehung lieben Die Jungen bod ihre Eftern fo, baß fie ihnen bie Laften ber Erziehung ber 2ten Brut erleichtern belfen. Gewöhnlich find Dies menige, Daber 2 ermachfene Junge bas Rleine in die Mitte nehr men und ihm jedes fleine gefundene Infett als Rabrung reichen. Dies hat mein murdiger Freund Berr Raumann auf feinem Leiche bei einem Parden oft beobactet. In der Buggeit find fe unruhig und fcbreien in ber Luft fliegenb, ibr belles: Retete und Rib. Ihr Angstgeschrei ift: ferrtet tet. Dft bort man auch ein helles: Rer. Die Jungen laffen fich fehr leicht gahmen, nicht fo die Alten. Die erftern lernen ihren herrn fennen, und laufen ihm nad. Gie lernen alles freffen, und laufen mit den Suhnern auf dem Sofe herum. Ihre Mahrung besteht eigentlich in Infetten, Burmern und Gamereien. Im Berbft find fie am fetteften und ihr Fleifd moble fcmedend. Die Begattung gefdieht auf bem Lande. Ihr Reft ift groß, platt und breit, und fteht auf umgefnictem Rohre. Die Zahl der Gier ift 8-9; fie find fast 23. lang, glattichalig mit Deutlichen Poren; Die Grundfarbe mehr oder wes niger gelbgrau, ober hellbraungelb mit rothbraunen, braunen und violetten Fleden und Puntten mehr ober minder dicht beffreut. Das Beib= den brutet die Gier allein aus, wird aber vom Mannchen befdugt und gewarnt. Rach einigen Tagen verlaffen die Jungen das Reft und folgen ihren Eltern, Die fie futtern und bei Gefahren warnen, mo fie gleich untertauchen, oder fich im Schilfe verbergen. Sie werden gefcoffen.

Purpur = Sultanshuhn. (Porphyrio.)

Schnabel fehr ftark, hart, bid, fonisch, fast so hoch als lang, furger als der Ropf; die Firste der obern Schnabellade etwas platt, und in die Stirn hineingehend, wo sie eine Scheibe bildet. Nasenlöcher seitlich, nahe an der Schnabelfirste, in der Hornmasse des Schnabels liegend, fast rund, durchgehend, Beine lang, stark, Zehen bei einigen Arten sehr lang; die vordern ganz getrennt, alle an den Seiten mit einer schmalen Saut gesaumt. Flügel mittelmäßig sang.

Das blaue Purpurhuhn. (Porph. hyacinthinus.)

Die Gonabelfirfte lauft in einer bobe mit Der Stirn fort; Die Mittelgebe langer ale ber Lauf, die Seitenplatte geht bis hinter die Augen. Baden, Reble und alle vordern Theile Des Bal: fes find foon turtieblau; hinterhaupt, Raden, Unterleib und Schenfel duntel indigoblau, aber wenig lebhaft; Bruft, Ruden, Dedfedern ber Slugel und Somungfedern lebhaft indigoblau; untere Dedfebern Des Schwanges rein weiß; Stirnplatte und Schnabel lebhaft roth; Gris ladroth; Beine und Beben fleifdroth. Comang

furz, blau.

Lange 18 3., Dohe des fehenden Bogels 16 3. Aufenthalt: Die flebenden Gemaffer und: fumpfigen Flugufer Der marmern Gegenden; baufig in Reisfeldern, haufiger auf ben Geen und überfcwemmten Gegenden in Gicilien, im griechischen Archipel zc. In der Lebensart nabern fie fich ben Baffer : und Rohrhuh: nern, doch leben fie mehr auf dem Lande, als Die erften. Es lagt fich fehr leicht gahm machen und gewöhnt fic bald an die Sausgenoffen. Auf ben Sofen lebt es friedlich mit ben Suhnern; foll fich auch wie Diefe im Ctaube baben. Geis ner Sufe bedient fic bas Purpurhuhn bei feinem furgen Salfe gefdidt, die Mahrungemittel jum Gonabel ju bringen. Romer und Griechen batten eine gewiffe Chrfurcht vor Diefem Bogel, brachten ibn nie auf ihre Tafeln, ließen ihn aber tommen und unterhielten fie in den Pallaften und Tempeln. Ihre Sanftheit, ihr edler Gang und felbft ihre foone Farbe erhob fie gu angenehmen Sausvogeln und gur Bierde ber Bofe. Sie blieben aber immer furchtfam, wenn man fich ihnen naberte. Ihr Gefdrei bei ber Furcht ift Anfange fdwach, Dann aber wird es lauter und durchdringender. Es beffeht aus 2 oder 3 Dumpfen Tonen; in der Freude find Diefe Tone fanfter und angenehmer. Die fich jest noch in Stalien finden, icheinen von jenen Zeiten der Ro: mer durd Bermilderung noch herzustammen, da ibr eigentliches Baterland Ufrifa mar. In Paris bat man einen gludlichen Berfuch mit ihrer Fort: pflanzung gemacht. Ihre Rahrung besteht in Rornern, Burgelfafern und Bafferpflangen; aud Getraide aller Art, Infetten und felbft Si: foen. - Ihr Reft bauen fie nach Art ber Robr= und Bafferhuhner und legen 5 bis 6 Gier von rauber Schale und weißer Farbe; fie follen gang rund fenn. Seiner Sconheit megen icont man

den Bogel, obgleich fein Fleifch wohl gut fcmet; fen mag.

Eigentliche Bafferhühner. (Fulica.)

Schnabel mittelmäßig, fart, fonifc, ge: rade jusammengedrudt, an der Burgel bober als breit; die Schnabelfirfte geht in Die Stirne hinein und bildet dort eine nadte Schuppe. Ra fenlocher feitlich, in der Mitte des Schnabels, in die Lange gespalten, gur Balfte mit einer Saut gefchloffen, melde bie Rafenrinne bededt, burchs gebend. Beine lang, dunn; alle Beben febr lang, an der Burgel vermachfen, feitlich mit hautigen ausgeschweiften Lappen verfeben, Flugel mittelmäßig. Gie machen eine deuts liche Berbindung zwifden ben Ufer: und Schwimmvogeln. Gie leben fast immer nur auf dem Baffer, schwimmen und tauchen vore trefflich, und bewohnen nur die fußen Baffer und Die Geefuften; geben nicht aufs bobe Meer.

Das schwarze Bafferhuhn, hurbel, Blaffenhuhn. (Fulica atra.)

Ropf und Sals tief fcmars; obere Theile schwarzbläulich oder schieferblauschwarz; untere Theile dunkelafcgraublau; Die Stirnfduppe weiß, leicht rofenroth überlaufen. Gris farmois finroth. Beine graufdmars, grunlich überlaus fen, über den Anien ein rothgrunliches Band. Lange 163 3. Flugelbreite 30 3., Schnabel 13 3. lang. Beim Beibden ift Die Stirnplatte. wie bei den Jungen, fleiner. Es ift ein febr meit verbreiteter Bogel. In Guropa auf allen Geen, Teiden und Fluffen, wenn legtere nicht ju fonell fliegen. Gegen ben Winter gieben fie fort, frieren Die Gemaffer aber nicht gu, fo bleiben viele da. Conft fommen fie in Den erften Lagen bes Marges wieder und gieben im October wieder ab.

Gie leben gern gefellichaftlich gufammen, und find auf Geen und großen Teichen, welche viel Rohr haben, oft fehr haufig. Gie fdmim= men mit beffandigem Ropfniden. Ihre Stimme flingt wie: Rum und Rod. Dies hort man besonders des Rachts auf ihren Bugen. Am Lage laffen fie Dabei noch ein helles: Dig und dumpfes Anappern boren. Ihr Blug ift fcmerfallig und fie fliegen nicht gern. Den

Jager fennen fie genau. Sie werden leicht gabm und freffen bann mit ben Buhnern auf bem Dofe aus einem Saffe. Im Berbft aber werben fie unruhig und fuchen ju entfommen. Che im Fruhjahr Die Bafferpflangen machfen, tauchen fe fleißig unter, fonft nicht. Wenn fie in gro-Ber Gefahr find, fo machen fie es wie die Rohr= buhne, halten fich unter dem Baffer an Pflan: gen feft und fteden blog ben Schnabel beraus. Den Rohrmeihen furchten fie befonders, denn bei Erblidung beffelben fcreit eine, und alles fürst bem Rohre gu, um fich ju verfteden. -Ihre Rahrung besteht vorzüglich aus grunen Bafferfrautern und beren Gamen, Bafferin= fetten, Fifchlaich und wohl auch fleinen Grofden und Fifden. - Im Rohrgebufd, mohl perfedt, trifft man ihr Deft. Beibe Gatten bauen bas Reft und bruten gemeinschaftlich. Das Reft enthalt 8-15 Gier, Die in 3 Do: den ausgebrutet merden, die fcmarg wolligen Jungen mit rothfafrigem Ropfpus, halten fich im Shilfe verftedt und werden von ben Alten gefüttert. Die Farbe der Gier ift rothgrau, mit Heinen rothbraunlichen Punften befprigt. -Man ichieft fie, fangt fie auch in ber Mauferzeit, (Anfang August) wo fie nicht fliegen ton= nen, mit guten Bafferhunden. Man ift fie, Doch muß bas Fleisch erft ins Waffer gelegt merben, fonft fcmedt es thranig.

Scheibenhuhn. (Chionis. Forst.)

Sonabel fart, did, hart, fonifc, conver, aufammengebrudt, gegen Die Spige gebogen; Die Burgel Der oberu Schnabellade bis gur Balfte durch eine Scheide von hornartiger Gub: flang bededt, welche vorn abgeschnitten und in Die Lange gefurcht ift; untere Conabellade alatt, einen offenen Bintel bilbend. Rafenloder am Rande, mitten am Gonabel, am Rande ber Bornicheibe. Beine mittelmäßig, ber nadte Theil der Schenfel fehr flein; Die Borderzehe burd ein Sautrudiment verbunden, meldes zwifden ber außern und mittlern breiter ift, Die immer nur an der Burgel verbunden. Blu: gel mittelmäßig; Die 2te Schwungfeber ift Die langfte; an der Achfel ein bofer. Bis jest nur folgende Art:

Das weiße Scheibenhuhu. (Chion. alba.)

Lange 14 3., bas gange Geffeber menig ausgezeichnet glanzend weiß; Die Febern bes Salfes etwas feibenartig; ber Schnabel febr did, leicht abgerundet, fomugig weiß, an ber Spige Schwarzlich. Die Dornscheibe figt feft, fceint aber im Leben etwas beweglich. Die Bas den find nadt, feifchfarben mit Bargden bededt. Die Beine fcmargrothlich, mit breiten Schildern; Die Ragel fcmars, Das Auge bleigrau mit eie nem innern rothbraunen Ringe. Auf ber Mitte Des Schnabels fieben 2 fehr deutliche rothbraune Bleden. Baterland : Reuholland. Gie follen fich in Flugen gufammenhalten, aber fcheu fenn. Das Fleisch hat nach Forfter einen abscheulichen Maggeruch; andere fagen dagegen, bag fein Bleifd dem Entenfleische gleiche. In bem Mas gen eines erlegten, fand man Fragmente von Condplien.

Sandhuhm (Glareola.)

Schnabel furg, conver, an der Spige gue fammengebrudt, obere Schnabellabe von ber Balfte ihrer Lange an gebogen, ohne Ausschnitt. Die Rafenlocher an der Burgel, feitlich gespal= ten. Die Schenfel bis auf Die Rnie befiebert. Laufe lang, dunn; Die mittlere an Die außere Durch eine furge Saut verbunden, Die innere getrennt; Die hintere Bebe ift am Lauf einges lenft. Ragel lang und malzig. Flugel fehr langs - Die Gandhuhner find fleine Bogel, Die in ben marmen und gemäßigten Gegenden leben; fie besuchen die Ufer der fugen und hellen Baffer, felten Die bes Meeres. Gie leben bon fleinen Bafferinfetten und Baffermurmern. Man hat fie fonft im Spftem bald zu ben Rebbuhnern, bald ju ben Schmalben geftellt, Da fie mit beiden einige Mehnlichfeit haben, mit legtern der langen Flugel und des Gabelfdman: ges megen.

Das halsbandfandhuhn, oftreichi= iches Sandhuhn.

(Glareola torquata. Gl. austriaca.)

11 3. lang, Flügelbreite 241 3.; ber gas belformige fehr tief ausgeschnittene Schwan; 5 3. lang, an der rothen Burgel breit und tief in den Ropf hineingespalten; Fris dunkelbraun. Reble und Gurgel blaficmugig roftgelb, auf

der Seite und unten mit einem schmalen schwarzen Band eingefaßt, welches vom Schnabel ansfängt und durch das Auge wegläuft, dann der Länge des halses nach heruntergeht und sich am Unterhalse umbiegt und mit dem der ansbern Seite sich verbindet. Zu beiden Seiten ist es etwas weißlich. Alle obern Theile sind rothslich grau. Diese Farbe zieht sich auch auf die Brust, nur ist sie dort rostgelb überstogen. Bauch und Aftergegend weiß, Schenkel weiß, so denkel weiß, fo auch die obern Schwanzbeckfedern; die grossen Schwungsedern braunschkern. Schwanzsedern schwungsedern braunschwarz. Schwanzsedern schwarz, die äußerste an der außern Jahne weiß, nur am Ende schwarz. Die Jungen unzerscheiden sich in den Farben von ihren Estern.

In Europas marmern Landern an Ufern Der Gemaffer trifft man Diefen Bogel, Desgleis den auch in Uffen und Ufrifa. Gie fliegen foreiend in Schaaren. Der Flug ift fonell, fowalbenartig und leicht. Der Flug geht meift an der Erde oder über der Dberflache des Baf: fers weg. Gie follen auch im Fluge Infetten fangen. Man trifft fie bisweilen auch weit vom Baffer entfernt an. Saufig laufen fie am Rande Der Gemaffer herum, find aber icheu. Ihre porzüglichfte Rahrung find Muden und andere Infetten, welche im Rohr oder an Binfen fic aufhalten. Das Reft legen fie im Didften Ge: robricht, in Binfen, bobem Grafs, ja felbft auf moraftigen Triften und in der Commerfaat an. Die 4-7 Gier find von der Grofe und Ge-Stalt wie die vom Biedehopf, fomugig grun: lichblau, ubeall mit fleinen grunbraunen Bunt: ten befprigt. Das Reft ift funfilos, unter ei: nem Erdflumpen und beffeht aus einem mit Durren Salmen ausgelegten Erdloche.

Flammant, Flamings. (Phoenicopterus.)

Schnabel did, ftark, hoher, als breit, gezähnelt, gegen die Spige zu kegelformig, ftumpf; an der Burzel nadt; die obere Kinnlade platt, dunn, schnell sich umbiegend, und auf die untere wie der Deckel einer Buchse aufliegend: untere Kinnlade langer und breiter als die obere und aufgedunsen. Nasenlöcher langlich, in der Mitte des Schnabels, durchgebrochen, nahe an der Firste des Dberschnabels, oben mit einer Saut bedeckt. Beine sehr lang; 3 Zehen nach vorne, die hintere sehr kurz und hoch oben am Lauf eingelenkt; die vordern 3

Behen mit einer Somimmhaut bis an bie Ragel vereinigt. Ragel furz und platt. Flugel mittelmäßig.

Es find fehr merfmurdige Bogel, welche Die Meeresufer und Gumpfe ber marmern Be: genden bewohnen, fic von Mufcheln, Meerinfetten und Fifchlaich nahren, welche fie auf: fifchen. Der fonderbare Bau ihres Schnabels nothigt fie babei ju einer gang eigenen Bemegung und Stellung, indem fie den Ropf ver: fehrt breben, um mit Bortheil den Saten ib: res Dberfdnabels dabei ju gebrauchen. Gie leben in großen Truppen, und wenn fie ruben oder Rahrung fuchen, follen fie Bachter aus: ftellen, die mit Gefdrei bei nahender Gefahr, mas wie eine Trompete klingt, marnen, worauf fich alles auf die Flucht begiebt. Gie mablen offne Orte und fennen genau den Jager. Im 4ten Jahre follen fie erft ihr prachtig rothes Gefieder erhalten. Ihre Fuße machen fie gu mabren Somimmvogeln, fie icheinen davon aber wenig Gebrauch zu machen. Dielleicht Dienen fte nur um im fumpfigen, modrigen Boden, fie nicht einsenken zu laffen. Gie ziehen in der Luft nach Art der milden Ganfe ein Dreied bildend, an deffen Spige fich ftets ein großer ftarfer Flam= mant befindet. Gie bruten der langen Beine megen, auf gang eigene Urt, nehmlich in rei= tender Stellung, indem fie die Beine zu beiden Geiten des hoben Meftes berabhangen laffen. Die Bunge der Flamingos ift febr Did, und fullt die Boble ber untern Schnabellade fo an, daß fie durch die Rander berfelben gefcugt wird. Sie ift von beiden Geiten von der Burgel an bis gur Balfte mit 2 Reihen fleischi= ger Margen, welche mit der Spige nach bem Raden zugefehrt find, bededt.

Die Alten kannten nur eine Art Diefer ausgezeichneten Gattung, jest kennt man mit Gewißheit 4 Arten:

Der rothe Flammant, Flamingo. (Phoenic. ruber. Linu.)

Die Sohe eines alten Bogels ist 4 f. 4; 3. Die Farbe desselben: der ganze Korper, Sals, Ruden und Schwanz mehr oder minder rosenfarb, besonders am Salse; Unterleib, Bauch und grosse Decksedern der Flügel fast weiß. Decksedern der Flügel lebhaft karminroth, Schwungsedern schwarz. Der Augenkreis und die Base des Schnabels weißlich, der übrige Theil des Schnabels sleischarboth, die Spise schwarz; die

Beine fleischfarben, Die Schwimmhaut duntel rofenroth. Um jungern Bogel find alle Theile bes balfes. und Rorpers weiß, oft fcmach rofenroth überlaufen. Er lebt im fudlichen Guropa an ben Ruften Staliens und Giciliens, auch in Afrifa. In Sardinien bringt er ben Winter ju und weilt dafelbft 6 Monat. Gie fommen Bu Taufenden an und es giebt einen prachtigen Anblid, Diefe rothe Schaar ju feben. In Der Gegend von Montpellier erfcheinen fie nur im Binter. Co fdeu fie in der Bildnif find, laf= fen fie fic boch gahmen, und merden bann que traulich, halten aber in ber Gefangenicaft nicht lange aus und fferben bald, vielleicht aus Man: get an ichidlider Rahrung. Bisweilen verirren fie fic auf ihren Bugen. Go fam ein Trupp von 27 Stud an den Rhein bei Gameheim, wovon man 6 Stud erlegte. Beim Fluge ftreden fie Die Beine nach hinten und halten den Sals wie die Storche fart gebogen. Gie nahren fic von Schneden, Condylien, Fifchlaid, viel: leicht auch feinigen Scepflanzen. - Das Reft befteht aus Sumpffrautern und Schlamm, mel: de in einem Sugel aufgehauft merden, 12 bis 2 F. über das Baffer vorragend. In der Mitte ift eine Bertiefung welche mit einigen Burgeln und trodnen Rrautern ausgefüttert ift. Diefe Daufen, welche der Bogel mit den Fugen gu: fammenfcarrt, gleichen von Beiten fleinen In: felden, und bilden eine flumpfe Ppramide, De: ren guß mit Baffer bespielt wird. Ihr Durch: meffer am Grunde mag 18 bis 20 3. betragen. In Die obere Bertiefung legt das Beibden 2-3 gang weiße nicht glangende Gier, von ber Große Der Ganfeeier, welche es in reitender Stellung ausbrutet. In Sardinien, zuweilen auch in Franfreich, im Departement der Rohnemun: Dungen, bei Arles bruten einige alljabrlic. Die Jungen find Anfangs faft grau. - Gie find fower gu ichiegen, weil fie fehr foeu und porfictig find. Ihr Fleifch fann man effen, Die Bunge foll einen vorzuglichen Lederbiffen geben. Apicius foll fie querft unter ben Romern auf Die Lafel, Souffeln voll, nebft Gehirn Diefer Bogel gebracht haben. Much Philoftratus fcagte Das Fleifc Der Flamingos hoch. Unfere Beit: genoffen finden es thranig, auch modrig. Dielleicht verftand Die Rochfunft der Alten es beffer, Diefe Speife boch fcmadhaft ju machen. Mus Den Flaumenfedern macht man verfcbiedene Bierrathen, Salebander, Gurtel 2c. und aus ben Anochen ber Beine machen Die Gardinier

eine Art von Flote, welche fie Lionette nennen. Diefe Instrumente geben einen fehr fanften Lon.

Sechste Ordnung.

S d) w i m m v b g e l. (Palmipedes.)

Die Gowimmfuße, welche ihnen ben Das men gegeben, fteben bei ben Meiften ziemlich weit hinten am Rorper, Daber ihr madliger Gang, Da Der Rorper außer dem Gleichgewicht fieht. Die Laufe find furg gufammengedrudt, Die Beben durch Schwimmhaute verbunden, bei einigen felbft die hinterzehe mit den andern verbun= ben; nur bei menigen find die Beben bes lappt. Das Gefieder dicht anliegend, und die haut mit fehr viel weichem Flaum bebedt. Die Fettdrufen am Steife fehr groß. Dft ftrei= den fie darüber mit dem Ochnabel meg, um das Fett auszudruden, womit fie dann die Federn einolen, wodurch fie por Raffe gefcugt find. Diefe Fettigfeit und Das felbft unter ber Saut liegende Kett, farbt bei einigen Baffer= vogeln mabrend des Lebens Die Federn; nach dem Lode, wenn das Fett verdunftet ift, werden die Farben dann verandert und weiß. Es find unter den Befiederten Die einzigen, de= ren Sals die Lange der Beine zuweilen um fehr viel übertrifft. Dadurch tonnen fie indeffen felbit unter Baffer gehen und mit großer Leichtigfeit tauchen, welches indeffen nicht alle thun. Das Bruftbein ift fehr lang, und fcugt die Gingeweide des Unterleibes; auf beiden Seiten hat es ein eiformiges, mit einer Saut bededtes Loch, vollig die entgegengefeste Bildung Des Bruftbeins der Suhner. Der Magen ift im 20: gemeinen mustulos, doch fehr verfchieden, die Blinddarme lang; der untere Luftrohrentopf einfach, aber bei einer Familie mit fnochernen oder knorplichten, tapfelformigen Auftreibungen verfeben.

So weit es indessen das furzgestedte Ziel dieser Arbeit erlaubt, theilen wir in gedrängter Rurze, unsern Lesern nachfolgendes mit. Die Basservögel sind über die ganze Erde verbreitet und ihre Zahl nimmt gegen den Aequator nicht zu, im Gegentheil sind die Länder gegen die Polarfreise mit eben so großen Schaaren dieser Bogel bevolkert, als die warmern Lans

der; mehrere Gattungen find ben Ruftenlans bern aller Erdtheile gemein, und nur wenige Arten find auf Die Tropenlander beschrantt. Die meisten Wasservögel leben fehr gesellig und bruten auch in großen Gesellschaften.

Die besten Schwimmer liegen am tiefften im Baffer, der Ruden fieht aber fets außer demfelben. In Gefahr tonnen einige den gan: gen Rorper unter Baffer behalten und nur den Schnabel hervorsteden. Die Pinguine und Flos: fentaucher, bedienen fich ihrer federlofen Glu: gel flets als Floffen. Die beffen Schwimmer legen jedoch faum & Stunde in einer Stunde jurud, wenn fie ruhig find. Leicht erheben fich Meven und Meerschwalben vom Baffer in Die Luft. Die furgere Flügel haben, ichlagen erft mit ben Flugeln auf das Baffer, bedienen fic auch dabei noch der Fuße und es verurfact Beraufc, wenn fich eine folde Schaar erhebt, wie das der Fall ift bei Enten, Ganfen und Comanen. Wenn aber Die Beine gu furg, Die Blugel dagegen ju lang find, wie bei den Fregat; ten, fo bedienen fie fic ber Schwimmfuße gar nicht. Die über bas Baffer laufen, muffen fich babei ftete ihrer Flugel bedienen. Ueber das Tauden hat Berr Faber, dem wir uber die Lebensart der nordischen Bogel viel zu verdanten haben, merkwurdige Beobachtungen mitgetheilt. Er theilt Diefe Fahigkeit in Schwimmtauchfahigkeit und Stoftauchfabigfeit. Beide fleben fich entgegen. Der Bau beider Arten Bogel ift aber auch ver= fdieden. Die Stoftaucher, die fich von oben ins Wasser hinabsturgen, find vortreffliche Flie: ger, die Schwimmtauder dagegen febr folechte. Die eigentlichen Laucher ruben alle auf bem Baffer, und wenn fie tauchen wollen, fo foie: ben fie den Ropf voran, und geben fich mit den Beinen einen farten Stof von unten nach oben, wodurch fie nach unten geschoben werden. Sie bewegen fich unter dem Baffer in allen Richtungen, und fleigen fentrecht bis auf den Brund des Deeres berunter, ober fdwimmen auch horizontal unter dem Baffer. Benn fiegum Athem gezwungen berauf muffen, fteden fie oft nur den Schnabel aus dem Baffer. Ginige tonnen 8 Minuten unter dem Baffer bleiben. Die Stoftaucher muffen fic erft in Die Luft er: beben, che fie untertauchen, weil fie es mit durch Die Rraft des Falles bemirten.

Frencient hat über die großen Flieger dies fer Ordnung fehr merkwürdige Beobachtungen gemacht. Es giebt Bogel, welche man wegen ihres beständigen Aufenthaltes über dem Meere mit Recht pelagif de genannt hat. Gonft hielt man die Fregatten fur die besten Flieger. Gie maden gwar große Reifen, boch find fie ges wohnlich nicht zu weit von den Ruften entfernt. Gie ruben nicht auf bem Baffer, fondern auf Felfen, da fie mit ihren furgen Fugen und langen Flügeln fich von der Wafferflache nicht wieder erheben tonnen. Die Tolpel findet man oftere 500 Seemeilen vom Lande, gewohn= lich aber zeigt ihre Erscheinung doch die Rabe des Landes und mehrere Geefahrer find bas burch zur Entdedung neuer Lander getommen, daß fie dem Buge folder Bogel folgten. Die eigentlichen pelagischen Schwimmvögel find Die Albatroffe und Die Sturmvogel. Die erffern, que gleich mit die größten Schwimmvogel, find auch Die beften Flieger und Die einzigen befannten Bogel, welche Die Erde umfliegen, da man fte in den füdlichen Meeren und in den nordliche ften von Ramtichatfa und den Rurilen antrifft. - Die Sturmvogel findet man in allen Deeren; die Beit ausgenommen, mo fie fich forts pflangen, bringen fie ihr ganges Leben bin, ben Drean in allen Richtungen zu durchfliegen, um auf muhfamen Bege ihre Rahrung von den fürmischen Wogen aufzufangen, welche sie nur fparfam finden und welche fast eben fo fonell perdaut, ale verschludt wird. Gie reifen um Bu leben, und meder Sturme noch Rebel hem= men ihren Beg.

Die Sturmvogel ericheinen bei dem fartften Sturme, Der ihnen Rahrung bringt, fundigen ibn aber nicht an. Bei Bindftille entfernen fie fic. - Die meiften Schwimmvogel leben in großen, oft ungahlbaren Gefellichaften befon= bers mahrend der Brutgeit. Parren fand auf feiner Entbedungereife nach den Polargegenden die fleine Lumme (Uria alle) in fo großen Saufen, daß mit 3 Flinten binnen 5-6 Stunden 1263 Stud getodtet murden. Boje ergablt in feinem Tagebuche, eine Reife nach Mormegen, er babe einen Schwarm Alfen und Lummen von 1000 Schritt Breite gefehen. Der Bug Dauerte fo lange, daß er und fein Reisegefahrte ibre Doppelflinten 10 mal laden und abfeuern tonnten, ehe der Bug vorbei mar. Colde Fluge gab es 2 - 3 in einer Gegend. Das Gefdrei betaubte Die Dhren. Somarme von Meven fagen auf ben Geeren fo, bag fie gang weiß erschienen und ein Doppeliduß 9 Stud niederftredte. Auf einer Infel an ber Rufte won Diemensland bes mertte man einen Bug von ichwarzen Sturmvos geln, melde in der Luft 50 bis 60 Dards (11 Gle)

Liefe und 200 Darbe Breite einnahmen. Gie flogen febr Dicht, und Diefer Bogelftrom Dauerte ohne Unterbrechung 11 Stunde, mit einer Schnelle, welche berjenigen ber Banbertauben nabe fam. Rimmt man nun bie oben angege: bene Tiefe und Breite an, und Die Schnelligfeit gu breißig engl. Meilen in einer Stunde, und giebt jedem Bogel 9 Quadratnarde Flugraum, fo erhalt man eine Zahl von 151,000000 See: pogeln. Auf Den Maluinen niften Die Reifefturm: vogel in fo großer Menge, baß Die Mannichaft Der Schiffe, welche dort megen des Geebund: fange verweilen, oft gange Boote mit den Giern beladen. Auf Diefen Infeln fammeln fich My: riaden von Cormorane, Pinguinen, Sturm: vogeln und Meven.

Der außerfte Morden, fo weit man gegen Die Pole vordrang und ebenfo die Gudpolmeere, fo weit man bort Lander antrifft, find in ben Commermonaten gleich reich an Geevogeln und reicher ale die Tropenlander. Diefe ungeheure Menge macht Die Polarlander auch jum Theil bewohnbar, ba fie fur einen großen Theil Des Sahres den Bewohnern Rahrung liefern, theils an Giern; theils an Bogeln. Legtere merben von ihnen gegeffen, ob fie gleich einen thranigen Gefchmad haben, ba fie einen weniger vermobn: ten Gefdmad als wir haben. Gin guter Bogelfan: ger ift daher dort ein nugliches und wichtiges Mit: glied ber Gefellichaft. Ge gehort aber Dagu außers ordentlicher Muth, Rraft, Ausdauer, ein fcmin= Delfreier Ropf, und Ertragung aller Unannehm: lichteiten, Die Witterung und Meer veranlaffen.

Schon altere Schriftsteller haben über ben nordischen Bogelfang geschrieben 3. B. Pennant. In diesem Jahrhundert haben Boje, Faber, Grabe und Naumann diesen Gegenstand beshandelt und die Dekonomie der nordischen Seevösgel in helles Licht geseht. Letterer hat durch sehr gelungene Abbildungen das Treiben einer folden Bogel-Colonie versinnlicht und es gewährt einen Genuß, die Abbildungen vor sich zu haben und die Beschreibungen zu lesen. Gern wollten wir einen Auszug davon mittheilen, wenn es der Raum nur erlaubte. Wir mussen daher nur auf jene Schriftsteller verweisen.

Die Bermehrung der Seevogel hemmt nicht das Aufsuchen der Gier durch Menschen betrieben, da sie durch neue Bruten ersest werden, wohl aber die Springfluthen, die oft die Brut einer ganzen Colonie zerftoren.

Die Benugung eines Bogelgeheges, wie 3. B. auf Lyft, ift gar nicht unbedeutend, Da ber

Befiger davon jahrlich feine Ginnahme auf 200 Thir. bringt. Er erhalt an 30,000 Ctud großer Mevencier, welche mit Moos in Rorbe gepadt, nach den Stadten Des Festlandes gebracht mer: ben, mo 20 Stud mit etwa 4 gr. bezahlt merben. Man halt auf manden Infeln Leute, Die fie auffuchen und mahrend der Commergeit in einer Sutte, neben den Bogeln wohnen, und pon Morgens 8 bis Rachmittag 3 Uhr mit bem Auffuchen der Gier volltommen beschäftigt find: als Lohn befommen fie auf ber Infel Luft Die Gier ber fleinern Bogel, Sturmmeven und Geefcmalben, beren Zahl fich jahrlich auf mehr als 20,000 belauft. Alle Diefe Gier find Sandelsprodufte und fehr moblichmedend, befondere die Der fleinen Geefdmalben. Die Gier der Gilber: meve find wenig fleiner ale Ganfeeier.

Die Papageien: oder Larventaucher niften in Felfenlocher, baher mahlen fie Schiefer: Felfen, wo fie in tiefe Locher niften und mit hunden, unsern Dachshunden nicht unahnlich, herz vorgeholt werden. Das Erklimmen der Felfen und das herablassen an Striden an den steilen Felfenwänden ift hochst gefährlich und koftet manz chem das Leben. —

In Grinifore Bogelberge niften fie in folder Menge, daß man bei ihrem Aufflug die Gonne nicht feben fann. Die Ginmohner fammeln dort jahrlich 20,000 Junge und es bruten dort menigftens 40,000 Paar. - In Schottland ift ber fonders die Infel Baf als Brutplag berühmt. Gie befteht aus einer hohen fteilen Telfenmaffe, Die von fern einem Ralffelfen gleicht, megen ber vielen weißen Bogel, vorzuglich Gulen und me= gen ihres weißen Rothe, obgleich der Felfen aus rothem Porphyr besteht. Man zahlt jahrlich 1000 Stud Gulen, Die ausgenommen werden. Gefchof= fen barf nicht werden und die Pachter gahlen jabr= lid 35 Pfd. Sterling Pacht. Der Buffin, (Pro: cellaria anglorum) brutet besondere auf St. Rilba und einigen Orfaden in fo unermeglicher Babl, daß er dafelbft die Sauptnahrung der Ginwohner fur bas gange Jahr ausmacht. Er niftet auf den bochften mit Erde bededten Felfen, mo er lange tiefe Rohren grabt bicht unter Der Dberflace entlang, in welcher er fein Gi ausbrutet. Rur mit Lebensgefahr tonnen Diefe Relfen erflommen merden.

Ueber die Grunde, welche wohl die Boget bewegen mogen, befondere Inseln oder Klippen andern vorzuziehen und jahrlich dahin immer wieder zurudzutehren, wo fie einmal gewesen, wenn schon so viele Taufende von Giern und

Jungen ihnen genommen, hat man Berfdiede: nes angegeben. Der Sang jur Gefelligfeit ift es nicht, wohl vielleicht aber ber Schug ben fie ba: Durch einander zu leiften vermogen. Gie verjagen fo leichter ihre Feinde, ja Die Raubmeven greifen felbft Menfchen an, und vertheidigen fic gegen fie. Die Rahrungsmittel, Die ein folcher Drt Darbietet, und Der Beimathe : und Gefell: fcaftetrieb mag fie mit feffeln, wie bei unfern Araben, wovon jahrlich an ben Brutplagen fo viele gefchoffen und bennoch fehren fie jahrlich Dabin wieder gurud. Auch haben bergleichen Felfen gegen Guden eine fteile Abdachung und Cous vor bem Rord: und Rordoftwinde. Gelbft Die Localitat, wo fie fich oft eingraben, ihre Gier ju legen, fo wie gewiffe Lieblingenahrunges mittel, bestimmen fie gur Auswahl eines Drtes. Faber führt noch einen andern Grund mit an: Daß im Fall Die Eltern von ben Giern megge: fangen oder getobtet werden, andere diefelben ausbruten. Er beweift es burch mehrere That: fachen, indem er aus ein und demfelben Refte ber breizehigen Meve brei brutenbe und aus ei= nem Refte des Larventauchers 6 herauszog, wo alfo einer nach dem andern die Gier bebrutete. Co forgt die gutige Natur überall fur die Erhal: tung ihrer Gefcopfe. Außerdem bilden Die Sommmvogel noch einen wichtigen Gegenfag ge: gen das gewohnte Gefeg der Ratur bei Gauges thieren und Bogeln, daß die fleinern Arten mehr, Die größern weniger fart fich fortpflangen. Die fleinern Arten legen nur ein Gi, Die größern ba: gegen, wie Enten, Ganfe, Schwane febr viele und nach den Suhnern am meiften. - Bas Der Bewohner der warmern Gegenden an Les benbunterhalt von feinen Ruben giebt, erfegen Dem Rordlander Diefe brutenden Colonien; fie gewähren ihm eine fo gefunde Roft als die Mild, und bas Fleifc ber Bogel giebt ibm Binter= porrath.

Sie fangen sie auf verschiedene Art z. B. mit der sogenannten Fleistange, einem eigenen Instrumente, woran ein Neg, womit sie lebend gefangen werden. Das Erklimmen des Felsens und das heraufziehen an Tauen ist sehr gefährz lich, so wie das herablassen eines Menschen an den Felsenwänden an einem 3 Jost dicken und 600 bis 1200 Fuß langen Tau, um zu den Nezstern zu gelangen. Nicht selten flürzen losgerissene Felsenstücke auf ihn herab, oder es reißt das Lau und der Unglückliche ist unrettbar versoren.

Bulegt muffen wir noch einer Entdedung bee Berrn Faber gedenten, daß nehmlich bei Baf:

fervögeln, die in strenger Monogamie leben ein, auch einige kahle Fleden, (Brutsleden) am Bausche sich finden, an denen sie sich Federn und Flaumenfedern ausgerupft haben. Da nun diese Bögel kein Rest bauen, so ist die Bestimmung der gedachten Flede klar, daß nehmlich die Eier inniger angedrückt, so mit den ungebundenen Federn besser bedeckt werden und auf diese Art mehr Wärme erhalten; da sonst durch die steisen Federn des Bogels, als schlechte Wärmeleiter bei Mangel an Nestwärme, die Brut verunglücken könnte. Sie bilden gleichsam ein tragbares Rest am Bogel. Den Sulen und Scharben mangeln sie.

Diese Drdnung ist nach Cuvier in 4 Fa-

milien eingetheilt.

Taudher. (Brachypteri.)

Mehrere von ihnen haben einige außere Aehnlichkeit mit den Basserhühnern. Die bei ihnen ganz nach hinten stehenden Füße erschwes ren ihnen den Sang und nöthigen sie auf dem Lande eine senkrechte Stellung zu halten. Die meisten sind schlechte Flieger, ja einige können gar nicht fliegen, was um so mehr sie an das Basser bindet. Das Gestider ist aber auch bei ihnen am dichtesten. Oft zeigt es selbst eine glatte und silberglanzende Obersläche. Sie schwimmen unter Basser, wobei sie sich ihrer Flügel als Ruzberslossen, ihre Blinddarme mäßig, an jeder Seize des untern Lavinr haben sie einen eigenen Mustel.

Seetaucher. (Colymbus. Linn.)

haben einen glatten, geraden, jusammengedrudzten, jugespisten Schnabel und linienformige Rasfenlocher; aber nach der Berschiedenheit ihrer Füße hat man fie noch eingetheilt, als:

Steißfuß. (Podiceps. Lath.)

Statt mehrerer Schwimmhaute, nur versbreiterte Zehen, wie die Wasserhühner, und die vorderen bloß durch Saute an der Basis verbumden. Der Ragel der Mittelzehe platt, der Lanssus start zusammengedrückt. Ihre tibia, so wie die des folgenden Untergeschlechts, verlängert sich nach oben in eine Spige, welche den Streck:

Stredmuskeln des Fußes eine fraftigere Infertion gewährt. (Die meisten haben eine prächtige feurige Iris.) Wegen deshalbmetallischen Glanzes ihres Gefieders, hat man dies häufig als

Pelzwert benugt.

Diese Bogel leben an Seen und Teichen und nisten im Schisse. Sie sollen bei manchen Gelegenheiten ihre Jungen unter dem Flügel tragen. Größe und Farbe des Gefieders andern mit dem Alter oft so ab, daß in Bestimmung der Arten manche Berirrung entstanden ist.

Der gehaubte Steiffuß, Aronen= taucher.

(Podic. cristatus.)

Lange 23 3. movon auf ben Sale uber 9 3. fommen. Flugelbreite 341 3. Der Conabel faft 2 3. lang, fcmal von ber Seite gufam: mengedrudt, fcarf jugefpigt, febr fcarfichnei: Dig. Beim alten Mannden fdmugig rofenroth, feine Gris brennend roth. Der Cheitel fdmart; auf feiner Mitte erheben fich 21 3. lange fcmarge feibenartige Federn, Die fich in zwei Bufchel in Geftalt zweier langer Dhren gertheilen; hinter Denfelben ift ein Drittheil Des Salfes bis an Die Reble unter den Baden herum mit bergleichen, Doch etwas furgern und Dichtern Febern befest, Die roftroth, an den Spigen fdmarg aussehen, und in ber Gegend ber Baden am langften berunter bangen. Er ftraubt Diefe Bierde meift auf. Reble und Baden junadit am Schnabel weiß; über Die Augen lauft ein weißer roftig angeflogener Streif; Die Federn des hinterhalfes braunlich fowarg; ber Ruden graufdmarg, Die Geiten fomarger mit roftroth durchmifcht; mo ber Comang fieben foll, fift nur ein zugefpigter Bufdel furger haarartiger Federn. Flugel braun: lich fcmarg; Die Geiten Des Salfes und Des Ropfes roftroth, der Bordertheil berfelben, fo wie die Dicht befiederte Bruft und der Bauch glangend filbermeiß.

Die Schenkel liegen am Ende des Korpers, und find bis \(\frac{1}{2} \). über bem Knie fest in die Saut verwachsen, so daß fie gerade hinten aus:

fteben.

Das alte Weiben weit kleiner als das Manneen unterscheidet sich lauch burch weniger lebhaftere Farben und der Federbusch und halstragen ist weit kurzer. Auf großen Teichen und Landseen trifft man ihn fast überall in unserm Baterlande, meist paarweise auch wohl nur einzeln. Seine eigentliche Zugzeit trifft im Marz

und April. Er zieht wie die übrigen Taucher nut des Rachts; ift fehr fcheu und fest fic, erblict er einen Menfchen, in Schufweite b. i. 2 - 300 Schritt weit in Sicherheit, wo er dann ruhig feiner Rahrung nachgeht, benn er tennt ben Schugen. Benn er fich vom Baffer aufschwins gen will, flattert er flete eine Strede auf Der Dberflace bin, wo er burch Unschlagen der Gluz gel und Beine ein lautes Geplaticher verurfact. Dann aber ift fein Flug fcnell. Rommt er aufs Trodne, mas fehr felten gefdieht, geht er auf= recht, außerft langfam und fcmerfallig. Er verrichtet wie feine Wefchlechteverwandten alle feine Sandlungen ichwimmend, felbft das Colafen, er ftedt dabei ben Schnabel unter Die Schulterfebern und weiß fich durch gefchidtes Rudern ftete auf einer Stelle, fern vom Lande gu halten.

Beibe laffen oft ein tiefes oft wiederholtes: Rod, fod, fod horen, dann ein weitonendes: Kraorrrr, Kruorrr folgt. Bei schonen, stillen und heitern Frühlingstagen sieht man sie auf großen freien Gewässern sich begatten; das Mannchen ruft dazu sein Beibchen mit einem starten: Rod, fod, welches das Beibchen besantwortet und schnell herbeigeschwommen kommt. Kommen sie nun unter heftigem Geschreizusammen; so richten sich beide aus dem Basser gerade in die Bohe, siehen so mit den Bruften und Bauchen dicht an einander geschmiegt, einige Ausgenblide und die Begattung ist vollzogen; was sie dann durch laut tonendes Geschrei, gleichsam dem übrigen Basservolke bekannt machen.

Sowimmend und tauchend fuchen fie ihre Rahrung. Dft find fie minutenlang unter bem Baffer damit beschäftigt; fie besteht besonders aus Fifden, Frofden und Bafferinfeften, denn Pflanzen, die man im Magen fand, scheinen mehr zufällig hinein gekommen zu fenn. Die Berdauung zu befordern, rupfen fie fich ihre eie genen Federn aus und verschluden fie, weshalb man auch immer einen Borrath davon in ihren Magen findet. Mannchen und Beibchen legen gemeinschaftlich jum Bruten ein fcmimmendes, fehr folecht gebauetes Reft an. Es beffeht aus nichts, als einem Rlumpen vom Boden des Baffers heraufgeholter, oft foon halb verfaulter Bafferpflangen, in welchem in der Mitte eine Bertiefung ift, worin 3-4 langlichte grunlich= weiße Gier liegen, Die von Schmug marmorirt erfdeinen. - Man findet das Reft immer an Der Seite Des Rohres, auf alten Rohrstoppeln befestigt oder blog auf dem Baffer fdwimmend. Manaden und Beibden bruten abmedfelnd Die

Gier in 3 Bochen aus. Gie haben eine fo ftarfe Brutmarme, daß oft das gange Reft, von Baffer burchzogen und Die Gier gur Balfte im Baffer liegen, doch fehr heiß und das Baffer in demfelben gang lau ift. Benn fie abgeben, bededen fe Die Gier mit Materialien Des Refles. Die wolligen Jungen find unten weiß, oben meifgrau und haben ichmarge Streifen. werden fogleich aufe Baffer geführt und im Schwimmen und Lauden geubt. Anfanglich find fie febr gart und fuchen Schug gegen Bellen und übele Witterung, auf dem Ruden der Mutter. Sind fie großer fo taucht die Mutter mit ihnen unter und lehrt fle ihre Rahrung fuchen, giebt fie ihnen aud fpater unter dem Baffer. Diefem Unterricht gu gufchen, gemahrt bem Beobachter Freude. Das Beibden liebt die Brut fehr und pertheidigt fie mit eigener Lebensgefahr. Gie find fomer zu fchießen und tauchen augenblidlich wenn fie den Blig auf der Pfanne feben. - 3m Ceptember beginnt ber Berbftjug, bod halten fich einige fo lange noch das Baffer offen ift, bei uns auf. Die abgezogene Saut des Salfes, Der Bruft und des Bauches giebt eine ber fconften Pelzwerke. Sonft bezahlte man fie fehr theuer, doch bat fie die Mode abgefest. Schade daß fie oft ber Berdauung megen, fich viele Federn aus: rupfen, und badurd Die Saut entblogen. Das Bleifch ift gart, murbe und fehr mohlfdmedend, nur muß man vorher die fette baut abziehen und es dann gehörig zubereiten. Gein Bett gleicht bem Gifchthran, wird leicht fluffig, und macht das Leder febr gefdmeidig.

Der Ohrentaucher, gebhrte Steiß= fuß.

(Pod. auritus.)

Gr ift 13 3. lang und 24 3. breit. Schnabel noch nicht 1 3. lang, der Unterfieser merklich in die Sohe gekrummt, etwas kurzer als der
obere, beide sehr scharschneidig; Iris brennend
karminroth. Kopf, ganzer hals und Oberleib
schwarz, an Burzel und Seiten mit einzelnen
roffarbenen Federn gemischt. hinter den Augen
entsteht ein Buschel rostfarbener, langer, zerschlissener Federn, die sich bis über die Ohrgegend erstrecken, die Federn am Kopf und hals
sind buschig und lang; Borderleib siberweiß. —
Er bewohnt die mit Schiss, Binsen oder Gras
zum Theil bedeckten Seen und großen Teiche des
mittlern Europas, ist scheu, vorsichtig und
taucht vortresslich; schreit pseisend sast wie die

kleinen Regenpfeifer. — Seine Nahrung besteht in Wasserinsetten, kleinen Fischen, Fischlaich, kleinen Froschen und deren Larven, auch zarten Theilen von Wasserpflanzen; auch findet man wie bei vorigen Federn im Magen. Die Benus hung mie bei vorigen. Nistet in Seen und Teizchen, sein Nest ist schwimmend; es besteht unten aus Wasserpssanzen oben aus durren, sehr regelmäßig unter einandergestochtenen Grasblatztern; darin findet man 3—5 grunlichweiße etwas längliche Gier. Beide Gatten haben am Bauche einen Brutsleck, der durch die von der Brust ausgerupsten und verschlucken Federn entsteht.

Eautherhuhn. (Podoa. Illg.)

Ihre Fuße find gelappt, wie bei ben Bafferhühnern und Seetauchern, aber ihr Schwanz
ist entwickelter als bei beiden, und ihre Rägel
spiger. Die 3 vordern Zehen mit einer haut
verwachsen und mit breiten, lappigen Seitenhauten; hinterzehe klein ohne haut, Flügel
mittelmäßig spigig.

Das surinamische Taucherhuhn. (Pod. surinamensis.)

Der Schnabel von blasser Farbe, Scheitel und Ropf schon schwarz, die Federn bilden am Raden einen fleinen spisigen Federbusch; über jedes Auge geht ein weißer Streif, der hinterpals schwarz, Borderhals weiß, ebenso die untern Theile, alles braunlich überlaufen. Ruden, Flügel und alle obern Theile rothslich graubraun. Der Schwanz sehr breit, wie ein Fecher und absgerundet. Beine braungelb, über die Gelenke der Zehen saufen schwarze Bander. Die Lange des Bogels beträgt 13 Zoll. Einige rechnen ihn zur vorigen Ordnung. Baterland: Amerika, von den wärmern Theilen der vereinigten Staaten an, bis nach Sudamerika und Paraguan, auf stehenden Gewässer.

Eigentliche Seetaucher. (Endytes. Illg. Mergus. Briss. Colymbus. Lath.)

Berbinden mit allen Charafteren der vorhergehenden vollständige Schwimmfuße, d. h. folde, Die bis an die Zehenspige durch Saute verbunben und mit spigen Rägeln verseben find. Es find nordifde Bogel, Die felten bei une bruten, im Binter aber hierher fommen. Dann erfchei= nen fie bieweilen an unfern Ruften. Gie geben nie, gefangen, rutiden fie auf bem Bauche.

Der fdwarzhalfige Geetaucher, der große Gistaucher. (Eudyt. Colymb. glacialis.)

Die obere Schnabellade faft gerade ; Die untere aufmarts gebogen, in ber Mitte breit, unten gefurcht, ber Somans hat 20 Federn und ift 2 3. lang. Diefer Taucher ift 28 - 30 3. lang, wovon der Sale 8 3. megnimmt, Blugelbreite 50-54 3. Der blaulididmarge Sonabel 21 -

3.3. lang.

Beim alten Bogel ift Ropf, Sale und Rehle foon fowars mit grunlichem und blaulichem Coimmer; unter ber Reble ein furger, weiß und fowars gebanderter Querftreif; am obern Theile Des Balfes ein breites Saleband, von weißen und fowarzen Langeffreifen, Ruden, Flugel, Seiten und Burgel fammetichwarg, auf allen Fe-Dern bes Rudens und ber Goultern, findet fic gegen ibr Ende ein doppelter, vieredig blendend meißer Bled; Dedfedern der Flugel, Geiten und Burget mit fleinen runden, weißen Fleden; Bruft und untere Theile rein meiß; Gris nuß: braun; Beine außen braunfdmarglid, innerlich

fo mie die Comimmhaute meiß.

Beim jungen Bogel find alle vordern Theile rein weiß; Ropf und Sinterhale braun grau: lich; an ben Baden fleine weiße und graue Puntte, Ruden, Dedfedern der Flugel, Burgel und Geiten Des Bauches in Der Mitte dunfelbraun, mit blaugraulichem Saum, obere Gona: bellade afcgrau, untere weißlich; Augen braun. Ale Standvogel findet fic der Gistaucher gwit foen bem 60 - 70 Grade nordlicher Breite. Den Sommer durch ift er nur in fugem Baffer an: gutreffen, im Binter befucht er dagegen die Mee: re und mandert den Ruften nach. - Es ift ein gantifder, ungefelliger, ernfthafter Bogel. Er fowimmt tief im Baffer und ift einer ber ge: mandteffen Taucher, der nur am Lande rubt, menn er brutet, und bann liegt er platt mit dem Rorper auf ber Erbe. Beim Tauchen braucht er nur die Suge, nicht Die Flugel. Die Fifche verschludt er unter bem Baffer. Die Stimme ift durchdringend, heulend oder gitternd, fie flingt , wie: uh-uh-uh und mird von dem Beibchen buuu beantwortet. Ift er gefangen, fo heult er bu - nynnn, meldes Das Beib.

den beantwortet. Gie tonen fcauerlich auf ben einfamen mit Rlippen umgebenen Bergfeen burd bas Echo beantwortet. Im September fieht man fie familienweise ju 7-8 Stud beifammen. 3m Berfted, wenn man ihre Stimme nachahmen fann, laffen fie fich anloden und fciegen, bes fondere von hinten, wo die Rugeln durch die Dicten Federn folagen, fonft meift abprallen.

Den Rordlandern ift er verhaßt, da er ihnen viel Forellen wegfifcht. Gie verachten fein Bleifc und gerbrechen deshalb auch feine Gier. Geine Rahrung befteht in lauter Fifden, mit benen er flets vollgeftopft ift. Im Mai zeigt er fic paarmeife in ben Buchten bes Rordlands und fuct Die Brutplage auf. Diefe find oft tief im Lande und auf Felfen, fo hoch im Gebirge, als ber Singichman. Um liebften mablt er einen fleinen unzuganglichen Berber in ber Mitte eis nes Landfees und buldet feine Gattungevers mandte in feiner Rabe. Die 2 Gier legt er Dicht and Ufer ohne ein Reft gu bauen, er liegt bas rauf mit horizontalem Salfe. Das Paar halt fehr gufammen und liebt auch feine Jungen febr; fie bruten abmechfelnb, und fommen bas nadfte Sahr an benfelben Brutort mieder. Das Gi ift über 31 3. lang und hat auf gelblich graus braunem Grunde bunfelbraune und tiefafche graue Fleden. Gelten findet man das Reft, da ber Die Fabel: bag bas Beibchen Die Gier in Den Achsellochern ausbrute. Man fieht oft Die Jungen mit ben Alten gange Stunden einander über und unter der Bafferflace fpielend verfolgen. Im Geptember verläßt die Familie Die Berge und befucht Die Meeresufer, geht aber nicht in die hohe Gee, fondern folgt den Ruften. Federn und Balge ale Pelgwert, laffen fic benugen.

Der rothfehlige Geetaucher. (Colym. septentrionalis.)

Seiten des Ropfe, Reble und Seiten Des halfes beim alten Bogel icon grau; Scheitel fowars gefledt; hinterfopf, hinterer und unte rer Theil Des halfes mit ichwarzen und weißen Langeftreifen; vorn am Salfe ein breiter, lebe haft faftanienbraunrother Fledt; Ruden und alle obern Theile braunfdmarglid, ohne Fleden bei febr alten, bei jungern Bogeln bis jum dritten oder vierten Sahr mit febr fleinen, meiße licen, undeutlichen Fleden, Sonabel fdmar; Bris braun ins orangegelbe übergebend; Beine außerlich fowarzgrunlich, inwendige Geite und 41 *

Sowimmhaut weißgrunlich, alle untern Theile

pon ber Bruft an rein weiß.

Beim jungen Bogel find bie obern Theile braunfdmarglich einfarbig, untere, fo wie Reble und Borderhals weiß. Ueber dem Uf: ter eine braune Binde Gris braun. Gomang fdmarglic. Lange Des Bogels 2 f. - Bater: land: Rormegen, Schweden, Seland zc. auf Geen und Teichen. Mußer den Geefdmalben Duldet er feinen brutenden Bogel in der Rabe feines Reftes. Ende Auguste verlaffen Alte und Junge das fuße Baffer und gehen in die Gee. Im Winter ift er haufig an der danischen Ruffe. Die Rahrung hat er mit Borigen gemein. Bum Brutplag mablt er folde Teiche, in deren Mitte ein unjuganglicher Berber liegt, mo bas Reft Dict am Ufer fieht, fo daß er fich leicht vom Refte ins Baffer ichieben fann. Im Mai baut er fein funftlofes Reft. Beide Gatten bruten wie bei Borigen. Gie haben nur 2 Gier, mo: von meift eins faul ift. Das Junge mird gleich von den Meltern ins Baffer geführt und gum Auffuchen der Rahrung angeleitet. Bei Man: gel an Fifden freffen Die Jungen Bafferpflan: gen. Wenn das Mannchen, das ber Rahrung wegen fich oft entfernt, gurudfommt, melbet es feine Ankunft der Gattin und Jungen mit dem wiederholten Gefdrei: farr, welches das Beib: den beantwortet. Sowimmend foreien fie laut und flaglich: a aum. Die Rormeger feben fie als Betterpropheten an. Die Geftalt ber Gier ift fast malgenformig, Die Grundfarbe fpielt ins rothbraune, oft aber ins grunliche, auch wohl ine dunkelbraune, mit kleinern fcmargen Bleden, unregelmäßig allenthalben dunn befprengt; Die Lange ift über 21 3., Die Breite 1 3. 8 Linien. Man pflegt fie nicht zu effen. Rugen und Jagd wie bei Borigen.

Lumme. (Uria.)

Schnabel mittelmäßig, ftark, gerade, fpißig, zusammengedrudt, obere Lade gegen die Spige leicht gebogen, die untere bildet einen mehr oder minder starken Winkel. Nasenlöcher an der Wurzel seilich vertieft, zur halfte durch eine befiederte haut geschlossen, durchgehend. Beine kurz, am Steiße stehend, außer dem Gleichges wichte, Laufe dunn; 3 Zehen nach vorn, alle mit einer Schwimmhaut verbunden; hinterzehe fehlt, Flügel kurz. Es sind Bewohner der nord; lichen Neere.

Die Brunnichische Lumme. (Uria Brunnichis.)

15-15½ 3. lang, Flügelbreite 27-29 3. Sommerkleid: Ropf und Sals schwarzbraun, legterer oben bleifarb überlaufen, der untere Theil des Halfes, die Bruft und alle untern Theile weiß, an den Seiten des Unterleibes einige einzelne braune Federn. Schwungfedern braun, die obern Deckfedern etwas dunkler; die Schwungfedern der zweiten Ordnung an der Spige weiß; der Schwanz braun. Der Lauf vorn und die Zehen schmugiggelb, das übrige nußbraun.

Minterfleid: Schlafe, Seiten Des Salfes, Rehle und Borderhals meiß, hinter den Augen bis zum Raden läuft eine schwarze Linie, übrigens wie im Commer. Man findet fie in Gronland und Island. Gie gehoren ben nordlichften und weftlichften Gegenden ber borealen Bogelzone an. Sie bruten in Island. Den Binter lebt Diefer Bogel an den islandifden Ruften und fluch. tet nur in die fdmalen Meerbufen, wenn gewals tige Sturme entstehen ober bas gronlandifche Gis fich um die Infel anlegt; dann flieben fie bei Laufenden in diefe Bufen, um Goug gu fuchen, friechen aufs Gis, mo fie zuweilen in großer Menge festfrieren und fo von Raubvogeln gefreffen, oder von Menichen ergriffen merden. Diefe Lumme hat es mit den Arteverwandten ge= mein, daß wenn fie fich aufe Land verirrt und Das Meer aus dem Geficht verliert, gang ruhig dafigt, fich wie verwirrt umschaut und fich greis fen lagt, ohne ihre Flugfahigfeit ju gebrauchen. Gie hat eine ichnarrende Stimme. Ihre Jun= gen werden mit fleinen Beringen ernahrt, fie felbft leben vorzüglich von Moluften und Meer= insetten. Bon oniscus arenarius werden ihre Excremente roth gefarbt. - Gie bruten in un= fäglicher Menge auf ber Infel Grimfoe bei Ice land. Die armen Ginmohner nahren fich im Commer größtentheils von Diefer Lumme und ibren Giern. In der Mitte Mais fliegt fie auf Den Berg, um ihre Gier ju legen. Gie ift nie mit andern Lummen gepaart, fondern jede halt fich fur fich und brutet fo in Reihen ihre Gier in der mittlern Region des Felsens aus. Ihr einziges Gi hat eine Dide Schale, und ift verhaltnismäßig fehr groß. Im Anfang Juni friecht das Junge aus, und Anfangs Juli flurzt es fic foon mit ins Baffer. In Grimfoe lagt man foon Ende Mai Leute in den Berg hinab, um Die Gier Diefer Bogel auszunehmen. Die Jagd

beim Mefte ift leicht. Rugen: Fleifc und Gier. Der Bogel wird geroftet und foll fo gut fcmeden.

Krabbentaucher, Taucherhühnchen. (Cephus.)

Der Schnabel furger als der Ropf, fast tonisch, an der Wurzel dicht mit sammetartizgen Federn bedeckt, stark, gewolbt, mit einer deutlichen Firste; Nasenlöcher seitlich, an der Schnabelwurzel rundlich, mit einer etwas erzhabenen haut umtleidet; Beine sehr kurz, hinzten am Korper; Flügel ziemlich lang, schmal. Schwanz schmal und zugespist. Sie mausern 2 mal im Jahre.

Die Zwerglumme, das fleine Tau= derhühnchen.

(Cephus minor, [Alca Alle.])

Im Winter der Obertheil des Kopfs nebst dem Oberseibe schwarz, am Nacken ein in der Mitte sehr schmales, weißes Halsband, die hinztern Decksedern der Flügel schmal weiß gesaumt. Die Schwungsedern der 2ten Ordnung mit weis sen Spigen, Ohrgegend, Kehle, Borderhals, Seiten und ganzer Unterleib weiß, Unterhals

Somarglich gefledt ober gewolft. Im Commer ift Ropf und Sale bie gur Bruft, und alle obern Theile gang fcmarg; Das Schwarze icheidet fich in der Ropfgegend fdarf vom Beißen, mas alle untern Theile bes Dedt; Beine braunfdmarg, Die Schwungfedern mehr fcmarggrau. Grie braun. Geine Lange betragt 101 und Die Flugelbreite 123 3. Er wird in ungeheuern Schaaren im nordlichen Gronland gefunden, fo weit man die Meere Des Gifes wegen befahren fonnte. Um Jeland ift er ein Standvogel und bringt dort den Bin: ter im offenen Meere gu. Im ftrengen Binter geht er in Die tiefen Buchten und fommt oft ju hunderten um. Benn bas gronlandifche Gis fic um die nordlichen Ruften legt, bringt es ungahlige Schaaren Diefer Bogel mit. Sie find dann vom bunger fo ausgemergelt, bag man fie mit ber Sand ergreifen fann. Auf 36: land und Rorwegen betrachtet man ihre Un: funft ale Borboten flurmifchen Bettere. Die: fer Bogel ift ein Bewohner des offenen Meeres, auf welchem er fclaft, fich ben gangen Sommer aufhalt und im ftartften Sturme mit Leichtig: feit auf ben aufgethurmten Bellen fdwimmt. Gie tauchen vortrefflich mit halb ausgebreiteten

Flugeln, Rahrung fuchend und bei Gefahren. Gie fliegen gut, ber Gang aber ift folecht. Ihr Befdrei hat verschiedene Tone, entweder rufen fie wie try - hy - hy - hy, worauf ein gaderndes allill - re - e - e - e - e auch laut ichreiend: Igiv, folgt. Meerinfetten, Bifcbrut, fehr fleine Krabben und Rrebfe, find ibre vorzügliche Rahrung. Gie haben 2 Brutfleden am Bauche. Mannden und Beibden bruten abwechselnd. Gie niften in großen Co-Ionien auf Felfen, zwiften Felfenfluden. Ditten im Juni legt bas Beibchen fein Gi, immer nur eine fo groß ale ein Taubenei, auf Den blogen Stein. Das Junge futtern fie anfangs aus bem Schnabel, bald aber flurgt es fich ins Meer, fucht fich felbft Rahrung von alten geleitet und beschugt. Die Farbe des Gies ift meiß mit blaulichem Schimmer. Man fangt und fcieft fie. Rugt Bleifd und Gier.

A I f. (Alca Linn.)

Conabel gerade, breit, zufammengedrudt, gegen die Spige fehr gebogen; beide Rinnla: Den gur Balfte befiedert, gegen die Spige ge: furcht; die obere hadig, die untere bildet ei= nen farten Bintel. Rafenlocher feitlich, am Rande linienformig, gegen die Mitte des Schna: bele, faft gang mit einer befiederten Saut gefoloffen. Beine febr furg, binten am Steife ftebend; nur 3 Beben nach vorn, und diefe gang mit der Schwimmhaut vermachfen. Ragel und Flugel fehr furg. - Gie haben mit ben Lummen gleiche Gewohnheit und gehoren gu den gahlreichen Bogelichaaren, melde die Meere der arttifchen Bone bevoltern. Gelten verlaffen fie das Ufer und geben meift nur gur Brutezeit ans Land. Gie ruben auf der Fußmur: gel in figender Stellung, flettern gern auf Schee: ren und Klippen; auch fie haben eine doppelte Mauser. Man hat fie in 2 Unterabtheilungen gebracht.

a) Larventaucher. (Mormon.)

Ihr Schnabel ift furzer als der Ropf und eben so hoch, ja hoher an der Basis, als er lang ist, was ihm ein ungewöhnliches Ansehn giebt. Eine glatte haut umgiebt meist die Basis. Die Nasenlöcher stehen am Rande und sind pur schmale Spalten. Sehr kleine Flügel. Sie

leben auf bem Meere wie die Fettganfe und bruten auf den Felfen. Graben fich Reftlocher, haben 2 Brutflede und legen nur ein Gi.

Der Larven=Papageitaucher, grau= fehliger Alf.

(Mor. Alc. fratercula.)

Seine Lange beträgt 14-16 und die Flus gelbreit e 18-91 3. Scheitel, hinterhale, ein Saleband unter der Rehle und alle obern Theile fcon fdmars; Baden, Dhrengegend und Reble afdgrau, von Somars allenthalben eingefaßt; Unterhale, und alle untern Theile rein weiß; Schwang etwas abgerundet furg, fdmarg. Der Schnabel hoch, febr jufammengedrudt, beide Laden an ben Firften ichneidend und von der Stirne gegen Die Spige fart gebogen, mit 4 Deutlichen Querfurden, der gange vordere Theil roth, ber hintere ichmarglich hornfarben, langs Der Stirne lauft eine orangerothe Bulft, welche ben fcmarglicen Theil fo einfaßt, bag ein brei: ediger Gled entfteht. Die Mundmintel oran: geroth, und die Saut um Diefelbe runglich und fo wie ber Augenliederrand hochroth; fo auch Die Beine, Magel grau; Gris graulich. Die Beimath Diefes Bogels ift innerhalb Des arti: fcen Rreifes, er wird aber gwifden bem 60 und 80 Grad brutend angetroffen. Geine fud: lichften Brutorter find Die Ruften von Jeland und Foroe. Im Binter giehen viele nach bem Drean fublicher, - Es find muntere und pof-Arlice Bogel, deren Rolonien einen fehr belebten Anblick gemahren. Gie figen Abende reis benweise auf bem Rande ber Bogelberge vor ibren Lochern, mo fie eine Stimme gleich ber eines gahnenden Menfchen: aa - baah, fonft ein hartes: orr, orr, boren laffen. In Be: fellichaft find fie meniger icheu, oft dummdreift. Sie vertheidigen fich und beißen durch Saut und Fleifd. Bon den Giern laffen fie fich nicht leicht megfdreden, fdiest man nach ihnen, fo fommen mehrere aus ihren Lodern bervor, fre: den den Sale lang aus, um ju feben mas es giebt, bann matideln fie wieder mit ichnattern: bem Gefdrei ins Restloch gurud. Die Jungen vertheidigen die Alten nicht, wenn man fie ih: nen wegnimmt. Bur Brutgeit fliegen fie oft bin und her und figen gern auf den bochften Felfen. Unter dem Baffer fdwimmt fie mit Flugeln und Fußen fehr gefdwind. Ihre Rahrung be: fteht meift aus Rrebfen und Fifchen. Gewohn: lich ift ihr Brutplag ju oberft im Bogelberge.

Der Bogel grabt die Sohle felbft, mit feinem fcarfen Schnabel und Rageln, fragt meniges altes Gras gusammen und legt nur ein Gi das rauf. Es ift meift bicht unter ber Dberflache und ist es ju tief hinter, grabt man von oben ein. Diefe Deffnung muß man aber forgfaltig wieder verschließen, benn fonft fommt feiner wieder binein, weil fie den Bug nicht ertragen tonnen. Das Reft befieht nur aus einer runden Dob. lung, fo bag mehrere Bogel fich barin umbres ben tonnen. Sie find 6 3. im Durchmeffer und bisweilen 2 Rlaftern tief. Man bedient fich, wie wir icon bemerft, der hunde, fie hervorzuho: len, Diefe gleichen unfern Dachehunden, Doch find fie hoher von Beinen und haben am Dinterdaumen eine doppelte Klaue. Sie pacen den Bogel und bringen ihn lebend, werden aber oft von ben Bogeln zu Schande gebiffen. Das Gi ift fcmugig weiß, mit großeren und fleineren vermafchenen, undeutlich grauen Fleden bededt, 2 3. lang und 11 3. breit. Nimmt man es, fo legen fie noch einmal, auch wohl jum dritten Male. Fångt man Die Alten, fo mird es von andern Artevermandten bebrutet, und man fann auf Diefe Art, mehrere von einem und dems selben Gie wegfangen. Die Larventaucher find monogam; beibe Gefdlechter haben einen Bruts fleden auf jeder Geite des Bauches, beide brus ten und futtern. Gie legen das Futter dem Jungen vor. Das Futter, Das fie oft zwei Deis fen weit holen, besteht in Gandoalen (Ammodytes tobianus), welche fie in fandigen Bos den auffischen und zwar 10-12 Stud ehe fte jum Refte eilen. Den Ropf bes Fifches behale ten fie im Schnabel und ber fcmale Rorper bangt berunter. Rur die Bildung ihres Gona: bels tonnte Dies gestatten, Diese Fifche Die wie ein-Anebelbart herabhangen, auf Diefe Urt gu transportiren. Die Jagd gefchieht meift beim Reffe. Rach Grabas Ergahlung murde auf ben Forverinfeln in 3 Tagen von einer fleinen abgefonderten im Meere liegenden Rlippe 5000 alte Bogel aus ihren Lochern gezogen und boch flagten die Foringer über Abnahme Der Bogel. - Gin einziger Mann fing an einem Lage mit ber foon ermannten Fleiftange 950 Bogel. Rugen: Rleifd, befondere ber Jungen und Federn. Man falt die Bogel auch ein und rauchert fie. Auf den Befimanorinfeln werden den Sommer durch ungablig viel gefangen, den man die Saut abs giebt, fe trodnet und im Binter fatt Torf brennt. Die Jungen laffen fich gahmen. Gee adler und islandische Falken jagen fie, auch

werben fie von Gingeweidemurmern und grofen blauen Laufen geplagt, Die felbft Menfchen angeben und fich fehr feft faugen.

b.) Eigentliche Alfe. (Alca. Cuv.)

Ihr Schnabel ift langer und von Gestalt einer Mefferklinge; an feiner Basis befinden sich Federn bis zu den Rafenlochern, ihre Flügel find zu klein um fich zu erheben, daher fliegen sie gar nicht.

Der Tord = Alf, Klubalf. (Alca torda.)

Lange 1 &. 31 3. Ropf oben, hinterhals und alle obern Theile im Binter fcmarg, Dh= rengegend und Geiten bes Dberhalfes meiß gemifcht, Reble und ganger Unterleib reinweiß, Sonabel fowars mit 3 Querfurden, wovon bie Bre weiß, unter der Reble ein weiß und fcmars gefledtes Saleband, Die hintern Comungfedern mit weißem Saum. Im Gommer ift ber gange Ropf und Reble icon fdwarzbraun, vom Sonas belruden bis jum Muge lauft eine fcmale, glangend weiße Linie, Die obern Theile alle fowarg, die untern weiß, die hintern Comung: federn mit weißem Saum. Der Schwang febr fpigig. Schnabel und Beine in beiden Sahres: griten fcmars; Gris braun. Geine Beimath ift zwifden bem 62 - 72 Grad nordlich; alfo ber Morben Ameritas und Affens. Es ift ein bum: mer und phlegmatifder Bogel, ber gange Stuns ben auf Felfen ober Scheeren figen tann, mit feifem Salfe und gedrehtem Ropfe ; ohne Roth watschelt er nicht von feinem Plage und lagt fich leicht eine Schlinge um den Sals werfen, wenn er auf dem Refte figt. Muf den Fugmur: geln geht er fdwer und ungefdidt wie ein Betruntener. Gigend ruht er aufrecht auf ben langen Gomang fich flugend; fehr gut tlettert er auf die Scheeren, Die bei der Ebbe aus dem Baffer hervortommen, hier ruhet er haufig in Gefelicaft ber Lummen. Bur Brutgeit fliegt er nicht felten bis zu ben hochften Felfen; auch Den Winter fieht man Fluge, Die aber niedrig gieben; er fowimmt fonell, taucht febr gut mit Benugung feiner Flugel; biemeilen fangt man ibn in Regen 20 - 30 Rlafter tief. herr Faber fahe einen bem Die Tupe meggeschoffen maren febr gut tauchen, mobei er blog die Blugel brauchte. Gie haben ein hartes, gabes Leben,

tauden todtlich verwundet, unter und beißen fic am Geetang feft. Die Stimme ber Alten ift ein tiefes: aarr. Ihre Rahrung besteht in fleinen Fischen, besonders Sprotten, arftischen Forellen, Sandaalen auch jungen heeringen. Gie find gefraßiger als Die Lummen. Gie le: ben paarweife, bruten auch abmechfelnd und beis De Gatten haben auf jeder Geite des Bauches einen Brutfled. Ihr einziges Gi ift bidicalig, fehr groß und fomadhaft. Beim Begnehmen Des Gies legen fie ein 2tes und bei Biedermeg: nahme ein 3tes. Die Farbe bes Gies ift weiß, felten nußbraun, mit vielen großern und flei: nen braunen Fleden. Gie mechfeln indeffen febr in Große und Farbe. Die Jungen werden mit Rifden gefüttert und betommen fcon halber: madfen Schwungfedern, und flurgen fic, wie wohl noch unflugfahig ine Meer. Das Gi wird phne Reft auf den Felfen gelegt. Man nugt Rleifd, Fett und Gier. Die Jungen nimmt man nicht. Uebrigens wird ber Fang wie bei den übrigen betrieben.

Der große, furzflügelige Alk. (Alc. impennis. Linn.)

Im Commer: vor den Mugen fieht auf je: Der Geite Der Conabelmurgel ein großer mei: Ber Fled; Ropf, Raden, Ruden, Flugel und Schwang tief fcmarg; Rehle, obere Theile und Geiten Des Salfes fdmargbraun gewolbt, Gei: ten des Korpers dunkelgrau, alle untern Theile rein weiß; über die Federn, welche die Stelle Der Schwungfedern ber zweiten Ordnung ver: treten, lauft ein weißer Saum; Gonabel breit, idwarg; an der Burgel der Dberlade eine tiefe Querfurche, an der Spige feche andere Furchen mit weißem Grunde; und an ber untern Lade find 8-10 meifliche Querfurden. Beine und Mugen fcmarg. Un den Flugeln mangeln die eigentlichen Schwungfedern, ber Schwang ift furg. - Große einer Gane. Lange 2 g. 1-2 3. Das Winterfleid verhalt fich volltommen wie beim Tord : Alf, der Augenfled fcmarg, mit eingemifchten weißen Federn, Unterleib und Reble rein weiß. Er lebt in der arttifchen 30: ne, in Gronland, ift aber nirgends haufig. Die Stellung ift figend und aufrecht; fie geben plump, flettern mit bulfe der rauben Suß: Burgeln und ber Flugel. Außer ber Brutgeit find fie felten am Lande. Somimmen und tau: den tonnen fie fehr gut und brauchen wie bie Gattungevermandten Die Flügel ale Ruder. Auf dem Lande laffen fie fich leicht antommen, doch find fie beherzt und beißen gewaltig um fic. Ihr Gang ift muhfam und matichelig; ihr Ge: forei foll wie: Mangla tonen. Er ift der fel= tenfte unter den Bogeln des Rordens, befon: Ders wegen Mangel an Flugfraft, mo er leich= ter gu tobten ift, theile rafft auch ein ftrenger Binter, dem fie fo leicht nicht entgeben tonnen, burd Rahrungsmangel viele bin. Ihre Saupt: nahrung find Gifde. Muf ben entfernteften Scheeren von Menfchen weit entlegen find ihre Brutplage. Das Gi liegt ohne Reft auf ber Dberflache, von ber Große eines Schwaneneies, Die Farbe des Gies des Tord : Alfs. Gein Fleifc foll gut fcmeden. Die Saute nugen Die Gron: lander ju Rleidungen, mobei die Federn noch innen fteben.

Fettgans, Pinguin. (Aptenodytes. Linn.)

Schnabel langer ale der Ropf, dunn, ges rade, an der Spige gefrummt; die beiden La: ben gleichlang, etwas flumpf; Die obere der gangen Lange nach geffreift; Die untere an Der Bafis breiter, und mit einer nadten platten Saut bededt; Rafengrube fehr lang, mit Fes bern bededt. Rafenlocher verborgen, am obern Theile Des Schnabels nabe an der Schnabel: firfte, und in den auf die Stirn vorgehenden Federn verborgen. Beine fehr furg, Did, gang am Steife febend; vier Beben nach vorn, 3 mit der Schwimmhaut verbunden, die 4te flein und mit ber Burgel an ber innern eingelenft. Klugel furz, ohne Federn, zum Fluge untaug: lich, mobl aber jum Schwimmen gefdidt. Auf Den erften Blid feben die fleinen Federn auf Den Flügeln, wie Souppen aus. Gie finden fic nur in den Polarmeeren, nur jum Bruten fommen fie aufe Land und rutiden mubfam auf bem Bauche gum Refte.

Rach den Schnabeln hat man fie in drei

Unterabtheilungen gebracht:

a) Mit langem dunnem, juspigtem Schnabel, die Oberfinnlade gegen die Spige hin etwas gebogen, auf ein Drittel ihrer Lange mit Federn bedeckt, wo dann die Nasenlocher flehen, von welchen bis jur Spige, eine Furche lauft.

Der große Fettaucher. (Apten patagonica.)

Ropf und Rehle schwarz, hinter ben Ausgen entsteht ein hochzitronengelber Streif, der sich an den Seiten des Halses hinunterzieht, und sich unter der schwarzen Kehle mit der anzbern Seite vereinigt; hinterhals und Ruden sind schwarzenden Leile von der Brust an, weiß, an der Brust mehr oder minder gelb, Flügel schwarzegrau, Schnabel lang und dunn, Zdavon schwarz, Spige und die untere Lade gelblich. Die Beine dick, schwarzige, schwarzbraun, die Zehen groß und duntser. Das Beiße des Unterleibes, ist wie das ganze Gesieder seiden glanzend. hohe

Des Bogels an 3 F.

Er bewohnt die Gegenden ber hoben fud: liden Breiten: Feuerland, häufig auf den Infeln Schetland, Reu: Georgien. Er lebt meift paarmeife und nicht in großen Gefellichaften. Im Januar aber verfammeln fie fich in Schaa= ren und gehen ans Land, mo fie fich bann paarweise an Die einfamften und unfruchtbarften Ruften begeben. Ballfifd : und Robbenfanger fuchen fie bann auf, ber iconen Saute megen, die man zu Labadebeuteln und Mugen benugt. Man fann fie gahmen, fterben aber bald. Ihr Gang ift febr langfam und befdmerlid. Benn fie recht fett find, wiegt einer an 30 Pfd. Gie tonnen ein furchtbares Gefdrei erheben. Die Gatten lieben fich, fo auch Die Jungen Die fie bis gur funftigen Brutgeit fuhren. Gie graben fich auch Sohlen und Gange wie die andern Gattungen. Ihr Bleifd mird nur aus Roth gegeffen.

b) Sprungtaucher (Catarrhactes. Briss)

haben einen starken, wenig zusammengedruckten spigen Schnabel mit abgerundetem Rucken, die Spige ein wenig gebogen. Die Rinne vom Rasfenloche an endigt schief beim untern Drittheil des Randes; Flugel ohne Schwungfedern, ganz unbestedert, nur behaart, zum Fluge untauglich.

Der goldhaarige Sprungtaucher. (Catarrh. chrysocoma.)

Bird etwa 1½ F. lang. Auf dem Ropfe ein Federbusch von ichon goldgelben Federn, welche an den Augenbraunen ihren Urfprung nehmen, und fic auf beiden Seiten des Kopfes an die

Dhrgegend verbreiten, im Affect richtet er fie auf. Beficht, Reble und Ruden fdwarzblaulich, fo aud Die Flügel, alle untern Theile weiß, Der glatte Conabel und Die Augen ziegelroth; Beine gelb= lid. Der Schwanz besteht aus 14 bunnen Federn, Die fast bartlos find. - Dan findet ibn in dem Cubmeer, in Diemsland zc. oft 2-400 Meilen weit vom Lande. Gie find ftete im Baffer und tonnten deshalb Fifchvogel genannt werden. Gie ichwimmen mit außerordentlicher Schnelle und bedienen fich bes Schmanges als Steuerruber, um ihre fchnelle Bewegung gu leiten. Ihre haar: artigen Febern find immer wie eingeolt, und folüpfrig, daber fie nie Feuchtigkeit annehmen. Die Saut fcheint Fett auszuschwigen. Benn fie an die Brutorier gurudtommen, fo find fie ma: ger, und die Saut ift fettleer. Gie fteben und geben auf der gangen Ferfe oder dem gangen Lauf, Der Deshalb auch breit und rauh ift. Ihr Gang foll fprungmeife gefdeben. Dft fieben fie in lan: gen Reihen hinter und nebeneinander und ma: den nur mit dem Ropfe und Salfe Bewegungen, dann erscheinen fie in der Ferne, Rindern, mit Sourgen betleidet, abnlich. Beim Comimmen ift der gange Rorper unter bem Baffer und nur der Ropf ragt hervor. Ihre Floffenflugel Dienen ihnen als mahre Ruber. Bie Die Fifche üben fie Diefelbe Conelle und Gefdidlichkeit aus, ja fie fpringen auch uber das Baffer, wie jene. Benn fie beim Bruten gezwungen aufe Land muffen, geben fie doch jeden Morgen und Abend ine Baf: fer, um ju fifden. Radber fdwimmen fie mie: Der gegen das Land und bleiben dann noch eis nige Beit am Ufer. Dier erheben fie ein furcht: bares Gefdrei, dem Efelgefdrei nicht unabnlid, worin fie fich einander gu überbieten fcheinen. Ihr Leben ift gabe, und wenn ber Schadel nicht eingeschlagen, erholen fie fich bald mieder, ver: theidigen fich tapfer mit ihrem Schnabel, womit fie haut und Fleisch burchbeißen. Cobald Die Jungen Das Meer erreichen tonnen, geben fie Dahin, und fehren gur Brutgeit wieder an Das Land jurud. Ihre Rahrung besteht in Fifden, Beichthieren, besonders Cepien. Bur Brut foarren auch fie fich Gange, in welche ein Menfc leicht geben fann. Diefe Gange laufen nach allen Richtungen, und endigen mit einem Loche, welches mit dem Schnabel gemachtiff, und an 3 F. Liefe hat. Gie figen in Diefem Loche gang verborgen, meift Mannden und Beibden beifammen. Die 2-3 Gier find von fomugig: gelber Farbe. - Im Baffer gu ichießen ift nicht rathfam, weil fie felten gleich bleiben, fondern

leicht durch Tauchen entkommen. Auf dem Lande foliagt man fie todt, doch muß man fich vor ihren Biffen huten, indem fie nach den Beinen haden und ftark verwunden. — Das Fleisch ift hart und unangenehm, und wird nur aus Noth gegessen.

c) Flossentaucher. (Spheniscus. Briss.)

Schnabel gerade zusammengedrudt, an der Basis unregelmäßig gefurcht, Die Spige der Oberfinnsade hatenformig, die der Unterkinnslade abgefluft, die offenen Rasenlocher in der Mitte stehend.

Der geflectte Floffentaucher. (Sphen. demersus.)

Alle obern Theile find fcmarggrau, ebenfo Reble und Baden; uber das Auge lauft ein weißer Streif, ber fic mit dem Beifen des Salfes verbindet. Borderhals und ganger Un: terfeib weiß, oft mit einzelnen runden braunen Fleden; an der Bruft entfteht eine Art von fcmargem Salsband, welches hufeifenformig fich mit feinen Schenkeln an Die Geiten Des Unterleibes hingieht, und nah am Gomange fpigig ausläuft, zuweilen mangelt aber Diefer Streif gang; Schnabel fdmarg, mit einer weiß: gelben Querbinde. Flugelden ichmarggrau. Lan: ge des Bogels 20 3. - Baterland ber fubliche Decan, nom Cap bis jum Polarfreis. Bur Brutzeit am haufigften auf Maluinen und Falf: landeinseln. - Die Gechundefanger nennen ibn: Sadaas, megen feiner bem Gfelgefchrei ahnlichen Tone; Die Spanier: Paxaros ninnos oder Rindervogel, weil ihre Schaaren in der Ferne fleinen Rindern gleichen. Er geht mit gleichsam affettirtem Unftande, ba er ben Ropf fleif und gerade, und den Schnabel in Die Sohe halt. Wenn er vom Lande ins Baffer fliehen will fo verliert er oft das Gleichge= wicht, macht laderliche Purzelbaume, ruticht auch wohl auf der Bruft fort, taucht und fcwimmt aber vortrefflich. Gie find dumm, denn oft icon ichlugen die Matrofen viele tobt, ohne daß die übrigen fich zur Flucht anschickten. Sie mehren fich indeffen tapfer, und haben ein fehr gabes Leben.

Bur Anlage ihrer Rester mahlen ste kleine Infeln. Gine derselben führt den Namen Pinguinsinsel, auf welcher ihre Zahl ungemein groß ist, indem sie von mehr, als 20,000 Bögeln bewohnt wird

Ban Roort foll foon im Sahre 1699 über 50,000 Stud getodtet haben, und Bood ließ im Sabre 1669 bafelbft gegen 100,000 Gier fammeln. Leffon und Garnot, welche eine Reife um die Erde mitmachten, haben und Darüber merkwurdige Radrichten mitgetheilt. Ihr Schiff Urania, ichei: terte an ben Ruften Der Maluinen, und Die Mannichaft murbe nach Lebensmitteln ausge: Gie besuchten Die Pinguininseln, Gee: fdidt. hunde gu finden, doch vergebene. Bei ihrer Un: naberung vernahmen fie ein furchtbares Gefdrei, Dem Efelgefdrei abnlich. Unfanglich mußten fie nicht, mas fie baraus machen follten. Da aber ber Lag anbrad, erblidten fie Laufende Diefer Bogel. Die Tauder verfdmanden im bo: ben Grafe, in ihren Lodern. Man fand fie aber, und in 5-6 Stunden hatten 10 Mann 60-80 Stud erichlagen. Giner mog 10-12 Pfd., in: beffen blieb nach abgezogener Saut und Entfer: nung ber Gingeweide nur 3-4 Pfd. Fleifch, mas nur megen des übeln Gefdmade, ber bun: ger zu effen erlaubte. Der Darmfanal mit bem Magen mißt 25 F., und da der Bogel nur 19-20 3. lang ift, verhalt fich Dies jum Rorper, wie 16 ju 1. Ihre Rahrung besteht in Fifden und Beichthieren. Gie leben paarmeife, und mahlen gern zu Brutplagen besondere fleine Infeln mit Torfboden, die mit hohen Gumpfgrafern oder Geggenarten bededt find. Zwifden Diefen Gras: malbern merben nun eine Menge Fuffeige an: gelegt, welche fich nach allen Gegenden bin ver: breiten. Gie unterhohlen den lodern Boden als lenthalben, und bauen fich ihre unterirdifden Bohnungen, fo bag bie barauf gehenden Ban: Derer berabfallen, und in Die Gufe gebiffen mer: Gie burchgraben den Boden in lauter Den. Biereden. Jedes dient ale Refiftelle, und wird ausgehöhlt. Der Gingang ift breit, aber ziemlich niedrig. Jede Soble ift ubrigens burd unter: irdifde Gange mit der benachbarten verbunden, fo daß fie fich befuchen tonnen. Die Gallerien find meift 10-12 F. breit, und geben auf 3 Geiten landeinwarts ju ben Lochern. Die 4te Seite bleibt offen, und fuhrt gum Deere. Golde Brutplage nehmen oft einen Raum von 3-4 Morgen Landes ein. Die Pinguininfel mird von den 3 Gattungen ber Floffentaucher bewohnt: Dem geflecten; welcher bei weitem ber hau: figfie ift, und ben Sauptstamm ber Republit aus: macht. Rad ihm fommt ber Sprungtaucher, beffen Individuen aber weniger gahlreich find, und endlich der große Floffen: oder Ronigs:

tauder, welcher nur in einzelnen Paaren un: ter ihnen ift.

Das Mannden fist immer neben bem bru: tenden Beiben, und wenn Diefes das Reft ver: lagt, folupft es felbft binein, und brutet fort, fo daß die Gier in der Regel niemals von beiden Gatten verlaffen merden, mas megen einer fonderbaren Gigenheit Diefer Bogel nothig ift. Cobald namlich die Gier der Rachbar erblicht, fucht er fie auch zu ftehlen, um fie felbft auszubruten, nicht um fie gu freffen. Der große Flof: fentaucher befonders lagt bergleichen Gelegen= beiten nie vorüber, einen folden Raub gu begeben, und fo findet man biemeilen Junge aller Arten in einem Refte, mas mohl in der Bogel= geschichte bei feinen andern vorkommen mochte. Dagegen todten fie Die Jungen der andern auf graufame Beife, wenn beren Eltern etwa um= gefommen find. Wenn man die Taucher am Ufer fieht, fo marichieren fie in Truppen gu 4, 6 und mehrern, wie die Goldaten auf der Pa: rade; auf den Brutplagen ift indeffen eine beftandige unordentliche Bewegung bemerfbar. Die einen fommen aus den Lochern beraus, und fpagieren umber, andere machen in den Gallerien den Rachbarn Befuche, und durchfreuzen alle Bange. Die Gier unferer Art find fo groß, als Ganfeeier, von grunlicher Grundfarbe mit brau: nen Fleden. Gie bruten mit großer Treue. Im Reste überrascht, flieben fie nicht, machen aber Die fonderbarften und lacherlichften Bewegungen mit dem Ropfe von einer Seite gur andern. Sobald die Jungen gu fdwimmen fabig find, verläßt die ganze Rolonie das Land.

Die zweite Familie enthält: Die weitfliegenden Schwimm= vögel. (Longipennes.)

Man trifft fie auf ber hohen See. Ihre starke Flugfähigkeit macht, daß sie sich überall verbreitet haben, so daß sie die Schiffer auf alsen Meeren antressen. Man erkennt sie meist an ihrem freien oder ganz fehlenden Daumen, an ihren sehr langen Flügeln und ihrem ungezähmelten Schnabel, der bei den erstern Geschlechztern an der Spige hakenformig, bei den übrigen einfach zugespigt ist. Ihr unterer Larnnr hat an jeder Seite nur einen eigenthumlichen Mustel. Ihr Magen ist fleischig, und ihre Blindzdarme kurz.

Sturmvogel. (Procellaria, Linn.)

Schnabel mittelmäßig, sehr hart, schneidend, an der Basis breiter; die Spige zusammenges druckt, gebogen, Kinnsaden gefurcht, an der Spige plöglich einen haken bildend, die untere gerade und abgestumpft; die Nasenlöcher röhrensförmig, vorstehend, aus 2 Röhren bestehend, welche aber nur eine deutliche Deffnung bilden; Beine mittelmäßig, dunn, mit 4 Zehen, deren hintere nacht, aus einem spigen Nagel besteht und an der Ferse sist. Man kennt 28 Arten. Sie machen ihr Nest in Felsenlöcher und sprigen auf die, welche sie angreifen, einen öligen Saft, mit dem ihr Magen stets angefüllt zu seyn scheint.

Der Ciefturmvogel. (Procel. glacialis.)

Die Lange von der Schnabelfpige bis gum Comange 1 F. 91 3. Ganger Borderleib, Dber: fopf, Sals und Schulter weiß graulich überlau: fen ; Die übrigen Theile Des Dberforpers hell afch: grau, Schwungfedern graufcmarglich; der abgerundete Comang oben weißgrau, unten weiß. Der Schnabel fart, furg, gedrungen mit hober, breiter, vorn aufgeworfener Rafenrohre, melde Durch eine tiefe Furche von der Dberfonabellade geschieden ift, und vorn nur eine Deffnung zeigt, Doch fo, daß man etwas im hintergrunde Die Scheidemand ber Rohren Deutlich fieht. Bor ber Deffnung macht ber Schnabel eine Biegung in Die Sohe und bildet, fich niederfentend, einen far: fen Saten, wie bei einem Raubvogel, Der aber, Da er feitwarts eine tiefe Furche bat, wie ange: fest ericeint; auch am Unterschnabel ift ber vor: Dere Theil breiter, und wie angefest. Sonabel ift gelb, auf der Rafenrohre bornfarb. Die Beine furg, dunn, Die Beben lang. Die bin: terzehe beffeht aber nur aus einem Ragel, bin: ten am Laufe eingelenft, fo bag ihre Spige beim Steben ben Boden nicht berührt. Beine und Bris gelb. - Die nordlichen Meere ber beiden Beken find Diefer Bogel Aufenthalt. Ihr Flug ift febr foon, fonell und ficher. Mit rafdem Blu: ge folgt Diefer Bogel bem Gange der Bellen, fo Dag man glauben follte, er murde von den Bo: gen verfclungen, benen er aber mit außerordent: lider Gewandtheit auszuweichen verfteht. trogt dem ftartften Sturme, und bringt gange Zage lang uber ben Bogen fliegend gu. Er geht auf Der Coble, aber folecht und ungern. 2m

haufigften finden fie fic auf treibenden Ball: fifchafern ein, in Chaaren, und ba, fo wie an Den Brutplagen laffen fie fic antommen, fonft find fie fehr fcheu. Die Stimme ift gadernd, wie gagagager, im Borne: fart. Gie taus den nicht. Mit andern Arten der Gattung ha= ben Die Gieffurmvogel Die Gewohnheit gemein, wenn fie jemand angreifen will, einen Strahl von gelbem Thran gegen ihre Berfolger auszu: fpeien, modurch ihre Federn nicht felten verdor: ben werden. Die Alten fpeien Diese Bluffigteit oft eine Gle weit, ohne die geringfte Unftren: gung in einem geraden Gtrahl von fich. Den Jungen im Refte toftet Dies mehr Mube. Bu Der Zeit, Da Die Bewohner Der Infel Grimfoe Die Jungen ausnehmen, bringen fie fleine Gefcbirre mit, in welche fie Die Bogel ihren Thran ausspeien laffen und melden dann diefe armen Infelbewohner im Winter in ber Lampe bren: nen. Die gang garten Jungen fonnen bies nicht. Sie gehören zu den fetteften auf der Rlippe bru: tenden Bogeln, und dennoch ift ihr Fleifc bas wohlschmedendfte von allen auf dem Bogelberge Grimfoe brutenden Bogeln. Das Fleifc ift weiß, wie buhnerfleifd. Meerinfeften, Medufen und ichmimmende Beichthiere machen ihre Rahrung aus. Um liebften ift ihnen Balfifch= fleifc und Sped. Gie fammeln fic Dabei und ganten fic mit den Wallfichfangern darum. Shr ftarter frummer Schnabel Dient ihnen gum Ber= ftuden. Mit einem Stud Leber an einer Angel fann man fie, wie die großen Raubmoven, leicht fangen. Mitte Mart legt Diefer Bogel icon fein Gi, nur eine. Grimfoe und Die Infelgruppe Bestmanor Dienen vorzüglich ju Brutplagen. Das Gi ift rauhicalig, groß und weiß. Gie follen 6 Bochen barauf bruten. Das Jun= ge ift gleich mit Flaumen bededt, da das Junge Der Tolpel gang nadt aus dem Gi fommt. Mann: den und Beibden bruten gemeinschaftlid. Das Gi liegt auf blogem Felfen in einer Spalte. Beide Gatten haben Brutflede. Das Ausneh: men der Jungen mird durch das und fcon befannte Geil, an dem ein Mann berabgelaffen, bewirft. Die Jungen find außerordentlich fett. Man betrachtet fie als eine Delifateffe, und falgt fie fur den Winter auch ein. Nach herrn Fabers Bericht werden in Jeland jahrlid 25-30,000 Junge Diefer Bogel ausgenommen, alfo Die Brut von 60,000 Bogeln. Merkwurdig ift es, daß die Babl der Bogel doch jahrlich gunimmt, ba ein großer Theil Die Gier an Orte legt, wo man nicht hintommen fann, und fo bleibt ben armen 42 *

Bewohnern eine unerschöpfliche, wiewohl muhfame Nahrungsquelle. Im September verlaffen alle die Bruteplage, und halten fic den Winter uber im offenen Meere auf.

Sturmfd) walbe. (Thalassidroma.)

Schnabel furz, dunn, sehr zusammengezdruck, an der Spige sich schnell frummend; Masenlöcher vorstehend und in eine Robre verzeinigt; Flügel lang, spigig; Beine dunn; Kopf langer als die Mittelzebe, die hinterzebe kaum bemerkbar, die 3 vordern dagegen lang; Schwanz viereckig oder schwach gegabelt. — Sie gehören zu den kleinsten Schwimmvögeln und finden sich allen Meeren.

Die kleinste Sturmschwalbe. (Thalass. pelagica.)

Lange 5 3oft 6 Linien, Flugelbreite 242 3. Gang ichwarzbraunlich, nur über die langen Ded: federn Des Comanges lauft eine breite meiße Binde, und an den Beiden ift ein weißer Fled. Rach Grabe ift bas Innere Diefer fleinen Bogel von dem aller andern gang verfchieden. Die Jungen find fehr tlein. Die Luftrohre theilt fic in 2 gleich große Acfte nach jedem Lungenflugel; Berg und Leber Dagegen febr groß, fo daß fie Den größten Theil der Bruft: und Bauchhohle einnehmen. Den Magen bemerft man faum, er erfceint nur als ein zwifden dem Schlunde und ben Gedarmen gefdlungener Anoten, mit etwas Thran gefullt. Der Blinddarm ift groß. Die einzigen befannten Brutplage finden fich in den nordlichen Meeren. Da man ihn aber von einem Pol jum andern antreffen foll, fo ift feine unumidrantte Beimath die Luft, über dem un: ermeglichen Drean, und er ift außer ber Brut: zeit fonach überall und nirgends. - Db es aber nicht verschiedene Arten fenn mogen, laffen wir Dahingestellt. - Beim Sturm fuchen fie Schug unter Dem Borde Des Schiffes, verfundigen ihn alfo nicht. Er treibt fein Befen im Berborgnen, verftedt fich forgfaltig vor dem Blide ber Men: fcen. Die Loder, in welche er brutet, find febr verborgen, er felbft aber auf offnem Meere hau: fig. Geine Schlupfwintel verrath er durch Anur: ren und Diepen, mas er des Rachts horen lagt. Dabei tann er leicht gefangen werden, ba er nie einen Berfuch gum Entfliehen macht. Er ift fo harmlos, daß er fich nicht einmal wehrt, fon:

bern nur feinen Ihran von fich fprift. Auf bem Bimmer ift er fo gahm, fich berumtragen gu laffen und es brudt fich in feiner Stellung tiefe Melancholie aus. Er fucht nicht nach Rahrung gleich ben meiften Seevogeln, Die fich verloren balten, wenn fie fein Baffer feben. Dr. Graba trug einen frei auf der Sand, ohne daßer auf der Strafe davon floh. Ale er ihn aber am Ufer Des Mecres in Die Bohe marf, floh er mit reis gender Schnelligfeit erft gegen den Bind und fucte dann mit halbem Binde Die Gee. Der Flug gleicht dem der Rauchschwalbe, fo lange die Gee ruhig ift; beim Sturm ichmeben fie mit ber größten Leichtigfeit uber und gwifden den Bel: len, dann fieht man fie wieder uber die Spigen der Wogen hinfaufen, wozu ihnen die verhalt= nigmäßig langen Beine Dienen, und Die Flugel, mit denen fie fcmeben.

Ihr Gefdrei ift: feteret-i auch mibl, wihl, ua, ua. Gie umichweben die Schiffe oft mehrere Tage hintereinander, ohne daß ein Sturm eintritt. Benn ihre Schwingen aber ben Glementen nicht widerfteben tonnen, merden fie oft meit in's Land verschlagen, und wenn fie Die Gee nicht mehr feben tonnen, mit banden gegriffen. Ihre Nahrung besteht mahrschein= lich in tleinen Schleimthieren, Dedufen 2c., melde auf der Dberflache des Meeres herumschwim: men, und von ihnen im fonellen Fluge erhafct werden. Rach Graba niftet er in Felfen und macht durch lofe Steine und Gerulle fich ein Loch fo tief, als moglich in die Erde. hier auf einige Grashalme legt er fein einziges rundes meißes Gi, Ende Juni. Mannchen und Beibden rupfen fich Federn am Bauche jum Brutfled aus. Beide Gatten bruten.

Sturmtauder, Puffin. (Puffinus.)

Schnabel im Berhaltniß langer, als bei den Sturmschwalben, auch dunner und schäftiger, als bei den Sturmvögeln, und die untere Schnabellade folgt der obern in der Biegung nach unten. Die Rafenlöcher sind röhrig, aber nicht doppellaufig, wie bei den Sturmvögeln, sondern wenig vorstehend, öffnen sich völlig getrennt nach oben, und stehen ganz offen. Die Hinterzehe besteht, wie bei vorigen, in einem Ragel, der beim Stehen den Boden nicht berührt. Die Klauen der Borderzehe spisig. Sie tauchen, die vorigen nicht.

Der nordische Sturmtaucher. (Puff. Anglorum.)

Lange 12-13 3. Der febr bunne Schna: bel 1 3. 7 Linien lang, der auß 12 Federn be: febende Schmang abgerundet. Alle obern Theile find fdmart; Seiten des Salfes und der Bruft grau gewolft; alle untern Theile rein meiß; Die Schwimmbaute weißlich fleischfarben, mit Bris dunkelbraun, Die braunen Streifen. Beibden haben einen Brutefled am After. Der junge Bogel mehr braun als ichwarg. Gie be: wohnen die Rufte von Jeland; in Menge um St. Rilba und um die Arfaben 2c. Gie fliegen meift nur bei der Morgen : und Abenddamme: rung, ben Lag uber fieht man fie nur felten. Gie fliegen aus ihren Lochern gu 10 - 40 Stud aus, meift hinter einander. Gie halten fich gern nabe an den Ruften, ichwimmen oft und tau: den gut. Im Binter halten fie fich im offnen Meere auf. Gie leben mahricheinlich von Fiichen, und niften auf hohen Felfen, deren Dber: flache mit Dammerde bededt ift; in diefe und in die Rigen der Felsen graben fie ihre Refter oft mehrere Glen tief, und Die Gange Dagu maden meift Rrummungen. Im Ende berfel: ben ift bas Reft, aus wenig welten Salmen gu= fammengefest, auf welchen das eine, fast runde, ungeflecte rein weiße Gi, liegt. Die Alten, Die man berauszog, fpien fein Fett aus, maren aber gornig, beißig, und fnurrten wie ein junger Sund. Die Jungen find fehr fett, und geben ben Bewohnern Die lederfte Speife. Daber icont man Die Alten, und lagt ihnen das Gi.

Sturmlumme. (Halodroma.)

Schnabe! fehr furz, gerade, zusammenges drudt, hart, in die Lange gestreift, an der Burzel etwas breiter, an der Spise dagegen zusammengedrudt und fehr hakenformig. Die Nasensoder an der Burzel, nach oben gerichztet, deutlich, an ihrer Wurzel eine Rohre bilzdend, welche aber durch eine Speidemand in Theise geschieden wird. Beine furz, nur 3 Zehen vorn, hinten gar keine; Flügel kurz.

Die Berardsche Sturmlumme. (Holod. Berardi.)

Sanze Lange 6-83. Dbere Theile fcmarz, alle untern weiß; Die Baden graulich und Die

Seiten ber Bruft schwarzlich. Die außern Festbern, bes furzen Schwanzes schmal, weiß gestaumt, besgleichen die Schulterfedern. Der Schnabel schwarz, die Beine grau. In der Rabe der Maluinen hat man ihn gefunden. Da er gut taucht, lebt er wahrscheinlich von kleinen Fischen.

An merkung. Sturm fäger. (Pachyptila. Illg.) Schnabel ftart, did, breit, niedrig, ftach, die obere Lade an den Seiten start aufgedunssen; oben mit deutlicher Firste, Spite hakenförmig zusammengedrückt. Die Nänder der Schnabelladen inswendig mit knorpelartigen Querblättchen gezähnelt, also sägenförmig; die untere Schnabellade ebenfalls stach, aus 2 an der Spite vereinigten Bogen gebilzdet, zwischen welchen ein kleiner Kehlsach ist; die Masenlöcher haben 2 deutliche Deffnungen, und bilzden 2 kurze Nöhren; statt der Hinterzehe ein sehr kurzer Nagel.

Der gebanderte Sturmsager. (Pach. vittata.) Länge 11 3. Ueber den feilförmigen Schwanz reichen die Flügel hinaus; alle obern Theis le graublau, am Ropfe dunkler, Schwanz: und Schwungfedern an der Spige schwarz, und über die Flügel läuft ein schwärzlicher Streif; die äußere Fahne der Schwungfedern schwärzlich, die innere weiß. hinter den Augen eine dunklere Binde. Schnabel schwarz, Beine blaßblaugrau. Baterland die südlichen Meere unterm 58 Grad.

MI batros. (Diomedea.)

Schnabel sehr lang, sehr flark, an den Seisten schneidend, zusammengedrudt, gerade an der Spige, aber sich ploglich umbiegend; Schnasbelruden abgerundet, obere Schnabellade an den Seiten gefurcht, an der Spige hakenformig, unstere Lade glatt, mit abgestugter Spige. Rasenslöcher seitlich, von der Schnabelwurzel entsernt, röhrenformig, an den Seiten bededt, nach vorn offen, in einer Furche liegend. Beine kurz, nur mit 3, aber sehr langen Jehen, welche ganz mit der Schwimmhaut verwachsen sind, die Seitenzehen mit einem hautrudiment; Rägel kurz und stumpf. Flügel sehr lang und schmal. Schwungsfedern furz, die der 2ten Ordnung lang. Man kennt mit Bestimmtheit 5 Arten.

Das Seef d aaf. (Diomed. exulans.)

Diefer Bogel fommt unter mancherlei Far: benverfciedenheiten vor. Die Sauptvariationen find : Ruden graulich; Die Farbe verbreitet fic über die Flügel, und wird immer brauner gegen Die Spige und gegen den Bauch bin. - Ruden und Bruft, fo wie Die Dedfedern ber Glugel blendend weiß; der übrige Flügel fcmarg. Das Beife ift mehr oder minder verbreitet zc. Die Beine find fleischfarb, ber Gonabel gelblich; ber Sale furg und did. Die gange Lange über 3 F., Flugelbreite 10 F. Man findet fie vom Bor: gebirge ber guten hoffnung an, bis nach Reu: Solland. Er ift nicht wild, und nur felten braucht er feinen großen Gonabel, womit er febr vermunden fann, ju feiner Bertheidigung. Er fliegt meift gang nabe auf dem Baffer, und nur wenn es fturmt, erhebt er fich hoher. Der ftartfte Sturm fceint ihm nicht im minbeften binderlich zu fenn. fr. Marion de Proce traf unter bem 34 Grad fudlicher und 91 Grad offlicer Lange eine große Bahl Albatroffe an, welche fich um den ftintenden Cadaver eines Ballfiches ftritten. Ginige flogen majeftatifc um bas Schiff, andere fagen ruhig auf dem Meere, die Mehrzahl aber fattigte fic an dem Cabaver. Man ließ ein Boot ins Meer und naherte fich den Bogeln, die mit der Sand ju fangen gemefen maren, hatte man nicht ihre Schnabelhiebe gefürchtet. Man folug fie Daber nieder, und erhielt fo 8 Stud in furger Beit. Diefe Dummheit ift aber noch mit einer Schwies rigfeit, fic vom Baffer zu erheben, verbunden, Denn fie muffen, um fich vom Baffer zu erheben, 40-60 Toifen über demfelben hinfchießen, ehe es ihnen gelingt, Luft zu faffen, und fich in Die Luft zu fomingen. Die Zeidnung mar bei ben Grlegten fehr verschieden, braun, weiß, grau verschieden vertheilt, doch feins dem andern gang ahnlich. - Ihr Gefdrei haben einige mit Dem des Gfele verglichen. Gr. Marion vergleicht es mit bem Grungen eines Someines und bem Wiehern eines Pferdes. Ihr Reft ift fehr unfunft: lich, und wird in einer trodnen Bertiefung an: gelegt, damit das eine große weiße Gi nicht berausfalle. Meltere Schriftsteller geben an, baß fie mehrere Gier legen follten. Ihr Bleifc ift hart, und von thranigem Gefdmad. Die Ramt: fcadalen machen aus den Flugeln Pfeifenroh: re, und eine Art von Ramm. Die Gier follen

gut schmeden, der Dotter foll aber beim Rocen nicht hart werden.

Meve. Mbve. (Larus. Linn.)

Schnabel lang oder mittelmäßig, fart, bart, jufammengebrudt, ichneidend, gegen Die Spige gebogen; Die untere Schnabellade bilbet einen vorfpringenden Bintel. Rafentocher feitlich, in Der Mitte Des Schnabels in Die Lange gefpal: ten, fomal durchgebend. Beine dunn, über Die Anie nadt, Lauf lang; die 3 vordern Beben gang mit einer Saut verbunden, Die Sinterzebe frei, furg, boch, oben eingelenft. Flugel lang, über den Schwang hinausreichend, ber aus 12 Federn besteht. Ihre Schaaren bedecken die Ruften aller Meere, von einem Pol jum andern. Gingelne Urten find fehr weit verbreitet. Gie find fehr gefraßig, trage, feig; in ihren Beme= gungen langfam und nur im Fluge fchnell. Alle Arten find in der Jugend geflect; dagegen haben die ausgewachsenen nur 2 Farben, weiß und ichwarz oder ichwarzblaulich oder hell afch= grau, Unterleib und Sale meift auch der Schwang, rein weiß. Die großen Arten fommen felten tief ine Land, dagegen die fleinern um befto haufiger. Es find mahre Nasvogel oder Beier Des Meeres, indem fie Ruften und Baffer von todten Thieren reinigen. Mas, todte und le: bendige Fifche, Beichthiere, Fifchrogen, Infetten, Rrebfe, ausgeworfene Gingeweide, furg alle thierische Refte verzehren fie. Ja Rrante und Bermundete werden felbft von ihren eigenen Artstameraden angefallen, und verzehrt. Gie verdauen fehr ichnell, daher find fie immer bungrig, und man fann wie von den Sturm= vogeln fagen : fie leben, um ju freffen. Gie tonnen aber auch den Sunger lange aushalten, eine Gigenschaft, Die ihnen bei großen Sturmen, mo fie nichte erhafden tonnen, gut gu ftatten tommt. Sie niften meift in großen Gefellichaften. Die Angahl der Gier fleigt von 2-4. Ihr Fleifc wird nicht gegeffen, mohl aber Die Gier. Go nußt man auch ihre Federn. Das Gefdrei ift hochft unangenehm. Merkwurdig ift es, daß fie, erichredt oder verfolgt, fich leicht erbrechen und die gange verschludte Mahlzeit durch den meiten Schlund von fich geben. Dies benugen Die Gomaroger :, oder Raubmeven, jagen fie und fangen bas Erbrochene auf, ehe es noch ins Baffer fallt. Man fennt 21 Arten.

Die Mantelmeve. (Lar. marinus.)

Beim alten Bogel ift ber Mantel fdmarg: lich ichieferfarben, Beine weißlich, fleischfarben; Augen gelb, Ropf, Sale, Unterleib und Schwang rein und blendend weiß, Schnabel gelb, am Ragel hellgrau, der Mundwinkel und Augenlieder: rand orangefarben. - Im Berbft und Binterfleid wird der Augenliederrand dunkelroth, Ropf und Dinterhals mit ichwarggrauen, wenig begrang: ten Shaftfleden und die Gegend um die Augen, mit fomargliden Schaften. Schwungfebern fowars mit weißen Spigen. Beim Jungen: Schnabel hornichwars, Gris braun, ber Rorper fomugig weiß, graubraun und braungefledt. Diefer Bogel ift febr weit verbreitet. Er be: wohnt die Meere von Rordeuropa, Rordaffen und Mordamerita. Den Menfchen fcheuen fie febr. Man findet fie einzeln, auch in Gefellichaf: ten auf Sandbanten, Rlippen 2c. mit eingezogenem Salfe und magerechtem Rorper figend. Die Alten und Jungen nicht brutfahigen bilben befondere Gefellicaften. Ihr Gefdrei ift faft mie bas Bellen eines fleinen Sundes: mamag, mamag, dann auch guivis, die legte Gilbe lang gezogen. Bei Sturmen fliegen fie tief auf bem Baffer hin, fo daß man glaubt, fie werden von den Bellen bededt, fegen fic auch mohl zwis fcen tobende Bogen und laffen fic von ihnen tragen. Gifche und Mas freffen fie am liebften. Rleine Fifche und Bogel verfcluden fie gang. Febern und Graten merfen fie leicht burch ihren großen Solund wieder beraus. Gie bruten in Den nordliden und nordoftlichen Gegenden Guropas. Ihr Reft befteht aus Seegras. Es enthalt 2-4 ziemlich große 31 3. lange und 21 3. breis te Gier, welche auf duntelolivenbraunem Grun: be, mit größern und fleinern fcmargbraunen Rleden überall, beinahe gleichformig befegt find. Sie find fower, am leichteften noch an ben Brut: ortern ju ichiefen. Bleifc gabe und ichlecht. Rugen geben Federn und Gier.

Die Silbermeve. (Lar. argentatus.)

Der alte Bogel im Sommer: Mantel blau: graulich, Augenliederrand orangegelb, Ropf, Sals, Unterleib und Schwanz blendend weiß, Schwungfederspigen schwarz mit weißen Fleden, Schnabel odergelb, am Nagel lebhaft roth; Iris gelb. Im Binterfleide ift Ropf, die Stelle vor

den Augen, Raden und hinterhals weiß, mit graubraunlichen Schaftfleden. Im Jugendtleid ift ber Schnabel hornfdmars, an der Burgel lichter, Mugenliederrand tiefgrau, Gris graus braun; Ropf und hinterhals hellbraun, mit bellgrauen Feberrandern; der gange Unterforper grau, überall graubraun gewolft und geflect. Lange 22-23 3. Das Beibden etwas fleiner. Much Diefe Urt ift weit verbreitet, an ben Ufern Der Rordfee, an ben Ruften Englands, Some: bens, auf ben Forverinfeln zc. Gie ift fehr ge= fellig, und lebt auf Wanderungen und gur Brutegeit in großen Schaaren, ba die andern fonft nur in tleinen Truppen, oder mehr einsam leben Sie foreit fehr haufig und fart: teut - eu feuf mit durchdringendem Tone. Bei ben Brutortern giouv lang gezogen. Gie ift ges mandt, fluchtig und fcheu, figt mit eingezoge= nem Salfe und magrechtliegendem Rorper auf Sandbanten. Ihr Flug ift leicht, icon, gerade aus. Taufende von ihnen bruten auf der Infel Sylt. herr Naumann befdreibt fehr artig ihre Brutplage, gedenft ihrer Menge, ihr heißeres Gefdrei: Sahaha und die beim Beibchen gleichsam Bache haltenden Mannden ihm ihr : Giaut, jaut, jauf entgegenrufend. Ihre Rahrung ist die der vorigen Art. Gie nissen auf Felsen, auch auf Sanddunen. Auf Gult liefern Diese Meven allein jahrlich 10,000 Gier. Gin bloges Gandloch mit vertrodnetem Geegrafe (Jostera marina) und Blasentang (Fucus vesiculosus) oder mit Salicornien ausgefüttert, bil= det das Reft; worin 3, felten 4 Gier gefunden mer= den. Gie find etwa 33. lang und 23. breit, dunn= fcalig, fcmad glangend, die Grundfarbe braun= lich olivenbraun, gelbbraun, graulich, gelbgrun ober blaggelb in allen Schattirungen, Die Fleden olivenbraun, oder duntelbraun, oder afcgrau, groß oder flein, dicht oder dunn gefaet, jumeis len nur mit einem oder zwei, felten gang ohne Flede. Ihr Rugen befteht in Giern und Federn. Das Fleisch Diefer Bogel mird nicht gegeffen.

Die Lachmeve. (Lar. ridibundus.)

Im Commer hat der alte Bogel folgende Farben: Ropf, Naden, Rehle und Oberhats schon duntel cofoladendraun, Augenliederrand orangefarben, um die Augen ein weißer Ring, Mantel hell aschgraublaulich, alle andern Theile rein weiß. Schnabel und Beine dunkelroth, Augen braun; Schwangfedern weiß mit schwarzer

Spige, Die außerfte mit ichwarzem Rande. -Sm Winter ift der Raden grau, an ben Dhren ein ichwarzlicher Gled, Baden graufdmarglich gewolft, Stirne, Sale, alle untern Theile und Comang rein weiß, das Uebrige wie im Coms mer. - Beim jungen Bogel ift ber Schnabel borngelb, an der Spige ichmarglich, Fuge fahl: grau; Ropf braunlich, vor ben Augen ein ichwarzbrauner, an den Dhren ein lichtbrauner Fled; der Naden weiß; der untere Sinterhals, der Dberruden und die Schulterfedern hellbraun, mit roftgelblichen und weißlichen Federrandern; Dedfedern der Flugel filbergrau; Borderhals und ganger Unterleib nebft bem Schwanze weiß, legterer mit einer ichmargen Endbinde. Die Bur: gel und Geiten des Unterhalfes roftgraulid. Lan: ge 15, Flugelbreite 391 3. Diefe Meve fcheint febr weit verbreitet und ift die einzige, welche regelmäßig auf ben Landfeen im Centrum von Guropa und auf den großen Fluffen fich aufhalt und dafelbft brutet. Gie fdeint die fugen Baffer ben falzigen porzugieben, und geht nie aufe offene Meer. Gie niften in Chaaren an ben Geen des nordlichen Deutschlands; am Boden: fee bruten fie auch. Im Berbft verlaffen fie den Rorden, und icheinen auf den Geen der Schweis und Italiens ju übermintern. Es ift ein lebhaf: tiger und unruhiger Bogel. Er hat einen fcho: nen Flug, und fdwimmt gut. Die Rachte brin= gen fie auf dem Baffer gu. Ihr Gefdrei ift freis fcend: Kriah firr und fred, fred und im Born: frrr, fred, ed ed. Gefangen mird fie febr gabm, erfdredt erbricht fie fich leicht. Ihre Rahrung besteht aus allerlei Bafferinfet: ten, Rafern, Getraide. Sie fuchen Diefelben nicht allein auf dem Baffer, fondern auf Biefen und auf frifch gepflugten Medern, wie Die Rraben, wo fie Rafer, Deren Larven, Spinnen, Regen: murmer u. bgl. auflesen. Im April fommen fie Ihre Beinde verfolgen fie mit bei uns an. großem Gefdrei. Gie niften in großen Gefell: icaften, bauen auf Rohrhorfte ihre Reffer neben einander von trodnem Schilf und Rohr. Darin findet man 2, bochftene 3 große mit deutlichen Poren und ichmadem Glange, 25 bie 27 Linien lange und 29 Linien breite Gier. Gie merden in 16 Tagen von beiden Gatten ausgebrutet. Die Grundfarbe ift olivengrun oder graulich, graugrunlich oder braungelblich, mit hell oder Dunkelbraunen und fdmargbraunen Fleden be: faet. Die Gier merden gegeffen. Auf ihre Fein: De flurgen fie fich und vertreiben fie durch ihr Soreien und burch ihre Schnabelhiebe. Mit fleiz

nen Studen Fleisch kann man fie erhalten, Baffer barf aber nicht fehlen.

Raub = Schmarogermeve. (Lestris.)

Schnabel mittelmäßig fart, bart, malgen= formig, ichneidend, jufammengedrudt und gebo= gen, an der Spige mit einem Saken. Dbere La: de mit einer Bachshaut bededt, die untere bil: det einen vorfpringenden Bintel. Rafenlocher gegen die Spige bes Schnabels quer, fcmal, hinten durch eine Saut geschloffen, durchgehend. Beine dunn, Laufe lang; die 3 vordern Beben Durch eine Schwimmhaut gang verbunden; Die Sinterzehe fehr flein, auf derfelben Sohe mit Den vordern febend. Ragel groß, fehr frumm. Somang abgerundet, Die beiden mittlern Federn immer langer. Flugel mittelmaßig. Fruher ma= ren fie mit den Meven verbunden. Gie find aber merflich von ihnen unterschieden, find beherzte, fubne und gantifche Bogel. Gie verfolgen Die Meven, mo fie Diefelben nur treffen. Wenn bei den Meven die weiße und graue Farbe vor= berricht, find bei den Raubmeven die Farben immer Dufter, mit Ausnahme einer Urt. Bei den andern ift der Unterleib mehr oder minder von der Karbe des Oberforpers braun oder grau: braun. Es find mahre Raubvogel, die von Fifchen, jungen Bogeln, Giern und Mas leben. Gie jagen andern Deven den Raub ab, oder angfi: gen fie, mo fie fich bann erbrechen, mas von Die: fem Schmaroger gefdict aus der Luft meggefan: gen und verzehrt wird. Gie bewohnen arttifde und antarttifche Lander, und entfernen fich felten von Diefen. Gie bauen fein Reft, haben Brut; flede, und vertheidigen fuhn ihre Brut.

Die große Raubmeve. (Lest. catharractes)

Ropf und Augengegend dunkelbraun, Raden und Oberhals braun, mit einem schmalen weißigelblichen Schaftstriche, der sich mit der Spige der Feder endigt, die untern breitern Federn des hinterhalses sind braun, in der Mitte mit einem rostgelben Fled und einem weißlichen Schaftsstrich; eben so der Mantel und ganze Ruden, Unterhals, Brust und Bauch braungrau, rostgarbe gewölft; Schwungsedern an der ersten Salste weißgelblich, an der vordern schwarzebraun, die außerste an der außern Fahne ganzschwarzbraun, mit weißen Schaften, Schwanzschaun, mit weißen Schaften, Schwanzschaun, mit weißen Schaften,

Sowarzbraun, Die mittlern Febern breit, nicht viel über einen Boll vorftehend und abgerundet; Sonabel und Beine fowarg; Laufe und Beben fehr rauchhautig, wie Chagrin. Bei ben meiften fteben am Ropfe und Raden einige weiße Febern, bei Jungen und Alten. Die Lange beträgt 1 Fuß 101 3., Flugelbreite 4 Fuß 4 Boll. Diefer Bogel ift weit verbreitet. Baufig auf den De: briden, Drfaden, Jeland ze., felbft in Rord: amerita, auf Reu : Geeland und Feuerland. Es ift ein muthiger, fraftiger, fuhner Bogel, Der den Uebergang von den Raubvogeln gu ben De= ven macht. Reugebornen Lammern hadt er Die Augen und bas Gebirn aus, raubt Geevogeln Gier und Junge, baber ihn alle furchten und haffen. Menfchen und vierfußige Thiere greift er mit großer Sartnadigfeit an, wenn fie fich feinem Refte nahern und bringt ihnen derbe Stofe auf Den Ropf bei. Die Faringer halten bann ein Meffer uber ihre Muge, auf welches er fich fpießt. Im Gigen gleichen fie den übrigen Meven, im Bluge einem Raubvogel, namentlich dem Abler, Dem fie auch in der Farbe gleichen. Im Gigen foreien fie: jia; beim Berfolgen jo! Daber nen: nen fie die Bewohner auch Johvogel. Gie verfolingen alles mas Fleifd ift. Im Mai geben fie nach den Brutplagen, fie mahlen dazu Bergebenen, ober mit Gras und Moos bededte Abhange Der Bergruden, auch Sandebenen in der Rabe fußer Bemaffer. Gie fammeln fic ba in großen Ro: lonien und bruten beifammen in Gefellichaften von 50 bis 100 Paaren. In ihrem Refte, bas nur in Sand gemacht ift, findet man 2 Gier, Die Did, bauchig, abgerundet, 3 3oll lang find, auf olis vengrunem ober braunlichem Grunde fieben große dunfelbraune Flede, felten hellgrune obne Bleden. Im Juni fommen die Jungen aus, im August ziehen fie befiedert mit den Alten fort. Die Gier haben einen großen Dotter, find febr fett, und merden gern gegeffen. herr Faber naberte fich einft einer folden Rolonie, von etwa 100 Paaren. Die Alten fielen ihn wuthend an. Gie fliegen Solag auf Solag aus der Luft berab auf feinen Ropf, indem fie ein tiefes: boo aus: fließen. Geinen hund verfolgten fie noch mehr, fo daß er fich winfelnd bei feinem Berrn verbarg. Bei Diefer Gelegenheit fabe er wie ein Mann: den ein verschludtes Junge, vom Giefturmvogel, jest feinen Jungen auswurgte, bas er von bem 2 Meilen entfernten Bogelberge geraubt hatte. Beibe Gatten baben Brutflede.

Die Schmarogermeve, Mevenbuttel. (Lest. parasitica.)

Beim alten Bogel find die obern Theile braun, grau oder roftbraun, am Ropfe am duns felften, ohne irgend einen Fled. Der gange Un= terleib ebenfalls gleichfarbig maufegrau, Die Somangfebern reichen etwa 2 3. über Die ans bern aus; auch findet man eine Barietat mit meifem Bauche. Die gang einfarbig braungrau: en find aber immer die haufigsten. Beim jun: gen Bogel ift ber Dberforper dunkelbraun, mit rofigelben Federrandern, der Unterforper auf verdedtem weißem Grunde, dunfelbraun und braungelb unter einander gewellt; die Behenmur: gel gelbweiß, Die hintere Balfte des Gonabels bleigrau, Die vordere fcmarglich, Die mittlern Somangfedern & Boll über die andern ausragend. Lange 14-15 Boll. Man trifft fie in den nordlichen gandern, den Ruften des baltifchen Meeres, Norwegen, Comeden, den Forverin= feln ac. Gie hat mit vorigen viel gemein, ift , fcheu und fcmer ju fchießen, verfolgt Meven und Seefdmalben heftig und nahrt fich wie vorige. Beim Berfolgen ichreien fie: jeau und jo und fangen, wie jene, ben Abgang ber Berfolgten. Gier anderer Bogel, 3. B. der Enten, faufen fie aus, ohne fie wie die großen Deven gang meg: Butragen. Sie bruten im Moore oder Grafe und Die Beibden beschäftigen fich damit das Reft zu runden. Die Alten vertheidigen bas Reft tapfer. Die Bartlichfeit fur Die Brut geben fie burch munderliche Geberden zu erfennen. Ihre 2-3 Gier find birnformig, ziemlich did und rauch: fcalig, mit deutlichen Poren und fcmachem Glange, etwa 30 Linien lang und 22 Linien breit, die Grundfarbe ift dunkelolivenfarben, mit braunen, dunkelbraunen und graubraunen, um das ftumpfe Ende oft einen Krang bilden; den Aleden befegt.

Meer=Seeschwalbe. (Sterna.)

Schnabel so lang oder langer als der Ropf, fast gerade zusammengedrudt, spigig auslausfend, schneidend; beide Laden gleich lang, die obere gegen die Spige leicht geneigt; Rafenloscher gegen die Mitte des Schnabels in die Lange gespalten, durchgehend. Beine klein; Lauf sehr furz; die 3 Vorderzehen durch eine haut verzunden; hinterzehe frei; Ragel klein, krumm. Schwanz gabelformig. Flügel sehr lang, liegen

in der Rube über einander, find mit ber Spige fart gefreugt, fabelformig in die bohe flehend .-Die Bunge vornnadelfpigig. Gie haben eine dops pelte Maufer, Die erfte im August, Die zweite im April. Die Geefdwalben find über alle Mee, re, Geen und Gluffe von einem Pole gum an: Dern verbreitet. In faltern gandern find es Bugvogel. Gie reiben fich ihres anhaltenden, fonellen und gewandten Fluges Die pelagis fcen Bogel an, befondere ben Sturmvogeln, Doch lieben fie mehr die Ruften als die offenen Meere und ruben gern auf der Erde aus; an: gefcoffen fuchen fie fich burch Schwimmen gu retten. Gie bruten an den Geefuften oft in großen Rolonien. Ginige bruten aber auch an Landfeen, Moraften und Fluffen. Schieft man von mehrern eine und lagt fie auf dem Baffer liegen, fo fommen die andern gurud und man fann bann noch mehrere fchiegen. 21 Arten.

Die caspische Seeschwalbe. (Ster. caspia.)

Große 18-21 3. Flügelbreite über 4 F. Im Binter ift Stirn und ein Theil bes Schei: tels rein weiß, Ropfplatte fcmarg, hinter: fopf weiß und ichwars gefledt, Raden weiß, Ruden, Schulterfedern, Mantel und Dedfedern Der Flügel blaugraulich, Gomungfedern blaugrau; Ceiten Des Ropfe, Borberhals und alle pordern Theile rein weiß, Somang hellgrau, Bris blau. - 3m Commer Stirn, Scheitel und Raden glangend fcmars, fonft wie im Bin: ter. Die Jungen erfceinen mehr gefledt. Man findet fie am cafpifden Meere, in Gibirien, Ins Dien, auch an der deutschen Dft : und Rordfee. Diese Seeschwalbe ift fehr foeu. Auf bem Buge findet man fie einzeln, paarmeife, auch gu 10-12 Stud; auf Den Brutplagen in Rolo: nien gu mehrern 100 Paaren beifammen. Sonft lebt fie auf der hohen Gee und verlagt fie felten. Gie fliegt icon, fonell und hoch. Gie hat ein fartes midriges Gefdrei, faft wie bas: Raab der Raben gur Paarungegeit oder menn fich jemand dem Refte naht. Rahrung: Fifche Die fie verichlingen fann, aud Gier und Junge anderer Bogel, Daber fie von Diefen auch ver: jagt mird. Todte Thiere frift fie nicht. Die brutenden Bogel figen alle in derfelben Rich: tung, mit ber Bruft gegen Die Gee gerichtet, Damit der bort berfommende Bind fie weniger beunruhige. Die Gier, meift nur 2 an ber Babl,

find verhaltnismaßig groß, fast 3 3. lang und 2 3. breit, rauchschalig, did, mit deutlichen Poren, ohne Glanz. Die Grundfarbe ift heller oder dunkler gelbgrau mit deutlichen olivenbraunen und aschgrauen, großen und kleinen Fleden, überall unregelmäßig bestreut. Das Mannchen foll am Tage bruten. Sie sind schwer zu schießen. Man nucht besonders ihre Eier, die gleich anz dern Meerschwalben und Meermevenarten salzig schmeden, doch aber gespeist werden.

Die rothfüßige, europäische Geeschwalbe.

(Ster. Hirundo. Linn.)

Sft 14-15 3. lang, Flugelbreite 32-33 3. Der 11 3. lange Schnabel icarfichneibig, fpigig, von ben Geiten gufammengedrudt, roth. Bris ber Alten lebhaft roth, bei Jungen braun. Der gange Dbertopf und Raden fcmars, Bruft und Bauch rein weiß, Ruden und Flugel hell: afcgrau. Der Schwang 4 3. tief gespalten. Beine roth, Ragel fcmarg. Fett und Saut befondere im Fruhjahre ichon orangefarben. Beim Beibden ift der weiße Bauch grau überpudert. Die Jungen feben bunt aus. Gie fommen im April bei uns an, niften hier und giehen im August wieder weg. Gie lieben die Fluffe, mel: de flade Betten haben. Fifde und Infetten find ihre Rahrung. Gie ichießen danach ins Baffer, holen die Beute und verfclingen fie über dem Baffer. Ihre Stimme ift ein helles langfames: fliiah oder friiah, und ihr Ungfigeschrei ein haftiges: fed, fred und fraid. In den flachen Betten ber großen und llei: nen Fluffe haben fie ihr Reft, das in einer Bertiefung im Riefe und Sande besteht, und nicht felten burd große Regen und anfdwellendes Baffer zerftort mird. Much gertreten fie oft die Fifcher aus Unfunde, da fie dem Ries auf dem fie liegen, febr abnlich feben. Gie legen 2, hochstene 3 gelblich fowarzbraun und afchgrau geffedte Gier, Die fie in 14 Lagen ausbruten. Um Lage bruten fie wenig und entfernen fic oft 2 Meilen weit vom Brutplage. Bei foled: tem Better und Die Racht hindurch bruten fie immer. Die Jungen laufen nach einem Lage foon aus dem Refte, und miffen fich gefdidt por ihren Feinden ju verbergen. Gie merden mit Fifden und Infetten aufgefuttert, und wenn fie erft fliegen tonnen, von den Alten, wie es Die Schwalben thun, in der Luft fliegend ge= futtert. Gie fdmeben baber beständig über bem

Baffer, fomimmen felten, laufen aber gut. Sie find nicht fower ju foiegen.

Die peruanische Seeschwalbe. (Ster. Inca.)

Mit nugbraunem und ichieferblauem Ror: per; an ben Geiten bes Ropfes ichneemeiße Re-Derbufdel, Die Spige Der Flugel weiß, Gona: bel blutroth, fart; Laufe und Schwimmbaute orangeroth, Ragel fcmar; am Mundmintel eine nadte, lebhaft citronengelbe Saut; an Bruft und Bauch einige falbe oder grauliche Flede, Seitel duntler; Gris grau; Die 2 Schnurrbarte an der Conabelmurgel beftehn aus einem Bus ichel rein weißer Federn, fie geben über bas Auge meg, und endigen an den Geiten bes Balfes, fie befteben aus 5-6 Federn und find abfiebend. Somungfedern braunfdmarg, wie Die Dedfebern mit weißer Spige. Der untere Blugelrand mit grauen, braungefledten Febern befegt; Somang oben ichiefergrau, mit braunen Shaften. Lange 141 3. Lebt an Den Ruften pon Peru.

Scheerensch nabel. (Rhynchops. Linn.)

Conabel lang, gerade, feitlich gufammenge: drudt, fo daß er gang mefferformig ift, an der Spige flumpf abgefdnitten, obere Lade viel furger als die untere, und ihre Seiten fo genabert, daß fie am Ende gang Busammenftogen, Die untere Labe, nur an der Schnabelmurgel breit, an der Spige ein einfaches, dunnes Blatt. Rafenlos der feitlich, am Rande, von der Burgel Des Sonabele entfernt. Beine ziemlich lang, dunn ; Lauf langer ale Die Mittelgebe, Die vorbern Beben burch eine etwas ausgeschnittene Saut verbunden; Die hintere Bebe am Lauf einge: lentt. Flugel febr lang. Die fonderbare Bil-Dung der wenigen hierher gehörigen Arten zeich: net fie aus. Gie mohnen in den Meeren beis fer Lander. Der Unterfonabel gleicht einer Def: ferflinge, der Dbere ber Defferfcheide in mel: de der Unterschnabel einschlägt. Der Bogel fowimmt febr felten, fondern ftreift unaufhors lich unmittelbar über Die Dberflace des Baffere bin und pflugt gleichsam Das Baffer mit feinem Unterfonabel, gefdidt Die Beute ergreis fend, und fie mit ber Schneide Des Dberfcna: bels faffend; ohngeachtet der langen Flugel ift fein Blug bod langfam, bamit er befto eber

feine Beute fehr und erhalden tonne. Diefe Urt feine Rahrung ju fuchen, gab Gelegenheit ju dem Namen: Bafferiderrer

Der schwarze Scheevenschnabel. (Rlynch. nigra.)

Alle obern Theile fdmarggrau, Stirne und limgegend des Schnabels, Baden, Sals und alle untern Theile weiß. Schwang gegabelt, roth: grau, weiß gefaumt, Die mittlern Schwungfe= bern an ber vordern Salfte meiß, daber ein weißer Streif über Die Flugel, Schnabel hinten roth, an der Spige fcmarg, Beine roth. In bem marmern Theile Rordameritas und den Ruften und Flugmundungen von gang Gudameris fa, find fie angutreffen. Mit den Meven und anbern Seevogeln bilden fie lange den Ruften un: geheure Schaaren, welche den himmel von der Mundung bes Fluffes Bento an, bis jur In= sel Quiriquine verdunkeln und in einer Lange von 12 Meilen immer in gleicher Menge por= banden find. Go unzwedmaßig im Bergleich mit andern diefer Schnabel gebaut ju fenn icheint, fo gut weiß ihn der Bogel bod ju gebrauchen. Leffon beobachtete namlid, daß er allerdings Beichthiere genieße und ben Schnabel dazu ge: brauche, aber auch bie zweischaligen Muscheln ju offnen. Die fandigen Ufer des Fluffes Pento an feiner Mundung find mit Badtrogmufcheln bededt, welche Die rudtretende Gluth in Den Sandlochern balb auf dem Trodnen lagt, Die Scheerenschnabel beeilen fic aber, fic der Thiere Derfelben ju bemachtigen, fie fegen fich neben Die Mufchel, und marten ruhig, bis diefelbe fich ein wenig offnet, in Diefem Mugenblid fteden fie den Unterschnabel dagwischen, die Mufchel gieht fich gleich wieder gufammen und flemmt Den Schnabel ein, der Bogel fliegt ju einem Stein, und folagt die Mufdel fo lange darauf, bis fie in Studen fpringt, oder das Band ger: fonitten mird, mo er dann das Thier vergehrt. Der mefferklingenformige Unterschnabel Dient alfo mirtlich ftatt eines Meffere. Diefes Deffnen geht fehr geschwind. Man tonnte ihn auf Diefe Urt Mufdelfreffer nennen.

Die dritte Familie, (Totipalmati.)

hat das Merkwurdige, daß ihre Daumen mit ben übrigen Fingern in eine einzige Saut vereinigt ift, und trog diefer vollfommenen Ruberfuße, find fie fast die einzigen unter ben 43 * Somimmvögeln, die gern auf Baumen figen. Sie fliegen fammtlich gut und haben furze Fuße. Linne bildete foon brei Geschlechter daraus.

Pelifane.

(Onocrotalus Briss. Pelecanus. Illg.)

Der am Ende mit einem hafen versehene Schnabel ift fehr lang, gerade, fehr breit und borizontal abgeplattet, oben befinden fich in seiner ganzen Lange 2 Furchen, in welchen die Masenlöcher verborgen liegen. Die biegsamen Neste der Unterfinnlade werden durch einen nachten und in einen ansehnlich geräumigen Sach ausdehnbare haut geflügt. Die Augenfreise nacht, wie die Kehle. Der Schwanz rund.

Der gemeine Pelifan. (Pelec. Onocrotalus. Linn.)

Der gange Bogel fcon meiß, leicht rothlich angeflogen, oder hell rofenroth überlaufen; Die Schwungfedern fcmart. Die obern Theile Des Schnabels blaulich, Rander roth; Schnabelna: gel roth; Die nadten Theile Des Gefichts weiß, rofenroth überlaufen: Reblfad hellgelb; Gris lebhaft braunroth. Fuge blaulich fleifchfarben. Am hinterhaupt ein Bufd langer und zerfchlif: fener Federn, ber Schwang beffeht aus 20 Fe-Dern. Lange Des Bogels 4 F. 7 3. Flugelbreite 9 F. 2 3. Die Jungen anfanglich grauweißlich. Lebt in den oftlichen Theilen Guropas; haufig an den untern Theilen der Donau bis gum fdmargen Meere. Gelten auf ben Geen im Innern von Guropa; fonft auch in Ufrita. Die Bunge ift febr flein, faum 4 Linien lang und Linie breit, und hautig. Die Knochen find fo bunn, daß nach Pennant bas Gewicht des gangen Stelets noch nicht 12 Pfb. wiegt. Da er bei feinem Fischfang jugleich auch Baffer mit verschludt, fo ift der Luftrohrentopf mit Ring: musteln verfeben, welche ihn dann ichließen, Damit Das Baffer nicht in Die Luftrohre bringe und er erstiden fonnte. Die den Gad bildende haut besteht aus einer Doppelten Schicht. Die innere hangt mit bem Schlunde gusammen, Die außere ift eine Fortfegung der haut des Salfes. Gie ift runglich und baber auf der einen Geite fehr ausdehnbar, auf der andern aber fann fie fic auch wieder fart gufammengieben, und leicht jur Entleerung das Baffer nach dem Schnabel bin, treiben. Der Magen ift nur eine Ermeis terung des Schlundes, mehr hautig als mus:

fulos. Durch mehrere Berengerungen aber gleich: fam in mehrere Gade getheilt. Die innere Saut ift fehr drufig und fchleimig. Der Pelifan ift ein Stoftaucher, der meift über bem Baffer fdwebt und bei Erblidung ber Fifche, ale feine einzige Rahrung, fdieft er unter daffelbe, mit feinen großen Flugeln aufs Baffer ichlagend, wovon die Fische erschreden, betaubt von ihm ergriffen merden. Bo fie in Menge find, follen fie ben Fifchfang auch gemeinschaftlich betreiben. Mit Fifden beladen tauchen fie dann wieder auf und verzehren den Raub auf dem Lande. Uebrigens find fie langfame, trage und plumpe Bogel. Leicht merben fie gabm und man hat welche 50 Jahr in der Gefangenschaft erhalten. Rur mit dem spigen Satennagel konnen fie verwunden, fonst haben fie menig Rraft in dem Schnabel. Ihr Gefdrei ift unangenehm. Die untere Schnabellade ift fo ausdehnbar, daß ein Menich leicht den Ropf durchsteden fann, Die Führer der mandelnden Menagerien zeigen Dies Sie find fehr gefraßig und freffen oft por. felbst große Fifche, fo follen fie Rarpfen von 3 Pfd. in ihrem Sade verbergen konnen. Dieser ift als ein Magazin zu betrachten, aus welchem Der große Magen eine zeitlang immer Bufdus erhalt, fo daß die noch im Beutel befindlichen Fifde ben verdauten immer nadruden, indem er zugleich die Gefdidlichkeit befigt, fie in dem Sade fo zu wenden, daß fie flete mit dem Ropfe querft eintreten muffen. Auf Diefe Urt ließe er fic auch wie die Fischerscharbe in China gum Fischfang abrichten. In der Gefangenschaft fref: fen fie auch Maufe und andere fleine Gaugethiere, auch Studen Fleifd. Bugeworfen fonap: pen fie Dinge aus der Luft meg.

Bur Paarungezeit ichwillt bem Mannchen an der Schnabelmurgel ein runder, ichmammiger Soder auf, welcher weich und fleischfarben ift, im Commer fic aber wieder verliert. Sie leben paarmeise und niften im Gumpfen an den Mun= Dungen ber Fluffe. Das Reft machen fie in Erd= loder aus Riedgras. Ihre 2-4 Gier find weiß und werden in 30 Tagen ausgebrutet. Die Jun= gen nabren fie mit Sifden, die fie im Gade bringen und ihnen vormurgen. Daber die Fabel: daß fie ihre Jungen mit Blut nahren, mas fie fich aus der Bruft abgapfen follen. Rach andern follen sie den Schnabel öffnen und die Jungen da= raus fressen lassen. In Menagerien legen Die Beibchen auch Gier, doch nie mehr als 2. Den Juden mar ihr Fleisch zu effen verboten; allein dies bedurfte es faum, da ihr Fleisch fehr thras nig und modrig fcmedt. Jung follen fie noch genießbar fenn. Ihr Fett fann man brennen. Die Reblfade geben Labadsbeutel.

(Halieus. Ill. Phalacrocorax Briss. Carbo. Meyer.)

Saben einen lang gezogenen, zusammenges brudten Schnabel, beffen Ende bes oberen hatig, Des untern abgeflußt ist; Die Zunge ift sehr klein, Die Rehlhaut weniger ausdehnbar, Die Nasenloscher, wie eine kleine Linie, Die nicht durchbobrt foeint. Der Nagel des Mittelfingers sageartig gezähnt.

Die eigentlichen Scharben haben einen runden Schwanz von 14 Federn.

Die Kormoranscharbe. (P. (H.) Carbo Linn.)

Im Winter ift das Gefieder am fconften. Der Korper ift fdwarz mit Bioletglang, Sinter: haupt mit langen bufchartigen Federn, am Salfe gerftreut einige weiße fcmale Federn, Reble und Geiten bes Ropfs hinter den Augen weiß; an Den Schultern und den Dedfedern der Glugel find die Federn in der Mitte fcmargblau glan: gend, mit fcmarzem Saum; die untern Ded: febern der Flügel fdmarglich, Die Schwungfebern fcwars mit Metallglang, an den Suften ift ein rundlicher, meißer Bled, aus gerfdliffenen Federn beffebend. Die Schwanzfebern hart, haben fehr elaftifde Schafte. Gris grun. Rehl = oder Rinn: baut nadt, bleifarben, mit gelben Bargen; Mu: genrand marzig. Beine fart, fcmarg. Mann: den und Beibden find fich gang abnlid. Im Sommer fehlt beiden Gatten der weiße Bled an Den Suften. Junge Bogel find oben allenthal: ben fcmarzbraun. Die Lange bes Bogels be: tragt 2 F. 6 3. Flugelbreite 4 F. Ihr gewohn: licher Aufenthalt ift Die boreale Bone; erfcheint aber auch fudlicher in Solland, Danemart und Solftein. 3m Binter fommt er an die deut: fom Ruften und zuweilen fogar auf die Land: feen. Gie find foeu und vorfichtig, fdwimmen und tauchen gut. Berfolgt fcmimmen fie mit dem gangen Rumpfe unter dem Baffer, nur Der lange Sale ragt bervor. Gie laffen fich leicht gabmen. Man foll fie auch fonft im Rorden zum Fifchfang gebraucht haben. Gie leben als ein von Sifden und niften in großen Rolonien,

wenn fie im Bogelberge bruten. Gie niften aber auch auf Baumen, wo man bann an 50 Refter auf einem Baume gablte. In Landfeen barf man fie nicht dulben, indem fie biefelben ent: voltern. - Ihre 3-4 Gier find verhaltnigma: fig fehr flein, weißblaulich, mit einem ftarfen Uebergug von weißem Ralt, mo oft nur Die Farbe bie und da durchscheint. Ihr großes Reft besteht aus Meergras und bergleichen Da= terialien, es ift immer nag und fcmugig. Beide Gatten bruten und futtern ihre Jungen, theils aus dem Schlunde mit Fifchen, großere Fifche aber zerlegen fie neben bem Refte und geben fie ben gefrafigen Jungen fludweife. Die Gier find übelichmedend und werden felten gegeffen. Die Jungen aber follen gut fomeden.

Fregatvogel.' (Tachypetes. Vieill.)

Gin Gabelschwanz, furze Füße, mit tief ausgeschnittenen Schwimmhauten, außerordents lich weite Rlafterung der Schwingen und ein Schnabel, dessen beide Kinnladen am Ende gesbogen sind, unterscheiden sie von vorigen. — Bermöge dieser Flugkraft entfernen sie sich sehr weit vom Lande. Sie stürzen sich auf die fliezgenden Fische und zwingen durch Flügelschläge die Tölpel ihre Beute herauszuwürgen. Es sind eigentliche Luftvögel, die weder auf ebener Erde stehen, noch schwimmen können, der kurzen Füße wegen. Sie seben auf den Meeren der heißen Zone; ruhen nur auf vorragenden Klippen und Baumen, wo sie auch nisten. Es soll 3 Arten geben.

Die große Fregatte. (Tachip. aquilus.)

Sanze Lange 3 F. 5 3. Flügelbreite 5 F.
4 3. Das Gefieder des alten Mannchens ift schwarz, mit schwachem blaulichen Schimmer, die Zügel nacht und schwarz; der Schnabel roth, Hüße schwarz; an der Rehle verlängert sich die Saut in 2 fleischige Lappen von lebhaftem Roth, welche mehr oder weniger herunterhangen. Das Weibchen (wovon wir auf der Tafel eine Abbits dung gegeben) hat einen weißen hals und Untersleib; Rücken, Flügel, Schwanz und die untern Deckfedern desselben, schwarzbraun; obere Deckfedern der Flügel schmußiggelb, der Schnabel hornfarbig.

Man findet fie auf den Meeren ber Eros penlander und etwas uber fie hinaus, auf beit ben Salbfugeln. Dbiger Rame deutet icon auf einen vorzüglichen Klieger bin. Ihre Blugfraft ift fo groß, daß man fie 400 Meilen von jedem Lande entfernt antrifft, und Die fartften Sturme vermogen fe nicht, von ihrem Fluge abzubringen. Lag und Racht fdmeben fie burch Die Luft ohne fichtbare Flügelbewegung, bald tief, bald fo bod, daß das Forfdersauge fie nicht mehr zu erreichen im Stande ift. Buweilen nabern fie fich wieder den Ruften fo, daß fie auf den Fischmartten Sifde, ober Die Ginge: weide derfelben boblen. Denn fie find fo gefragig, daß einer auf einmal 2 Pfd. Tifche verfolingt. Wie Die Raubmeven zwingen fie auch durch beftige Angriffe Die Tolpel fich zu brechen, mas fie bann aus ber Luft megidnappen. Muf dem Lande figend, fann er nicht gut auf, da: her mablt er Gegenstande von denen er fich gleich in fein Glement Die Luft fturgen und flie: gen fann. Ueberrafcht man ihn auf ebenem Lande, fo tann man ihn fangen. Gben fo wenig tann er fcwimmen, weil er fich auch bier nicht er: beben fann. Gein Geficht muß außerordentlich gut fenn, indem er aus weiter Ferne die über Die Bafferflache fpringenden Fifche, besonders Die fliegenden bemertt, und mit Bligesichnelle herabfturgt, doch nicht ins Baffer, fondern da: ruber hinschießend und feinen Raub faffend, mit dem Schnabel, auch bieweilen mit ben fü-Ben Die bagu auch geschickt gebauet find. Glie: gende Fische find ihre hauptnahrung, Die zwiichen ben Tropen allenthalben in Menge vorfommen. - Das Beibchen foll nur 2 Gier le: gen, die Jungen merden im Defte gefüttert, bis fie fliegen tonnen. Die Gier follen fleischfarb, mit kleinen karmoifinrothen Punkten bestreut fenn. Man nugt ihr Fett, dem befondere me: Dicinische Rrafte zugefdrieben werden. Auf den Untillen wird es fehr gefucht gegen Podagra und Rheumatismus angewendet und die Klibuftier benugten es fonft ale einen Sandeleartifel, unter dem Namen Fregatiol.

Tolpel.
(Dysporus. Ill. Sula, Briss.)

Schnabel ftart, lang, an der Bafis fehr did; gegen die schwachgebogene Spige zusammengedruckt, der Mund bis hinter die Augen gespalten; die Rander der Schnabelladen gezähenelt. Gesicht und Gurgel nacht. Nasenlöcher an der Wurzel, linienformig, verborgen. Beine start, turz, fehr weit nach hinten ftehend, die

Sinterzehe nach einwarts gelenkt, alle vier durch eine ftarte Saut verbunden. Der Ragel der Mittelzehe fageformig gezahnelt. Flugel lang. Die Nacht ichlafen fie auf dem Baffer.

Der weiße Tolpel. (Sula alba.)

Schnabel lang, blag, bleifarben. Schlafe, Scheitel und Sale weiß, gelb überlaufen, ubri: gens weiß. Die Flügel lang und schmal, Die Schwungfedern der erften Ordnung ichwartbraun; der Schwang feilformig; Beine ichwarge braun, über die Zeben grun. Das Rleid der Jungen ift braun. Man findet fie in den arttiichen Gegenden beider Belten. Saufig auf den Bebriden, in Schottland, Rormegen und 36: land. Er geht schlecht, der Flug ift ausharrend, fcnell und oft fehr hoch. Er ift ein Stoftaucher, der fich aus der Luft auf Das Baffer fturgt und untertaucht. Die Beute verschlingen fie unter dem Waffer. Bei ihrem ichnellen Fluge folgen fie den Wanderungen der Beringe und anderer Fische und fo fieht man ihre Erscheinung gern. Den Winter durchleben fie im offenen Meere. Im April nabern fie fich ben Brutplagen. Rab= rung Tifche. Auf der Infel Grimfoe find ihre Brutplage, auch ift die Insel Bag dieses Bogels wegen berühmt, und man nannte ihn deshalb auch den baffanischen Pelikan. Die Refter fteben auf offenen Felsbloden. Ihr großes Reft besteht aus Seetang, den fie oft weit im Schnabel ber: bei bringen. Auf der Insel Bag bruten jahrlich Myriaden, fo daß die eine Geemeile im Umfang babende Infel, von ferne gang einem Ralffelfen gleicht, denn mo nicht Bogel figen, liegen ihre weißen Excremente. Jedes Beibchen legt nur ein Gi. Die Islander laffen die nicht wohlschmes denden Gier liegen, nehmen aber nur die Jungen. Das Reft ift immer nag. Die Gier meiden oft febr in Form und Große von einander ab und es giebt darunter haufig unregelmäßig gebildete, mas fonft bei den in Freiheit leben: ben nicht der Fall ift. Meift ift das Gi 3 3. lang und 2 3. im Durchmeffer. Die Farbe beffelben ift weiß mit grunlichem Unfluge, befommt aber beim Bruten einen braunlich falfartigen Ueber: jug, der fehr fest fist, fonft ift das Gi von feinem Korn. Gie leben paarmeife und fcblep: pen ben gefraßigen Jungen viel gu. Beim Un= nabern fcreien Jung und Alt ein tiefes hartes: orrr aus, mas fehr unangenehm flingt. - Das Ginfangen der Jungen ift auf der Infel Bag für

B3 Pfb. Sterlinge verpachtet. Bei Strafe darf weder ein Alter geschossen, noch Eier genommen werden. Bon jungen Bögeln werden vom August an über 1000 Stud eingefangen und in Edinzburg und andern Orten das Stud mit 20 gr. bezahlt. Mit heringen und andern Fischen, auch mit Sepien werden die Jungen groß gefüttert. Diese Bögel werden besonders von einer langlichen Laus (Pediculus Bassani) geplagt; so befällt sie auch bisweilen eine anstedende Seuz che, die viele tödtet.

Schlangenhalsvogel, Anhinga. (Plotus. Linn.)

Schnabel lang, ganz gerade, dunn, spins delförmig, sehr spisig; untere Lade turzer als die obere; beide an der Spise sein gezähnelt. Masenlöcher verborgen, liniensormig, in einer wenig tiefern Rinne liegend. Beine turz, dick, stark, weit nach hinten stehend außer dem Gleichzgewicht; Rlügel lang. Schwanz sehr lang, hat 12 elastische, gewellte Federn, abgerundet. Der Dals sehr lang, Kopf sehr flein, dies veranlaste den obigen Ramen. Sie schwimmen und tauzchen sehr gut.

Der schwarze Anhinga. (Plot. anhinga.)

Beim alten Bogel find alle Theile tieffcmarz, nur am Dberhale und an der Reble mehr braun, mit einzelnen weißen Federden; Schultern und Dedfedern ber Flugel weiß gefledt und geffreift, Comang bei Alten und Jungen braungelb. Das Jugendfleid fdmarg, Borderhals und Geiten Des Salfes fcmugig ifabellfarben, Scheitel, ein fomaler Streif über ben hinterhals, fo wie die Soultern braun, eben fo der Dberbauch; Un: terbauch und die ubrigen Theile fcmarg. Die Große einer Ente. Diefer Bogel bewohnt Ame: rita, von Brafilien nordmarte bie Louifiana und Morida und auf der Gudfeite bis Paraguan, porzüglich an ben Ufern ber großen Stro .. e. Ge ift ein milder und icheuer Bogel, der in tleinen Gefellichaften lebt, die fich auf Durren Meften der Baume, Die uber bas Baffer hervorragen, verfammeln. bier bewegen fie figend Flugel und Schwang, legtern breiten fie facherformig aus. Heberraicht flurgen fie fich wie todt in Das Baffer, tauchen große Streden, mobei oftere Der Ropf, Sale und Schwangfpige fichtbar wird. Babrend Der großen Tageshige fliegen fie boch

über Gluffe und Geen. Gigend bewegen fie ben Sals gitternd und ichlangenformig mindend. Ale febr icheue Bogel fieht man fie felten am Lande; fdwimmend ragt meift nur ber Sals herbor. Bei ber geringften Gefahr tauchen fie gleich unter und erscheinen nun in weiter Entfernung, oft bei 1000 Schritt, erft wieder, um Luft gu icopfen. Sie fdwimmen vortrefflid und fuchen ihre Rabrung unter dem Baffer. Merfwurdig ift noch Die Bildung ber Schwung : und Schwanzfedern. welche bei feinem andern Bogel fo gebildet find; fie find nahmlich in Die Quere gefurcht, (fanfte Bellenlinien bildend), fo wie die Runft, fie Durch Preffen an Bandern oder Papier bervoraubringen verfteht. Ihre Rahrung beffeht meift aus Fifchen, vielleicht auch mit aus Infetten. Ihr auf Baumen befindliches Reft besteht aus Reifern und bunnen Zweigen; barin findet man 2 langliche Gier, von blag hellbrauner Farbe.

Tropitvogel. (Phaëton.)

Schnabel von der Lange des Ropfes, did, fart, hart, ichneidend, seitlich sehr zusammengedrudt, spisig, von der Wurzel an gegen die Spise sich schwach neigend; Schnabelrander an der Basis breiter, im Fortgang schmaler und gezähnelt. Rasenlöcher an der Burzel, seitlich, oben und nahe an der Burzel mit einer nachten haut bedeckt, durchgebend, Beine sehr furz, weit nach hinten siehend, die vordern Zehen lang, die hintere seitlich, innerlich am Laufe eingelenft, alle in die Schwimmhaut verwachsen. Flügel lang, Schwanz kurz, mit zwei sehr langen und sehr schmalen Federn.

Der rothschwänzige Tropikvogel. (Phaët. phoenicurus.)

Långe 11½ 3. bis zum Ende des Schwanzes ohne die schmalen Federn, welche an 73. långer sind. Farbe: weiß, silberglanzend, vor den Ausgen ein breiter brauner Fled; die Afterfedern bilden einen großen schwarzen Fled in ihrer Mitte; die dem Körper am nächsten liegenden Schwungsedern ebenfalls schwarz; Schnabel gezähnelt, roth, die beiden mittleren schmalen Schwanzsedern ragen 7½ 3. über die andern vor und sind schörroth, da, wose über den Schwanzhervorragen, am Schwanze sind sie so breit als die übrigen Schwanzsedern und weiß, der Schwanz besteht mit denselben aus 12 Federn,

eine biefer beiben langen Federn ift meift etwas langer ale bie andere, Die Schafte find ichwarz, an Der Spige weiß, auch die Schafte der Flugel und übrigen Schwanzfedern find fcmars; Beine weiß, blaulich überlaufen. Man findet fie in Den Tropenlandern. Meift nur in der Begat: tungezeit fieht man fie auf dem Lande. Gie mablen nur unbewohnte Infeln gum Aufenthalt, wohin fie auch des Abende immer von ihren wei: ten Reifen gurudtehren. Denn fie durchftreifen ungemein weite Raume mit ihrem leichten und gierlichen Fluge. Gie wohnen in tropifchen Regionen und ihre Gricheinung fagt es den Gdif: fern, daß auch fie fich in diefen befinden. Gie nabern fich ben Schiffen oft fo, daß man ihre Reugierde fraft. Pfeilschnell flurgen fie oft aus bedeutender Sohe herab, fich ihrer Beute bemach: tigend, ohne zu tauchen. Man fieht fie in allen Richtungen Die Infel Bourbon durchftreifen, fich auf Baume fegen und ein lautes Gefchreiterhe: ben. Gie fliegen aber auch aufs Baffer, um fdmimmend auszuruhen, fchlafen auch wohl Darauf. Beife Gegel und rothe Flaggen loden fie an. Gefangen laffen fie fich nicht leicht gab: men. Ihre Nahrung besteht aus Fischen, Die fie, wenn fie auf der Dberflache der Gee fpielen, mit Dem Schnabel ergreifen, auch fangen fie fliegen: De Fische aus der Luft meg. Gie niften in Felfen an den unzuganglichsten Orten, g. B. auf Bourbon in dem hohen Bafaltfelfen, ben Die Alten fcreiend umfliegen. Die Jungen find mit blendenden weißen Flaumen bedectt. Gie legen nur 2 Gier von gelblicher Farbe, mit roftfarbe: nen Fleden. Auf Dtabeiti und andern Infeln fammelt man die langen ausgefallenen Federn zum Pug.

Die vierte Familie. (Lamellirostres.)

Die hierher gehörigen Bögel haben einen dicen, meist mit einer weichen haut überzogenen Schnabel, dessen Rander mit kleinen Zahnschen oder mit Lamellen besetzt sind. Die Zunge ist breit und fleischig und an den Rändern gezähnelt. Flügel mittelmäßig lang. Sie leben mehr auf dem Süßwaser, als auf der See. Bei ben meisten Männchen der hierher gehörigen Bögel ist die Luftröhre an ihrer Gabelung mit Kapseln von verschiedener Form versehen. Ihr Magen ist groß, sehr mustulös und ihre Blindzdarme lang. — Der große Stamm: Anas. Linn. umfaßt diejenigen Schwimmvögel, deren Schnabel groß und breit und dessen Rand mit

einer Reihe hervorstehender, dunner, querstes hender Blattchen besetht ift, die dazu bestimmt scheinen, wenn der Bogel seine Beute ergriffen, das Wasser abfließen zu lassen. Man theilt sie in mehrere Unterabtheilungen.

S th w a n. (Cygnus. Bechst.)

Schnabel an der Burzel hoher als breit, mit einem fleischigen hoder, stumpf, breit, an der Spige mit einem Nagel und etwas frumm; Schnabelschneiden gezähnelt und mit Querplattchen versehen; Nasenlöcher gegen die Mitte des Schnabels offen; Unterschnabel platt. Die Zügel glatt; hinterzehen nacht. — Sie zeichnen sich durch ihere Größe, Schönheit und den Anstand, mit welchem sie auf den hellen Gewäsern hingleiten, aus. Sie nähren sich von Körnern, Wasserpflanzen und Inseten.

Der ftumme, rothschnabelige Sof= ferschwan. (Cyg. Olor.)

Un der Schnabelmurgel ein farter ichwarger Boder. Der übrige Schnabel rothgelb, mit Mus: nahme bes Randes, der Rafenlocher und der Spige, welche ichmart find, der Mugenring fcmarg; Gris braun, Beine fcmarg. Das gange Gefieder rein weiß. Die Lange betragt 5 %. Flügelbreite 7 F. 83. Dabei erreichen fie ein Ge wicht von 20-25 Pfd. und druber. Der junge Bogel braungraulich, der Schnabel und die Fuße bleifarb, erft im dritten Jahre mird bas Gefieber rein weiß. Man findet fie besonders auf Den Binnenmeeren des öfflichen Guropas und auf großen Geen der oftlichen Gegenden, baufig in Sibirien. Gezahmt findet er fich befonbers auf Geen und Teichen. Gegen den Bine ter ziehn die milden fudlich. Geine Luftrobre ift gang einfach. Die Tone, Die er von fich giebt, beffeben aus einem unbedeutenden Schnurren und Brummen und einem leifen Gequatel. Bei Bermundungen, ober wenn man fich bem Refte nabert, laffen fie noch einige abgebrochene angftliche, flohnende und schreiende unangenehme Los ne boren. Ronnen aber nie, wie man fonft for belte, (vor ihrem Lode) einen Gefang horen laffen. Der Gang ift langfamer ale bei folgenden. Den Sals tragt er ftets Sformig gebogen. - Gie werden fehr gabm. Wenn fie aber Gier und Junge haben, tann man ihnen boch nicht gans

trauen, ba fie Baffer fcopfende Madden, gu Diefer Beit mit ben Flugeln ine Baffer gewors fen haben. Ge fieht icon, wenn fie fo auf einer Bafferflace binfegeln, und durch Hufhebung Der Dedfedern ein Segel bilben, mo fie bann Der Bind mit Schnelle treibt. Sie fliegen fels ten, wenn es aber gefdieht, mit großem Ge tofe, bei fillem Better hort man es weit. Das Befaus mit ben Flugeln flingt wie: Grau, grau, grau. Gie reinigen einen Fifchteich febr vom Fifchfraut; indem fle nicht allein den Gaas men und Die jungen Spigen freffen, fondern aud Saufen bilden; ju Ruheplagen fur fic und ihre Jungen. Im Marg ftellen fie fich bei uns ein, ofe in großen Truppen. Will man die Jungen gahmen, fangt man fie ein und logt ihnen Das erfte Flügelgelent ab, bamit fie nicht fort: Bieben tonnen. Gie gewohnen fich dann leicht an Menfchen, folgen ihnen und erreichen ein febr bobes Alter. Man bauet ihnen auch Baus: den, in benen fie troden figen, fic verbergen und bruten tonnen. Gie freffen allerlei Baffers pflanzen, Gamereien, Infetten, junge Frofche und Schneden, Die fie mit ihrem langen Salfe und dem Sonabel, den fie als Taftorgan gu brauden icheinen, vom Grunde heraufholen, Brodt, Getraide und das gewöhnliche Ganfe : und Entenfutter erhalten Die Zahmen. - Das Beibden bauet bas Reft ins Schilf, ober Geftrauche nabe ans Baffer, es besteht aus Robrs ftengeln, Binfen und Blattern, ift groß, aber folecht gebaut. Gie brauchen Dazu viel Material mas fie unter dem Baffer auffuchen und auf: thurmen. Gie beffern es jahrlich wieder aus, fo daß es immer großer wird, oft 3 F. im Durche meffer hat und bequem einen Menfchen tragt. Sie legen 6-8 bellgrune Gier in daffelbe, wels de von rauber Schaale, fehr poros und noch einmal fo groß als Ganfeeier find. Gie bruten 6 Boden. Die Jungen fdreien faft wie junge Banfe. - Der Soman empfiehlt fich durch feine Schonheit, ift eine Bierde ber Gemaffer und halt befiederte Fifdrauber von Leiden und Geen ab. Das Fleifc der Alten ift gabe, bas ber Jungen, mohlichmedend. Die Federn find pon vorzüglicher Gute und merden gu Betten benugt. Bei Berlin werden fie wie Die Ganfe jabelich gerupft, und geben fo einen bedeuten: ben Ertrag. Die Schwungfedern geben befannt: lich gute Schreibfedern und die Flaumenfedern Dienen auch gum Bug.

Der Singeschwan, wilde, Bruch= fcman.

(Cyg. musicus.)

Das gange Gefieder bes alten Bogels rein weiß, Ropf und Sals gelblich angeflogen; Schnabel fowars, an ber Burgel gelb; Gegenb um Die Augen gelb; Gris braun, Beine fcmary Die Jungen hellgrau, Schnabel matt fchwart. Die Bange eines Alten beträgt 4 F. 10 3. Flus gelbreite 8 F. 6 3. Er bewohnt ben Rorden beider Belten, Gibirien, Island, auf Den Geen Lapplands bruten fie haufig. Die Lufte robre untericheidet ibn febr von vorigen. Gie geht nemlich in ben weiten und hohlen Ramm Des Bruftbeins, biegt fich dann trompetenfor: mig um, und geht wieder aufmarts, fich nach innen wendend in die Lungen. Die Tone bie er ausftogt, flingen eben nicht unangenehm, verdienen aber ben Ramen eines Gefanges nicht. Es flingt in der Luft von den fleinen herums giebenden Schaaren, wie fernher tonende Pofaunen: uugh, uugh. Dem Rordlander ane genehme Tone, Die ihm Die Unnaherung einer milden Jahredzeit verfunden. Erfchredt, ruft das Beibden ein lautes: ang bem Rannchen gu, Das ebenfo, nur mit tieferm Ion beantwortet wird. Gang, Betragen und ber ftete aufrecht getragene Sale, lagt ibn fcon von Beitem von porigen unterscheiden. Das Auffliegen verurfacht einige Mube und großes Geraufd, dann aber geht der flug rafch und weit. Gie werden leicht gabm. Bu und fommen fie nur in barten Bintern, find bann febr fcheu und halten fich meift in der Mitte der Gemaffer. Ihre Rafe rung befteht hauptfachlich aus Bafferpflangen, Infetten, fleinen Schalthieren 2c. Die fie mit bem untergetauchten Salfe, wie Die Enten oft auf Dem Ropfe fiebend, von bem Boden gu erhalten fus den. Des Nachts, befonders bei Mondenfchein find fie febr thatig. Bu Ende Aprile gieben fie nach den hohen Bergfeen, mo fie bruten und wo man in ichilfreichen Teichen und Bergfeen faft immer im fußen Baffer, bas große breite, aus Binfen' und andern Bafferpflangen befis hende Reft antrifft. Unfange Mai findet man Darin 5-7 Gier, fast fo groß wie Die Des vos rigen, von febr grober und porofer Schale, oft noch mit einer falfartigen Rrufte überzogen. Die Farbe ift meift olivengrun meiflich, bald etwas heller, bald dunfler, bis ins braunliche giebend. Das Reft ift mit den Daunen Des Beibdens, melde fie fich felbft ausrupft, aus: gefüttert. Sie foll 14 Lage an ihrem Reste bauen, und in 30 Lagen die Eier ausbrüten. Das Männchen hält Wache, und vertreibt, was sich dem Reste nähert. Die Jungen kommen sehr entwickelt aus den Eiern und suchen gleich ihre Rahrung im Wasser. Die Alten führen und beschüßen sie lange. Im October sind sie erwachsen. In ihrem Baterlande fängt man sie zur Mauserzeit, da sie, wie die Enten die Federn fast plösslich verlieren und einige Zeit nicht sliegen können. Sonst schießt man sie auch. Man nugt von ihnen Sier, Fleisch und Federn. Die Haut mit den Flaumensedern nußt man zu Passatine.

Der ich warze Schwan (Cyg. atratus, plutonia. Sh.)

ist etwas dider als unser zahme Schwan, trägt sich aber eben so schön. Er ist glanzend schwarz, mit Ausnahme der 6 ersten Schwungsedern, die weiß sind. Der Schnabel und die nackte haut am Kopfe roth; die Beine dunkelgrau. In Neuzbolland und Diemessland werden sie gefunden. Auf einigen Flussen sind sie gemein. Sind übriz gens sich und wild, lassen sich aber doch leicht zähmen. Man hat sie auch schon nach Europa gezbracht. — Erst neuerlich hat man welche nach England gebracht, wo sie aber leider bald starzben. Das Stuck soll mit 100 Athler. bezahlt worz den senn.

Anmerk. Wir führen hier noch den schwarzs halsigen Schwan an (Cyg. nigricollis.) Er ist kleiner als der zahme, der Hals sehr dünne; der Kopf und die obere Hälfte des Halses sammetschwarz, alles übrige rein weiß; von den Augenliedern bis zum hinterhaupt läuft eine schmale weiße Linie; der Schnabel an seiner Warzel blutroth, an der Spise schwarz; Beine schwarzroth. — Der Schwanz hat 18 Federn. Sanze Länge des Vogels beträgt 3 F. 2-43. Klügelbreite 5 F. Vaterland: Südamerifa. Sie leben in Schaaren zu 100 beisammen. Sind sehr schen. Sie gehen mit aufrechtem Halse. Ihr Fleisch wird gegessen.

(Anser.)

Schnabel hoher als breit, an der Burgel zuweilen aufgetrieben, gerade, verfürst, an der Spige abgerundet, durch Querblattchen gezähnt; die obere Lade etwas gebogen und an der Spige mit einem Nagel; die untere platt und schma

ler, hinterzehe einfach; die Flügel mittelmäßig lang, ohne Spiegel. — Sie gehen ins Wasser meist nur um sich zu baden, verweilen darin nicht sehr lange, ob sie gleich gut schwimmen. Sie leben in zahlreichen Schaaren, sind sehr wachfam, mißtrauisch und scheu. Die Luftröhre ist bei beiden Geschlechtern einfach. Zarte Kräuter und Samereien sind ihre Nahrung. Sie legen viel Eier und führen die Jungen lange. Die Arten sind über alle Länder verbreitet, wandern aber fast alle regelmäßig. Das reichzliche und dichte Gesieder wird benuft, so wie Bleisch und Sier.

Die Wilde,= Schnee,= Moor,= Saat= gans. (Ans. segetum.)

Unter ben bei uns befannten milben Ganfe : Arten die haufigfte die ju Ausgang Geptem= bers zu uns fommt, zu taufenden bei uns uberwintert, und bon ben Landleuten als Borbo= te ftrenger Ralte betrachtet wird. Gie ift fleiner als Die Zahme. Thre Lange beträgt 30-32 3. Die Flügelbreite 64-69 3. und bas Gewicht 8 Pfd. Der 21 3. lange Schnabel ift an Den Rafenlochern etwas niedergedrudt; ber Dberfiefer fart fageformig gezahnt; Der fcmar: ge Schnabel hat zwifden ben fcmargen Ragel und den eirunden Nafenlochern einen 1 3. breis ten orangerothen Ring. Der Ropf duntelgrau mit braun ftart überlaufen, an ber Schnabelmurgel befindet fich zu beiden Seiten und oben ein fleines meißes Bledchen; Die befiederten Mugenlieder meißgrau; Unterhals und Untertheile hellgrau, Ruden, Schultern und Dedfedern ber Blugel braun, weiß gefaumt, Burgel braun: fcmarglich; Unterleib und Gegend um den Mfter rein weiß; Gris dunkelbraun; Beine orangeroth. Die Spigen Der in Rube liegenden Glugel ragen 11 3. über Die Schwanzfedern binaus. Die Seitenfedern des Salfes find in viele abgesonderte Riefen (gansehalfig) getheilt wie bei andern Ganfearten. - Ihr eigentliches Baterland find Die arttifden Lander, mo fie in Gumpfen und im niedrigen Geftrauche bruten. Gie legen 10-12 meiße Gier, an Große den Giern unfrer Ganfe abnlich. Im Berbft fommen fie auch ale Bugvogel zu une. Gie gieben in gro-Ben Truppen und beobachten dabei eine mertmurdige Ordnung. Sind nicht über 8 bis 10 Stud, fo bilden fie fast immer eine fchiefe Li: nie, find aber viele, eine Doppelte fchiefe Linie,

ober 2 Schenkel eines Dreied's wovon ber eine Schentel etwas furger ift, fo bag biefer Bug Der Figur einer Pflugschleife nicht unahnlich ift. Der Fuhrer ift ein febr altes Mannchen, mels des fich durch Große und Stimme auszeichnet. - Sie find außerft icheu und vorfichtig und unterscheiden genau ben Jager vom Wanderer und Adersmann. Gie fliegen faft immer fehr bod und außer Schufweite, bald nach Diefer, bald nach einer andern Gegend hin. Gehen Die Buge im Berbft eilig boch in ber Luft nach Beffen, fo fann man annehmen, bag meift bald Schnee fallen wird und fie mildern Gegenden ju eilen. Geben aber ihre Buge im Krubjahre nach Dften; fo folgt mildere Bitte: rung. Beim Buge ichreien fie beständig, am meiften, wenn fich einzelne entfernt haben. Shr Gefdrei ift ein nicht gar fartes murmelnbes: taddadadat. Die grobere Stimme des Gan: feriche flingt wie: Ania und fajaja, Die bo: bere der Gans: flirra, fgiifgif, fmiotof ober faifa. Dft horte ich diefen Unterfcied ber Stimme, von der gabmen Gane, bei meinem Freund, orn. Naumann, der einige Diefer Ganfe gegahmt bielt, und wenn wir fie ausein= ander gefrieben, durch Diefe Zone mieder gu: fammen gu rufen fich bemuhten. Große Fluffe, Geen, Teiche, besonders große Bruche, find ihr liebster Aufenthalt, fo daß man fie dafelbft gu taufenden antrifft. Dit Lagesanbruch fliegen fie in die naben Stoppelader, befonders auf Saferfelber. Sie freffen auch viele Arten Sa: mereien, Gras, grunes Getraide, am liebften Berfte und Safer, auch grune Erbfen und Boh: nen, Burgeln der Bafferpflangen zc. Begahmt gewohnliches Ganfefutter, Sand und fdmarge Erde. Des Rachts geben fie meift in Die Bruche jurud. Im Berbft und Fruhjahr thun fie ben grunen Gaatfelbern viel Chaden. Im ftrengen Binter gieben fie fo weit gen Beffen, bie fie offene Felder finden. Im April gieben fie nach ihren Brutortern. Gie baden fich oft, wobei fie fich gang naß zu machen pflegen. Jung laffen fie fich leicht gahmen, bruten aber nie in unferm Rlima. Schwer laffen fie fich fchiegen, mas meift nur durch Lift und bei faltem Bin: ter gelingt. Die und ba merden fie auch auf ei= genen Beerden mit Garnen durch gabme Ganfe angelodt, gefangen. Das Fleifc ber Jungen ift portrefflich, das der Alten gabe und fast un: geniegbar. Die febr guten Federn merden ver: fdieden benugt.

Die Grau,= Merz,= Hedgan 6. (Ans. cinerens. Naum.)

orn. Raumann gebuhrt bas Berbienff, Die Geschichte Diefer Gans genau auseinandergefest und nachgewiesen zu haben : bag nur fie bie Stammmutter unferer zahmen Gans ift, weshalb wir fie auch da fie bei uns brutet hier befonders mit anführen. Die Lange von der Schnabelmur= gel bis jum Ende bes Schwanges beträgt 2 %. 10 3. Flugelbreite 5 F. 5 3.; Das Gewicht 102 Pfb. Der 3 3. lange Echnabel bleich orange= roth, ber Ragel grauweiß, fonft wie bei ber Bahmen geftaltet. Der Ropf ift braunlichgrau, Der Raden dunfler, Die Salsfedern gerieft, wie bei poriger Art. Muf ben Chultern und ben Dberruden find Die Federn fcmargbraun mit grauweißen Ranten; Der Unterruden hellafch. grau. Die legten obern Dedfedern des Comanges, ber Bauch und Die Geiten meiß. Der aus 18 Federn beftehende Schwang 6 3. lang. Die in Rube liegenden Flugel laffen 13 3. pon ber Schwangspige unbededt. Die großen farten Beine find fleischfarben, in's gelbliche fallend, Die Rrallen grauhornfarbig. Gie find fchlanter ale Die gahme Gane, Gefdrei und Betragens aber eben fo. Bo die Saale fich in die Elbe ergießt, habe ich felbft ihre Brutorter befucht. Go bald im Fruhjahr Die Gemaffer offen find, fels len fie fich truppweise bei und an Bruchen und Geen ein. Die Paare halten fich fehr treu gu: fammen. & der angekommenen begatten fich nicht (gehn giefte) mahricheinlich gang junge und fehr alte. Co lange fie bier find, bleiben fie auch truppmeife beifammen und fliegen unter fermen und ichreien wie die Bahmen, nach Rahrung aus. Die Gans baut fich auf Rohrstumpfen, fleis nen mit Baffer umgebenen Grashugeln und fleinen Infeln, von Rohrftoppeln und trodnem Chilfe, ein großes, hohes, aber flaches Reft; worin man 5-14 Gier findet, von Farbe fcmu-Big grunlich, fo groß wie die der Bahmen. Co: bald fie ein Gi gelegt, bededt fie es mit ben Restmaterialien und beim Anfang des Brutens hullt fie Diefelben in ihre an Bruft und Bauch ausgerupften Flaumenfedern ein und brutet 4 Bochen. Der Ganfert vertritt Die Stelle Des Bachtere und theilt mit ber Mutter treu die Gorge fur Die Rinder, fuhrt fie auch mit. Bei augenscheinlicher Gefahr, befonders bei Unna: berung von Menfchen, ift er aber ber erfte, ber Die Flucht ergreift und mit einem angfilichen ftarten: faht, faht davon eilt. Die Gans 44 *

hingegen ift dabei erft angftlich bemuht, durch ein oft wiederholtes Bermahnungsgeschrei die Jungen jum Berfrieden ju bewegen ehe fie flieht, und fobald die Gefahr vorbei, ift fie wieder in ihrer Mitte. Die Jungen gleichen benen ber gahmen Gans. Sie nahren fich von grunen Rrautern und gang fleinen Infetten. Rach und nach mers Den fie von den Alten auf nahe belegene Biefen und endlich auf Fruchtfelder geführt, mo fie dem Getraide nicht geringen Schaden gufügen. Benn Die Alten von den noch Jungen meggefchoffen mers ben, fo fommen die Jungen oft um, wenn fie nicht zu den Jungen anderer alten Ganfe gelangen und von ben Alten angenommen werden, mo bann ein fo mitleidiges Paar, oft eine Menge Bu fuhren hat. Gobald fie fluchtig genug find, begeben fie fich von einem Gebruche, Gee 2c. gum andern und fchleichen fich fo fort. Die Merg: und Moorgans find fich einander abgeneigt und fobald fich legtere bei und einftellen, b. i. ju Un. fang September fo machen ihnen die Mergganfe Plas. Gie fliegen meift fehr unordentlich durch einander ber, boch miffen fie auch wenn ihr Bug meit geht, eine gemiffe Ordnung zu beobachten, fie machen nemlich auch ein offenes Dreied. Gie nahren fich wie Die gahmen Ganfe von allen Ar: ten des Getraides, auch Rohl, Rubfaat 2c. mos nach fie in der Abenddammerung ausfliegen und Dann oft vielen Schaden thun. Sie laffen fic auch eingefangen nudeln und merden fehr fett. Shre Maufer tritt im Juni ein, und da die Schwungfebern ber Alten fast auf einmal aus: fallen, fann man fie im Schilfe verborgen, mit einem guten Bafferhunde auffuchen und fangen laffen. Die Maufer der Jungen geht dagegen febr langfam von flatten. Jung aufgezogen begatten fie fich mit ben gahmen Ganfen und man fann fruchtbare Baffarde bavon ziehen. Ihre Reinde find Die Raubvogel, Die befondere Die Sungen beftig verfolgen; Die Adler Die Alten. Der liftige Buche befchleicht fie biemeilen auch auf dem Lande. Die Jungen haben auch mancherfei Krantheiten, wie die Jungen ber Baha men auszufleben, 3. B. Die anftedende Poden. frankheit. Sie laffen fich leichter ale Die vorigen fdiegen, auch in Sugschleifen auf ihren Beides plagen leicht fangen. Die Jungen, Die die ans grengenden Meder befuchen, fann man wenn man Den Pag nach dem Baffer verrent, mit den Banben fangen. Diefe merben fehr bald gahm. Das Wildpret der Jungen ift wohlschmedend, das ber Alten, hart und gabe. Die Federn merben wie beim porigen benugt.

Anmerk. Cereopsis Lath. den Barnakels gansen sehr ähnlich, mit noch kleinerm Schnabel, dessen haut viel breiter ist und sich etwa bis auf die Stirne erstreckt. Man kennt bis jeht nur eine Art die in Neuholland lebt. Cereop. cinerea Lath. Alschgrau, mit schwärzlichen Schwingen und Schwanz, auf der Oberseite etwas ins Braune, mit einigen schwärzlichen Schaftstrichen; Stirn, Wachshaut und Tarsen gelb, Schnabel und Pfoten schwarz.

Eigentliche Enten. (Anas. Bechst.)

Schnabel niedriger als breit, an der Bass und an feinem vordern Ende eben so breit, bismeilen auch breiter als er gegen den Kopf hin ist. Ihre fürzern auch mehr nach hinten stehenden Füße machen ihnen das Gehen unbequemer, als den Gänsen; ihr hals ist auch fürzer; ihre Luftzröhre schwillt an der Zertheilungsstelle in Knochentapseln an, von denen die linte meist die größte ist. Auf den Flügeln einen Fleck von verzschiedenen Farden Spiegel genannt. Füße 4zehig. — Eine zahlreiche Gattung nühlicher Bözgel. Die meisten haben eine doppelte Mauser, im Inni und November.

Man hat unter ihnen einige Unterabtheiluns gen gemacht, als: Lauch, : Schell, : Moors enten.

. . .

Die Sammetente. (Anas fusca, Linn.)

Unter ben beutschen Enten eine mit ber große= ften, an Rorper und Gliedmaßen, wie alle Lauch= enten plump. Ihre Lange beträgt 22 3. Die Flügelbreite 401 3. Der große Schnabel mißt von der Stirne bis an die Spige 2 3. und en-Digt fich in einem breiten ubergefrummten Da= gel. Ueber ben Rafenlochern ift ein mulfliger Soder, Diefer fammt ben Rafenlochern, Die gange Sonabelmurgel, Conabelrander und der gange Unterfiefer, bis nabe am untern Ragel fcmara: Das Uebrige Des Dberfcnabels prachtig orange= gelb, in ber Mitte vom Soder nach dem Ragel zu, ein Streif rothlich weiß, der Ragel gelbroth : Die Gris perlfarbig. Der Ropf ziemlich did, Die Stirn fehr lang, nahe uber dem Soder merflich eingedrudt. Ropf und Sals fcmarz mit fcmadem purpurfarbigen und grunen Glange, ein fleiner halbmondformiger Fled dicht unter bem Muge, und das untere Mugenlied rein weiß; das übrige Gefieder sammetschwarz, ber Spiegel

meiß. Der 31 3. lange Schwanz befieht aus 14 jugefpigten Febern. Die Spigen ber in Rube liegenden Flugel bededen nur 3 ber Ochmang: lange. Der Rorper ift bicht mit weichen elaftis fchen , braungrauen Dunen bededt. Die Farbe ber großen Beine ift hochroth; Die Gomimm: baute und Gelenke Der Beben mattichwarg; Die fpigigen Rrallen hornschwarz. Die Luftrohre eiz nes eben befchriebenen Mannchens ift febr qu: fammengefegt, der obere Luftrohrentopf ift fnos dern, febr bart, und bildet eine gewolbte lang: liche, in der Mitte geftreifte Budbfe; etwa in Der Mitte Der Luftrobre ift eine andere, ebenfalls gang fnocherne runde Buchfe, wie ein Knopf, binten, mo er an die Salemirbel grangt, mehr abgeplattet; der untere Luftrohrentopf behnt fich ebenfalls etwas rechts und links aus und bilbet 2 platte Trommeln. Die Weibchen und Jungen oben braunschwarz, Die untern Theile weißlich, graubraunichmarglich geftreift. 3mifden Augen und Schnabel und an der Dhrengegend ein weißer Bled. Ihr Baterland ift ber Rorden und Die arte tifden Gegenden beider Belten, baufig in Normes gen und Schweden. Bismeilen werden fie auch bei uns auf dem Salgfee bei Geeburg auf ihren Durchzugen angetroffen. Gie halten fich meift nur in fleinen Gefellichaften auf bem offenen Baffer auf, wenn die Gegend nicht gang ficher ift. - Rur Des Abends nahern fie fich dem Lans De und fuchen am Strande Rahrung. Heber: rafcht laffen fie beim Muffliegen ein fart tonen: Des tiefes: Arraa boren, fast wie eine Gaat: frabe. Sie tauchen gut und tief. Angeschoffen fommen fie nicht wieder jum Borfchein. Die alten Mannchen werden fehr felten auf dem Bu: ge beim Beibden und Jungen gefunden, mahr: Scheinlich ziehen fie allein. Ihre Rahrung befieht in fleinen Conchilien, Infetten und Wafferpflan: gen, mobei fie auch fleine Steinchen mit verfchlus den. Gie niften innerhalb dem arftifchen Rreife an den großen Geen. Das Reff beffeht aus Gees gras und Federn, meift unter Bachholdergebufc angebracht; Darin findet mans-10 große graulich ober gelblich grauweiße Gier. Das Fleifch hat einen etwas thranigen Gefdmad. Im Darg begeben fie fich an Die Brutorter, im Spatherbft febren fie gurud.

> Die Wammente. (Anas tobata.)

Lange 2 &. 6 3. Der Schnabel furg, platt, an ben Seiten breit. Am Mannchen eine breite,

fcblaffe und hangende Saut am Rinn. Das Gefieder glangend fcmarg, Die Flugel furg. Die Febern Des Ropfes und Salfes lang, glatt und fcmarg; Die Geiten Des Salfes mit regelmäßis gen mattweißen und fcmargen Streifen; Die untern Theile bes Rorpers braunschwarzlich glangend mit weißen Bidgadlinien, Flugel und Schwang braun; ber Schnabel, Die hangende haut und die Beine fdmarg. Das Beibchen ift fleiner, regelmäßiger weiß gestreift, Die Geiten bes Salfes bellbraun, braunfalb gefledt, feine bangende Saut. Die jungen Mannchen gleichen Den Beibchen; haben aber fcon eine fleine Bamme. Baterland: Dceanien, porzuglich bie Gegend um Ronig George Safen. Gie tauchen unaufhorlich, oft fdwimmen fie unter dem Balfer mit dem gangen Rorper und laffen nur ben Ropf feben. Bei Gefahren tauchen fie fcnell und tommen erft in weiter Ferne gum Borfcheine.

Die Kragenente. (Anas histrionica. Linn.)

Die Lange beträgt 181 3. Die Flugelbreite 261 3. - Schnabel furg, jufammengedrudt, Ragel fehr ftart gefrummt; Lange 11 3. Rafens loder an ber Schnabelmurgel und hoch oben. Das Mannchen ift ein Schoner Bogel; Sals und Ropf ift bei ibm violetschmarglich, ein großer Bled awischen den Mugen, ein fleinerer binter den Augen, ein Streif an den Geiten Des Sals fes, ein Saleband, welches halbmondformig die Bruft umgiebt, und ein Theil ber Schulterfes bern rein weiß; von ben Achseln nach ber Unterbruft geht ein zweites aber unterbrochenes Sale= band gegen die Mitte. Beide Salebander find fcmarg eingefaßt. Bon ber Stirn lauft ein fcmarger Streif mitten uber ben Scheitel gwis fchen 2 roftrothen, welche im Raden endigen. Bruff, Unterleib und Mantel dunfelfchieferblau, am Bauche mehr ins Braune fpielend; Geiten Des Bauches taftanienbraun; Spiegel duntel braun violet. Conabel fcmars, Augenbraunen, Beine ichmarglich. Burgel, Steif, Schmang= und Schwungfedern fcmarg, neben bem Schwan= ge ein weißer Bled. Beim Beibchen find alle abern Theile dunkelbraun, graulich überlaufen, gegen die Stirn und vor den Mugen ein weißer Bled, Conabelmurgel und Dhrengegend weiß; Bruft und Bauch weißlichbraun überlaufen und gefledt; Geiten braunroth. Lebt im arttifchen Rreife. In Island ift Diefe Ente ein Standpo: gel. Im Winter find fie auf dem Meere. Im Durchzuge kommen fie auch nach Deutschland. Fliegend lassen sie ein wiederholtes et — et — et — et — et beren. Erschreckt, stößt das Mannchen ein heiseres leises he aus. In Island brüten sie im Juni, sie legen 5—7 weißgelbe, kurze und dicke, 2 3. lange Eier. Sie tauchen sehr gut, ihre Nahrung besteht aus Fischen, Schalthieren, Insekten und zarten Wasserpstanzen. Schießt man einen Gatten oder ein Junges; so nähert sich der trauernde Uebriggebliebene und verzagt, slößt den Lodten an, um ihn zum Aussehen zu ermuntern, nachdem dies geschehen, schwimmt er erst fort.

E i d e r g å n f e. (Somateria. Leach.)

Sie haben einen etwas langern Schnabel wie die Schellenten, der hoher die Stirn hinauf steigt, wo er durch eine befiederte Ede wie ausgeschnitten erscheint; nach vorn ift er aber ebens falls etwas schmaler.

Die Siderente, Sidergans, Sider= vogel.

(Somat. An. mollissima.)

Die Schenkel des Schnabels verlangern fich feitlich bis zur Stirne in 2 platte Lamellen, Sus Be graugrunlich. Un jeder Geite lauft über Die Mugen, vom Schnabel ein ichwarz violeter Streif, der auf der Stirne zusammenläuft; Raden und Dhrgegend talfgrun, Baden, Sale, Schultern, Dedfedern der Flügel und Ruden weiß, Bruft meiß rothlichgelb; Bauch, Burgel, Schwang und Schwungfedern tieffchmarz, eben fo die Seiten Des Burgele und Unterleibes. Das Mannchen im erften Jahre braungrau, duntelbraun gefledt; von der Wurzel des Schnabels an lauft uber die Augen meg eine breite weißliche Binde, mit ichwarzen Dunkten. Das Gefieder des Beibdens rothbraun mit ichmarglichen Querbinden. Dedfedern der Flugel in der Mitte ichmarg, dunfelrothbraun gefaumt, über die Flugel laufen 2 meiße Streifen, Bauch und Unterleib braun und dunkelgrau mit ichwarzen Querbandern. Die Lange 25 3. Flugelbreite 454 3. Ihr Baterland ift der Morden. In Guropa die Ruften von Mormegen, Schweden, Island zc. Bisweilen verfliegen fie fich auch in unfere Gegenden. Die Luftrohre des Mannchens ift in ihrer Lange gleich weit; ber untere Luftrobrentopf wird nach vorn breiter und bildet links einen Knochenvorfprung

von fpharischer Gestalt; der untere Theil Des obern Luftrohrentopfe ift fehr vorftehend. Ge find Scheue Bogel, nur gur Brutzeit find fie als halbe Sausvogel anzusehen. Im Binter fam= meln fich alle im offenen Meere. Erfchredt ents flieht die gange Schaar. Gie tauchen vortrefflich ung fuchen auf dem Boden bes Meeres ihre Dabrung. Sie haben ein fehr gabes Leben, freffen fleine Rrebfe, Meerinfetten, fleine Mufcheln und Bafferpflanzen. Im Mai ziehen fie nach ben Brutplagen, dazu mablen fie Die Scheeren im Meere oder Inselchen. Dft findet man die Refter bicht unter ben Mauern ber Saufer. Die Infel Bidoe ift ein Sauptbruteplag. Das Reft besteht aus Geegras oder Moos. Das brutende Beibchen lagt fich auf den Giern figend, ffrei= deln. Das Beibchen rupft fich Die Federn aus der Bruft und bededt damit die Gier. Diefe Dunen merden besonders aufgesucht und oft mit Lebensgefahr aus den Felfenhohlen genommen. Es find dies die toftbaren Giderdunen, die man nur von lebenden Bogeln begieht. Man nimmt fie oft 3mal fammt den Giern, fo daß dann das Mannchen auch Federn jum Refte geben muß. Dimmt man fie aber jum 3ten Dale, fo perlagt fie den Ort und fommt das folgende Sahr auch nicht wieder. Die Gier feben graugrun, 5-6 an der Zahl, von 3 3. Lange. Den Bewohnern des Nordens bringen bie Federn an= fehnlichen Gewinn. Fleisch und Gier kann man essen, doch schont man die Bogel, um jahrlich die Federn nugen zu konnen.

& & f f e I e n t e n. (Rhynchaspis. Leach.)

Merkwürdig durch den langen Schnabel, defe fen völlig cylindrisch gebogene Oberkinnlade, am Ende erweitert ist. Die Lamellen an ihm find so lang und dunn, daß sie eher Wimpern gleischen. Diese Bögel leben von Gewürmen, die sie im Schlamme der Bachrander suchen.

Die Löffelente, Breitschnabel, Taschenmaul. (Anas clypeata. Linn.)

Lange 193. Flugelbreite 3433.; der Schnasbel 21 3. lang, von löffelartiger Gestalt, am Wordertheil bauchich 11 3. breit, in der Mitte schmaler, vorne befindet sich ein frummer Nazel; der Unterkiefer in der Mitte so gebogen, daß er da offen bleibt, wenn er vorne fest zugethan

iff. Diefe Deffnungen verfchließen fehr feine lange, tammartige Bahne. Die Bunge fehr groß und fleifdig, vorn einen fleinen Loffel bilbend und in der Mitte eine tiefe Rinne, und auf beis Den Seiten bis an Den Schlund 2 bewegliche Lappen. Bei recht alten Mannchen ift ber Gonabel glangend fcwarg, Ropf und Sale fcmarg fcon grunglangend, (entenhalfig), Der untere Theil des Salfes und der Ropf fcneemeiß. Steiß und Dedfedern bes Schwanzes grunglangenb fcmare, ber Spiegel grun. Die Dedfedern bes Blugels himmelblau, Die vordern Schulterfedern weiß. Die gange Bruft vom Ropfe bis jum Uf: ter glangend taffanienbraun. Auf jeder Geite Des Aftere ein weißer Bled. Die Beine icon gelbroth. Die Sauptfarbe Des Beibdens ift braun, ber Spiegel ichmußig buntelgrun mit meißer Ginfaffung. Diefe Ente ift auch bei uns Biemlich baufig; ein Bugvogel, ber eben nicht fdeu ift. Gie legen 7-9 Gier. Das Reft legen fie mit ihren Dunen aus und bruten 4 Bochen. Sie leben von Bafferinfeften, grunen Baffer: frautern, deren Samen und garten Grasfpigen. Sie tauchen nicht. Ihr Fleifch ift von angeneh: men Gefdmad, im herbft wie mit Bett übergo: gen. - Ihr Schnabel ift besonders Bafferinfet: ten zu fangen eingerichtet. -

Die Brandenten

haben einen nach vornsehr abgeplatteten Schnabel, der sich an der Basis in einen Socker erhebt.

Die Brand,= Rracht,= Bergente, Wihlgans.
(A. Tadorna.)

Lange 24 3.; Flugelbreite 42 3. Der 43 3. lange Comang mird von ben Flugelfpigen bis auf 1 3. bededt. Ropf und Sals febr bunfel: grun, Die untern Theile Des Balfes, Dedfedern Der Flugel, Ruden, Geiten, Burgel und Comang: murgel rein weiß; Schultern, eine breite Binde über Die Mitte Des Bauches, Unterleib, Comang: federn und Spige der Schwangfedern tief fcmarg, ein breiter Gurtel von lebhafter Roftfarbe um: giebt die Bruft, und fleigt bis auf die bobe bes Rudene; Flugelfpiegel grun purpurfarben, am Conabel beim Mannchen ein fleischiger, blut: rother Boder, bis wo die Stirne aufhort; Beine fleischfarben; Gris braun. Das Beibchen ift fleiner und hat fatt bes Boders einen weiß: lichen Bled. Es bat faft, ale Auenahme bei

Den Enten Die Farben bes Mannchens, nur mat: ter. - Der Rorden von Guropa ift ihr Bater: land; häufig in Solland und an den Ruften Frant: reiche; Bufallig nur im Innern Guropas. -Diefe Ente ift ein halber Sausvogel, ber gefchägt und gehegt wird. Das Fleifch fcmedt thrania und wird nicht gegeffen, ob fie gleich nicht von Bifden, fondern mehr auf bem Lande lebend ihre Rahrung, Die aus fleinen Conchylien, am Strande aufgesucht, aus Ufermurmern und Getraide beffeht. Dbigen Ramen hat fie mahricheins lich erhalten, weil fie fich oft am Ufer in ben Brandungen aufhalt. Den Binter bringen fie im Meere gu. Gie laufen und ichwimmen gut, tauchen aber nur angeschoffen, fich zu retten. Die Luftrobre des Mannchens erweitert fich in 2 Sohlen von inorpliger Gubftang, movon die rechte doppelt fo groß als Die linke ift. Die Jungen von gahmen Enten ausgebrutet, merben febr gahm und find bann eine Bierde der Bofe. Gie niften in Ranindenhohlen; auch bereiten ihnen Menfchen dergleichen Bohlen mit mehrern Rebengangen, Diefe merden mit Rafen jum Aufmachen belegt, Damit man taglich nachfehen und Gier und Dunen herausholen fann. Ge= fchieht es mit Borficht, fo laffen fie fich ftreis deln. Das Mannchen halt Bache und wenn bas Beibchen Rahrung fucht, brutet es. In 30 Las gen fommen die Jungen aus. Beibe Gliern fuß: ren Die Jungen ins Meer, fie lieben fie febr. Die Ginmohner jener Gegenden haben folche Entenbaue ju 9-12 Refter, mo fie 2-3 Bo= den hindurch Die Gier ausnehmen, ihnen dann aber 6 Gier gum Ausbruten laffen. Gie legen 10-15 Gier, burch bas Begnehmen legen fie aber weit mehr. Die Alten nannten Diefe Enten bes Reftes megen gucheganfe. Auf danifden Infeln giebt es Bauerhofe, Deren Bewohner jahr= lich 2 - 300 Enteneier ausnehmen; fie find groß und glangend weiß und merden von den Rord: landern fehr geliebt, fo wie die gewonnenen Dunen , womit fie Die Gier gu bededen pflegen.

Anmert. Wir gedenken hierbei noch der bestannten Bisamente (A. moschata) die fälschlich türkische Ente genannt wird, aus Amerika stammt und dort auf Bäumen nistet. Sie wird der Zierde wegen auf vielen höfen gehalten, weniger des Nustenst wegen. Begattet sich auch mit den andern Enten. Die Kapsel an der Luftröhre ist sehr groß, eirkelsförmig, senkrecht abgeplattet und ganzlich links stehend.

Die gemeine wilbe Ente, Merzente. (Anas Boschas, Linn.)

Ift ohne Zweifel bie Art von ber unfere Sausente abstammt; benn auch bei biefen wie bei jenen, hat der Entvogel einige gurudgerollte Redern auf dem Schwanze. Die Lange bes Mannchens beträgt 222 3.; Die Flugelbreite 36% 3. Ropf und Sals fdmarg, gelbgrun und purs purblau glangend, mas man burch bas Wort: entenhalfig ju bezeichnen pflegt, dies begrengt ein breiter weißer Ring , ber Ropf glangend faftanienbraun. Der untere hinterhals nebst ben langen Seitenfedern erscheinen in ber Ferne afchgrau, find aber eigentlich weiß und fein dunkelgraubraun, wellenformig in die Ques re geffreift. Die Beine find gelbroth. Die Ente ift gelbbraun und fcmargbraun geflectt. Es giebt auch unter ben Bahmen einige, welche ben Stammeltern abnlich find. Gie find übrigens bei uns gemein und finden fich in Bruchen, Geen und mit Beidengestrauch bewachsenen Graben. Bei ftrenger Ralte verlaffen fie und, fehren aber bei eintretenden Thauwetter wieder gurud. Beis te Reifen machen fie nach Art ber milben Ganfe. Mit den Flügeln bringen fie einen eignen pfeiz fenden Lon hervor, woran man fie von allen übrigen unterscheiden fann. Gie find fehr fruchts bar. Im Marg paaren fie fich; das Reft ift funftlos und befteht aus durren Blattern. Die Ente verftedt es, bamit es bas geile Mannchen nicht fieht, weil er fie fonft immer beunruhigt. In Bruden, auf ichilfreichen Geen, auf und in hohlen Beiden zc. Gie legen 8-14 große eirunde, graulichgrune Gier, Die fie mit Reftmaterial beim Begfliegen bebeden und wenn fie bruten, bededen fie biefelben mit ben am Bauche ausgerupften Dunen. Gie bruten 4 Wochen. Ift der Baum boch, fo tragt fie Die Mutter im Schnabel, eins nach dem andern aufs Wasser, mas es auch vor bem Mannchen ver= borgen thut, weil er fie nicht felten todtet. Das Weibchen beschüßt indessen mit Lebensgefahr ihre Jungen gegen Raubvogel. Im Juni be: geben fich die Mannchen auf große fcifreiche Gewaffer, um fich ba ju maufern, weil ihnen dann Die Schwingen auf einmal ausfallen und fie leicht gefangen merden tonen. Ihre Rah: rung besteht in Rifden, Frofden und beren Brut, Soneden, Bafferinfetten, Bafferpflan: zen, Samen, Getraide, im Winter Gaat, Ger= fle und hafer am liebsten. Den haferichwaden, die sie austreten und ausschlagen, sugen sie

großen Schaden gu, auch freffen fie Gicheln und Ruben. Flugellahm ziehen fie eine große Strede unter dem Baffer bin. Gegen Abend in Der Dammerung fliegen fie ihren Nahrungsmitteln nach, Die fie auf fleinen Teichen und Pfugen, Die fle durchschnattern, suchen. Den Jager mit= tern fie weit aus. Uebrigens merden fie gahm und begatten fich mit ben gabmen, fo wie Diefe mit jenen. Der Bruchweihe, Banderfalte und Sabicht thun ihm vielen Schaden; auch Mars ber und fleine Raubthiere fugen den Alten, der Brut und den Giern Schaden gu. Rur mit Lift und auf dem Unftand fann man fie erhalten. Da fie weiter riecht (windet), ale fieht, muß man fich immer gegen ben Bind anftellen. Auf großen Geen legt man Entenfange und Entens heerde an, wobei man sich zahmgemachter Lods enten bedient; auch in Schleifen am Ufer mit Getraide gefornet, fangt man fie. Die Bucht der wilden Enten gludt am beften, wenn man den gahmen milde Enten : Gier unterlegt, mo fie bann mit ben gahmen Enten aufgezogen wer= den. Um beften fcmedt das Fleifch der Jungen jur Berbftzeit. Die abgezogenen Ropfhaute der Mannchen geben ein allerliebstes Pelzwerk und die Rielen der großen Schwingen nugt man zu Pinfeln.

Die chinesische Ente. (Anas galericulata.)

Unter den Schwimmvogeln ift Dies einer der schönsten und am sonderbarften gebaute. Die beiden dem Körper zunächst gelegenen Flügel= federn auf jeder Seite haben fehr lange Fahnen, und find facherformig ausgebreitet in Die Dobe gerichtet; Diefe Federn find an ber aus Bern Geite fahlblau, an der innern icon orans geroth, fowars und weiß gefaumt und fonder= bar abgeschnitten; ihr Ende bildet die 2 Bin= fel eines Dreieds, deffen Spige der Schaft ift. Um hinterhaupt ein herrlicher Federbufch von zerschliffenen meißen, purpurrothen und grunen Federn, welche bis auf den Ruden berunter= bangen, Die Federn bes Salfes find fcmal, meniger lang und fastanienbraun in Purpurfarbe Schillernd und nach hinten abftehend. Die Stirn ift dunkelgrun, die Baden weiß und hellroft= roth; Vorderhals und Dberbruft lebhaft roftrothorangefarben, an den Seiten und unten mit 4 fammetichwargen und ichneeweißen Bandern, Die untern Theile Des Rorpers ichnees weiß; Geiten graubraun mit ichwarglichen Quer= Areifen, am Ende mit einer weißen und einer fdmargen Binde; ber Ruden braunlich orange: roth; die großen Dedfedern der Flugel meiß, an der Spige fcmars; Die Schwungfedern grau: braun, außen weißgrau gefaumt, ber Schwang braunlich; Schnabel und Beine roth. - Die obern Theile bes Beibchens find braun; Die Bebern am hintertopf etwas langer, als bie ubrigen; hinter ben Mugen ein weißer Streif, ein anderer lauft über ben vordern Theil der Baden; Reble, Bauch und die untern Dedfe: bern bes Comanges icon weiß; Bruft braun, mit ovalen weißen Gleden, an ben Geiten bell roffroth; Flugel braunlich; Die breiten Federn an ben Flügeln fehlen. - In ber Proving Ran= fin ift fie einheimisch. Un den Ruften von Japan ift fie gemein und mird bort Rinnobfui genannt. Gie fteben bei den Chinefen in bobem Werth und Dienen ale Sinnbild ehelicher Treue. Denn am Morgen der Dochzeit erhalt die junge Gattin von ihren Freundinnen ein Paar von Diefen Enten mit Bandern gefchmudt, jum Ge: fchent. Es mare ju munichen Diefen fconen Bo: gel auch in Europa fortzupflangen. Bur Fort: pflanzungezeit und im Binter brauchte man fie nur warm zu halten.

Anmerk. Noch gebenken wir; ber Brautzente. (Anas sponsa, Linn.) Diese schone Ente ist in ganz Nordamerika zu finden. Sie hat einen metallzgrünen Scheitel und herabhängenden Federbusch und eben so grüne Nüdenseite und Schwanz. Ueber dem Auge weg vom Schnabel bis zum Nacken, läuft eine weiße Linie, hinter dem Auge, darunter, eine zweite; Kehle bis zum Nacken weiß, hinterkopf und Brust dunkel violetbraun darunter zur Seite ein weißer und schwarze halbmond; hüften ochergelb und schwarzpunktirt, mit weiß und schwarzen halbmonden. Der Spiegel violetblau.

Tauchgans, Gager, Meerrachen. (Mergus, Linn.)

Der Schnabel dunner und cylindrischer als der der Enten, und in jeder Kinnlade langs deren Randern mit nach hinten gerichteten spizen Zahnen, wie bei einer Sage bewaffnet. Das Ende der Oberkinnlade hakenformig. Ihr Ansehen und felbst die Farbung des Sefieders das der gewöhnlichen Enten, aber ihr Magen weniger mustulds, und ihre Eingeweide und Blindbarme kurzer, Beine kurz weit nach hinten stehend. Die Auftreibung des untern Kehltopfes der Mannchen ist ungeheuer und zum

Theil hautig. Sie leben auf Landseen und Beihern, wo fie viel Fische verzehren.

Sie schwimmen oft mit dem Körper ganz unter dem Wasser, so daß nur der Kopf herworschaut. Es sind geschickte Schwimmtaucher. Sie fliegen lange und schness. Der Gang ist sehr wankend und ungeschickt. Sie sind auf die kalzten Klimate verwiesen und besuchen nur im Winter die gemäßigten Gegenden. Noch nie hat man sie als hausthier zähmen können. Die alten Männchen mausern im Frühjahr, die alzten Männchen und Jungen im herbst, wie die Enten. Sie legen 12-14 Gier. Um das Rest legen sie einen Kranz von Flaumensedern. Das Heisch schmeckt thranig und wird nicht gegessen.

Der Ganfesager, große Seerachen. (Merg. Merganser. Linn.)

Länge über 2 F.; Flügelbreite 2 F. 7-8 3. Schnabel 3 3., an der Spige ein großer hatenformiger Ragel. Beide Rinnladen find inwendig mit einer doppelten Reihe icharfer Bab: ne befegt die rudwarts gebogen, so scharf wie Radeln find. Die außere Reihe ift mit 30 bis 32 Bahnchen befegt, man bemerft fie von au-Ben, obgleich der Schnabel gefchloffen ift. Die Farbe des Schnabels ift zinnoberroth. Der Ragel braungrau; Die Gris hochroth. Spiegel weiß, ohne eine ichwarze Querbinde. Das alte Mann= den tragt eine Dide und furge Solle ober Fe: Derbusch. Ropf und oberer Theil des Salfes, Bruft, Bauch, Unterleib, Dedfedern der Glu: gel und die vom Rorper am meiften entfernten Schulterfedern weiß, im Leben fanft und blag aurorafarben, im Tode wird Dies bei ausgeftopften in ein schlechtes gelblich fchimmerndes Beig verwandelt. Dberruden und die gunachft am Rorper liegenden Schulterfedern fammet: fcmars; Achfeln fcmars; große Dedfedern der Blugel fcmars gefaumt, Ruden und Schwans afchgrau; Schnabel duntelroth, auf dem Schna: belruden und am Ragel ichwart; Beine gelb: roth. - Ropf und Dberhale bes Beibchens ift braunroth, am Ropfe ein Federbusch von langen zerschliffenen und fehr fcmalen Federn, Reble rein weiß; die untern Theile des Rorpers graublaulich; Bauch und Unterleib weißgelblich; alle oberen Theile des Rorpers dunkelafchgrau; Spiegel weiß; Conabel mattroth; Gris braun; Beine rothgelblich. Baterland die arftischen Gegenden der beiden Welten, im Commer befon: bere auf fußen Gemaffern in der Rabe des Meeres; im Berbft in großen Chaaren auf dem Meere an den nordlichen Ruften Europas. Celten tommen fie in unfere Gegenden. -Die Luftrobre bat beim Mannchen 152 Ringe, ift etwa von der Dide eines Schwanenfiels und bat 2 Ermeiterungen, movon Die erfte großer ale die zweite ift, ebe fie in die Luftkapfel fallt, Die ihre 2 Luftrohren : Mefte in Die Lungen vertheilt. Die Beibden haben Diefe Ermeiterungen nicht. Die Stimme ift ein helles Rnar: ren. Es find icheue, milde, fluchtige und un: rubige Bogel. Der Flug ift fonell und mit pfeifendem Geraufch begleitet. Gie tauchen gut und bleiben oft 2 Minuten unter Baffer, mo fie Fifche verfolgen, die ihre Sauptnahrung aus: machen, aber nur wie ein Finger lang, von ihnen perfchludt merden tonnen. Frofche hohlen fie aus Dem Schlamme, wo fie übermintern, hervor, Desgleichen auch Infetten. Gern niften fie am Ufer reifender Gluffe, zwifden Roufteinen, in Felfenlocher und in hohle Baume. Das unfunft: lich gebaute Reft befteht aus Genifte, man fin: Det darin 12-14 fast an beiden Enden gleich Dide, weißliche Gier, Die fie in 4 Bochen aus: bruten follen. Die Gier find geniegbar, bas Bleifc aber ift thranig ; fie fcaben ber Fifchzucht.

Der langschnäblige Säger, gemeine Seerachen.

(Merg. serrator.)

Die Långe beträgt $22-23\frac{1}{2}$ J. Die Breite 33-36 J. Gewicht 2 Pfd. Der Schnabel $2\frac{3}{2}$ J. Die Form des Schnabels hat er mit vorigen gemein, nur eine größere Anzahl Zähene in der untern Kinnlade, denn in einer Reis be sind oft 42-50, in der obern sieht man aber gewöhnlich nur 34, gleich Nadelspissen scharzfer Zähne. Der Schnabel zinnoberroth, auf der Mitte des Oberkiefers der Länge nach ein schwarzer Anstrich, der bei Jungen nur braun ist, der hakenförmige Nagel graubraun. Kopf, Federbusch und der obere Theil des Dalses schwarzerun glänzend (entenhalsig), beim Mann:


den am Salfe ein weißes Saleband, Bruft roft: braun mit schwarzen Fleden, bei ber Ginlentung der Flugel fteben 5-6 runde, weiße Flede mit fcmargem Saume; Flugelfpigen weiß mit 2 ichwarzen schmalen Querbinden; Dberruden und Schultern tief schwarg, Bauch weiß; Schenkel und Burgel mit graulichen Bidgadlinien; Beine orangeroth. - Beim alten Beibchen finb Ropf, Federbufch und Sale roftbraun; Reble weiß; Borderhale und Bruft grau und meiß gewolft; Die obern Theile und Geiten dunfelgrau, Die untern Theile weiß; Ochnabel und Beine matt brangefarben, Gris braun. Morden von Guropa und Affen ift ihr Baterland; im Winter haufig an Sollands Ruften, auch auf den Fluffen und Geen im Innern der Comeig, meift Junge, alte Mannchen find wie beim vori: gen felten. Rommen oft icon im Rovember an, und gehn im Marg wieder gurud. Er hat in feiner Lebensart mit vorigen viel gemein. Beim Blig der Gewehre taucht er fo fcnell unter, daß man ihn felten trifft. Im Berbft findet man fie in Schaaren. Der Flug ift fchnell, man hort dabei ein pfeifendes Getofe. Die Stimme ift ein helles ichnarrendes Rorr. Todt: lich verwundet taucht er unter und fommt nicht mehr zum Borfcheine. Die Luftrohre ift von mittlerer Lange und gleicht an ihrem obern Theil der des vorigen Sagers. Die Rahrung und Die Art fie gu erhaschen, hat er mit bem Ganfefager gemein. Gie niften in Morden, 3. B. in Jeland auf fugen Landfeen und Tei= den Anfange Mai. Die 7-12 Gier find fdmu: gig weiß, fie liegen in einem blogen Loche auf der Erde, Das mit durrem Grafe ausgefüttert und mit Tedern umfrangt ift. Im Juli find Die Jungen meift ausgebrutet. Das Beibchen fuhrt fie und ruft fie bei Gefahren durch ein lautichnarrendes: err gufammen. 3m Gep: tember ichmimmen fie ichon mit ber Mutter in den Buchten umber. Auch an der pommerfchen Rufte hat man fie brutend gefunden. Gier und Dunen, wie bei Borigen, werden benugt. Schaden auch der jungen Fischbrut.


Druckfehler.

Seite 31, a, 3, 8, von Unten I. nahren will. — S. 89, b, 3, 3, von Oben, pragnt I. prangt. — S. 98, a, 3, 5, von D. 1. wegen des lichten Grundes. — S. 100, b, 3, 9, v, D, über den I. über dem. — S. 127, a, 3, 10 v, D, weise I. weiße. — S. 130, b, 3, 7 v, U. dem I. den. — S. 138, a, 3, 10 v, U. findet I. finden. — S. 149, b, 3, 25, v, D. dem I. denen. — S. 160, a, 3, 5, v, U. Ginfaumlung I. Giersammlung. — S. 161, b, 3, 10, v, D, Gine I. Gin. — S. 218, b, 3, 17, v, U. vor das Loch I. vor dem Locke. — S. 232, b, 3, 13, v, U. Schänzen I. Schwänzen. — S. 245, a, 3, 29, v, D, Kieß I. Wieß. — S. 255 b, 3, 17, v, D, Kürste I. Kieß. — S. 279, b, 3, 3, v, D, Ktoofe I. Kloake. — S. 283, b, 3, 2, v, U. u. I. nur. — S. 302, b, 3, I v, U. gen I. Holzungen. — Rebelkrähe statt Nebelkrähe.









· Tuf 4. Der schmuzige Ausregel. Der große Condor






Jagdfalke altes K.





9 Der Jagetfalhe (Weischen) 10. Der Würgfalhe (attes Weischen)





u Lec Wurgfalke (Sunges Manchen) 12 Ler Saulen futhe attes Manchen)







Taubenjalke ultes W.



Lerchenfalke attis. 16.









Thurmfalke M.









Dir Minuller alle 4.



Jaf. 12.



Steinadler jung Me





Der Königsadler utt. W.











Sceadler jüngers M.





Fieldle't attestreitschen


















1 Der gemeine Sperber 2 Rother Milan 3 Rothbrauner Milan





, Kornweihe n. Miesenweihe au 3. Rohrweihe n







Juj 21





. Restfarte Weihe







Tay 24.



. prican Hranichgeier





Du mittere Chrente.







. Schleurente









Der Schuhu











Der Lwergkaulz



Die Schmeenle











Der Deurgkautz





1. Der große Würger München 2.3. "kleine Würger 2M3M





1 Rethkopfiger Warger 2 jung Vog. 3 Rothrickiger , ,







t Der gehelmle Würger ? "Pilangua



- Try . i.i




Huhnenschwanz Fliegenfanger



Fadenschwänziger Miegenschnapper









Gehaubter Tangara.













Schieferblauer Drymephile













Blauer Sc<mark>hn</mark>apper.





11/11 Ringdrossel: Man Kungdrossel, jung thio Alpendelile Man



· 14/10





· 14 16








Blaukehlchen Was

. Blaukehlchen Man





Gartenröthling Man



Hausrothling. was. Man.



Jul 1.9





Suf. 50 · Sperbergrasmücke 1.M2 mgV · Sangergrasmücke 3.114W



14.51

Jackengrasmicke M. Dernyrasmireke Herbstr. ornojasmucke M


De Zaungrasmiieke sr.



1. 1.52

Tenerköpfig Goldhahnchen 1. M. 2. W. s. jung Vog.









Brachpieper Monchon.













(Jaf. 57.














(/4/59.





Die Felsenschwalte.
















Die Feldlerche



Die Hanbenberehe






Lie Keidelerche. 1. Berglerche Mäuchen. 1. junges Weitschen





1. Lie kurzgefliegelte Gerche. 2. Kalander . .





1 Die Kohlmeise M 2 Die Tannenmeise M
3 . Haubenmeise M 1. . Sumpfmeise M






Lie Blaumeise 1. Mann. 2 jung 109.

Lasurmeise 3 M.

Schwanzmeise 4 M. 5 junger W. 6 jung 109.





Die Beutetrehrmeise. 1.11. 2.103 jung Poget. 4. Lie Bartrohrmeise.











a, Die Schneespornammer laum 2.m. 3. ote W. 6. Kappenammer. M





Der Haus sperling.



Der Feldsporling





Der Buchfirek Manchen



Der Schneofink








Juj. 13 Der Erlinzeisig M Der Erlenzeisig W. Ler Detronenzeisig. Ter Girlitzhanfling W. Der lanurienvogel. Ler Girlitz hanfling M.



Juf 14
















Hiefornkruterschnabel 1 M. 2 jung M. 3 H.





: lufin Dev Rosengimpul Der indische Regelschnabel Der Harmingimpel









Der gem Slaar 1,11. 2 W



Der Holkrabe. M.









Die Nebelkrähe





Die Tehle



Die Setelkrähe.



Die Elster.





















· Tuj 68.



Der sechsfadige Taradiesvogel.









Der spitsehwärz. Langklauer.







Der Mauerspecht.





Juf 14. Der grüne Honigsauger.



er grasgrine Colibri Der gefleckte Colibri.

Per stahlglanzende Colibri.



Juj .94.



Der prächtige Colibri.











Ler Wiedehopf 1.M.2W.




















Der heiliger Plattschnabel Eisvegel



Dr dreizehige Eisrogel.





















Juj 1114 se Buntspeckt.









· 1/4 100:





· 1/1/ 11/ Hickuck. Der Glanzkuckuck. Les rethaujige Com



. Tuy 108:





Der weißschnablige Etnzeiger







Ler davaw.clische Karaka Ler Tjanen. Ruruku.









1/1/112





Der Arakarim gefurcht. Tehnubel.
























Der grüne- Musafrefser. Der rethhaubige Musufrefser







Lev quianische Tieres












Der Parraqua!

















nd der Sonnerats Hahn Der kupferfark Flahn Der Flahn v Bankiva









,

.

.

•

· .

,

Juj 1:8 Der glanzende Buschfasan

Den Jamen . . tracis.





Las.



Das Mittel Wildlich



Juj. 130.



Das europ. Hasethulin. 1 1. 2 1.







· Try 1st



Lichtensteins - Ganga














Der isabellfarbige Tinamus. Das streitsachtige Laufhuhn:



Der dunkle Tinamus




Ter kleine Tinamus.





Die Kronentaube.



Die Nicobarische Hahnertaube.





Die Ringeltaube 1. Mañ. 2. jung 19








Die Hobstaube 1 Min 2 jung to






Die Trommeltaube




Die Monchtaube.





Die Fauentauber



Die Turzettaube.






Lie turkische Taube.









Die Lachtauber





Die Felsentaube IM. 2. V.





Juj. 14









Ler africanische Araups.






Der americanische Strauß.








What rollaintign Winger, Humdolter, Los Roys and Kingal Into Manny and aff Just Minter bearingsof, In South fignery or funds. - Sai San mais from ment fringen










Der grosse Halsbandregenpfeifer Der kl. Brachvogel:




Der schwarzbauchige Riebitr 1. som 2 Wint































. Tuf 156 8 Der Laufreiher Der afric Nimersatt. Ler weiße Löffelreiher



. 14/ 1.52 The state of the s Der heilige Flis. L'ar braune His.




· 1/19 138 Der rothe His. Lar große Bruchvogel.









1 Ler rostrothe Tumpflaufer 182. 3 Ler Twergstrandlaufer. 4 Ler Kampfhahn













Jul 163





Lie punktirte Rolle. Ter Hachtelkoenig.













· Luj 166



Ler rothe Hamingo.



Juf 167



Der Chrentaucher.

Das surinam : Taucherhuhn.





Die Brunnichische Gumme Das kleine Turcherhuhn.




· Lug with





· 1/19/110



Der göldhaar Sprungtaucher Der gefleck Floßtaucher



Jug. 111 Die kleinste Sturmschwalle Lie Berardische Sturmlumme. Ger Eissturmvogel. Der nordische Hurmtaucker










Die Schmarotzer Raubmeve!




Juf in












Juf.17. Der weiße Tolpel! Der rothschwänzige Tropikvogel For schwarze Inhinga.





Juj 118 Der Hockerschwan. Der schwarze Schwan Der Singschwan:












Die Brandente i.M. 271. Die gem wilde Ente 1 Min 2 West.



· Luf 182.







Der langschnablige Jueger.





